




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
100470





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1604/D



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
T604/D



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
10640

1604

17113

2 H

II


N. 01


B 1


L


9


301














IN HOC VOLVGINE CONTINENTVR
VALERII CORDI SI-
mesusij Annotationes in Pedacij

*Dioscoridis Anazarbet de Medica materia libros V. longè aliæ quàm an-
tè hac sunt euulgatæ.*

EIVSDEM VAL. CORDI HISTORIAE STIRPIVM LIB. III. POST
humi, nunc primum in lucem editi, adiectis etiam Stirpium iconibus: & breuissimis Annotatiunculis.

SYLVA, qua rerum fossilium in Germania plurimarum, Metallorum, Lapidum & Stirpium aliquot vario-
rum notitiam breuissimè persequitur, nunquam hactenus usæ.

DE ARTIFICIOSIS extractionibus Liber.

COMPOSITIONES medicinales aliquot, non uulgares.

HIS ACCEDVNT

STOCC-HORNII ET NESSI IN BERNATIVM HELVETIORVM DIA-
tione montium, & nascentium in eis Stirpium, descriptio Benedicth Aretij, Græcæ & Hebræicæ linguarum
in schola Bernensi professoris clarissimi.

ITEM

CONRADI GESNERI DE HORTIS GERMANIAE LIBER RECENS,
una cum descriptione Tulipæ Turcarum, Chamæcerasi montani, Chamæmespilii, Chamænerij, & Conizoidis.

Omnia summo studio atque industria doctiss. atque excellentiss. uiri CONR. GES-
NERI medici Tigurini collecta, & præfationibus illustrata.



Cum Gratia & Privilegio Cæsareo ad annos octo.
M. D. LXI.

Le Cogen 1590

francesco ad 1600



E. LIBRIS
GULIELMI NORTH
A. M.
SID. COLL.
CANTAB.

Inclyto & Spectabili Collegio medi-

CORVM IN ILLVSTRI ACADEMIA VVITEBER-

genſi, CONRADVS GESNERVS Medicus & Philoſophiæ interpres in ſchola Tigurina ſalutem
& pacem Chriſtianam P.



VALERII CORDI SCRIPTA QVAECVNQVE COL-
ligere potui (clarissimi uiri & medici præstantissimi)
ut in publicum tandem ederentur cum adornassem nu-
per, & singulos libros singulis patronis, illis ferè à qui-
bus aliquos eorum acceperam, dedicasse: Primum
qui eius in Dioscoridem Annotationes continet, in
Iohannis Rallæ pharmacopolæ Lipsensis auunculi es-
tius & studiorum promotoris benignissimi, nomē in-
scripsi. Paulò post uerò cum intellexi, optimum illum uirum, ex hac mor-
tali uita nobis sublatum esse, ne suo patrono priuatus hic liber, nullo aduers-
sus calumnias protectore muniretur, non illum solùm, sed pariter omnes ei-
us lucubrationes (quanquam singulas, ut dixi, singulis etiàm patronis dis-
caui) inclyto patrociniò uestro commendare iuxta & nuncupare uolui: Idq̃
non leues ob causas. Cum enim tota Academia uestra, omnium quas Ger-
mania nostra habet, omni doctrinæ sacrae humanæq̃ genere excellentissi-
mis doctoribus, longo iam tempore, facile principatum obtinet: tum me-
dicæ facultatis Collegium nobilibus eruditione & uirtute professoribus
floreſcit. Huius autem cum aliquando alumnus atq̃ discipulus multis, ut ac-
cepi, annis Val. Cordus fuerit, (quamuis & Lipsiæ interdum, non paucis
mensibus hæserit) omnes eius ingenij foetus, ad eandem Facultatem ueluti
parentem, quæ procul dubio ijs iam quasi pupillis, materno amplexu reci-
piendis, ac fouendis benigna sit futura, remittendos iudicaui. Nam & CL.
V. Vitus Vinshemius, Cordum nostrum olim audiuisse amasseq̃ fertur,
& Casparus Peucerus, magnificus nuper Academiae uestrae Rector, medi-
cus ac philosophus summus, Phœnicis illius Melancthonis gener, notum
charumq̃ eundem quin habuerit, non dubito: & alij fortè, quorū nomina
ignoro. Mihi quidē, si fortassis miramini, nulla unquā cum Cordo uiuen-
te notitia interceſſit, sed singularē in materia medica doctrinam, ab eius obi-
tu, predicari cum audiuissem, & iam aliquos ab Euricio patre editos libros
auidiſſimè perlegissem, nescio quē intra me cōsentientis naturę uis, ad illum
amandū me pertraxit. Pulchrè Homerus: *ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον.*
Minus uerò mirū est similitudine quadam tacitoq̃ cōsensu animos uiuen-
tium trahi iungiç. Sed à defunctis quoque ad eos qui supersunt admiran-
dæ huiusmodi conuenientia & coniunctionis ingeniorum fomites mana-
re, magnam sanè admirationem meretur: & ineffabilis quædam ἀπόρροια
(ut Democritus forsan loqueretur) aut σύρροια hæc esse uidetur. Σύνωνος δὲ
δοκῆς καὶ σύρροος ἔστι μόνον ὁ μικρότερος κόσμος κατὰ τὸν Πλάτωνα ἀρχηγὸν ἱπποκράτη: ἀλλὰ
πολὺ μάλλον καὶ πρότερον ὁ μέγας, ὁ τὸ ὅλον ἀρχέτυπον: καὶ τὸ τό γε ἔχ' ἥ τ' οὐ κατὰ τὰς
a η

PRÆFATIO.

ἡ ἄλλος καὶ νοεῖς, ἢ τὰς γύλους καὶ αἰσθητὰς φύσεις. Sed hæc forsan nimis philo-
 phice: & Deo potius quàm naturæ συμμάχου tales acceptæ sunt ferendæ.
 Ego certè, qui Val. Cordum de facie nunquam uidi, nec ulla naturali aut
 ciuili occasione illum habui coniunctum, occulto quodam animorum
 (Αὐτόματος δ' ἀγαθὸς ἀγαθῶν πρὸς ἑρῶτας ἵενται) & mira studiorum consensione,
 excitato in eius manes amore, modis omnibus, quæcunque literis manda-
 uit conquirenda, exornandaque, cum aliàs, tum iconibus Stirpium addi-
 tis, denique edenda ac defendenda per me, & alios optimos doctissimosq̃
 patronos, quorum uos principem locum tenetis, mihi proposui: idq̃ ma-
 gna ex parte consecutum me spero: eoque nomine Deo immortalī gratias
 habeo: & præstantias uestras, ut mihi, si audacius feci, ignoscant, oro. huius
 enim audaciæ præclarus nostro sæculo Norimbergæ medicus Hierony-
 mus Heroldus Lipsensis, mihi suator fuit: Cuius consilio ut procliuus ille
 meus in Cordum amor, sic erga uos obseruantia, facile subscripsit. Cordi
 autem eiusque librorum patrociniū, alacri paratōque animo uos susce-
 pturos, adeò non diffido: ut multis ad id uos cohortari superuacaneum
 putem. Non equidem omnes eius opiniones defendendas dixerim, ut ho-
 mines sumus: sed eas quæ ueritati consonæ uidentur, ut sunt pleræque: &
 ipsum in genere optimi iuuenis eruditionem, industriam & conatus, eius
 denique famam & gloriam, quam meritis est amplissimam. Recentiorum
 certè nonnulli ex inuentis scriptisq̃ Cordi partim editis, partim non edi-
 tis, & profecerunt, & sua exornarunt scripta, nullo id candore confessi: id
 quod mihi, qui suam cuique laudem tribuendam censeo, non parum do-
 luit, nec minima, ut de operum eius editione cogitarem, causa hæc extitit.
 Nuper doctissimus amicus meus de hisce Cordi libris, his uerbis ad me
 „scripsit: Velim te in præfatione operum Val. Cordi ipsum excusare, quòd
 „ultima manus eis non sit adhibita. Profectus enim in Italiam, Romæ febrī
 „ardente extinctus est: cum plurimas per Italiam stirpes obseruasset, & mul-
 „ta in Annotationibus in Dioscoridis libros emendasset: quæ omnia per
 „studiosos quosdam medicinæ fuerunt surrepta. In multis quidem ipsum
 „sententiam mutasse affirmauit mihi piæ memoriæ uir Cornelius Sittardus
 „medicus, socius & comes peregrinationis eius, atque etiam morbi. nam e-
 „uaferat ex morbo per quartanam. Sic ille: qui hoc etiam significauit, anno
 „superiore, Valerij fratrem medicum Hildeshemij, chemisticæ artis & re-
 „mediorum quæ arte illa ad medicinam parantur peritissimum, diem suum
 „obijisse. Digna mihi certè quamuis imperfecta, Cordi scripta, quæ lucem
 „publicam uiderent, & ad posteritatem transirent, sicut Augusto olim Ver-
 „gilij Æneis, uisa sunt. Nam uel inchoata peritorum artificum opera, impe-
 „ritiorum operibus, quibus ultimam illi manum imposuerunt, meritò præ-
 „feruntur. Etsi uerò innumera à Cordi obitu ad hunc usque diem, circa ma-
 „teriam medicam, quæ ipsum latuerant, inuenta sunt, plurimis passim uiris
 „eruditis in amœnissimum hoc studium magna cum æmulatione incum-
 „bentibus: Summa tamen hæc illius laus est, quòd inter primos fermè sæculi
 „nostri harum rerum inuestigatores, permulta inuenerit, paternæ omnino
 „eruditio.

PRÆFATIO.

eruditionis & gloriæ hæres. Nam, si quid ego iudico, pater eius Euricius, uir omni genere doctrinarum cultissimus, medicus peritissimus, & poëta optimus, dum uiueret, neminem in erudita Stirpium cognitione parem habuit. Patris uerò in materia medica studium & industriam æmulatus filius, etiam superauit: patris ad summam hanc laudem exemplo, iuuenili feruore, ingenij dexteritate, honestæ gloriæ studio, peregrinationibus multis & longinquis, labore & industria maximis, denique singulari gratia Dei præeunte & continente reliquas causas omnes, excitatus, adiutus atque promotus: ita ut inter primos, principes & præcipuos quosque reuocatus ab omni antiquitate, ornataque & aucta Stirpium ac totius medicæ materiæ cognitionis, authores & assertores cenferi ac celebrari apud omnem posteritatem sit commeritus, neque uir bonus aut eruditus quisquam hanc ei gloriâ intidere debeat, aut possit. Quod si Deo placuisset, diutius in hac uita eum relinquere, nemo omnium hodie, qui rei plantariæ cognitione excellunt, (pace ipsorum dixerim) hanc palmam ei præiperet, non magis quam Herculi extorqueret clauam. Huius igitur Academiæ uestre tanti discipuli, libros per me adornatos & editos (ne uel interirent, uel ab hominibus ambitiosis & alienæ gloriæ insidiantibus premerentur,) ornatissimi & doctissimi uiri, serena fronte, placidoque uultu suscipite, & quoad eius fieri potest, & par est, in clientelam receptos defendite:

mèque amantissimum obseruantissimumque uestri re-

damate. Valere: Tiguri. tertio Cal. Iunij

anni M. D. LXI.

CON. GESNERVS MAGNÆ SPEI IUVENI

N. IOANNIS RALLÆ PHARMACOPOLÆ LIPSENSIS, FOE-
licæ memoriæ, filio S.



VCTAS ET EMENDATAS AB AVTORE, VAL. CORDI IN
Dioscoridem Annotationes, meo studio edendas, optimo &
præclaro in arte sua viro Ioan. Rallæ parenti tuo, Cordi autem
auunculo, nuper dedicaram: ne uidelicet posthumus liber, qui
nunc uigesimo ferè anno à conditoris sui obitu in publicum prodit, inter
tot Momos & alienæ gloriæ fucos, sine tutore aliquo appareret. Equum
autem uidebatur, ut liber ab eo mihi communicatus primum, (hunc enim
ad me mittendum à parente tuo, ni fallor, Ioan. Placotomus insignis me-
dicus accepit,) ad ipsum reuerteretur: præsertim cum maximam studio-
rum suorum partem libri author, eius ex sorore nepos, ipsius benignitati
promotionisq; ut fama prædicat, acceptam referre solitus fuerit. His causis
etiam tertia accedebat, quòd in simplicibus medicamentis dignoscendis,
summa parentis tui industria ac eruditio esset: id quod & alijs argumentis,
& misso ad me olim cultissimè horti uestri locupletissimo Stirpium cata-
logo, facillè cognoui. Neque me latet multa egregia medicamenta, pharma-
copolis & medicis plerisque ante ipsum incognita, ab ipso primum uestra
in regione demonstrata fuisse. Itaque inscriptam in eius nomen dedicatio-
nem primæ huius Cordi operum partis, ante paucos menses ad typogra-
phum miseram, nullo mihi domi exemplari seruat. Paulò post uerò si-
mul & optimum parentem tuum, fatis concessisse: & dedicationem meam
in uia, nescio quorum hominum perfidia, intercidisse intellexi. Illam qui-
dem sibi non ingratam fore per benignis ad me literis, paulò ante mortem,
iam significauerat pater. Quòd si exemplar mihi superfuisset, omnino
idem denuo ad typographum misissem excudendum. Vera enim solidas
que gratitudo, non erga uiuentes solum, sed etiam defunctos, suum tuetur
ac seruat officium. Et sanè doleo ita contigisse. memini enim de Cordo in
epistola illa quædam me protulisse, ab amicis accepta, quorum non amplius
recordor. Ne uerò sine patrono in manus hominum, quorum plerique
alienis laboribus utcumque elaboratis, obtreçant & insidiantur, liber hic
imperfectus perueniret, unius defuncti loco plures excellentissimosque pa-
tronos delegi, totum nempe in illustri Academia Vultebergensi medi-
corum Collegium: qui omnes hosce posthumos Cordi libros, tueri ac fo-
uere, ut equidem spero, dignabuntur. Tibi autem priuatim, egregij patris
optime fili, has in Dioscoridem Annotationes nuncupare uolui, ut sicuti
unicus ab eo filius es relictus, annum ætatis, ut audio, uix decimum sextum
agens, ita ut ad paternæ etiam gloriæ, industriæ, doctrinæq; fastigium aspi-
res, te cohortarer, & currenti (quod aiunt) calcar adderem. Id si, ut coepi-
sti, facere pergas, spes iusta est, te quoque ad longam, patris instar, senectam,
animo corporèque ualentem, domi tandem inter tuos, similiter piè placis-
deque, tuo fato functurum, & ad uitam migraturum meliorem. Quod
quidem

quidem ut nobis, & omnibus Christum profitentibus, feliciter eueniat, is ipse Dominus & Præceptor noster, unigenitus Dei æterni filius largiatur. Nos interea inter tot tantæque miserrimæ huius & ancipitis uitæ discrimina, ad tantum certamen nos præparabimus, ac meditabimur mortem: cuius exempla in omni ætate, fortuna, ualitudine, quotidie præter omnem expectationem uidemus. Nam uel ex amicis, quibus aliquos huius uoluminis dicaueram libros, perbreui sanè tempore, non solum parens tuus, iam senex: sed etiam Philippus Bechius medicus eruditione præcellens, in uigore ætatis, cum hæctenus semper optimè ualuisset, Basileæ: & iuuenis omnino Caspar Collinus pharmacopola non uulgaris, apud Vallesios, obierunt. Meditemur igitur communem omnium finem, ne nos miseros inopinatò opprimat. Vale, & me ama: meque uicissim tui amantissimum fore, propter Cordum præcipue cognatum tuum, quem uides quantifaciam, tibi persuadeas. Tiguri Heluetiorum, anno Salutis M. D. L X I. Calendis Augusti.

CON. GESNERVS CANDIDO
LECTORI S.

DICTISSIMAE UTILISSIMAEQUE ISTAE VAL. CORDI Annotationes in Dioscoridis libros V. plurimùm ab ipso authore, paulò ante mortem eius, emendatæ (asterisco * ubi aliqua super genuina lectione dubitatio, aut aliquid imperfectum erat adiecto) auctæq; ab initio operis usque ad Libri II. Caput C VIII. (quod est de Hordeo,) nunc primùm prodeunt. Inter quæ etiam pulcherrimæ sunt de Succini, deq; Sacchari natura disputationes. Quæ uerò deinceps sequuntur, quoniam ab authore morte præuento, absolui non potuerunt, ex prima editione, (quæ scripta ab eo antequam in Italiam uenisset, Francfordiæ olim publicata est, cum Gualtheri Riffii Dioscoride,) continuauimus. emendatiora tamè ea quoq; & explicatiora dedimus, cum aliàs, tum ex breuissimis quibusdam ipsius Cordi (aut ex eius ore exceptis) in V. Dioscoridis libros Annotationibus manuscriptis. Hoc nò dissimularim, nonnulla quæ superflua mihi uidebantur, & nihil quam oneratura lectores, (ut capita quædam in Libro secundo, super aquatilibus quibusdã animantibus, Cordo, aliisq; eo tempore per Germaniam eruditis, adhuc incognitis,) penitus à me recisa esse: quòd non solum utile nihil ex professo, sed ne obiter quidè continerent quicquam. In Capitum distinctione magna est uarietas: nos ferè iis numeris notauimus Capita, ut in Jac. Goupyli Dioscoridis editione Græcolatina Lutetiæ anno 1549. edita habentur. Notha quædam in Dioscoridis libris addita uel omissa, Capitum uarietatem fecerunt, &c. iis nos aliquando nullum numerum apposuimus, ut cum Goupyli editione nobis conueniret. Porro omnia ubiq; rectè dixisse & iudicasse Cordum, ego mihi defendendum non sumo: nec libuit meas censuras ubique addere, etiam ubi potuissem: nam in multis ne potuissem quidem.

QVI NAM SCRIPTORES DIOSCORIDIS DE MEDICA MATERIA libros, & quomodo explicauerint. De nonnullis, quàm qui hodie uiuunt, liberius iudicabunt posteri.

AMATVS Lusitanus medicus, primùm Ioan. Roderici Castelli Albi Lusitani nomine, in duos priores Dioscoridis libros, commentarios quosdam edidit: deinde rursus Amati Lusitani nomine Enarrationes in quinque Dioscoridis libros: quæ

Venetis primum excusæ sunt, mox Argentine apud Vuendelinum Rihelium, anno 1554. in 4. Nomenclaturas rerum in uulgaribus linguis, Italica, Hispanica, Gallica & Germanica adiecit. Totus ad rerum cognitionem inclinat: in quibus multa quidem bona & rara docet: sed non raro etiam aberrat. Multa aduersus errores eius Matthiolus nuper scripsit. Audio eum emendasse plurima, & nouam editionem moliri. Vide etiam infra in R. Constantino.

ANDREAS Lacuna Segobiensis, medicus Iulii III. pont. max. Annotationes in Dioscoridem iuxta uetustissimorum codicum fidem elaborauit: quas Gul. Ro-uillius impressit Lugduni 1554. in 16. In præfatione scribit se Dioscoridis libros in Hispanam linguam uertisse, & scholiis minimè poenitendis illustrasse. (Eum codicem Antuerpiæ excusum audio cum iconicis figuris.) Quo labore, inquit, dum fungerer, annotaui septingentos uel plures locos, in quibus author ille, partim peruersus ab interpretibus Latinis, (in Ruellii quidem translationem potissimum animaduertit:) partim mutilus ac truncus, partim genuina sua priscæq; destitutus dictione, conspiciebatur: quos omnes quam accuratissimè fieri potuit, castigauit, ac restitui, adiutus antiquissimo ac integerrimo codice manuscripto, &c. Nuper etiam libellus quidam huius authoris, duabus (si bene memini) chartis conscriptus, aduersus Cornarii Dioscoridis librorum interpretationem editus est.

BARTHOLOMAEVS Marantha Venusinus medicus, condidit Methodi cognoscendorum simplicium medic. libros tres, eleganter profectò & eruditè: quos suis typis publicauit Vincentius Valgrifiuss Venetiis, anno 1559. in 4. Hi ad Dioscoridis innumera loca rectè intelligenda utilissimi sunt: ut cōmentarii quidam in eius libros, non grammatico tamen, sed philosophico more instituti, uideri queant. Promittit autem ex professo etiam in Dioscoridem commentarios: quos ualde desideramus.

BENEDICTVS Textor Segusianus, medicus per eruditus, libellum De stirpium differentis ex descriptionibus Dioscoridis, utili sanè & pulcherrima methodo digessit. Is in Gallia primum prodiit: deinde Argentinae apud Vuendelinum Rihelium Hier. Tragi Stirpium historiarum coniunctus.

CONRADVS Forerus Vitoduranus, iuuenis doctissimus, amicus noster, easdè, ut Benedictus Textor Stirpium differentias digessit, non quidem è Dioscoridis solum, sed etiam Plinii & Theophrasti editionibus. Nondum excusas puto.

CONRADVS Gesnerus. Lege in Oribasio.

FAVSTVS Longianus Dioscoridem in linguam Italicam ante P. Andream Matthiolum conuertit.

GUALTHERVS Riffius Argentinensis, ante decennium (circa annum Domini 1548.) si probè memini, defunctus, Dioscoridis libris à Ioan. Ruellio translatis, imagines crassiusculè factas, & breues explicationes adiecit: quas Christianus Egenolphus impressit Francoforti, anno 1549. in fol. unà cum Valerii Cordi nostri in Dioscoridem annotationum editione prima, sicuti diximus. In iis quidem nihil ferè suum adfert: sed aliorum fermè scripta repetit, satis breuiter.

H. B. P. medicus nescio quis, neque enim aliter quam tribus his literis innotescere uoluit: Annotationes breues singulis Dioscoridis capitibus ex interpretatione Ruellii subiecit, Adiectæ sunt etiam icones, perparuæ & crassiusculæ. Balthasar Arnolletus excudit Lugduni 1550. in 8. In exprimendis (inquit) simplicium facultatibus & forma, Galenum secutus sum: in priuata uerò simplicium censura, eximium illum & eruditione & perspecta diligentia Matthiolum reddidi, &c.

HERMOLAUS Barbarus patritius Venetus, uir eruditionis nomine nunquā satis laudatus, Dioscoridem nobis primus Latinū reddidit, elegantissima quidem & Pliniana dictione: ubi tamen accusatur, quòd nimio Plinium imitandi studio nunquam à Dioscoridis sententia recesserit. Adiecit etiam Corollarium longè doctissimum, & uariū argumenti, quo non Dioscoridem solum & rem medicam illustrat: sed simul utranque linguam & omnem philologiam pulcherrimè exornat.

Diosco-

Dioscoridis librorum interpretatio una cum Corollario, impressa est olim in Italia: Corollarium uero duntaxat in Germania Argentinae apud Ioan. Schottum 1525. in fol. cū Io. Ruellii interpretatione, & Marcelli Vergilii Commentariis ab Othone Brunfelsio decurtatis: ita ut singulis capitibus suū Corollarium subiiciatur. Et eodem anno Coloniae apud Io. Soterem in fol. post Dioscoridis contextum Græcum, & Marcelli Vergilii e regione interpretationē, subnexis ad singula capita eiusdem commentariis integris, seorsim in operis fine.

IACOBVS Goupylus rei medicæ hoc tempore disertissimus professor Luteciæ, dedit Castigationes in Dioscoridis libros, breuissimas, sed utilissimas: quibus contextus Græcus collatis exemplaribus diuersis, (excusis & manuscriptis, & locis ueterum medicorum Dioscoridem citantium: & interpretationibus quibus Latine recentiores quidam huius scriptoris libros uerterunt, ac olim Plinius, &c.) emendatur. Arnoldi Birckmanni uidea publicauit Parisiis 1549. in 8. una cum Græco Dioscoridis contextu, & interpretatione Ruellii e regione.

IANVS Cornarius Germanus Zuiccauiensis medicus, Dioscoridis De materia medica libros V. & unum De bestiis uenenum ei aculantibus, alterum De letalibus medicamentis, Latinos fecit, prioribus quinque Emblemata addidit: posterioribus Expositiones. Opus euulgatum est Basileæ in officina Frobeniana, anno 1557. in fol. In his emblematis & expositionibus, etsi rerum cognitio non admodum ultra quam ab aliis prius locupletatur: uocabulorum tamen in utraq; lingua uis ac proprietas plurimorum pulchre explicatur: & genuina lectio passim tum Dioscoridis, tum Plinii, locis innumeris inuicem collatis restituitur.

IOAN. Agricola Ammonius, præclarus Ingolstadii nostro seculo medicinæ interpretes, reliquit Indicem copiosum simplicium medicam, à Dioscoride proditorum: & alium communem libris de simplicibus, Dioscoridis, Galeni, & Serapionis.

IOAN. Baptista Egnatius in Dioscoridem Annotationes extare feruntur, quas nondum uidi.

IOAN. Dantzii Germanus, (quo cum aliquando Italiam ingressus sum, fertur autem obiisse Francoforti ante annos aliquot,) Dioscoridis uolumen in Germanicam linguam transtulit: quod Francoforti, ni fallor, cum iconibus excusum est.

IOAN. Lonicerus Germanus, qui longo iam tempore, in Academia Marpurgensi floruit, Scholia quædam in Dioscoridis libros composuit, cum nomenclaturis Græcis, Latinis, Hebraicis & Germanicis. Liber impressus est Francoforti 1543. in fol.

IOAN. Manardus Ferrariensis medicus, in doctissimis epistolis suis cū alia multa passim ad cognitionē medicaminū simplicium eruditè docet: tū in prima libri 8. epistola Marcelli Vergilii interpretationē in primum Dioscoridis librū examinat.

IOAN. Ruellius Suefionensis, medicus, Gallus, Dioscoridis libros Latine expressit inter primos nostræ memoria, post Hermolaum quidē, sed ante Marcellum, à quo aliquoties notatur. deinde eandem interpretationem recognouit, ita ut cæteris ferè omnibus hodie à doctissimo quoque præferatur. Emendari tamen in ea quædam poterunt, à Iacobo Goupylo, Andrea Lacuna, Cornario, & Matthiolo obseruata. Eiusdem Ruellii De natura stirpium libri iii. eleganter & copiose conscripti, ueluti commentarii quidam cū in Dioscoridis tum aliorum De plantis libros existimari possunt. Li Lutetiæ primum, deinde Basileæ excusi sunt: & nuper à quodam (ut audio) in Compendium contracti.

MARCELLVS Vergilius Florentinus Dioscoridē, mox post Hermolaū & Ruellium Latinitate donauit. & commentarios doctissimos adiecit: in quibus partim Dioscoridis uerba explicat, partim translationis suæ rationem reddit, partim uero Hermolai translationem reprehendit. Ad ipsam quidem plantarum rariorum aut incognitarum notionem non multum emolumenti adfert.

MELCHIOR Guilandinus Borussus scripsit quædam de erroribus Matthioli in Dioscoridem commentariorum, &c.

ORIBASIVS Sardinus Collectorū libris undecimo & duodecimo, simplicium medicamentorū descriptiones Sex Dioscoride præcipue (ordine literarum proponit. Euporiston uero libro 1. eodem ordine, facultates ac uires eorum, ex Galeno opinor mutuatus. Ii Baptista Rosario Nouariensi medico interprete Latini extant, excusi ab Ilingrinio Basileæ 1557. cum reliquis Oribasii. Quod si Græcè etiam eorū copia daretur: possent fortè Dioscoridis quædam inde emendari. Nos quoq; Historiam plantarū dedimus eodem ordine, ex Dioscoridis descriptionibus: quibus ex Theophrasto, Plinio, & recentioribus Græcis multa addidimus: uires autē breuissimè ex Paulo Aegineta, &c ea excusa Basileæ in . anno 1541. & est mox etiam Venetiis in 16.

OTHO Brunfelsius Moguntinus Marcelli Vergilii in Dioscoridem commentarios decurtauit, ut supra in Hermolao diximus.

PETRVS Andreas Matthiæ Senensis Dioscoridem primū Italicè interpretatus est, & commentariis in eadem lingua copiosis illustrauit. Deinde etiam Latine reddidit, adiectis figuris quam plurimis elegantissimisq; stirpium. Vincentius Valgrisius excudit aliquoties Venetiis, nō sine nouo semper auctario. Nunc etiam Pragæ in Bohemia ubi author degit, Bohemica Germanicæq; lingua idem opus, cū maiusculis & perpulchris iconibus, longe auctius excudi, aut excudendum esse breui audio, primum Bohemicè & Germanicè, deinde etiam Latine.

PETRI Paduani Additiones quasdam in ueterem translationem Dioscoridis (quæ ferè integra habetur in Syluatici Onomastico & Io. filii Serapionis libro de simplicibus) extare aiunt.

R. CONSTANTINUS edidit Correctiones Lemmatū & Adnotationes in Amati Lusitani enarrationes, cū illis pariter excusas Lugduni à Guil. Rouillio 1558. in 8. unā cum iconibus ex Fuchsi ferè libro desumptis, exiguis.

VALERII Cordi Simesusii Annotationes doctissimas in Dioscoridis libros V. secundo ab authore auctas & recognitas &c. Iosias Rihelius cudit Argentinae anno 1561. in folio, unā cum libris quatuor eiusdem, quibus Descriptiones Stirpium uariarum continentur, & alia quædam egregia: & Con. Gesneri De hortis Germaniæ libro.

Audio & Rufi ac Plutarchi quædam fragmenta in Dioscoridis libros extare Græcè in Italia, nondum excusa: quorum copia facta sit Aloisio Anguillare Romano, horti medicorum Parauii procuratori, uiro in uariarum stirpium cognitione summo & facile principi: ut fama loquitur, & ipse (spero) propediem suis lucubrationibus declarabit.

ABEN Bitar (uel, ut alii scribunt, Ebenbitar) scripsit De simplicibus medicamentis opus insigne & magnum, ordine alphabetico, citatis authoribus, quod à Bellunenſi aliquoties citatur, qui & Arabicum expositorem eum alicubi nominat. Hoc non ita pridem ex peregrinatione sua in Orientem doctissimus uir Guil. Postellus secum aduexit. In eo (inquit in epistola, quam de suis ac peregrinis & secum aduectis libris olim ad me dedit) simplicia quam plurima & remedia innumera, quorum nec nomen, nec uis, nec usus nobis adhuc innotuit, sunt expressa: atque omnia ita absolutè, ut quicquid super iisdem medicamentis apud Dioscoridem, Galenum & Oribasium imperfectum & mutilatū est, ex hoc uolumine restitui & farciri possit.

DIOSCORIDI falso attribuuntur libri duo Græci, quos manu scriptos habeo, De curandis morbis, per simplicia ferè medicamenta, secundum morborum genera digesta, &c. Eos breui Latine edendos spero, Io. Moibano doctissimo

Reipub. Augustanae medico interprete.

IOHAN.

IOANNES CRATO FERDINANDI CAE.

SARIS AVGVSTI MEDICVS, CON: GESNERO MEDICO
Tigurino S.



QUAM SYNCERVS ET CANDIDVS SIS AESTIMATOR VOLUNTATIS amicorum, optime & doctissime Gesnere, abunde satis testantur, literæ tuæ 23 Avgvsti scriptæ. Eas cum heri acceperim, uides quanto post ad me perlatae sint, quam fuerant datae. Fuisse autem mihi uehementer gratas atque optatas, dubitare non debes, etiam si in animi mei declaratione non utar pluribus uerbis. Nihil enim humanitatis studioso & cum fide amicitias colenti, quo in genere hominum me semper esse & numerare uolui, parum erga se uoluntatis testificatione optatius. Quod igitur ad mutuam beneuolentiam & amicitiae nostrae firmitatem attinet, ea iacta fundamenta confido, quae eam sustinere, & certam praestare possint. Officiorum autem uices ita reddam, ut omnia potius mihi defuisse quam summam uoluntatis propensionem intelligas. Ac nunc nihil aequè cupio, quam iuuare me posse editionem tuam scriptorum Valerii Cordi, mihi dum in uiuis esset, coniunctissimi & amicissimi. Sed quid possum in tanta temporis angustia? Inuentis aetatis & primae adolescentiae eius studia non mihi sunt explorata: neque, ut arbitror, hæc scire multum refert. In familiaritatem eius deueni ante annos uiginti, cum uterque nostrum audiret Philippum Melancthonem explicantem Nicandri Alexipharmaca. Omnia in illo dona conspiciebantur naturae, quae cum homine nascuntur: & mentem doctrina à pueris institutione patris excoluerat. Erat moderatis temperatisque moribus, & ad omnem uitae consuetudinem aptus. Ingenii tanta uis praeditus, ut ubicunque id intenderet, non natus ad hoc quod agebat, sed à Deo uictus uideretur. Praecipue autem possessionem artium sibi quasi haereditario iure à patre Euricio Cordo, (quem Poëtam & Medicum eximium fuisse scripta ostendunt,) relictam, augendam atque amplificandam putabat. In Poëticis rariuscule sese exercebat: Verum laudabile carmen scribebat. In rei Medicæ investigatione erat totus: & non solum studium, sed ardorem quendam amoris, (sine quo, ut Cicero inquit, nihil quicquam egregium unquam assequimur,) praeseferbat. Et cum studium (ut idem ait) perueniendi aliquo nihil prodest, nisi illud quod edo, quod intendas, ferat deducaturque cognoris: laboriosas sepe peregrinationes unius simplicis Medicamenti inuestigandi causa, suscipiebat: perscrutabatur omnia loca Metallica, praecipue Misniae & Saxoniae: herbas mirifico studio inquirebat, nihil non molestiarum perferens, ut in exactam cognitionem earum perueniret. Itaque & inter uarias oberrationes & profectiones, ut quae bona essent, meliora redderet, perpetuo ueterum descriptiones attentè considerabat, easque tanquam ungues notas sibi facere conabatur. Haec autem uita & studiorum ratio faciebat, ut ea quae scripsit uirtutesque uita potius, quam elaborata & perpolita uideantur. Dioscoridē in schola Vuitebergenli ter legit, ac primo quidem ea dictauit, quae nescio quomodo extant. Peruagatus deinde Thuringiam atque uicina loca, multa mutauit, & alios quasi Commentarios in Dioscoridem confecit. Atque hos postremos arbitror ad tuas manus peruenisse. Priusquam uero iter in Italiam profecturus ingrederetur, tertio Dioscoridem in gratiam quorundam amicorum enarrauit. Sed in praefatione nec ipse quicquam scripsit, neque aliis dictauit. Quae autem docuerat, singulari studio obseruata & scripta D. Iohannes Aurifaber, uir pietate & doctrina excellens, ornamentum patriae nostrae, & scholae Regiomontanae, Sambienfium Episcopus, popularis meus, mihi pro perpetua nostra necessitudine & in amicitia fide communicabat. Ea nisi ad textum Dioscoridis mei essent scripta, & talia, ut pleraque omnia in iis libris, quos te diuulgare uelle scribis, reperiri existimem: iam nunc tibi optime mi Gesnere mitterem. Interea, ne prorsus officium meum tuae uoluntati defuisse uideatur, accipies cum his literis festinanter, ut res ipsa ostendit, scriptis, doctrinam quandam Cordi de Oleis destillatis, & extractionibus, ut uocant, quibus

addidit rationem consiciendi olei Vitrioli: cuius author Valerius Cordus perhibetur, uerè an secus, ad meum iudicium nō reuoco, cum ipse in eo quædam desiderem: Habebam prius exemplum admodum corrupte scriptum: uerum nuper Ioachimus Camerarius F. quem & propter parentem uirum summum, ac Germaniæ singulare decus, & propter suauissimos mores, diligentiam, industriam, & rei Medicę studium, diligo, ad me multo emendatius misit. Hoc igitur accipies, atque cum iis, quæ ad te peruenisse scribis, conferes. Arbitror Ioachimo à Iohanne Ralla Pharmacopola Liplico, scripti copiam factam: certum non scio. Eum Valerius Cordus ut parentem, propter coniunctionem, quæ ei cum patre Euricio fuerat, colebat, nec illius auctoritatem etiam contra suam uoluntatē, negligebat: cum & Ralla uicissim Cordum, quibus posset officiis prosequeretur. Aceius quidem rogatu primū Dispensatorium, ut uocant, collegit. Postea Casparus Pfründ, qui illis temporibus Pharmacopolio Vuitebergensi præerat, & nunc iucundos aspectu atq; rarioribus herbis excultos Torgæ hortos habet, obsequio quodā uictus, eas annotatiunculas, quas editas cōspicimus, addidit, atq; in istum ordinē, quo Senatui Norimbergensi hæc sunt exhibita, redegit. Cæterū quam hoc fecerit inuitus, & quā uix rectum putauerit, ut ex suo quasi præscripto hæc uel illa fierent, memini: & haud dubiè, si diutius in uita fuisset, plurima in eo libello emendasset, nec sic ut nunc est, exiisset. Sciebat enim illud, in quo quis offenditur, etiam ea quæ laudanda sunt sæpe obruere: ac memini cum Ianus Cornarius me præsentē libellum recens editum inspiceret, & appellationem confectionis Diathamaron à Thamar, quod Arabibus Dactylū significare Cordus arbitrabatur, deductam uideret, suauiter eum ridere, atq; *ῥα κατὰ λόγον*, quasi contra mortem ualeat, dictam existimare, siue hoc recte, siue non recte, aliorum sit iudicium. Habeo & Censuram Aloisii Anguillaræ Romani mihi amicissimi, & rei herbariæ peritissimi uiri, de Dispensatorio non inutilem, quā breuissimè hoc permittente Aloisio facere potero, uidebis. Nunc cum non satis sciam an Aloisio *δὲν τῶν* sint de his *ῥα κατὰ λόγον*, non uolo ea publica facere, quorum illum pudere aut pigere ullo modo possit: iniustissimū enim esse arbitror diuulgare contra uoluntatem hominis amici ea, quæ ipse omni studio continere cupiat. Vt autem ad Cordum redeam, priusquam Germaniam relinqueret, Theriacam magno studio composuit, quā præclari Medici singulari atque admirabili dexteritate esse factam, in difficillimis curationibus sunt experti. Reliquit & amicis alias suas Compositiones uarias, inter quas in primis cōmendantur Pastilli è Succino, quos in gratiam Andræ Aurifabri artis Medicæ Doctoris eximii & principis Borussiae &c. Archiatri, amici nostri fecerat, quem miro successu iis uti in sui curatione ipse uidi, cum sanguinis mictu laboraret. Sed Compositiones Cordi longum esset recensere. Adiuncto autem sibi opt. & doctissimo iuvene Hieronymo Schreiberō Norico, cuius diligentia magnam partem Curationum, & consultationum Montani, quæ extant, rei Med. studiosi debent, qui postea Parisiis est extinctus, atque in eius cythra insignis calculus, ut commemorante Iohanne Pontano audiui, repertus. Hoc, inquam comite, cum aliis quibusdam Anno 1542. est in Italiam profectus, in qua diligentia, industria & singularis studii omnia, quæ terra atque mare habebat, inuestigandi plurimos testes & admiratores etiamnum habet, qui sciunt ex rebus penitus perspectis planeq; cognitis atque ab omni arbitrio seiunctis, Cordum ea pronunciaſſe, quibus apud Italos, uiros doctos, magnam scientiam tandem sit consecutus. Non totum biennium Patauī & in uicinis locis uixerat, cum Hieronymo Schreiberō comite, Romam abiit, in itinere multum defatigatus, inquisitione & inspectione herbarum & aliarum rerū in Appennino, quibus illas doctrinæ suæ copias augeri posse arbitrabatur, ex defatigatione largiori esu fructuum & potentioris uini potu, cum bidui aut summum tridui itinere Roma abesset (obsequiebatur enim amicis, præsertim ei, quem præter Schreiberum secum habebat comitem, interdum immo dice) in febrim incidit: qua non multo post, cum grauius Symptomata accessissent, summo rei Medicæ detrimento, Anno 1544. Sept. Cal. Octob. cum

natus

natus esset Anno 1515, extinctus est Romæ grauissimumq; desiderium suorum amicis in Germania reliquit. Totum igitur uitæ breuis curriculum, in quo tot arcana naturæ eruit, cognitionem herbarum, metallorum, piscium (eos enim quos Adriaticum habet mare, singulari studio depingendos curauit) monstratis ueterum descriptionibus illustrauit, atq; auxit: & de plurimis homo adolescens & Germanus Italos senes, (ea tamen uirtute præditos, ut multi de se, ἄβασκον potius quàm γηρασκον πολεμὸν ἑαδασκόμενοι, dicere possint, erudiuit) fuit annorū uiginti nouem, cū longiori quidē spacio esset dignissimus, Ideoq; in dolore quē recordatio Cordi nobis facit, uerissimē possumus usurpari, quod Poëta dixit: Optima prima ferē manibus rapiuntur auarīs; & illud Ioachimi Camerarii summi mei amici, quod alludens ad cantilenā Læconicā scripsit nobis ipsis occinere, *Νῦν δὲ σοὶ, πρόσθεν δ' ἔτι ποτ', μετέπειτα δὲ ἄλλοι.* De Valerii Cordi sepultura diligenter quæsiui, cū anno 1543, Romę essem, ac audiebam in sacra æde Germanū esse humatum. Verū primò quidem nō potuit nobis commonstrari locus: postea cum reuersi essemus Neapoli Romam, incidimus in Chirurgum quendam Germanum hominem, qui morienti adfuerat, is ad Mariæ de anima, D. Iohanni Baptistæ & D. Paulo Heinzeliis, Senatoribus Augustanis, & D. Adolpho Oeco Medico Augustano atque mihi sepulchrum eius commonstrabat, & hæc quæ scripsi de uitæ exitu commemorabat. Pro eo autem, quo D. D. Heinzeli (quorum beneficio mihi contigit Italiam perlustrare) in rem literariam sunt animo, cuidam mandata dabant de Epitaphio conficiendo: uerum Iohannes Brunsterus, qui deinceps Romam est profectus (ut accepi) hoc cessante illud fieri curauit, qui & ipse cum in Germaniam esset reuersus, Norimbergæ, quæ illi patria erat, diem suum obiit. Hęc, ut grato animo, & honoris amicorum etiam demortuorum studiosus, recito, ita tibi gratias ago, cum pro naturæ tuæ bonitate & candore, non solum memoriæ Valerii Cordi faues, uerum etiam aliorum studiosissimum te esse declaras, & ipse famam tuam undique puram eo modo exhibes, ut neque exulius ignominia, id quod quidam faciunt, laudem quæras, & laboris premium, quod ex prædicatione est, iis etiam, qui tenuiter tuos summos adiuuant, & quibus a natura minora sunt data tribuas. Denique excitas plurimos, & operas ingenii tui melioribus scriptis illustrari uel etiam obscurari gaudes. Sed de Valerio Cordo satis. Ad reliquas Epistolæ tuæ partes respondebo quam primum aliam occasionem mittendi ad te literas nactus fuero. Nunc hæc negligere nolui, lapidem nostratem mitto, & Margam quam Dalmata quo scripsi, pro terra Lemnia uenditat. De Herba Split non conquiescet cogitatio mea dum aliquid extricem. Cetera referuo proximæ Epistolæ, tibiq; hoc de me, quod ueteres in conditionibus scripserunt, affirmo, me quibus sciam poteroq; modis, tibi summa fide & uolūate omnia grata facturum. Bene uale. Salutat te & Lælium Soccinum, cui

& ego salutem opto, Zacharias Vrsinus, Vratisla-
uiæ ex meis ædibus die Lucæ Medi-
ci & Euangelistæ Anno
1559.

b iii

EX EPISTOLA GE. AGRICOLAE (CVIVS

COPIOSISSIMI DOCTISSIMIQUE DE IIS QVAE EX TERRA EFFLUUNT & EFFODIUNTUR, LIBRI EXTANT) AD VVOLFgangum Meurerum epistola.

VALERIUS Cordus, quoad uixit, non cessauit ad me mittere omnia, quibuscumque iuuari atque ornari mea studia possent, iuuenis longa uita dignus, sed perpetua dignior.

EX GVALTHERI RIFFII ARGENTINENSIS,

IN PRIMAM VALERII CORDI ANNOTATIONVM
in Dioscoridis libros editionem, praefatione.

EVIT in Val. Cordo cum in uniuersa medicina perdiscenda, tum uero praecipue cognoscendi Simplicia med. incredibile studium: ad quod illum parens Euricius medicus, idemque poeta clarissimus & autoritate & exemplo inflammauit, qui filium ab incunabulis inter ipsas herbas ac flores educari uoluit. Accessit ad optimam institutionem, ingenium acre, & rara naturae felicitas, cui nihil arduum aut inaccessum esse posset: ad haec, mirabilis industria atque assiduitas in inquirendis rebus, in super & perceptorum fidissima custos memoria, qua ita excelebat, ut integeras descriptiones singularum rerum ac diuersorum authorum secum ubique animo circumferret, ac expromeret ubi opus esset. His dotibus breui tempore eo progressus est, ut excellentes medici ac senes discendi gratia adolecentem frequentes accederent. Subinde etiam uarias peregrinationes suscepit, quod certius & exactius omnia suis ipsius oculis subiecta cognosceret: ne uel aliorum narrationibus (quod pluribus accidisse uidebat) deciperetur. Ac primo quidem perlustrauit omnem ferè Germaniam, ac uicinas Septentrionales regiones. Intrauit horrentes saltus, superauit editissima montium iuga, demisit se in profundissimos specus: & pleraque summa diligentia peruestigauit, quae in istis partibus gignuntur, paucis hucusque nota. At quoniam bona pars medicamentorum exoticis constat, ne illa parum cognita haberet, conuertit se ab Aquilone ad alteram mundi plagam, adscitoque uno atque altero comite peruenit in Italiam: ubi breui nouus ille hospes propter ingenii praestantiam, multis admirationi esse coepit. Sed, quae est humanarum rerum fragilitas, in ipso studiorum cursu è medio sublatus est, magno cum dolore omnium doctorum, & inestimabili iactura totius medicinae.

EX BIBLIOTHECA CON. GESNERI.

EURICIVS Cordus Simesusius, natione Germanus, Valerii pater, utraque lingua doctus, Marpurgi medicinam professus est: & rem herbariam non parum adiuuit. Botanologicum eius, siue Colloquium De uariis herbis, excusum est Coloniae apud Ioan. Gymnicum anno 1534. in 8. chartis 13. eodem anno ab autore scriptum. Idem Theriaca & Alexipharmaca Nicandri poetae Graeci Latinis uersibus heroicis reddidit eleganter. Liber impressus est apud Egenolphum Francforti anno 1532. in 8. chartis 5. Epigrammata quoque scripsit, praefertim à Graecis translata.

ANDREAE

ANDREAE ELLINGERI MEDICI EPI-
GRAMMA DE INVENTORIBVS SCORDII ET CHA-
mædryos in Germania.

Scordion à Scorodo dictum, quod spiret odore
Allia, nunc uestit flore rubente comas:
Propter aquas & putre solum stagnantis Elestri,
Qui nostros tardis flexibus ambit agros.
Caule breui, folijs instar Trifaginis herba,
Mansa leuem gustu producit amaritiem.
Virtute eximia: membrīs agit omne uenenum,
Præstat ab immunda corpora tuta lue.
Quæ sitam multis uni tibi Corde repertam
Scimus, & huic merito nunc quoq; durat honos.
Vdo crescentem in saltu prope moenia doctæ
Vrbis, ubi flauas deuehit Albis aquas.
Te quoq; qui certa medicamina conficis arte,
Nonnulla inuenti gloria Rhalla manet.
Prunus Elestrinis humilem deprendis in oris,
Quæ tibi carpenti uisa Chamædryos erat.
Verum odor indicium fecit manifestus, habentis
Quas illi ueterum dant monumenta, notas.
Quid? qua laude ueham studium, quo plurima nobis
Planta peregrini cognita facta soli est?
Quis ferulam nosset, quis odoriferam Panaceam?
Quis te pictorum mollis Acanthe labor?
Quis Cynaram, Asphodelon? quis purpureos Hyacinthos,
Stoechada, Dictamni Grosiactiq; comas?
Si nostri paulum cessaret cura Crateuæ:
Quo duce Plantarum surgit odora seges.
Quas tener illius feliciter educat hortus:
Sæua licet, Borea flante, repugnet hyems.
Grati agnoscamus Cordi Rhallæq; fidelem
Quam studijs operam nauat uterq; bonis.

VALERII CORDI SIMESUSII, in Pedacii Dioscoridis ANAZARBEI PRIMUM DE MEDICA MATERIA LIBRUM, Annotationes.

DE IRIDE. CAP. 8.



RIS, SIVE IREOS, SIVE IRIDIS, IN GENITIVO CASU PRO
feras, eadē est planta, quapropter inepte quidam tanquam
diuersas distinguunt, Iris & Ireos. Est autem Iris Illyrica ea
radix, quæ in pharmacopoliis Ireos & Germanicē Viol-
wurz appellatur. non quod uerē sit uiolæ radix, sed quod
odore uiolas imitatur, ea propemodum sola ab authoribus
cunctis aliis eius speciebus præfertur. Nascitur etiam apud
nos & proprie uocatur Blaw liltien / Blaw / chwertel, &
Schwert hew. Sed suas habet quibus ab Illyrica distingui-

† vulgò Li-
lium coele-
ste uocant.

tur notas. Est enim horribiliore odore iniucundior, & multo maiore acrimonia gu-
stanti molestior, faucesq; grani Gnidiū modo exurit, quapropter caliditate quidem
Illyricam plurimum superat: sed quanto hac illa est superior, tantò etiam aromatico
odore & sapore inferior existit. V. ehemētius quoq; aluum quàm Illyrica purgat. Est
etiam in floribus differentia, siquidē nostra Iris purpureum fert florem, in arcus cœ-
lestis colorem uariantem, unde totum Iridis genus nomen inuenit. Illyrica uero can-
didum producit.

DE ACORO. CAP. 10.

Persuasum omnibus est Acorum eam esse herbā, quæ à nobis Gelbschwertel ap-
pellatur, quantum uero hac à ueritate distet opinio, facile intelligunt qui rationem &
communes sensus habent. Acorus enim in tertio calefaciendi ordine à Galeno ponit-
ur, eum qua facultate etiam iucundum & aromaticum tam odorem quam saporem
habet. Qui uero apud nos prouenit, falso appellatus est Acorus: nihil acrimoniæ, ni-
hil item quod aroma redoleat aut sapiat sortitus, sed austeri & acerbi saporis pluri-
mum. Hinc necessario sequitur eum cōtrarium uero acoro temperamentum habere.
Atqui hoc non concesserim, eum sic in nostris terris degenerare, nam quamuis hic
ipse falso uocitatus Acorus etiam in calidis regionibus nascatur, eandem tamen ser-
uit austeritatem: & contra uerus Acorus frigidioribus locis nascens, eandem habet
acrimoniam, quam in Syria multo calidiore terra enatus. Porro uerus Acorus multo
iudicio nihil aliud est, quam illa radix quæ hodie in omnibus totius Europæ
pharmacopoliis calamus aromaticus appellatur: cui sententię nos quoq; eo usq; sub-
scribimus, donec nos erre ris cōuincat aliquis, multis id enim argumentis demonstra-
ri potest, ea omnia adducere longum foret: interim nobis sufficiat uiuorum bonorum
fides & authoritas, qui in Syria nostrum falso uocatum calamum nasci uiderunt, iis-
dem omnibus insignem notis quibus Acorus describitur. Quod autem uero Ca-
lamo aromatico careamus, suo demonstrabitur loco. Antonius Musa magni nomi-
nis in Italia Medicus, Acorum putat esse uerā & omnibus cognitā Galangam, quam
sententiam affirmare nō possum. Multo etiam minus eos probamus, qui Galangam
maiores ante paucos annos afferri coeptam, uerum Acorum esse autumant, in quam
opinionem ipse quoq; penē seductus fuissē. In ea autem adhuc sunt plures medico-
rum, inter quos est etiam Leonhardus Fuchsius clarus apud nos medicus. Sed cum
utraq; Galanga Cypero sit cognata, Acorus uero Iridi, diuersum iudicauimus. No-
bis etiam compertum est maiorem Galangam foliis, caulibus, & paleareis, flore, &
semine, Cypero similem esse, sed undiq; maiorem, nec habet grandem Iridi aut pseu-
doacoro æqualem & luteum florem qualis Acoro est. Acorus præterea in confortan-

Galanga.

de uentriculo ualde commendatur. Galanga uero maior eum subuertit & uomitum ciēt, tantum abest ut confortet: nihil enim odore aut sapore habet quod aromaticam uim referat, sed simplicem tantum, eamque uehementem & ingratam tam gustu quam olfactu acrimoniam.

[¶] Vulgo dictum Calamum aduersus aquas corruptas multi peregrinantes secum ferunt.

DE MEO. CAP. 3.

Meon quod quidam etiam Meu appellant, solo tantum nomine cognoscitur: res autem ipsa hodie penitus incognita est, quamuis pharmacopolae radículas quasdam acres hoc nomine ostendunt: non tamen omnes eandē demonstrant. Quidam enim Magistrantiā, appellatam radicem: quidam angelicam: quidā Toydylon, hoc est, Beerwurz dictam radiculam: quidam etiam alias quasdam radículas, quas agyrtæ Olentidē uocitant, Meu nomine uendunt. Verum autē Meum in calida & medicamentorum feracissima Italia sponte uix nascitur, nedum in frigidiori Germania. Propterea olim in Italia Medici hanc herbā studiose in hortis serebant, testante Plinio libro xxi statim in principio capitis xxxij, ubi sic inquit. Meu in Italia non nisi a medicis seritur, & iis admodū paucis: Quapropter licet eius uice aliam eiusdē facultatis & temperamenti herbā accipere, quam uero pro ea capimus Meon nominare non perinde cōcessum est. Missa autē aliquando mihi est a Ioanne Neseo pharmacopola Francofordiano, herbarū indagandarū studiosissimo homine, planta quaedam pro uero Meo quam secum ex Italia attulerat, caulibus, foliis, umbellis, & semine Anisi, tenuioribus tamen, & acri admodū & aromatico semine, quae omnino uidebatur descriptio nisi respondere. Quoniam uero radices eius nō aderant, nihil certi iudicare potui: nam ex solae ex hac planta medicis in usu fuerūt, tanquam aliis herbæ suae partibus, foliis, semine, floribusque efficiores.

DE CYPERO. CAP. 4.

Cyperum Graeci etiā Cypeirum & Cypirum uocant. Plinius tamen inter Cyperū & Cypirum differentiam facit, sed magno errore, Reuera enim nihil differunt: quare siue Cyperū siue Cypirum pronuncies, aut alicubi scriptum reperias, eadem erit planta. Est autē Cyperus iuncus odoratus, angulosus, triangularisue, a quibusdam etiam quadratus appellatus, sed male admodū, non enim quadrangularis illi est, sed triangularis caulis. Eius autem duae sunt species, alter longas habet radices, is Graecis uocatur Cyperis, in pharmacopoliis uero Cyperus Romanus siue longus: alter rotundus habet & siue inuicem cohaerentes radículas, quem pharmacopolae Cyperum rotundū appellant: Graeci autem simpliciter: Germani utrumque uocāt Wilden galgan/ hoc est syluestrem Galangam. Porro parcius effertur ad nos longus Cyperus.

DE CYPERO INDICO.

Cyperus Indicus, cui a Dioscoride tribuitur amaritudo, Zingiberis figura, et Croceus color, ea est absque dubio radix, quam ubique Curcumam in pharmacopoliis uocant, quidam etiam terram meritam, quamuis terra nō sit, sed radix ex India ueniens. Rarus eius est in medicina usus, sed frequens tingendis mensis aliisque rebus.

DE CARDAMOMO. CAP. 5.

Cardamomi appellatione grana quaedam in pharmacopoliis habentur, & gustu & olfactu admodum aromatica. Manardus & Antonius Musa contendunt nos uero Cardamomo carere, quoniam ab authoribus descriptae notae granis Cardamomū appellatis non conueniant. Quod quidem uerum esse ipse fateor, non tamen continuo proclamandum erat nos uero Cardamomo carere. Dioscorides enim & Serapion integros Cardamomi utriculos siue fructus granis confectos, ut olim afferebantur, atque non raro nostra etiā aetate, descripserūt. Hodie uero ut plurimum cortices, quia lignosi & nullius qualitatē sunt abiiciuntur, & sola grana folliculis inclusa propter saporis & odoris fragrantiam ad usum reponuntur: hinc etiā est, quod Graeci in compositis medicamentis semper expeant Cardamomū. *ῥιζομακίς* & *ῥιζομακίς* Cardamomi, hoc est, exenteratum & ex utriculis exempta uiscera siue grana, et ipsam medullam siue semina. Cardamomi autem hodie duo offeruntur genera, Maius alterum, & Minus alterum. Maius fructum habet iignosum, fractu contumacem, ficus propemodum magnitudine & figura: intus angulosus & aromaticis granis, mali Punici

omissum
in impres-
sio.

nisi modo, plenum. Minus uero fructum fert auellana nuce ut plurimum minorem, triquetrum & minoribus granis repletum, eiusdem saporis & odoris, sed uehementius palatū & linguam penetrantibus: ex his frequentius in usu est minus, quod simpliciter hodie Cardamomum uocatur, maius parcius affertur, propterea quidam in eius locum Grana paradisi, alias Melligeta nominata, substituerunt, eaq; Cardamomum maius uocauerunt: improprie tamen & male. Nam sapore quo piperi similia sunt, & odore, plurimum à Cardamomo differunt. Fructus tamen siue utriculi figura magnam habent cum maiore Cardamomo similitudinem, qui oui plerumq; magnitudine conspiciuntur, & granis (quæ nouimus) onusta sunt, Cardamomo instar angulosis. Illi uero plurimum errant, qui Nigellæ Citrinæ semen Cardamomum esse credunt, quod etiā Antonius Musa non immerito reprehendit. Porro Arabes utrumq; Cardamomum generali nomine, & Cordumeni, & Saccolla appellant. Itaque uehementer errant ii qui Cardumeni apud Serapionem Carui agreste interpretantur: id enim est cum Cardamomo. Nec aliquem suspensat quod Serapion eandem rem alibi Cordumeni, alibi Sacollæ nomine describit: in capite enim de Cordumeni ea recenset, quæ apud Dioscoridem de Cardamomo leguntur: in Sacolla uero rem eo de pingit modo, ut Arabes descripserant, & ut ipse uiderat, & quemadmodum adhuc affertur Cardamomum. (Iam cum) Dioscoridis & aliorum Græcorum descriptioni, & Cordumeni & Sacollæ apud Serapionem, historiæ per omnia conueniat, nemo diuersum statuatur esse, Cardumeniā Sacolla. Porro Arabes pulchrè etiam suis nominibus Cardamomi species distinguunt. Siquidem maius appellant Heyl, minus uero Helbane, qui autem contrarium dicunt, errant.

*Cardamomum minus, nomen seruat in Pharmacopolijs, Germanicè Cardamömle. Arabicè Helbane. Maius uero, Arabicè Heyl, diuersum à granis paradisi, quæ aliqui Cardamomum minus improprie uocant, minus fortè precioso uiribus intelligentes: mole enim maiora sunt, aliqui maiori Cardamomo substituant.

DE NARDO. CAP. 6.

Cum simpliciter Nardi uocabulum apud authores reperitur, semper Indicam uel Syriacam Nardum intelligere debemus. Sunt enim multe Nardi differentiæ, ut Indica & Syriaca: quæ tamen nullum nisi folis natalibus discrimen habent. Præter has sunt Celtica, quæ etiam Saliunca uocatur: Montana; Rustica, quæ etiam Asaron: Celtica siue Phu, & Malobathrum: de quibus singulis deinceps agemus. Syriacam autem siue Indicam Nardum, de qua nunc sermo nobis est, eam esse censemus, quæ adhuc in pharmacopolijs, Spica Nardi, Spica Indæ, & simpliciter Spica appellatur, cuius omnes notæ adeo descriptioni conueniunt, ut nulla discrepet. Quapropter nō raro eos mirari soleo, qui Nardo uera nos carere contendunt. Fatemur tamen ipsi nunc afferti Nardum ualde inueteratam, fatuo propemodum languidoq; sapore & odore, & antea humore aliquo dilutam & maceratam, ut tutius conueniensq; sit Celticam, hoc est, nostratam Nardum pro Indica accipere.

DE NARDO CELTICA. CAP. 7.

Celtica Nardus absque ulla controuersia est ea, quæ hodie à Pharmacopolijs Spica Romana uocatur: nulla enim prorsus est quæ descriptioni nō conueniat nota. Testatur Dioscorides hæc Nardum Saliuncam ab incolis, ubi nascitur appellari, quod uocabulum interpretis Virgilius Marcellus in Gallicam peruertit, admodū infirmis rationibus & argumentis inductus. Nam Germani pleriq; eandem herbam adhuc proprio ueteriq; nomine Seliuncæ appellant. Celtica autē Nardus apud nos in Germania & finitima nobis Istria, Norico, Pannonia, & alpisbus nostris prouenit, ideo potius Germanica quam Gallica cognominari debet, cum in ipsa Germania & finitimis regionibus uersus hybernū ortū nascatur: quo fit ut adhuc ex Norico, Istria & Pannonia superiori in maxima quantitate Venetias deferatur. Quare ipse Dioscorides huic Nardo Gallicæ cognomentum non tribuit, sed Celticæ & Saliuncæ. Celtarum enim appellatione tam Germani quam Galli ab historicis uocantur, quemadmodum etiam Galatarum. Itaq; etiam hæc Nardus Galatica à Græcis nominatur: Adde quod Saliuncæ uocabulū in lingua Germanica significet animum iuuenilem reddens. Habent etiā Germani alia nomina, quibus suam Nardum appellant, ut sunt

Lauendu-
lam nō esse
Nardum
Celticam.

Martenblumen & *Spicanarden*. Sed omnium propriissimum & vetustissimum est *Selinum*; quod Romani in *Saliuncam* deflexerunt. Illi autem uehementer errant & impingunt, qui *Spicam* siue *Nardum Celticam* eam putant esse plantam, quæ ab aliis *Lauendula maior* siue *Massiliensis Lauendula* & *Spica* appellatur, unde olei *Spicæ* in pharmacopoliis uocatum dicitur: toto enim cælo hæc duræ plantæ distant. Siquidem *Nardus Celtica breuis* describitur herbula, quæ propter breuitatem suam radicitus euulsa in manuales fasciculos perinde hodie, ut olim ligatur. *Lauendula uero maior* lignosus, longusque frutex est, neque in fasces radicitus euulsus ligatur. *Nardi Celticæ* folia subflaua describuntur. *Lauendula uero maioris* ex uiridi colore in cinericiu uergunt. *Nardus Celtica luteo* describitur flore. *Lauendula maior* seu *Spica* purpureum ostendit ferè. In *Celtica Nardo* folia radices & coliculi medicinam faciunt: folia enim & flores, quoniam neque saporem neque odorem habent, ex omni usu abdicantur. In *Spica* contra, soli flores & folia medica ui pollent: radices autem atque caudices & uirgæ, quoniam lignosæ & odoris saporisque expertes sunt, nemini sunt usui, præterquam in accendendo igne. Hunc enim usum in *Narbonensi Gallia*, maxime eius parte, quæ *Prouincia* uocatur, præstat, ubi frequens admodum est odoratissimi huius fruticis spicati prouentus. Certum igitur est *Lauendulam maiorem* siue *Spicam plurimum a Nardo celtica* differre, utraq; enim sui generis est planta. Quid autem sit hæc maior *Lauendula*, quæ etiam *Spica* uulgo uocatur, indicabitur tertio huius operis libro, cum ad *Stœchadem* peruenerimus.

DE NARDO MONTANA. CAP. 8.

Montana Nardus, quæ etiam *Niris*, *Neris*, *Thylacitis* & *Pyritis* appellatur, olim ex *Cilicia* coriaceis sacculis, quos *Græci* *βυδάνα* uocant, ad exterarum nationes ferebatur: partim ad medicinæ usum, partim etiam ut in sacrificiis, ignibus, propter iucundum odorem iniiceretur, unde etiam illi *Pyritidis* nomen factum est. Hanc itaque *Spicam* intelligit in *Fastis* suis *Ouidius*, cum ait, Et sonat accenso spica *Cylissæ* foco. Non enim *Crocus* eo loco intelligendus est, qui igni iniectus foetet. *Nardus uero montana* in flammam iucundioris odoris resoluitur. Copiosè hæc in *Cilicia* prouenit. Quapropter potius *Pauli Marfi Piscinensis*, quam *Antonii Phanensis* commentarium in hunc *Ouidii* locum probauerim. Nam ille *Nardi spicam*, hic uero *Crocum* per *Cylissam* spicam intelligendum asserit. Porro hodie nullus est apud nos *montanæ Nardi* usus: quoniam non amplius affertur, præterquam quod interdum casu cum aliis mercibus apportetur, sed id rarissimè accidit. Hi autem uehementer errant qui *montanam Nardum* eam putant esse herbam quæ a nobis *Βασηλεϊττερλεϊν* & *Wingengrün* appellatur, muscus potius funiculi modo per terræ serpens, quam herba, asperis locis enascens, nullo neque sapore neque odore commendabilis.

† Wein-
grün Tra-
go.

DE ASARO. CAP. 9.

Asarum quamuis odore *Nardum* imitetur, ut etiam propterea syluestris *Nardus* nominetur, nullam tamen formam cum *Nardo* communem habet. Non defuerunt qui *Asarum* etiam *Baccharem* appellaret, propter odoris similitudinem: ambe enim, tam *Asarum* quam *Baccharis* odoratæ describuntur, herbæ diuersæ tamen sunt, ut omnes testantur. Male igitur *Baccharis* descriptio in *Asari* historiam, & e contra in *Dioscoride*, a librariis translata est, natura diuersas, eandem herbam esse putantibus, in correctionibus uero exemplaribus, seorsim de utraque agitur. Nam *Asarum* primo libro inter *Aromata* recenset *Dioscorides*: *Baccharem* uero in tertio inter odoratas & coronarias herbas describit. Est autem *Asarum* ea herba, quam nos *Naseltwurcz* nominauimus, quod plerumque & ferè semper in coryletis nascatur. *Antonius Musa* Italus, diligens herbarum inquisitor, sed *Germanicæ* linguæ ignarus, ideoque uenia dignus, a lepore illi factum nomē apud Germanos interpretatur, sed male, & ab aliis fortasse persuasus: nam si a lepore eius nominis etymum duceretur, non *Naseltwurcz* sed *Najenwurcz* scribendum & pronuntiandum esset, ut nostræ linguæ uel medicoriter periti facillè intelligunt. Latet tamen plerisque etiam Germanos suæ ipsius linguæ energia & proprietas.

DE

Phu, siue Nardus Cretica quam etiam aliqui syluestrem aut agrestem Nardum cognominat, solo odore Nardum æmulatur: cetera enim omnino illi dissimilis existit, hæc autem ab omnibus esse creditur ea, quæ Valeriana appellatur: quoniam uero præcipuæ notæ descriptioni non respondent, non possum assentiri iis qui in uertendis Græcis authoribus & alias scribunt & pronunciant Phu absque ulla contradictione esse Valerianā. Non tamen negauerim Valerianam aliquam Phu esse speciem agrestiore, odore uirosiore, radice multum à genuino differentem, & ueteribus non descriptum. Verum tunc aut Phu ea est herba, quam Germani Tyriactæstrant/et Gartenjeliunck / quasi Theriacariam herbā, & satiuam seu hortensem saluicam aut Nardum appellant. Radices habet multas digiti crassitudine, quæ transversæ in superficie terræ serpunt, sed graciles fibras à tenui tuberculo in terram agunt. Scio quidem Leonhardum Fuchsiū diuersum à nobis sentire, credit enim uulgarem nostram Valerianam melius descriptioni conuenire, qua in re liberum cuius relinquitur iudicium utranque Valerianam cognoscenti: habemus enim & nos certas rationes, quibus persuademur hortensem illam Valerianam uerum esse Phu: itaq; minime ipse male habebit quod non secum sentiamus.

† Matthioli quoq; hanc (ipse Phu matius appellat) magis descriptioni respondere putat, quam Phu agreste, quod minus nominat: apud nos quidem multo procerius prouenit.

DE MALOBATHRO. CAP. 11.

Malobathrum crediderunt multi Nardi Indicæ folium esse, uerum decepti & falso. Dioscorides enim ipsaq; experientia contrarium testantur. Malobathrum ueteres etiā Græci φάμαρ, Romani idē significante uocabulo Folium nominabant. quoniam nihil aliud quam folium esset, sine radice, in India paludibus innatans, hinc uingenta, quæ Malobathro odorabantur, foliata Romanis dicta sunt, expetebaturq; folium hoc preciosissimis quibusq; unguentis. Iam uero amplius non affertur, præterquam quod casu nonnunquam cum Nardo Indica affertur, ut semel atque iterum deprehendimus. Itaque operæ pretium nos facturos existimamus, si figuram ipsius descriperimus, ut aliis etiam id inquirendi ansam & occasionem præbeamus. Est autem Malobathrum, folium propemodum rotundum, & disci figura orbiculatum, trium fere digitorū, quoquo uersus latitudine, colore in fusco & spadiceo cinericeū, uenosum, densum, laurino crassius, lentum, flexile, & fractu contumax, nisi omnino aridum fuerit, gustu subacre, subamarum, tenue, per palatum se diffundens, orisq; halitum odoris gratia diu commendans, odore acre, Nardi æmulum & admodum aromaticum. Eius in locum Casia Cinamomi & Caryophylli folia substituta sunt, quæ pro Malobathro quidem in usum recipere licet cui libet: sed eadem Malobathrum siue folium Indum appellare non perinde licere arbitramur.

✱ Quod pharmacopole pro Folio ostendunt, non Folium uerum, sed Casia folium est.

DE CASIA [specie Cinamomi.] CAP. 12.

Cassia siue Cassia multiplices habet differentias. Est autem Cassia de qua hic agitur Cinamomo cognata arbuscula, cuius ramuli & furculi si cū ipso cortice, ligno adhuc inherente uendantur, Xylocasía appellantur: cum uero exempto ligno cortices tantum adportantur, Cassia Syringitis, uel Syringis nomine ueniunt, quoniam excavati cortices fistulæ similitudinem habeant. Talis est antiquorum Calsia fistula siue fistularis Cassia, Arabes uero aliam Cassiam fistulam in usum medicinae introduxerunt, recentioribus Græcis appellatam Casiam nigram: quæ fructus proceræ est arboris in India, & nunc etiam Aegypto, ut aliqui tradunt, nascentis. Eum fructum Aristobulus fabam Indicam uocat, quoniam longis siliquis claudit semina fabis non dissimilia, diuersæ penitus cum priore facultatis. Porro ueterum Cassia fistularis siue lignea multis sæculis in Europa uisa non est, sed eius loco cortex uenosus radices cuiusdam gustu acerbus & tenuis uenditur. Iam uero quorundam diligentia factum est, ut aliquot eius species rursus adferantur, sed tanta est quorundam pharmacopolarum ignauia & retinendorum erroris pertinacia, ut etiam admoniti, eam sibi non comparent. Habet autem Cassia hæc tantam cum Cinamomo similitudinem, ut alterutra

in aliam nō raro degeneret, ut Galenus scriptum reliquit. Itaq̃ difficile est etiā ipsius
Cassia species omnes dignoscere.

* Quod pro Folio hodie ostendunt, non uerum Folium, sed Cassia folium est. Daphnitiidis cognomen à folio laurino
factum putat Cordus.

DE CINAMOMO. CAP. 13.

† Species
ultima,
que proxi-
mè à Cas-
siam accen-
dit.

Cinamomi non pauciores quam Cassia species sunt: optimum autem est quod Ga-
lenus in libro de Theriaca ad Pisonem & de Antidotis describit: tali uero hodie o-
mnino caremus. Hactenus enim ex omnibus eius speciebus tantum unum illud t ad
nos in Germaniam allatum est, quod Arabes Darfeni, & Græci Characium, hoc est,
uallare uocant, propterea quod baculorum crassitudine uallos æquet. Quidam opi-
nantur nos in uniuersum Cinamomo carere, & uocatum uulgo Cinamomum siue Ca-
nellam Cassia potius speciem esse. Cum uero tam Cinamomi quam Cassie plures sunt
differentiæ, inter se ualde cognatæ, temerarium esset pronunciare nos in totū quouis
Cinamomo destitui. Cinamomum autem, ut hodie affertur, cortex est sui fruticis, ca-
nali conuoluto similis, ideoq̃ Canellam aliqui uocant: nos uero Cinnamomum en/
Cinnamomum en/ Canelsbordien, & Cinameti, id est Cinamomi cortices siue Cana-
les, siue libros, & Cinamomum appellamus.

DE AMOMO. CAP. 14.

Amomum, ut parens meus Euricius Cordus prodidit, est paruus ille & odoratus
frutex, ueluti unguibus quibusdā in racemosam faciem cōuolutus, quē monachi Ro-
sam de Hiericho, & Rosam Sanctæ Mariæ uocant. Cui sententiæ ego quoq̃ subscri-
bo, quoniam nihil offendo hoc in fruticulo quod Amomi descriptioni & notis repu-
gnet. Antonius Musa tamen, harum rerum diligens scrutator, huic iudicio contra-
dit, eo fretus argumento quod Amomo folia tribuantur Bryoniæ, quod quidem ne-
gare non possum: sed æquo animo de rebus iudicare oportet: authorumq̃ tradita,
& id de quo agunt auctores diligenter & fideliter perpendere. Dioscorides enim eo
modo depingit Amomum, quo in Oriente nascitur. Parens uerò meus de Amomo
iam dudum rescisso sententiam suam dicit. Ideo quamuis in Hierichuntide apud nos
neq̃ flores, neq̃ Bryoniæ folia deprehendamus, minime tamen certò quis statuatur, A-
momum non esse Sanctæ Mariæ siue Hierichuntida rosam. Quæ enim cōtumacia tan-
tillus frutex multos ante annos carptus, & in longinqua regione trans maria uetus,
toties pro miraculo ostentatus, & innumeris tractatus gestatusq̃ manibus, folia sua
reineret, cum etiā intacta in folitudinibus propemodū omnes, tam arbores, quam
frutices & herbes, singulis annis foliorum dehonestentur defluuio, & nuper decerpta
peregrinantiumq̃ capitibus imposita frons flaccescat, & quamprimum folia amittat,
uel leni admodū aure statui. Quare nō suspendat aliquē, quod Hierichuntis, siue San-
ctæ Mariæ rosa, Bryoniæ folia nō habeat cum ad nos adferretur. inquirendum potius
sit quibus tam facilis est in Syriam nauigatio, qualia sunt Hierichuntidi rosæ, adhuc
in Media & Assyria nascenti folia. Si Bryoniæ, maneat ergo ea Amomū: si uerò dissimili-
lima, tum primum hac de re merito dubitabimus: nemo enim temerē negauerit
nostrā Hierichuntida rosam Bryoniæ similia habuisse folia, cum adhuc in Oriente na-
sceretur. Igitur eousq̃ patris subscribimus sententiæ, donec manifeste demonstretur
Hierichuntida rosam dissimilia Bryoniæ folia habere. Est præter folia etiā aliud
quod Antonium Musam remoratur, nempe hoc, quod Hierichuntis rosa nares non
uulnerat, quantumuis recens, quod dictū quomodo ipse intelligat nō possum conii-
cere. A Dioscoride enim probatur Amomū τὸ ὀσμὴν πλεονεχόν, hoc est, odore feriens,
quod uidelicet acri & aromatico odore olfactus organa afficiat: id autē facit uera Hie-
richuntis rosa, nō tamen usq̃ adeo ferit & uulnerat nares, ut cruentæ fiant. nihil enim
ex censu aromaticum hoc odore facere potest, sed attractu, ut Garyophylli atq̃ optimū
Cinamomum. Itaq̃ non uideo cur Antonius Musa alioquin doctissimus uir, hac in re
scrupulosum intellectū excitare debuerit in uocabulo πλεονεχόν. Porro duæ sunt Hie-
richuntidis rosæ species. Altera tota lignosa, fractuq̃ cōtumax, gustu insipida, nec odo-
rata: Altera lignosa quidē, sed fragilior, gustu aromatica, ualde odorata, intusq̃ race-
matim concreto, semine plena, quarum prior Amomis, altera uerò Amomū uocatur.

Hierichun-
tis rosa du-
plex.

* Loco huius uulgo habent semen botryos: alij Sisonis. Arabes Pedem columbinum uocant. Est & alius Pes colum-
binus Geranij species.

Costi triplex genus apud ueteres, in Arabicum, Syriacum, & Indicum diuiditur. Recentiores uero, duas tantum ex sapore differentias statuunt: alterum dulcem, alterum amarum appellantes. Sed tanta est rerum confusio, ut is quem dulcem uocant amarus, & quem amarum nominant dulcior gustu sentiat. Conuenientius igitur est, ueterum modo secundum regiones, quibus nascitur species eius distinguere. Admonuit autem nos Dioscorides, quosdam pro Costo Comageni Helenii, hoc est Inulæ, in Comagene orientis regione, prouenientis radices uendere. Sunt enim nostra Campana Inulæ densiores, quapropter facile imperitis pro uero Costo substituuntur. Cuius doli nos quoque pharmacopolas admonemus, nam idem adulterinus Costus hodie non minus quam olim adfertur. Et præter hunc nullum alium habent pharmacopolæ uero Coste similiorem. Ideo quomodo adulterinus dignoscatur, docebimus, occasionem pharmacopolis genuinum inquirendi daturi. Obseruauimus autem sapissimè quatuor ad nos Costi appellatione afferri radices, genere & specie omnino diuersas. Primus enim aduehitur ex oriente Comageni Helenii radix, quæ nostrati Inulæ per omnia est similis, nisi soliditate & densitate tantum differret: colorem habet in cinereo candicantem, saporem amariusculem ut nostra, non tamen adeo acrem, idcirco ideo, quoniam inueterascit antequam ad nos perferatur. Affertur autem ea in partes per transuersum aut longum incisa. Cum transuersè fuerint incisa, nostram Inulam eodè modo incisam orbiculato rugarum habitu, referunt. Præter Comagenum Helenium nuper uendi cœpit Costi uice radix per transuersum in taleolas secta, crassitudine plerumque manum complens, foris fusco, intus candicante colore, cortice crasso, substantia rara, & leuis odore, cum teritur rancidam aliquam pinguedinem olens, gustu supra modum acris, nauseosa, rancida, saluam ciens, & strangulationem comminans. Vtraque adulterinus est Costus. Altera uero non sine uitæ periculo intra corpus sumitur: est enim Thapsiæ species in monte Gargano effossa, ut ipsi ex Agyrtis audiuius, qui semen eius nobis attulerunt, in umbellis foeniculi aut anethi modo enatum, crassum, nigrum, magnitudine et figura tritici, sapore radices suæ quam Agyrtæ corrupto nomine una cum Italis Costones, quasi Costum amarum uocant. Huius autem usum ad interanea non temere probamus, foris uero imposita efficacius etiam uero Costo & profundius attrahit ruborem, tumoremque excitat & exulcerat ut Thapsia, cuius speciem esse ante diximus. Veri autem Costi in antiquis & bene instructis per Germaniam pharmacopoliis, species deprehendimus duas, quarum altera Syriaci, altera Arabici Costi historiam representat. Altera enim radix est duum ad plurimum digitorum latitudine, per transuersum in taleolas secta, colore candida, pondere leuis, gustu acris, aromatica, acrimonia sua diu palatum oblidens, odore acris, iucunda, orisque halitum ad longum temporis spacium bonitate odoris commendans. In summa, nihil deest quod ad Arabici historiam attinet. Altera crassitudine iam dictam æquat: sed buxæ colore, & pondere differt, odore tamè ac sapore Arabico omnino similis. Tales quidem sunt Arabicus & Syriacus Costus. Indicum uero nondum nobis uidere licuit. Interim pharmacopolas hortamur, ut uerum costum emere studeant, & repudient tandem adulterinum. Porro non me latet, Hieronymum Tragum credere costum etiam apud nos in Germania nasci, esseque eam herbam quæ Germanis Pestilenzwurts uocatur, quam opinionem omnino improbamus, non tamen ideo existimet quispiam nos quidquam hac in re detrahare auctoritati uiri alioqui optimi, & in iuuanda herbaria medicina diligentissimi. eius enim studium & industriam ita probamus ut nunquam alterius, qui ante eum in Germania lingua nostra aliquid de simplicibus medicamentis scripserit. Quid autem sit ea radix, quam ipse costum esse contendit, suo loco indicabimus, quarto Dioscoridis libro, cum ad Petasitis historiam perueniemus.

* Est & herba Costus, quam aliqui Mentam Saracenicam uocant, Marienmünz.

DE SCHOENO, [Id est, luncum odorato rotundo: quem Squinantum uulgo uocant.] CAP. 16.

Ἐσχοίνος Græcis luncum significat, qui in duo diuiditur genera, alter enim odoratus.

A iij

Helenium
Comageni
pro Costo.

Thapsiæ
maioris radice
dix pro Costo
lib.

Veri Costi
species
duæ.

ratus cognominatur, alter palustris. Hoc autem loco inter aromata recenset Dioscorides, priorem & odoratum illum in Syria, Arabia & Lybia nascentem, quem Græci *μυρρίκη* et *ῥιζομύρρη* cognominant, Latini luncum odoratum teretem et rotundum, ut distinguatur ab anguloso odorato luncu, de quo supra in Cypero dictum est. Græci tamen plerumque sine cognomento *ῥιζομύρρη* absolute scribentes, semper rotundum odoratum luncum intelligunt, quod meminisse Græcorum lectores oportet. Expetebantur autem olim huius odorati teretis lunci omnes partes ad medicinam; culmi uel delicti, flores, coma, & radices: præferebatur tamen alijs flos, quem peculiariter *ῥιζομύρρη*, uel composito nomine *ῥιζομύρρη* appellabant. quo quidē nomine hodie in pharmacopolijs non flores, sed culmi eius habentur, uerum corrupto: nam Squinantum appellant. Itaque floris nomen culmis & stipulis inditum est, non enim ad nos flores perferuntur, nec est aliquis nostrorum negociatorum (quos nos percontati sumus) qui in tota uita sua huc allatos uidisset. Quod quidem mirum non est, cum olim etiam in ipsam Græciam non amplius deferrentur. Miratur enim Galenus eos qui lunci flores semper expetere solebant, nam eius quoque ætate in Græciam referebatur odoratus rotundus luncus, summitate Camelis prærosus. Libentissime enim eo uestuntur, ut ipse testatur: ob quam causam nostri hunc odoratum teretem luncum, *Ramelstro* & *Ramelshaw* hoc est, Camelorum stramen & scœnum appellant, qua quidem in re Galeni dictum confirmant. Contuli autem aliquoties hac de re cum mercatoribus, nonnullisq; alijs grandæuis & magnis uiris, qui uisendæ terræ sanctæ gratia in Orientem hinc proficiscebantur. Ii retulerunt, negociatores ex Syria Alexandriam ducere Camelorum greges, quos Carauanas uocant, impositas merces ferentes, cum autem in solitudines perueniant inter Syriam & Aegyptum ad Arabiam sitas, neque pabuli neque aquæ copiam inueniri, nasci tamen se eas uias ubique aridas ueluti stipulas easque numerosas, densas, & stipatas ex uno radicum cespite, admodum odoratas: quas obiter inter eundem aut alijs quiescentes depascant Cameli, eamq; ob causam se pabulum hoc *Ramelstro* & *Ramelshaw* appellare. Referebant etiam illos solere tali pabulo Camelos onerare, ne in sterilibus locis deficerent iumenta: quod uero super sit Alexandria & Alkairi ipsi admodum uendere.

DE CALAMO AROMATICO. CAP. 17.

Duo sunt Calami hoc est harundinis, quemadmodum etiam lunci, prima diuisione genera. Alter uulgaris ubique aquis & stagnantibus locis nascens: & odoratus alter, in India, Arabia Syriaq; proueniens, de quo hoc loco Dioscorides agit. Vulgo in omnibus pharmacopolijs radix quædam calami aromatici nomine uenditur, sed nihil habet cum uero calamo similitudinis: antea autem a nobis indicatum est eam genuinum esse Acorum. Sed operæ pretium nobis esse uidetur rationes, quibus inducti id statuamus, hoc loco referre, ne uideamur sine iusta aliqua causa & temere tot sæculis receptam opinionem impugnare, quamuis primi non simus: cum ante nos Manardus & parens noster Euergetius Cordus idem fecerint. Vt autem res tota, legentibus hos nostros commentarios intellectu facilius fiat, eam paulo uerbosius prosequemur sumpto ab historia & descriptione calami aromatici exordio. Principio igitur hæc ordinata planta Calami nomen inuenit, quoniam Calamo, hoc est, harundini alicui uulgari figura & habitu similis existit: uidelicet distractis per obliquum transuersumq; radicibus, culmorum radicumq; geniculatis internodijs, & in his fistulæ simili cauitate, araneorum telas referente in his lanugine, & tereti habitu. Aromatici uero cognomentum ei propter odoris iucunditatem inditum est. Itaque quantum ex omnium authorum concordia historia, ipsaq; oculata fide & propria inspectione colligere possumus, Calamus aromaticus est uulgari harundini similis, culmos emittens minoris ut plurimum digiti crassitudine, interdum uero graciliores, ex interuallo geniculis interceptos, fistulæ modo concavos, atq; in ipsa cauitate araneorum telæ similem lanuginem habentes, colore in candido rufescentes. Radicibus nititur culmis descriptis similibus, candidioribus tamen & crebrioribus geniculis præcinctis, cauis & ipsis. Odor & sapor tam radici quam culmo acris, suauis, aromaticus, Schoeno quem Squinantum uocant non admodum dissimilis, sed iucundior.

Acorum
pro Calamo
uendi.

andior. Talis igitur est Calamus aromaticus uerus, quem aliquoties in pharmacopoliis inter Squinanti, ut uocāt, stipulas & Spicam Indicam inuenimus. His enim nō nunquam calu immixtus ad nos fertur, aliās autem per se non aduehitur. Subscribimus igitur nos quoq; iis qui tradunt, nos Calamo aromatico carere: nam uocatus in pharmacopoliis absolute Calamus, aut cognomento aromaticus, neque geniculatus harundinis modo ex intervallo radices aut culmos, neque concauas habet, neq; iubatam in summitate paniculam, sed magnum florem lridi æqualem, colore luteum, caulem q; & radices solidas. In summa, lridi cognata est planta, nihilq; aliud quam uerus Acorus. Porro nihil mouet nos Hermolai Barbari doctissimi alioqui uiri autoritas, scribentis se legisse, in Mæotide etiam odoratum nasci Calamum, radice subalbida & sine fistulis, plena intus & amara, specie Acori, hoc est, ut recte intelligamus falso uocati Acori: nam hic Calamus quem Barbarus describit, idem cum uocato uulgo Calamo aromatico existit: ideoq; non merito eos reprehendit qui hunc Acorum esse putant. Quod autem dicit utrumque genus Acorum odore superare, ita intelligendum est. Verus Indicus Calamus, & qui Calami nomine ad Mæotidem paludem nascitur, odoris bonitate uincunt eam radicem stypticam falso Acori nomen habentem. Hæc ideo longius executi sumus, ut pharmacopolas & negociatores instigarem, ut tandem genuinum Calamum expectant. Nam si Nardi spica, Cardamomum, & alia aromata, ex India, Syria, & Arabia afferuntur: quid impedit quo minus etiam Calamus ad nos aduehi queat? Sed pleraque huiusmodi confusiones & errores sordidus quæstus & foeda lucri cupiditas, bonarum & honestarum rerum omnium calamitas, peperit.

DE BALSAMO. CAP. 18.

Balsamum parua est arbuscula, numerosis sarmentis fruticosa, cuius historia & descriptio non est eadem cunctis authoribus: aliis picea, aliis Terebintho, aliis Pyxanthæ similem tradentibus. Propterea difficile nobis est, quicquam certi de ea prodere. Partes eius tres medicis usui sunt, uidelicet lignū quod Xylobalsamū, fructus quem Carpobalsamum & Cassamum, atque liquor quem Opobalsamum ac Balsamelæon uocant. Efficacior omnibus liquor, proximè fructus, postremum bonitatis locum sarmentorum siue lignum obtinent. Cortex tamen sarmentorum ipsū lignum medica uis superat. Fuit autem omnibus huc usque sæculis maximum præceteris aromatibus cunctis Balsamo præcium, ideoq; mille modis adulterabatur, præcipue liquor, deinde etiam fructus, atque ipsa uirgulta. Hodie uerò ne adulterati quidem Opobalsami copia nobis contingit. Nouimus in omnibus pharmacopoliis pro Xylobalsamo ostendi tenuia quædam uirgulta, ex quibus maxima pars fatua, omnisq; odoris & saporis expers existit. Non dubium igitur, quin pro Xylobalsamo alterius cuiusdam fruticis surculi uendantur: reperiuntur tamen inter eos nonnunquam qui mirum in modum odoris & saporis gratia commendantur. Idem quoque de Carpobalsamo uocato usu uenit. Semina inania sunt & insipida, habentq; figuram Hyperici fructuum, qua figura etiam Dioscorides nothum Carpobalsamum depingit: non raro tamen inter ea inueni quæ maiora essent adulterinis granis, pleno pinguique intus & oleoso nucleo, odoris in attritu gratissimi, & quæ gustu ineffabili odoris, saporisq; gratia oris halitum diu commendarent. Porro ipsum Carpobalsamum uix credo ad nos afferri amplius, uastatis Syria, ludæa, & nunc etiam Aegypto, Turcarum & Barbarorum rabie & incursionibus. Ita que nemo speret temere se synceram Balsami lachrymam consecuturum. Vidimus tamen uerum Carpobalsamum, quod hominum memoria aliqui ex Aegypto attulerunt, Hierosolymis huc reuersi, colore fuluum, lentum, spissum & inueteratum, interim tamen suauissimi adhuc odoris, cuius tantillum totū palatum penetraret. Hæc itaq; dixisse hoc loco de Balsamo sufficiat. Totam autem partium Balsami historiam & descriptionem desiderantes, remittimus ad Plinium, Pausaniam, Strabonem, Heriolum Barbarum, Ruellium, & alios, qui de toto frutice longius scripserunt. Nos quoq; alibi paulo diligentius quam hoc loco Balsami partes descripsimus, ut uolentes in libris nostris de historia simplicium medicamentorum inquirere possunt.

DE ASPALATO. [Eruditi quidam fruticem, quem pro Acacia pingit Matthiolum, Aspalati speciem faciunt.] CAP. 19.

Aspalati appellatione hodie nusquam in pharmacopoliis medicamentum habetur. Est autem odoratus, spinosusque frutex, ut authores tradunt. Possunt autem rerum studiosi totam eius historiam ex Plinio, Hermolao & Ruellio discere, nobis nihil certi haecenus scrutari licuit quod ad eius cognitionem faceret. Non enim nomine tantum incognitus est, desideratur etiam ipsa res. Recentiores uero omnes, praesertim uero Serapionis interpretes, tradunt Darisahan, hoc est Aspalatum esse Puniceam sylvestrem, seu ut ipsorum uerbis utar, arborem mali Granati sylvestrem: quod

Quod non sit Malus Punica sylvestris.

nemini sano iudicio praedito unquam persuadebunt. Aspalatus enim odoratus gustuque subacer est frutex. Punicea uero tam Sylvestris quam sativae materiae cortex nihil odorati, nihilque acrimoniae praeseferunt, praeterquam quod folia grauem aliquem fetorem, ferè ut Cynoglossa & uirens Sena atrectata emittant. Huius autem erroris causa est magna inter Puniceam sylvestrem & Aspalatum, similitudo. Vtraque enim arbuscula fruticosa, multique spinis armata est, utrique etiam roseus flos. Nonnulli uero uehementius impingunt, qui credunt Aspalatum siue (ut Arabes uocant) Darisahan idem esse cum Berberi, spinoso frutice, a quibusdam Oxyacantha uocato, qui & ipse sylvestri punicea non dissimilis existit, idque

Quod non sit Berberi.

tanquam secretum magnum solos se scire opinantur, quam opinionem omnino reprobamus. Scimus etiam Ioannem Ruellium constanter affirmare, Aspalatum

Quod non sit lignum Rhodium.

esse lignum Rhodium, uulgo (ut ipse ait) Rodoen appellatum, quod mango- nes officinarum persape pro Algaloch, hoc est ligno Aloe substituant, idque tanto- pere affirmat, ut dicat nullos nisi ueritatis furdos hoc inficari posse. Nos autem saluo omnium bonorum sano iudicio, id inficari nos ingenue fatemur, qui & ipsi tamen indaganda ueritatis magno flagramus studio & desiderio. Quare si quid contra eius sententiam pronunciare cogimur, id faciemus rei cognoscendi studio, non quod auctoritati doctissimi alio qui uiri quicquam detrahare conemur. Statuimus autem contra eius iudicium, lignum Rhodium non esse Aspalatum, haud absurdum rationibus inducti. Principio igitur illud nouisse legentes oportet: lignum Rhodium, quod Ruellius uulgo Rodoen appellari scribit, idem esse cum eo quod apud nos a quibusdam Rhodifium appellatur lignum. Venditur enim saepe pro Algaloch, quod etiam Xilaloen, hoc est, lignum aloen uocant, & ponderosum est, ita ut aque immersum lapidis modo subsidat, nec unquam postea emergat. Fiunt ex eo quoque globuli quibus funiculo traiectis praeces suas mulierculae numerant. Est praeterea odoratum, in sum-

Ruellij argumenta, quod Rhodium lignum sit Aspalatus. Fortè nos.

ma idem est cum Rhodio cuius Ruellius meminit, nostrum Rhodifium lignum. Com- pellimur autem deinceps singulas eius recitare notas, quas Ruellius Aspalati historiae & descriptioni applicat, & per omnia conuenire constanter affirmat. Primum existimat Rhodium lignum cum nasceretur fruticosum fuisse, idque nobis testari qui bus adhuc ex asperatum scateat, spinis nonnunquam inhorruisse arbusculam, putat declarare aculeorum uestigia. Modicam arborem uel fruticem fuisse, satis ligni reliquias docere. Pondere etiam respondere Aspalato Rhodifium lignum asserit, quoniam lapidis modo confestim praecipit sidat. Addit praeterea hoc lignum subrubere, & in purpuram quandam, exuto cortice, tendere, atque duriciam & spissitudinem eius tactu sentiri. Odoris quoque suauitatem indicare ligni suffitum, gustuque lenem amarum- lentiam recipere, & quadantenus amarescere: denique gustu deprehendi in eo acrimo-

Eadem diluta.

moniam & adstringendi uim quam Galenus Aspalato tribuat. Haec sunt eius rationes, quibus suam sententiam confirmare conatur, eas sigillatim confutare ueritatis causa cogimur. Principio autem ex nodis nemo ratioeinarum potest fruticem Rhodium lignum fuisse, cum non tam fruticibus quam arboribus proprii sint: neque ullapars definitionis habeantur fruticem designantis. Theophrastus enim fruticem definiens libro primo de historia plantarum sic inquit: *ῥαμνός* (seu ut quaedam exemplaria) non admodum bene habent, *ῥόγανον δὲ τὸ ἀπὸ ρίζης καὶ πολυτέλειης, καὶ πο- λυκλάσας, διὰ βέτος, παλιν*: hoc est, ut Theodorus Gaza uertit: Frutex uero, quod ab radice, caudice multiplici ramosumque se attollit: ut Rubus, Palurus, & nullam facit nodorum mentionem, sicuti paulo ante in arboris defini- tione

tione fecerat. *ῥυδιόν*, hoc est arborem *ῥυδιόν*, id est, nodosam uocans. Ad hunc
 modum neque alii qui ex partium omni ratione aut circumscriptione fruticem de-
 finiunt, nodos ei assignant. Igitur quod nodi in Rhodio ligno scateant, non probat
 fruticem fuisse: sed intortam & tuberosam arbusculam. Est enim incurua, tuberis
 bus & conuolutis pectinibus intorta eius materia, quæ res manifeste indicat arbo-
 ris potius caudicem quam fruticis uirgas fuisse. Ferè enim omnes frutices (paucis ad-
 modum exceptis) multis longis, rectisq; uirgis à radice assurgunt, ut spina Crispina,
 Rhamnus, et Oxyacantha: adde Corylum, Ficum, Sambucum, Agnum, Eleagnum,
 & id genus alios. Quo fit, quod non existimemus, solum Aspalatum tortis enasci cau-
 dicibus. Si uero id ipsum quis affirmet, ei confestim argumentum ex nomine sumptum
 obiciemus. Dicitur enim Aspalatus alio uocabulo etià Erylisceptrum, quæ uox plu-
 ribus comis est herbis, ut Cypero, Chamæleoni albo, Spina alba. Obseruauimus
 autè nos diligenter nō nisi recta attollentibus & capitatis herbis, Erylisceptri cogno-
 men, propter aliquam sceptri similitudinem, imponi. Sic enim sceptri cacumen emu-
 latur utriusq; Chamæleonis Capitulum, sic etiam Cyperus in erectiorū caulium sum-
 mitate diffusa gerens comam sceptri imaginem representat. Quemadmodū quoq; spi-
 na alba quæ procero, tereti, & harundineo caule, cauliq; imposito capitulo non dissi-
 milem scepro præ se fert figuram. Itaq; etiam Aspalatū recta in altū attolli censemus,
 cum & ipse Erylisceptri nomine gaudeat: quare hoc Ruellii argumentum nō probat
 fruticosum Rhodii ligni habitum. Quod autem subiungit spinis id inhoruisse, ut
 declarant aculeorum uestigia, multo est incertius. Apparent quidem in superficie ei-
 us tubercula quedam, & nodi, & præcisorum ramulorum uestigia, sed quæ nihil mi-
 nus referant quam aculeorum reliquias. Aculei enim Aspalati, quantum ex Theocri-
 to etiam colligere possumus, graciles & ad uulnus infesti sunt, quemadmodū Rham-
 ni, minimeq; crassi aut lati, ut tanta uestigia tuberaq; occupare aut tegere unquam po-
 tuerint. Deferimus igitur hanc rem omnibus bonis & æqui iudicii hominibus diu-
 dicandam, qui aperte cognoscent, nullis aculeorū uestigiis exasperari id lignum, sed
 ramorum potius resectorum & tuberosorū nodorum reliquiis inæquale reddi. Fa-
 tetur tamen ipse quoq; Ruellius, spiculis suis castratū id afferri. Quapropter nec ista
 ratione cuiquam persuadebit, spinosum fuisse Rhodium lignū. Modicam arborem
 fuisse ipsi quoq; ex materia non usq; adeo crassa colligimus. Sed non continuo Aspa-
 latus est, quod modicæ arboris magnitudinem habet. Neq; enim adeo gracilia sunt
 hæc ligna, ut fruticis fuisse uideri possint: afferuntur enim sapissime quæ una manu
 nemo complectatur. Vidimus nos non raro à caudice aut radicum principio resecta
 tubera, quæ crassitudine utramque manum implerent, & propter eam amplitudinem
 pocula ex ipsis facta memini. Contra Aspalatus frutex, quo medici usi sunt, ea crassi-
 tudine non describitur. Quod uero ponderosum sit lignum Rhodium, perinde non
 comprobatur Aspalatum id esse: non enim quicquid ponderosissimum est & lapidis
 modo aquæ iniectum subidit, Aspalatus, nominandum erit, cum nullus unquā scri-
 ptor tanti ponderis tantæq; densitatis notam Aspalato tribuerit. Confertur enim
 (quod ad pondus hoc loco attinet) sibi ipsi ab auctoribus Aspalatus. Itaque in eo pro-
 batissimus cēsetur, qui in suo genere densissimus & ponderosissimus fuerit. Siquidē
 non tradūt auctores omnium lignorū ponderosissimum esse Aspalatum. Nam quæ
 pondere alias superant arborum materiæ numerantur, (Ebene,) Buxi, Oleastri, &
 id genus arborum, quarum nulli ferè pondere inferius est Rhodium lignum. Nos
 uero non ita ponderosum esse Aspalatum uel inde colligimus, quod quidam seru-
 laceus esse Plinio dicatur, hoc est rarus, fungosus, leuissq; qui improbatur & probatur
 ponderosior. Ergo credendum est Aspalato materiam esse densiorem, lignosorem,
 & grauiorem Ferula, non omnium ponderosissimam, sed natura accedere ad ligni ali-
 cuius lentorem & duritiā: id enim Dioscoridi aliisq; Græcis significat *εὐλόγος*, &
 Latinis lignosus, non quod omnia ligna soliditate uincit, sed quod prope ad ligni na-
 turam duritia accedit, illud enim non lignosum sed lignum & plusquam lignum ap-
 pellandum est. Longe igitur maius est Rhodio ligno pondus, quam Aspalato tri-
 buit: quapropter neque densitas eius nimia, neq; modum excedens duritia, neque
 tactu sensibilis spissitudo causæ censendæ sunt, ob quas Aspalatus uideri possit.
 Negamus etiam subrubere & in purpuram quandam exuto cortice tendere hoc li-
 gnū.

*2. n. Ruellii
 n. n. n.*

3. n.

4. n.

gnum. Miror autem cum Rhodio ligno diuersi sint, sibiq; alternis uicibus immixti colores, cur silentio præterierit candicantem, & pallidum: rubescentem tantum & purpurascensem eligens forte, quia hi propius quam illi ad descriptionem accedebant. Sed pace Ruellii & uenia bonorum omnium dixerim, non rubescere, neque ad purpuram uergere Rhodium lignum. Floridi enim & iucundi aspectus *ὑπερυδρος* & *πορφυρίσκου* colores, significatq; prior uox illa medium inter candidum & sanguineum aut roseum colorem: altera ex modico candido & roseo in profundiore, hoc est purpureū uergentem. Rhodium uero lignum talibus nunquam blanditur coloribus, sed habet uenas partim albicantes, partim pallidas, partim in spadiæ ceo fuscas et nigras: qui omnes aspectu luridi sunt, nec quicquā gratiæ præter diuersitatem habet, rarissimeq; inuenitur quod nō distinctos habeat hos omnes colores. Aspalatus uero neque pictus est neque maculis diuersi coloris distinctus, sed uno tantum conspicitur, ex duobus tamen perfecte mixtis. Miror etiam non dubitare aut perpendere Dioscoridis interpretes cuinam Aspalathi parti inesse debeat subrubens aut purpurascens color. Nam dubium nobis relinquit Dioscorides, utrum de cortice an ligno id intelligendum sit, cum probat aspalatum *μετὰ τὸ περιφλοιιδῆναι ὑπερυδρον, ἢ πορφυρίσκοντα*, hoc est, post excorticationem subrubrum aut purpurascensem, indefinite enim ponitur infinitiuus *περιφλοιιδῆναι*. Interpretes uero omnes, quemadmodum etiam Plinius infinitiuo modo positum uerbum in participium Latinum conuertunt: quo fit ut omnes intelligent eum colorem ipsum lignum præ se ferre debere, postquam deglubatur. Nos uero contrarium intelligimus, censemus enim id de cortice dicere Dioscoridem. Nam quamuis totus hic frutex Aspalatus nominetur, à medicis tamen id nomē etiam ad certam eius partem, quæ maxime usui fuit translaturum esse uerisimile uidetur. Ita enim Casiam, ita Cinamomum appellamus, cortices tantum suarum arborum, cum id nomen aliàs totis arbutis & fruticibus proprium sit. Quemadmodum enim omnes odoratæ arbusculæ & frutices cortice maiorem quam ligno gratiam habent, ut Cinamomum, Casia, Balsamum & alia eiusmodi, ita etiam in Aspalato se rem habere ratiocinamur, sed id nostra auctoritate uix alicui persuadebimus: igitur ueterum testimoniis adductis forte fides nobis habebitur. Plinius naturalis historiæ libro XXIII capite XIII inquit uulgaris cuiusdam & syluestris spinæ (quæ Aspalatus nominetur, & ex qua urnæ fullo-niæ implentur) radicem usum præbuisse, eaq; multos per Hispanias fuisse usos ad odores & unguenta. Dein de subiungit historiam Aspalati ut in oriente nasci ab auctoribus describitur, & nos non dubitamus, quin ea spina eadem cum aspalato fuerit. Omnia enim de ea scribit quæ alii aspalato tribuerant, postquam in oriente geniti Aspalati uires recensuisset, dicens. Similia præstare quoque Syluestrem putant. Non enim refert quod uulgarem hanc dicat spinam, nam uulgaris etiam erat Aspalatus in Aegypto, Syria, Cycladibus, Sicilia, Creta, Rhodo, Nisyro, Phocidis agro, & pluribus locis enascens, ut Plinius scribit: sed non ubique odoratus. Itaque Aspalatus qui in Hispania uulgaris erat, nobis qui frigidiora loca incolimus, non perinde uulgaris & cognitus est. Fuisse autem radicis usum iam ex Plinio probauimus, non tamen indicat num totæ radices an cortices tantum medicinam fecerint. Igitur afferemus etiam aliorum testimonia. Serapion in capite Darisifahan, hoc est aspalathi adducit auctoritatem cuiusdam Sulachin, dicentis hunc in modum: Darisifahan est planta spinosa, ingrediens in speciebus medicinarum odori ferarum, & habet florem croceum, & cortex ligni eius tendit ad rubedinem. Idcirco si Arabs Sulachin, subrubrum colorem cortici inesse scribit, cur non etiam apud Dioscoridem uocabulum *ὑπερυδρος* ad Corticem referimus potius quam lignum? nam si lignum subrueret, de eo adscripsisset Sulachin, & non de cortice: quapropter iste color tribuitur ei Aspalathi parti, quæ plus cæteris in usu fuit. Fuisse autem Corticis usum in medicamentis testatur Galenus diuersis locis: libris de Theriaca ad Pisonem, & de Theriaca ad Pamphylianum in magmate Hedychroo secundum Magni descriptionem. Vtroq; enim libro recipiendum esse iubet ad confectionem Hedychroi magmathis, *ασπάλαντος ῥιζος φλοιόν*, hoc est Aspalathi radicis corticem. Idem testatur Aëtius in suffumigio quodam, corticem Aspalathi recipiendum præcipiens. Cum uero corticis, & præsertim ex radice usus fuerit, & rubescens color manifeste cortici à Sulachin

videtur add. in Collegio pharmacop. p. 209.

labin Arabe assignetur, nemo temere affirmabit, ipsum Aspalati lignum rubere aut purpurascere, & utilius Cortice in medicina esse. Contra in Rhodio ligno cortices, studio & industria, ceu omnis aromaticæ facultatis & utilitatis expertes, cum proxima & exteriori materia profundius resecta abiciuntur, soliusque ligni cor odore & sapore commendatur. Ideo neque hac ratione Rhodium lignum Aspalatus esse potest. Odoris autem suauitatem in eius suffitu deprehendi non imus inficias: sed multa sunt præter Aspalatum odoramenta quæ iucunde olent per se aut prunis imposita. Taceo autem quod Aspalatus odor ad Castoreum accedere quibusdam scribitur, qualem odorem in Rhodio ligno tam crudo quam prunis imposito non percipimus. Miramur præterea cur Ruellius dicat Rhodium lignum letiem amarulentiam respicere, quod antenus amarescere, cum non inclinet tantum ad amaritudinem *resipit, quam in Aspalato esse debet. Si uero accurate gustum consulamus, Oleastri saporem sed amariorem & acriorem in eo sentiemus. Galenus qui alias diligenter medicamentorum sapores considerat, & nihil, quod ad diiudicandas eorum qualitates attinet, prætermittere solet, nullam amaritudinem Aspalato tribuit: quam si euident in eo esset, nequaquam silentio præterisset. Rhodio uero ligno tanta inest amaritudo, ut nullius gustum fugere possit: cui adiuncta est, cum aliqua adstringendi ui, manifesta acrimonia, quæ paulatim incipiat donec prorsus exalefactas fauces, propemodum ut Cocognidium exasperet & feruore detineat, quare id in tertio gradu completo, calidum pronunciamus. Aspalato contra dilutius est temperamentum. Habet enim, ut Galenus testatur, diuersas qualitates, acrem quidem calefacientem, stypticam uero refrigerantem: itaque in caliditate & frigidityte medium quiddam obtinet, ut ex uiribus ei attributis ratiocinamur. Si uero aliquantulum superat acrimonia adstringentem facultatem (quod tamen nullus asserit) primum ei completum caliditatis gradum assignemus. Quemadmodum etiam facit Serapion, illud inter medicamenta recensens, quibus primus est in siccitate & caliditate excessus, quod Aspalati temperamentum duobus gradibus excedit Rhodii ligni caliditas. Porro cum hæc Rhodii ligni notæ non possint ad Aspalati historiam referri, haud uideo qua aliquis ratione nobis persuadeat, idem esse Rhodio ligno Aspalatum. Sed obicitur nobis fortasse, quod potius indicemus quid non sit, quam quid sit Aspalatus. Verum æquos animos legentium id non spero offensurum. Longius enim ideo negotium tractauimus, ut reiecta falsa de Rhodio ligno opinione alios etiam instigaremus, ut uerum inquirant Aspalatum, quod nos etiam conabimur. Allatus est hæcenus in totam Europam pro Cassia lignea cor-
tex radicis cuiusdam, crassiusculus, colore purpurascens, præsertim fractus, gustu stypticus, tenui odore gustantium palatum achalitem commendans, quem ex Aspalati specie aliqua detractum opinamur, nihil tamen affirmamus, antequam ad reiectam cognitionem perueniamus. Vt autem aliquam calumniæ partem effugiamus, ostendamus quid sit apud autores Rhodium lignum, cum Oleæ Aethiopice historiam attigerimus.

DE MUSCO. CAP. 20.

Duo sunt medicis præcipui odoris medicamenta, eodem ferè nomine insignita. Alterum Muscus, alterum Moschus appellatur. Quod Moschi nomine ab Aethio dicitur, Indicæ cuiusdam Capræ odoratum pus est, cuius usum nos Arabes docuerunt. Quod autem Latinis Muscus, ueteribus Græcis *βρύον* & *εμάχρος*, recentioribus uero etiam *μύσος* siue *μύσος* dicitur. Villosa & odorata arborum canities muscus est, e Cedri, Quercus, Populi albæ & aliarum quarundam arborum ramis dependens: quæ crebro in odoratis unguentis, suffitibus & cæteris medicamentis usa est antiquitas. Quamuis autem musci appellatio quarumcumque arborum uillosam caniciem significet, quotiescunque tamen Bryi, Musci, Splachni aut Hipni uocabulum apud Græcos legentibus occurrit, semper intelligendus est hic odoratus arborum muscus, quem Arabes Vfineam uocant. Non me fugit Hermolaum Barbarum differentiam inter Bryon & Brion constituere, nec conicere possum qua fretus sit autoritate aut ratione. Nam candidos illos albæ Populæ racemosos

musci uillos, quos Barbarus Brion dici tradit, Dioscorides etiam Bryi nomine comprehendit. Quod autem alibi Brion alibi Bryon apud authores legatur, librarium incuria accidit, pro u litera i, scribentium. Aëtius pluribus locis testatur ὕπνιον siue ὕπνον idem esse quod βρύον & ἑπλάχνον, hoc est, muscum arborum odoratum. Idem tamen author libro xxiii. capite cxviii in Masuaphi confectione interprete Iano Cornario, scribit Hipnum canaliculam paruum esse ex arbore quæ Damascena dicatur, itemque ex ea quæ Rhodacinea appelletur. Qua quidem in re miror Aëtium, si modo non mendosum est eo loco Græcum exemplar: non enim tantum contra aliorum omnium auctoritatem, sed & contra suam ipsius sententiam id protulisset, cum alibi muscum ὕπνον esse dixerit, cui nihil simile canalicula quæpiam habere potest. Itaque mendosum suspicor esse hac parte exemplar, quod interpres Cornarius queritur etiam situ, carie & blattis exesum fuisse. Per canaliculam autem intelligendus est cortex ex arbore Damascena detractus, canalis figuram habens, quemadmodum in Cassia & Cinamomo uidemus. Cum autem à nullo alio Hypnus cortex aut Canalicula esse dicatur, & ipse Aëtius sæpe testetur Hypnum idem cum Bryo, hoc est, † pansco, & splachno esse, non potest fieri quin defectus quidam sit in isto uerborum contextu. Coniicio uero statim Hypni uocabulum in integris exemplaribus sequi Aspalatum aut alium quendam odoratum corticem, de quo id dicat Aëtius. In eam enim confectionem alias non ingrederetur Aspalatus, qui tamen peculiariter omnibus ferè odoramentis misceri solet. Præterea canaliculato Aspalati cortice medicutebantur, nascitur etiam in Syria & Rhodo insula Aspalati arbuscula, ideo non sine ratione à Damasco Syriæ urbe & Rhodo, natalibus suis, Damascena & Rhodacinea nominari potuit. Scio tamen Aëtio Rhodacini nomine etiam Persicam malum dici. Cum uero Persica malus procerior & crassior sit, quam ut tam parue canaliculæ ex ea deglubi queant, non uideo qua ratione aliquis per Damascenam aut Rhodacineam arborem, Persicam malum intelligere debeat, præsertim cum nihil habeat quod iucundè oleat Persicæ mali cortex, siue à caudice, siue ramis, siue radicibus detrahatur. Quantum uero ex interpretis Cornarii translatione colligere licet, uidetur differentiam constitutere inter Damascenam & Rhodacineam arborem. Dicit enim: canalicula ea parua est ex arbore quæ Damascena dicitur, itemque ea quæ Rhodacinea appellatur, ea ratione canalicula cuius meminit Aëtius non esset unius eiusdemque arboris cortex, sed duarum diuersarum, quod omnino absurdum est. Species enim indiuidua cum sit ea canalicula, è singulari etiam arbore eam detrahi necesse est. Quare nos ita potius legendum apud Aëtium existimamus. Canalicula ea parua est, ex arbore quæ Damascena dicitur, quæ etiam Rhodacinea appellatur. Non tamen quisquam existimet nos interpretem culpasse. Credimus enim uitio exemplaris id accidisse, quam primum autem Græci exemplaris copia nobis facta fuerit, diligenter hunc locum considerabimus. Hactenus enim non licuit nobis sua lingua scriptum legere. Porro hic odoratus arborum muscus, nusquam in Germaniæ pharmacopoliis cognoscitur, nec credo ipsum temere in reliquis Europæ nationibus aut uulgo haberi aut cognosci. Recentiores magno errore muscum & moschum diuersissimi generis medicamenta, nominis similitudine decepti, confundunt. Muscum enim uocant non odoratos arborum uillos, de quibus iam diximus, sed latè olens Indicæ cuiusdam capræ pus, quod proprie Moschus ab authoribus nominatur, & à quibusdam recentioribus Castoreum, quamuis plurimum à Moscho Castoreum differat: quoniam uero non raro Moschus folliculis & utriculis Castoreo similibus inclusis uendatur, atque ut ipsum ferè grauiter oleat, propter aliquam similitudinem id nomen adeptus est. Oportet igitur circumspectos esse lectores ut discernant an Moschus, an Castoreum apud aliquem huiusmodi scriptorum recipiendus sit.

DE AGALLOCHO. CAP. 21.

Agallochum odoratum est lignum, quod recentioribus Græcis Xyloaloe, hoc est, lignum

lignum Aloë appellatur, quo nomine uulgo in pharmacopoliis ostenditur. Quis-
 dam è recentioribus id etiam simpliciter Aloë & Aloa nominant, quorum in nume-
 ro est Ludouicus Vartomannus, qui Orientales & Australes regiones descripsit.
 Videntur tamen etiam ueterum nonnulli similiter per Aloën Agallochum intel-
 lexisse. Nam Diapasma illud quo lectulum suum odoris gratia conspererat mu-
 liercula, de qua in proverbiis Solomonis legitur, Myrrham, Aloën & Cinamo-
 mum recipit: quo loco minime intelligendus est denatus ille amarissimus & gra-
 uiter olens succus Aloë uocatus, qui nullis odoratis pulueribus, aut Diapasma-
 tis miscetur unquam, nec reputatur inter aromata & odoramenta. Itaque hoc pro-
 uerbiorum loco per Aloën Xyloaloe, hoc est, Agallochum intelligimus, ceu ple-
 risque etiam aliis locis. Sunt autem plures Agallochi differentiae, ex quibus optimū
 quoddam ad suos usus referunt Indi & reliqui Australes populi, nobis quod non ita bo-
 nitate excellit mittentes. Miror autem nusquam apud Galenum in censu simplicium
 medicamentorum Agallochum inueniri, cum tamen ante ipsum Dioscorides de eo egē-
 rit, ac post eū etiam Paulus Aegineta, qui omnia sua ex Galeno excerpit. Citant etiā
 in testem Galenū Arabes scriptores de Agallocho loquentem, quo fit ut omnino ere-
 dam, eius mentionē inter simplicia medicamenta fecisse Galenum, sed temporum in-
 iuria ac librariorū incuria id caput è libris de simplicibus medicamentis excidisse. Nus-
 quam etiam Plinius huius ligni, sub Agallochi nomine meminit, quamuis diligenter
 Dioscoridis scripta perlegerit. De Taro tamen scribit pauca, quod idem esse cum
 Xyloaloe, hoc est, Agallocho, Aëtius affirmat. Dioscorides Agallochum Thuino
 ligno simile esse dixit: uidendum igitur qualis sit Thuia arbor. Theophrastus li-
 bro v. de historia plantarum, Thuia materiam tribuit quae uetustate corrumpi uix
 queat, & radices habeat crispissimas preciosioribus operibus expetitas. Eadem
 arbor aliis authoribus, ut cum plerisque doctis suspicamur, etiam Citrus & Troge-
 tes appellatur, siccantēque preciosissima ē radicebus eius apud Romanos mensa, qui-
 bus a stimulationem fecit crispis uenis conuoluta, & maculosa materia, quam etiam
 Croco tingebant, ut paulo post in Croco dicemus. Est igitur Thuia lignum ue-
 nis intortis crispis conuolutum, & maculosum quemadmodum Betulae, Fraxini
 & Aceris arborum tuber, tum Bruscum tum Molluscum Germanis Wajel & Fla-
 der dictum, quo hodie etiam ubique apud nos mensa & delicatiora opera fiunt.
 Hinc itaque Thuino ligno simile describitur Agallochum, quoniam maculosum, cri-
 spumque sit, quale saepe uidimus ad nos adferri. Idem autem Agallocho accidit
 quod Thuia. Quemadmodum enim non quauis eius materia aut pars crispatur,
 ita etiam non quoduis Agallochum crispum apparet. Quod uero radici proxi-
 mum aut radice pars fuerit, fluctuantibus uenis in crispum habitum uibratur. Por-
 ro quid ad nos deferretur non usque adeo ponderosum est, ut aquae iniectum lapi-
 dis modo subsidat. Haec enim nota non est praecipua, neque omnibus Agallochi
 speciebus propria: alioquin Rhodium lignum, quod pro Xyloaloe uenditur, opti-
 mum esset Agallochum. Considerande potius haec notae: uidelicet ut sit odoratis-
 simum, etiam per se, ut est integrum gustu: ualde aromaticum, modice amarefcens,
 leniter adstringens, pingue & resinosum, cuius suffitus gratissimū late spargit odorē,
 & ut gustatum ac palatum commendet, ceu in libris nostris de historia medicamen-
 torum diffusius indicauimus. Animaduertendum postremo est, ne decipiamur in
 Agallocho comparando, plerique enim Rhodium lignum ignaris pro eo uendunt,
 quem dolum Ruellius quoque taxat. Adulteratur praeterea Agallochum, ut Pla-
 tearius tradit, ligno quodam in montibus Almasiae nato, quod pondere, nodoso
 habitu, & quadam aromatica ui Agallochi notas utcumque refert, sed neque no-
 men ligni, neque ubi siti sint Almasiae montes indicat. Matthaeus Syluaticus
 Pandectarum author idem paulo aliis uerbis refert, & lignum quod pro Agallo-
 cho uendi conqueritur, Chamelae radices esse scribit. Videndum igitur quid
 nam per Chamelaeam eo loco intelligendum sit. Significat autem Chamelaea pro-
 prie eam plantam, quam Latini Oleaginem & Oleastellum, Arabes uero Meze-
 reon uocant Thymelae, hoc est, granum Gnidium ferenti frutici figura & uiti-
 bus similem. Eius radices Matthaeus Syluaticus pro Agallochouendi credidit,

sed malè. Nihil enim simile habet cum Agallocho dodrantalis plantæ radix, sub-
stantia rara, lenta, flexilis, & gracilis: cum Agallocho, neque rara neque ueruosa, ne-
que flexilis neque gracilis sit materia: sed densa, lignea, flexenti contumax, rigi-
da & crassa. Præterea Chamelææ illius lignum (quo adulteratur Agallochum,) mentitur colore, pondere, nobis & sapore uerum Agallochum. Chamelææ uero, hoc est, Mezerei radix, nihil horum præ se fert. Itaque aliam quandam plantam per Chamelæam (qua quidem Agallochum adulteratur) legentes intel-
ligendum meminerint, qua de re nostram sententiam studiosis communicabimus. Chamelææ uox apud Græcos, perinde ut apud Latinos Oleastelli, non tantum Me-
zereum designat, uerum etiam Thymelæam: & præter Thymelæam & Chame-
læam, Oleastelli uox aliam paruum quandam oleam sui generis, quam Cilibracam Columella appellat, (quamuis quidam Calabricam legere malint). Cum igitur uas-
ga sit & pluribus plantis communis Chamelææ & Oleastelli appellatio, absque du-
bio etiam ad Oleastrum, quæ syluestris & pumila est olea, referri potest, quæ alio nomine Græcis κόρυς & Ἀγυλαρία uocatur. Cum autem authores nos admo-
neant Chamelææ radicibus Agallochum adulterare impostores solere, nec ullo pacto hoc possit intelligi uel de Oleastello, hoc est Mezereo, uel de Thymelæa, necesse est ut per Chamelæam hoc loco intelligamus Oleastrum, qui parua & syluestris est Olea, maxime cum talis ei sit materia, quæ facile pro Agallocho substitui queat. Est enim oleæ densum, solidum, ponderosum, gustu amarum & acre lignum, præ-
fertim syluestri, imprimis autem in Arabia & Aethiopia nascenti, cui propter cœli calorem etiam odorata est materia. Censem igitur sæpe pro Agallocho uendi Aethiopici siue Arabici, aut alibi in calidioribus locis enati oleastri lignum. Nam ipsi Arabes scriptores testantur in Arabia nullum Agallochum gigni, sed aliud quoddam lignum ei non dissimile, quod est oleastri. Idipsum autem idem est cum Rhodio ligno uulgo uocato. Non obstat quod Ruellius dicit lignum Rhodium in Rhodo insula nasci. Curenim in Rhodio non nasceretur Oleaster, cum etiam frigidioribus terris familiaris sit. At quæ causa sit quod credamus idem esse Aethiopici Oleastri materiæ Rhodium lignum, differemus elicere donec ad Aethiopicæ oleæ historiam & descriptionem perueniamus.

* Pro Agallocho plerique uendunt lignum Rhodium uel Rhodisium uulgo dictum: quod uilius Agallochi species est: cuius lignum est solidum, durum, uarij coloris, amarum: & uidetur Oleastri uel oleæ Aethiopicæ lignum esse.

DE NASCAPHTHO. CAP. 22.

* Storax
rubea, Thy-
miama.

Nascaphthum quod etiam Narcaphthum & Lacaphthon Græcis uocatur, cor-
tex est arboris cuiusdam, ut authores tradunt, ex India allatus. Incertum autem est cuiusnam arboris cortex sit, siquidem hac de re nihil certi nobis tradiderunt Græci scriptores. Paulus Aegineta tamen libro vii. in compositione Cypheos magni siue heliaci Lacaphthū interpretatus corticem piceæ, uel alterius cuiusdam arboris, magis dubios reddit lectores. Non est quidem cur aliquis credat Pini aut Piceæ corticem Nascaphthum esse. Si enim harum arborum corticem Nascaphthum appella-
rent authores, nihil uilius in Europa Nascaphtho esset. Quoniam uero ex alio orbe in Europam fertur Nascaphthum, nihil minus quam Pini aut Piceæ cortex fue-
rit. Hodie nullum habetur hoc nomine in Europæ pharmacopoliis medicamen-
tum, nec temere apud Aromatopolas sub alio nomine latens cortex reperitur. Nisi enim hic Nascaphthum fuerit prorsus rem ignoramus. Cum uero nobis certo non constet unde afferatur, & cuius arboris cortex sit, sicca appellata storax, de re ignota non est operæ precium longius dicere. Ex India non afferri argumentum est uilitas, quamuis alijs quoque indicis id constet. Serapion Abicis cuiusdam testimonio fre-
tust, ait siccam uocatam storacem corticem esse arboris storacem (Styracem re-
sinam) fundentis, qui decoctæ & expressæ liquidæ styraci supersit, quod tanquam ue-
ri simile non impugnamus. Hoc tamen reticendum haud existimamus, nobis uide-
ri aliam esse & diuersam arborem liquidam Styracem fundentem, ab ea quæ ca-
lamitam

famitam sudat Styracem, ut paulo post in Styrace indicabimus. Hoc enim loco non de Styrace, sed Nascaphtho nobis differendum est. Ioannes Rhodericus Lusitanus Nascaphthum putat esse preciosam illam arboris cuiusdam Indicæ materiam, quam ligni aquilæ nomine instructiores Lusitanorum officinæ seruant. Sed cum hoc lignum non sit cortex, sed arboris cuiusdam Indicæ materia, Agallocho similis (cuius etiam speciem esse arbitrabamur) non ausim eius opinionem confirmare. Siquidem Nascaphthum cortex est arbori suæ detractus. Aquilæ uero lignum, non cortex, sed lignum est, quamuis nonnunquam etiam cortice uestitum afferatur, sed raro, & cui non sit eadem, quæ ipsi ligno in odore & sapore gratia. Nos itaque ingenue fate-
mur, nobis hæcenus nihil certi de Nascaphtho constare. Hortamur igitur alios, ut id inquirant.

DE CANKAMO. CAP. 23.

Quod Κένκαμος ueteres Græci dixerunt, recentiores Græci pariter Arabibus ^{*Lach} Lacham appellant: & facile intelligent, qui Arabum authorum libros, cum Græcis ^{uel Laccæ} contulerint, Lacham idem esse cum Cankamo: dubitat Hermolaus Barbarus, quo-
niā Lachæ odore uacare uideatur, qui possit ad suffimenta dari. Sed nullum hac in re dubium mouendum est. Non enim omnia quæ suffita olent, per se ut sunt integra spirant, quod etiam in Lachæ contingit. Est enim densa, solida & arida prorsus cum ad nos uenit. Itaque non potest ipsius substantiæ inclusus odoratus eius uapor, & halitus per se erumpere, prunis uero imposita folate non infusam odorem dif-
fundit. Quare odor eius suffitu tantum percipitur. Est autem Cankamum con-
cretus humor, seu lachryma, in India & Arabia nascens, arborum ramulis & sur-
culis undique circumfusus, colore fuluus & pellucidus, qui Laccæ nomine in omni-
bus pharmacopoliis ostenditur. Authores figuram arboris in qua gignitur non tradunt. E recentioribus tamen Ludouicus Vartomannus, Nuci luglandes ferēti-
ti similem esse scribit. Quinetiam de re ipsa dubitant scriptores. Plerique enim Gummi siue lachrymam esse affirmant: Rhasis uerò de coelo eam cadere dicit su-
per ramos Gubera arboris, quam Mespilum interpretantur, quam bene autem non scio. Apud nos certe ueris tempore arborum surculis circumfusa uidetur seu spu-
mosa quædam & lenta salina, quam Cuculi uomitum aut saliuam agrestes uocant pueri. Ea æstate concreuit in Laccæ soliditatem, sed multo est tenuior ac gracilior: colore cinericeo etiam à laccæ differt. Nos hæcenus eos sequimur, qui Lacham Gummi aut lachrymam esse affirmant. Nam habitu & aspectu nihil prorsus ab aliis lachry-
mis differt.

DE CYPHI. CAP. 24.

Cyphi non est simplex aliquod medicamentum, sed Thymiamia quoddam, & odorata diuque sacrata confectio: qua Aegyptii sacerdotes ad suffitus, medici uero ad diuersas morborum iniurias antiquitus utebantur. Eius multæ fuerunt composi-
tiones: quæ autem Medicis receptæ sunt, à Dioscoride, Aetio, Paulo Aegineta & aliis describuntur. Arabes hoc Thymiamia Cochion & Cyphi intelligendum est, quod in Mithridatium Antidotum ingreditur. Requirit autem ad Cyphi suum Dio-
scorides ^{αδελφον}, hoc est, uegetam Iuniperi baccam. Cum autem duæ sint Iuniperi species, quarum altera maiorem, altera minorem fert fructum, dubium est utrius baccæ accipiendæ sint. Marcellus Virgilius interpretes crassas Iuniperi baccas è maiore Iunipero intelligit, ut ex commentario eius in hoc caput scripto aperte col-
ligimus. Nos autem ^{αδελφον} appellationem non ad maioris Iuniperi fructum refe-
rendam censemus. Significat enim plenam, adultam, & iusti incrementi baccam siue maioris, siue minoris Iuniperi: ideo magis probamus hoc loco Ruellium, qui non magnam aut crassam, sed adultam uertit.

DE CROCO. CAP. 25.

Crocus herba est bulbosa radice, foliis longis & admodum angustis: flore Lilio non dissimilis, autumnò è terra emicante. Stamina singulis floribus plerumque

ANNOTAT. VALERII CORDI

terna, nonnunquam etiam plura sunt, oblonga, gracilia, colore puniceo, & egregio odore, cum exaruerit, quæ propter excellentiam cæteris herbæ partibus præstantur, & Croci nomine ueniunt. Crocus alibi sponte provenit, ut in Cilicia, alibi olerum modo in hortis feritur, depositus ordine radicum bulbis, ut Cyrenis, in Sicilia, Italia, Gallia, & Germania. Nam apud nos quoque foeliciter provenit, uident eo latè pluribus regionibus, segetis modo, agri, præsertim Misnia. Satiua præfertur in medicina sponte in Coryco natus, sed nemo speret temere ex Asia ad nos adferri. Itaque uti cogimur, Italico Aquilæ urbis agro genito, & nostrati seu uernaculo. Tradit Dioscorides Thuinam † tingentes in Italia satiuo usos fuisse, quoniam succi copia & coloris bonitate, sponte natum uinceret. Quo loco non satis fecerunt legentibus interpretes Barbarus, Ruellius, Marcellus, & uetus interpres, quemadmodum nec ipse Plinius, quod omnium eruditorum & honorum pace & uenia dixerim. Neque enim culpam transferendam in uiros doctissimos existimamus, sed potius in librarios, *Thuiæ arboris materiam.* pro *Thuiæ* † scribentes, quorum uocabulorum prius illud mortarium, alterum uerò Thuiam arborem significat. Hinc factum est quod omnes mortarium interpretati sint, sed malè admodum & absque ullo sensu aut intellectu. Quæ enim est in tingendis Croco mortariis utilitas, aut quis usus Croci coloris ex mortario. Nos semper hoc de Thuiæ arboris materia intelleximus. Nam quemadmodum adhuc preciosa opera crispa Fraxini & Aceris materia aut turberibus earum elaborata diluto Croco tinguntur, ita etiam ueteres Thuiam, quæ & ipsa crispa est, infecisse uerisimile est, immò certum. Idem suspicatur etiam Ruellius, non quidem in Dioscoridis uersione, sed in suo de stirpibus opere, tam herbam ipsam cum radice, quam Punicea florum stamina Germani pariter Gallis Arabico uocabulo, *Saffran* nominant.

DE CROCOMAGMATE. CAP. 26.

Crocomagma Crocini unguenti, cuius paulo post mentio fiet, fex & sedimentum est. Constat autem Croco & Myrrha, quæ expresso Crocino unguento remanent, acin pastillos conformantur. Probat Dioscorides Crocomagma, quod dentes & linguam uehementer ad aliquot horas permanente colore inficiat. Quo loco Ruellius per *duos* annos intellexit, sentiens optimum esse quod uetustatem seruat, & multos annos daret. Sed Dioscoridis sententia est, optimum esse quod infectos dentes Croceo colore ad multas horas permanente obsideat. Ita enim hunc authorem intellexit Marcellus interpres, cuius uersionem hoc loco magis quam Ruellii probamus. Huius Crocomagmatis apud ueteres usus fuit. Postea Arabes Trochiscos Crocomagmatis, & corrupto nomine Crocomagmatis recentiorum nonnulli appellant. Capiunt hi ut Mesues tradit Crocum, Colcotar, Alumen, Calcadè, & Gummi Arabicum. Quid autem sit Colcotar & Calcadis (quia huius loci non est) in quinto libro, ubi metallica medicamenta attigerimus, ostendetur. Paulus Aegineta quoque libro vii pastillos quosdam ponit, quos etiam Crocomagma uocat, quorum compositionem ex ipso autore legentibus petendam relinquimus.

DE HELENIO. CAP. 27.

Helenium Romanis Inula, pharmacopolis Enula Campana, Germanis Alant nominatur. Herba est uerbasci foliis, procero caule, floribus Conyzæ modo orbiculatis, colore aureis, radice crassa, perenni, gustu amara & odorata, cuius usus est. Nascitur sponte tam montanis quam campestribus locis, utrisque tamen (ut obseruauimus) pinguibus. Interim etiam in hortis bulbosis radicum oculis feritur. Caulem interdum eadem radix non emittit. Hinc est, quod Dioscorides tradat, caulem quibus locis non proferre Helenium. Nos longa obseruatione deprehendimus, id non fieri singulari aliqua natalium locorum natura, sed ratione temporis & radice ætate. Cum enim sponte enatum, se non radicum oculis sed disperso uentis pappaceo semine latè, propagat, aliquot primis annis noua germina semine enata non possunt caules producere, donec ad iustam ætatem & magnitudinem radix perueniat. In hortis autem auulsis radicum oculis satum citius incrementum capessit, caulemque

caulemque emittit, quem tamen omnibus annis eadem radix non semper molitur, sed alterius plerumque.

*Helenium hoc Theophrastus nomine Chironij Panacis describit. Helenium autem ipse uocat alterum duntaxat Dioscoridis ē Cratæa descriptum Helenium.

† Helenium ex Helenæ lachrymis enatum aiunt: quam fabulam pulchrè describit Nicander in Theriacis suis.

DE HELENIO AEGYPTIO. CAP. 28.

Theophrastus huius Helenii sub hoc nomine nusquam meminit, quamuis Helenium quoddam describit foliis paruis, cuius sit coronis usus. Nouisse itaque legentes oportet Theophrasti Helenium idem esse cum eo, cuius historiam Dioscorides in fine huius capituli ē Cratæa desumpsit, quam Helenii speciem (cum ipsi Dioscoridi ignota fuerit) difficile quis iudicare poterit, tanquam nobis peregrinam & calidis maritimisque, Aegypti præsertim locis, familiarem.

DE OLEO ACERBO. CAP. 29.

Olei propria appellatione intelligunt authores pinguem Oliuarum succum. Itaque cum simpliciter & indefinitè positam apud scriptores Olei uocē lectores inuenerint, meminisse eos oportet, natium & ex oleis expressum succum recipiendum esse. At cum omnia alia olea ex herbarum seminibus eliciantur, hoc priuatim Germani Baumöl / hoc est arboreum oleum nominant: quoniam non ex herbarum seminibus, sed ex arborum fructibus exprimitur. Diuiditur autē in plures oleum differentias, sed geminas præcipuè. Aut enim satius premitur oliuis, aut syluestribus. Quod uero ex Oleastri baccis fit, rursum in tres differentias primarias conciditur, cum aliud uulgares Oleastri, aliud Aethiopice Oleastri, aliud Cilibrace oleæ siue Oleastelli fundant, Urbanae, seu (quod idem est) satiaæ oleæ baccis expressum, nationibus & regionum quibus gignitur diuersitate, in plures species distinguitur. Sed ubicunque genitū duas habet differentias: aut enim ex immaturis adhuc oliuis premitur (de quo nunc sermo nobis est) aut ex maturis. Quod immatura fundunt oleæ, priuatim Græcis ἀμωρπῆς, & ἀμωρπῆον appellatur, quoniam id cruda, acerbè, & sole nondum percocta trita baccae remittant. Latinis Acerbum oleum appellare mos est, recentiores Græco nomine magis delectantur, Omphacinum appellantes.

DE OLEO COMMUNI. CAP. 30.

Apparet Dioscoridem hoc uno eodemque capite continua orationis serie de omnibus olei speciebus egisse. Librarios uero membra capituli huius in plura capita redegeisse. Primæ itaque parti tractationis de oleo præfixus est titulus περὶ ἰσλαιοῦ ἀμωρπῆς. Secundæ autem parti περὶ ἰσλαίου κοινῷ, hoc est, de oleo communi. Est autē oleum commune, uulgare illud ex maturis & disruptis oliuis (Græci δρῦς ωτῆς appellant) expressum, quod nos Germani Aeißöl, id est, maturum oleum nominamus. Non enim refert quod Dioscorides παλαιότερον, hoc est, uetustius dicat. Siquidem mea sententia per hanc uocem nequaquam intelligendum est uetus Oleum, sed quod Omphacino sit uetustius, ideoque in comparatiuo gradu παλαιότερον, & ἢ παλαιόν dixit. Nec quis credat commune hoc ē disruptis baccis expressum oleum uetustius acerbè esse debere, expressionis tempus respiciens: hic enim non est genuinus sensus. Vetustius enim ideo dixit, quia Drupæ oleæ, ex quibus commune hoc premitur oleum, diutius in arbore sua pendet, quam Omphaces, & ad iustam ætatem perueniunt. Oleum itaque quod Drupis inest uetustius existit eo, quod ante maturitatem decerpæ oliuæ continent. Esse autem hunc Dioscoridis sensum ipse paulo post indicat eodem capite, cum simpliciter παλαιόν, hoc est, uetus oleum ponit. Prima igitur capituli parte de acerbè oleo: secunda de uetustiore, hoc est, maturo: tertia uero simpliciter de ueteri agit oleo.

DE OLEO SYLVESTRIS OLEAE. CAP. 31.

Oleū ex agrestis oleæ, quæ Cotinus & Oleaster appellatur, baccis expressum hoc loco Dioscorides intelligit, quod quouis alio efficacius cum acore manifeste adstringit. In Pharmacopoliis nostris non habetur, nec temere etiam in Italiae officinis: quare superuacuum est plura de eo dicere.

Reperitur natura etiam candicans oleum: sed Dioscorides de eo tractat quod arte & industria humana candorem contraxerit, ad quod eligendum est, quemadmodum ipse precipit, quod per se albicer. De albatur autem leuaturque duplici modo, adiectis uidelicet odoratis quibusdam rebus, ueluti hic ostendit: aut sine his, pura solummodo crebroque effusa & refusa aqua, idque duas ob causas. Primum ut acrimoniam, amurcae reliquias, & pinguedinis candorem in aquam deponat. Deinde etiam, ut aspectu candoreque magis placeat, ne fusco aut profundiore colore candida unguenta inficiat. Lauatur praeterea aliis modis habito diuersarum affectionum respectu, aquis aliquibus odoratis, ceu Maiorana & Lauendula: seu frigidiore aliqua, qualis est Rosacea.

Sicyonium oleum uocatum, in Sicyone Achaiae urbe praeparabatur, unde nomen inuenit. Porro ne Graecorum lectores haereant aut impingant, duplex esse Oleum hoc nomine una tantum littera mutata meminerint. Alterum *Σικυνώνιον*, alterum *Σικυώνιον* appellatur. *Σικυνώνιον* est cuius Dioscorides hic meminit & nomen a Sicyone Achaiae urbe obtinuit: hoc autem intelligit Paulus Aegineta libro iij. capite ix. de Leihargi cura: & libro eodem capite xx. in cura Tetani. Vtroque enim loco requirit *Σικυνώνιον* media syllaba non per *o* breue, sed per *ω* magnum scripta. *Σικυώνιον* uero diuersum penitus est a priore, habetque longe aliam nominis causam. Quemadmodum enim a Sicyone urbe *Σικυνώνιον*, ita hoc a *Σικύς* radicibus aut succo, quae recipit *Σικυνώνιον* dicitur, media syllaba non per *ω*, sed per *o* scripta: nam *Σίκυον* Cucumerem Graeci uocant. Fit autem hoc oleum non ex satiuo, sed agresti Cucumere, quem nunc Asininum, olim Anguinum appellabant Latini. Meminit Sicyonii huius Paulus Aegineta libro iij. capite lxxvij. in cura coxendicis, ubi de sanguine exigentibus per alium medicamentis agit his uerbis. *καὶ ὁ χυλὸς τῆς ἑλατηρίας, καὶ τὸ δι' αὐτὴν τὸ διὰ τῶν ῥιζῶν αὐτῆς συντιθε-
μενον σικυνώνιον ἔλαιον*. Hoc est (si quis uerbum uerbo uertat) Et succus Elaterii, & ex ipso aut ex radicibus ipsius compositum Cucumerinum oleum.

Πύρον, siue *γλοιὸν βαλανέων* Graeci uocant Strigmenta, quae in balneis a lauantium cute desringuntur, & sub scamnis & pauimentorum tabulis in lubricum & glutinosum humorem concreta, reperiuntur. Cum autem apud omnes gentes non fuerit idem lauandi mos, aliis oleo se inungentibus, aliis simplici aqua lauantibus, ideo haec strigmenta etiam uariant. Intelligit autem Dioscorides hoc loco per balneorum strigmenta sordes humanae cutis, una cum sudore & inuncto oleo lauantibus defluentis. Mos enim Graecis multisque aliis gentibus fuit, inter lauandum oleo corpora emollire, qui deinde etiam ad Romanos translatus est. In Germania uero nunquam fuit haec consuetudo: ideoque strigmentis, hisce quatenus oleo constant, destituimus.

Graecorum iuuentus in palaestra se nudis corporibus luctando exercens oleo inungebatur, quod cutis sordibus, sudori & pauimentorum pulueri inter luctandum casu mixtum in pauimentum destillans, frequenti luctantium insultu conculcabatur, & in unum corpus coalescebat. Colligebantur, & medicis in suos usus uendebantur hae sordes, priuatim *πάρω* appellatae, quoniam pedibus conculcarentur.

Cum oleo inuncti iuuenes inter exercendum parietibus & aereis Gymnastiorum statuis sordida affricarent corpora, aut casu admoerent, ipsae statuae luctantium strigmentis perfundebantur, quae sordes, & ipsae ad medicinae usum detergebantur. Diferebant autem a palastrarum sordibus, quod puluerem admixtum non haberent, & quod aliquid aeruginis ex aereis statuis contraxissent, itaque illis acriores erant. Porro cum Dioscorides dicat parietum gymnastiorum & statuarum sordes calefacere, non oportet

oportet intelligere ligneis tabulis, faxis, lateribus, aut marmore constructis parietibus adherentes sordes. Hæ enim parum aut nihil à balnearum strigmentis differunt; sed eas quæ parietes, quatenus ære obducti essent, obsiderent. Ornabat enim antiquitas gymnasiorum parietes æreis signis, tabulis & statuis: quem sensum etiam è Paulo Aegineta & Galeno collegimus. Siquidem hi non parietum, sed alter eorum σκεῶν, hoc est, uasorum, meminit, sine dubio æramenta parietum & ærea uasa quibus continebatur Oleum intelligens.

DE OLEOMELLE. CAP. 37.

Oleomel, quod Græci ἐλαίου μελί uocant, quoniam in Syria, alio quam nostro orbe, provenit, nec satis auctoribus constat è quam emanet arbore, difficile nobis est rem peregrinam indicare. Nouisse tamen hoc legentes oportet, duplex esse Oleomeli, alterum quod sponte sua ex arboris caudice defluat, & alterum quod ex eiusdem arboris furculis humana arte & industria eliciatur. Longius de eo Marcellus in suo commentario egit, quæ repetere non est nostri instituti, poterunt uolentes ea quæ commentatus est ipsi legere. Nos, quod ad aliquam cognitionem attinet, non silentio præteribimus, apud nos ueris tempore è betulæ & quercuum caudicibus sponte sua distillare humorem liquido melle crassiorem, ad quem apes & id genus insecta conuolent. Est enim gustu dulcis, sed nauseam gustantibus affert. Alliciuntur eius dulcedine agrestes pueri nonnunquam, sed postquam tantillum degustauerint, nausea & capitis dolore corripuntur, qui superueniente uomitu paulo post soluitur. Porro hunc liquorem Oleomel esse nequaquam affirmamus, sed similem aliquem in nostro orbe genitum. Aliud ab hoc est qui sauciatis Betulæ & Ostryæ arborum caudicibus manat humor, aquæ modo liquidus, pastoribus & agrestibus ad restinguendam sitim expeditus. Scimus etiam hunc liquorem à quibusdam in Septentrione gentibus, tanquam uinum aut cereuisiam ad quotidianum potum repositum toto anno seruari. Hermolaus Barbarus propemodum in ea est opinione ut credat idem esse cum Oleomelle æromeli, hoc tanquam à ueritate alienum minime probamus, confutare uero non est necesse, cum id Marcellus & Ruellius præstiterint.

DE RICININO OLEO CAP. 38.

Postquam de nativo oleo, de quibus quæ oleo sunt strigmentis, & quod olei pinguedinem habet Oleomelle differuit Dioscorides, sermonem iam ad factitia fleuit olea, qualia sunt omnia quæ ex herbarum Olerumque seminibus exprimuntur. Eliciebantur autem hæc antiquitus affusa cõtura offæ feruenti aqua & expressa, à qua innatantem pinguedinem auferabant. Hodie diuersa sunt ratione. Cõtunduntur enim, tum leniter teruntur semina, postea è feruente adhuc offa & cuneis satis impacta, ut pinguedinem excussam exprimunt. At Ricininum oleum, quod ρικινίου Græci, Arabes uero Oleum de Kerua appellant, è Ricini seminibus olim in Aegypto fiebat plurimum. Vtebantur enim eo ad lucernarum lumina, nunc uero parcius apud nos in Europa conficitur, præsertim in Germania, quamuis ubique iam herba hæc fata proveniat; hæc qualis sit, & quot habeat species, ubi ad quartum librum perueniemus, indicabimus.

DE AMYGDALINO OLEO CAP. 39.

Tam dulcibus quam amaris amygdalis expresso oleo hodie frequenter utuntur medici. Veteres amaras nuces ad hoc oleum eligebant, quarum pinguedinem priuatim Metopium appellabant, quoniam Metopii unguenti, quod Galbano cõstat, confectiones ingrederetur. Dulcibus Amygdalis expresso hodie utimur in lenienda aluo, corpore alendo, & medicaminum, præcipue purgantium, acrimonia obtundenda.

DE BALANINO OLEO. CAP. 40.

Ex glande unguentaria, quæ Græcis Balanus Myrepica uocatur, hoc oleum exprimitur, id Arabes scriptores, oleum de grano Ben appellant. Erat olim frequens eius in preciosis unguentis usus, nunc uero paucissimi eo medici utuntur.

Quid

Quid autem sit Balanus Myrepica in quarto huius operis libro indicabimus.

SESAMINVM. CAP. 41.

CARYINVM. CAP. 42.

DE HYOSCYAMINO OLEO. CAP. 43.

Hyoscyaminum oleum è semine cuiuscunque Hyoscyami conficitur, tutius tamen est, ut ex ea Hyoscyami specie eliciatur, quæ albos profert flores. Exprimebatur autem olim tuso & aqua calida macerato semine, quem modum adhuc quædam Herbariæ mulieres obseruant, sed ita confectum facillime corrumpitur, & foedum odorem contrahit: quoniam remanet in eo plurimum infusæ aquæ, quæ putrescit atque ipsum oleum corrumpit. Quapropter nos præferimus quod ex tuso & tosto semine ut exprimitur: syncerum enim & clarum est, nihilque alieni aut aduentitii humoris continet, ideoque putredini accorruptioni minime est obnoxium ut illud.

DE CNIDIO OLEO. CAP. 44.

E Thymelææ fructu, quem Græci *νόκκον κνιδίου*, Latini granū Cnidium appellat, Cnidelaum exprimitur, cuius hodie rarus est, præsertim apud nos, in medicina usus. Exprimitur autem eo modo, quo Amygdalinum & Hyoscyaminum, tuis, leniter tostis, & dein expressis grani Cnidii nucleis. Porro qualis sit frutex Thymelææ, cuius fructus est granum Cnidium, in quarto huius operis libro, cum ad purgantia medica menta peruenierimus dicemus: Vbi Dioscorides eos reprehendit qui granum Cnidium Chamelææ fructum esse existimant: in quem errorem etiam interpres Virgilius lapsus est, quamvis Dioscoridem huic errori reclamantem diligenter uerterit. Quapropter nemo fidem Marcello habeat in huius capituli commentario dicenti Chamelææ, quam Cneoron Theophrastus uocat, granum Cnidium semen esse, alia enim & diuersa à Thymelæa granū Cnidii ferente, planta Chamelæa est, ut suo loco ostendemus.

DE CNICINO OLEO. CAP. 45.

Cnicinum oleum è Cnici (quem recentiores medici & pharmacopola omnes Carthamum appellant) seminis nucleo exprimitur, cuius hodie quoque non minus, quam Cnidii olei perquam rarus est usus. Fit autem eodem modo quo Amygdalinū, purgatis & cortici suo exemptis nucleis: quod melius est, quam si uua cum corticibus pinguedinem imbibentibus exprimantur.

DE RAPHANINO OLEO. CAP. 46.

Dux sunt herbae quæ uulgo hodie Raphanus appellantur, altera maioris, altera minoris cognomento: quarum altera grandi Lapatho æqualia & similia habet folia, caulem sesquicubitalem in uirgas diuisum: flores exiles, candidos, & numerosos, radicem longam, crassam, candidam, odore & sapore Nasturtii, sed acriorem. Germani *Whe-retich*, hoc est, Marinum Raphanum appellant. Ex huius semine non exprimebatur Raphaninum oleum. Nam nullus est ueterum, qui ad Raphani genus hanc plantam retulerit. Itaque male faciūt qui Raphani uocabulo eam appellant, cum potius Nasturtii speciebus adnumeranda sit, quod ueteres etiam fecisse, cum locum inquireret, indicabimus. Raphaninum ergo oleum è propriè uocati Raphani semine exprimitur. Latini radicem, Germani *Wiberetich*, hoc est, Rapo similem Raphani figura & qualitate Rapis non sit dissimilis. Fit autem ea ratione qua Amygdalinum. Exprimuntur apud nos similiter olea è Iuglandibus, Fagi nucibus, Rapi, Napi, Sinapis, Lini & Papaueris semine, quibus pro oleo oliuæ frequenter ad obsonia nostri utebantur, interdico à summo pontifice ieiuniorum tempore butyri & adipum usu. Nunc autem plerisque in locis fieri desierunt, excepto quod è Lini exprimitur semine. Hoc enim pictores colores suos diluunt, & ad Vernisij confectionem Dantiscant utuntur.

DE NIGELLINO OLEO. CAP. 47.

Nigellinum oleum è Nigellæ semine exprimitur, eius rarus admodum est in Germania

mania usus. Si quis autem uoluerit, tusa & leniter tosta donec calefiant semina ui exprimant, quemadmodum in Amygdalino & Ricinino dictum est. Animaduertendum autem est ne ad confectionem eius falso appellatam Nigellam accipiamus, in segetibus nascentem, foliis longis, hirsutis, caule geniculato, flore puniceo, simplici & parua rose non dissimili, semine in oblongo & acuminato uasculo, nigro, intus candido, & frumentalicuius modo farinam reddente, planeque inodoro: hæc enim herba nihil minus est quam Nigella. Recipiendum igitur est uera Nigellæ semen, quod odoratum est, & passim in aruis sponte, atque in hortis satum prouenit, de qua suo loco plura dicemus.

DE SINAPINO OLEO. CAP. 48.

Sinapinum oleum est Sinapis semine, quemadmodum Raphaninum exprimitur. Fieri autem potest ex omnibus Sinapis speciebus, hoc est, Sinapi agresti & satiuo: Eruca, Erucula maiore, & Erucula minore: sed nostrates raro eo utuntur, ideoque in nostris pharmacopoliis non reponitur. Ad abstergendas cutis maculas uultus eo illinunt.

DE MYRTINO OLEO. CAP. 49.

Hactenus Dioscorides natui, hoc est, proprie uocati olei differentias recensuit, quo quidem in genere continentur ex cuiuscunque olea aut Oleastri baccis facta olea: quibus statim subiunxit ea, quæ ex fructuum & seminum quorundam nucleis tuis exprimuntur, aut coctura eliciuntur: Hæc autem secundum olei genus constituunt, quod Plinius Factitium appellat, quamuis ad hoc genus etiam referat Oleastri & Chameleæ, hoc est, parui cuiusdam Oleastri baccis expressum oleum. Factitium rursus in duo genera diuiditur: alterum enim simplex est ceu Amygdalinum, Ricininum, Sefaminum & omnia quæ ex solis fructuum & seminum nucleis exprimuntur, uel arte: quædam etiam ex aliis quibusdam ceu Pice, Thure, aut Resina aliqua, aut aromatibus eliciuntur: alterum uero compositum: hoc fit maceratis oleo natiuo, arborum, fruticum, & herbarum foliis, floribus, seminibus, aut aliis partibus medicaui pollentibus, qualia sunt quæ iam sequuntur, Myrtinum, Laurinum, Lentiscinum, Mastichinum, & reliqua eiusmodi. Atque hæc non inepte composita olea & simplicia unguenta appellantur, siquidem Paulus Aegineta libro septimo, ubi oleorum & unguentorum compositiones recenset, eodem fere modo appellat & distinguit. Est enim differentia inter unguenta & olea, ut Galenus quoque plerisque in locis testatur, clare autem de simplicibus medicamentorum facultatibus libro secundo circa finem, ubi Rosacei meminit, oleum Rosaceum appellans: quod simplici ratione fit, maceratis in oleo rosis absque alia cuius aromatis, aut odoramenti alterius adiectione. Cum enim præter Rosas etiam alia recipit aromata, quibus spissatur & odoratur oleum, iam non amplius oleum, sed unguentum Rosaceum appellandum est, quod meminisse legentes, & medicinarum studiosos plurimum refert, & quidem in hoc capite apud Dioscoridem. Tradit enim duplicem Myrtini confectionem, alteram simplicem, alteram compositam: quarum prior Myrtinum est oleum: altera uero, Myrtinum unguentum, quoniam non tantum Myrto & oleo constat, sed præter hæc etiam aliis aromatibus, quibus spissatur antequam Myrtum recipiat oleum. Hoc non tantum de Myrtino, uerum etiam de Laurino & aliis quibusdam intelligendum. Porro, ad confectionem Myrtini, uera est recipienda Myrtus, quæ in Hispania, Narbonensi Gallia, & Italia nascitur. Non illa adulterina, in omnibus Germaniæ syluis & montibus proueniens, cuius baccas patria lingua i Devedelber nominamus. Qualis autem sit uera Myrtus plerisque notum est, qui uero hunc ignorant, eos ad Myrtum remittimus, de quo infra hoc ipso libro differemus. Nouisse etiam legentes oportet, nostræ ætatis medicos uulgo non uti Myrtino, quod Dioscorides conficere docet, sed eo cuius compositionem Arabes authores in suis scriptis reliquerunt.

DE LAVRINO OLEO. CAP. 50.

Laurini olei uaria est præparatio: nostra autem ætate, hoc frequenti in usu est,

ANNOTAT. VALERII CORDI

est, quod ex oliuæ oleo & Lauri frondibus oleo incoctis conficitur. Id nonnulli man-
gones uti iucundiore colore uireat trita ærugine tingunt, non sine ementium & uten-
tium periculo. Porro si diligenter præparetur, satis hilarem acquirit colorem, ut non
sit opus ærugine colorem genuinum æmulari & mentiri.

DE LENTISCINO OLEO. CAP. 51.

Lentiscinum oleum fit maceratis & incoctis acerbo oleo Lentisci arboris maturis
fructibus, quos *ζυγιδας* Greci uocant. Apud nos nullus est huius olei usus, quoniam
neq; aliunde affertur ipsum oleum, neq; in nostris regionibus Lentiscus nascitur, e cu-
ius baccis conficere nobis liceat.

DE MASTICHINO OLEO. CAP. 52.

Mastichinum oleum quod uulgo in Pharmacopolijs oleum mastice nominatur,
iuxta ueterum traditionem conficitur pura & leuigata Mastiche, hoc est Lentisci resi-
na, oleo acerbo incocta & dissoluta. Nostra uero ætate hoc oleum præparatur eo quo
Arabes docent modo.

DE VNGVENTIS. CAP. 53.

Vnguenta preciosa, quæ *μύρα* Greci uocant, antiquitus odoris & uoluptatis gratia
inuenta & præparata sunt. Postea cum ratio medicæ eorum uim deprehenderet, & ex-
perientia comprobaret, coepit id quod ad luxuriam tantum inuentum erat, etiam ad
salutem humanæ sanitatis cedere. At quoniam utilitati odoris fragrantia mixta esset,
auxit ijs precium uoluptas, & quanto preciosiora erant, tanto magis expetebantur.
Fuit autem quotidianus eorum in conuiuijs usus apud Græcos, Persas & alios cultio-
res Orientis populos. Vngebantur enim conuiuantium capita, capilli & barba, qui-
mos deinde etiam ad Romanos defluxit, sed serò admodum. Hinc Latini poetæ to-
ties in iucundis conuiuijs ad hilaritatem excitandam, liquidos odores, Achæmeniam
Nardum, & alia huiusmodi requirunt. In Germania uero hucusq; nunquam in usum
hæc unguenta recepta sunt. Nam quæ uulgo in Pharmacopolijs ex multis & diuer-
sis medicamentis conficiuntur, olea potius sunt composita ad propulsandos ab hu-
mano corpore morbos inuenta, quam unguenta. Et si enim non tantum id, unde co-
gnominantur, recipiant, sed multa alia etiam odoramenta, tamē quia neq; antea spise-
satur certis aromatibus oleum, neq; quæ ingrediuntur aromata odoris gratia expe-
tuntur, unguenta hæc olea nominanda non sunt. Plerumq; enim nullam habent odo-
re fragrantiam quo olfacientes inuitent, sed medicam quandam facultatem, quam sa-
ni homines, quantum uis uoluptatibus dediti auersantur. Talia sunt quæ hodie in no-
stris Pharmacopolijs conficiuntur ex Hyperico, Costo, triplici piperis genere, Cap-
parum radicibus, Euphorbio, uulpe oleo incocta, Scorpionibus, & id genus alia. Er-
go non tantum *μύρον*, hoc est, unguentum, id uocandū est, quod etiam alia quædam,
præter id unde nomen habet, recipit, sed quod aromatibus conficitur & odoris suæ
uitate delectat.

DE ROSACEO VNGVENTO. CAP. 54.

Duplex est apud medicos Rosaceum. Alterum, quod simpliciter fit maceratis in
acerbo oleo Rosarum rubentium nondum penitus explicitarum folijs. Et alterum
quod admixtis oleo odoramentis conficitur: hoc autem propriè unguentum, illud ue-
rò oleum Rosaceum probatis authoribus dicitur. Nostræ autem ætatis medici Ro-
saceo oleo utuntur: nam unguentum rosaceum, quod admixtis odoramentis constat,
nusquam confici uidimus.

DE ELATINO VNGVENTO. CAP. 55.

Ex palmæ arboris nondum florentis folioso operimento (quod *ελάτη* Græcis di-
citur) Elatinum olim fiebat unguentum, hodie uero fieri desit. Quidam eius loco fa-
ciunt unguentum ex semine abietis: creduntq; in huius unguenti compositione abie-
tem *ελάτης* appellatione significari: sed malè admodum. Aliud enim est hic à Discori
de descriptum Elatinum unguentum, quam oleum ex abiete, quod Galenus Acopū
οἷον ἐλάτης uocat.

DE MELINO VNGVENTO. CAP. 56.

Melinum ex malis Cotoneis adhuc conficitur, non tamen aromatis odoratur, sed simpliciter fit maceratis ad solem in oleo Cotoneis malis, uocaturq; Oleum Cotoneorum à Pharmacopolis.

DE OENANTHINO VNGVENTO. CAP. 57.

Oenanthinum ex Labruscæ (quæ uitis agrestis est) floribus, Græcis οὐρανὸν appellatis conficiebatur. Nunc uerò eius nullus apud nos usus.

DE FOENOGRAECINO VNGVENTO. CAP. 58.

Hoc à quibusdam adhuc præparatur, sed simpliciter ex Foenigræci seminibus oleo incoctis, uel ad solem maceratis.

DE SAMPSUCHINO VNGVENTO. CAP. 59.

Sampsuchinum ex Maiorana, quam Græci Σάμψυχον appellant, fiebat, admixtis aliis aromatibus: nunc uerò hoc modo non amplius præparatur. Nam omnia ferè unguenta quæ olim odoris gratia conficiebantur, hodie in Europa fieri desierunt. Recentiores tamen aliud substituerunt, quod Oleum Maioranæ uocant.

DE OCIMINO VNGVENTO. CAP. 60.

Ex Ocimo hoc quondam conficiebatur.

DE ABROTONINO VNGVENTO. CAP. 61.

Ex Abrotono nigra seu Mascula hoc olim fiebat unguentum: nunc quidam ad solem cum Abrotono maceratum oleum, Abrotoni oleum uocant.

DE ANETHINO VNGVENTO. CAP. 62.

Hoc hodie simplici ratione ex Anethi floribus in oleo ad solem maceratis conficitur: quidam etiam Pharmacopolæ secundum aliam descriptionem conficiunt. Vulgo in Pharmacopoliis Anethinum oleum uocatur.

DE LILINO VNGVENTO. CAP. 63.

Lilinum, quod Græci non tantum κρίνον, uerum etiam Σάβιον Persico uocabulo appellant, Persis Lilium susan nominantibus: adhuc fit, sed tantum in oleo maceratis candidis liliis.

DE CROCINO VNGVENTO. CAP. 64.

Crocinum nostris quoq; temporibus fit, non tamen secundum hanc descriptionem. Pharmacopolæ hoc suo more præparatum oleum Croci appellant.

DE NARCISSINO VNGVENTO. CAP. 65.

Non amplius confici Narcissinum unguentum Medici curant, cum uulgo Narcissus non cognoscatur. Quid autem sit Narcissus in quarto huius operis libro ostendimus.

DE LIGVSTRINO VNGVENTO. CAP. 66.

Ex Ligustri floribus, quoniam odorati sunt, hoc olim conficiebatur unguentum. Nunc uerò nusquam conficitur. Quid autem Ligustrum sit, hoc ipso libro non longè post.

DE IRINO VNGVENTO. CAP. 67.

Ex Illyrica Iride hoc præparabitur unguentum. Recentiores alio modo confectum oleum Irinum nominant.

DE GLEVCINO VNGVENTO. CAP. 68.

Simplex hæc est Gleucini confectio, quæ à Dioscoride ponitur. A Galeno hæc ipsa etiam de compositione medicamentorum κατὰ γένος libro septimo recensetur, & ad Dioscoridem refertur: & præter hanc alia tres indicantur, quæ plura recipiunt aromata siue Medicamenta. Nomen à musto, quod μέθυ à Græcis dicitur, accepit. Hodie uerò non amplius, quod quidem sciamus, conficitur.

DE AMARACINO VNGVENTO. CAP. 69.

Diuerfum hoc est à Sampfuchino, quamuis utrumq; Sampfuchum & Amaracum capiat. Alia uerò Aromata, quæ ingrediuntur, differunt. Quare ut distinguantur ab inuicem hoc Amaracinū, illud Sampfuchinū, appellarūt. Hodie autē hoc fieri desuit.

DE MEGALIO VNGVENTO. CAP. 70.

Hoc hodiē nō conficitur, nam Dioscoridis etiam ætate nō amplius conficiebatur.

DE HEDYCHROO VNGVENTO. CAP. 71.

Hedychroon ab hilaritate coloris nomen accepit, hodie uerò non præparatur. Pa stillietiam qui Theriacam Andromachi ingrediuntur, similiter Hedychroi appella-
lantur, qui plurimum ab hoc unguento differunt. Quapropter ineptè apud Paulum Aeginetam libro septimo in Theriacæ compositione, uocabulo Hedychroi adiecit unguinis appellationem interpres Albanus Torinus Vito durenfis.

DE METOPIO VNGVENTO. CAP. 72.

Metopium Galbanum recipit, propterea à Galbanī planta ab Aegyptiis Metopion appellata nomen accepit. Non præparatur hodie.

DE MENDESIO. CAP. 73.

Mendesio unguento, quod ab Aegypti urbe Mendesia nomen accepit, hodiē nō amplius Europæ medici utuntur. Nusquam enim in Europa conficitur, nisi quis singulariter id fieri curauerit.

DE STACTE. CAP. 74.

Dicta est Stactē à stillando. Est autem recentis expressæ Myrrhæ destillans pinguis-
simus flos. Antonius Musa Styracem liquidam, Stactē esse cōstanter affirmat, sed malè meo quidem iudicio. Sunt enim natura penitus diuersæ Styracis & Myrrhæ arbores: & huius lachryma in aqua resoluitur, illius uerò in oleo, uel oleo simili humore tantum. Myrrha præterea optima ex aqua fit. Stactē per se magno emitur. Sty-
rax uerò liquida admodum parua. Quare cum ex plurima Myrrha, quantumuis bona, minimum exprimitur Stactē, & Storax liquida longè minoris, (quanquam Myr-
rha etiam uilissimo ueneat) nemo temere affirmabit eam Stactē esse. Quod si non satis efficax hoc argumentum contradicentibus uidebitur, electa Myrrha Stactē ex-
pressimus: qua uix aliquid reperiatur, quod diutius & latius oleat, odore aromaticum modo iucundum. Sed propter grauitatem aliquam sensoris irrepētē, facile somnū
conciliat. Possunt nostro exemplo uolentes si ueram Myrrham eamq; optimam elin-
gant, non magno labore eam exprimere. Nam uulgo hodie apud nos non exprimi-
tur ob recentis Myrrhæ inopiam, sed in Arabia Mecha copiosè adhuc confici ne-
gotiatores referunt.

DE CINAMOMINO VNGVENTO. CAP. 75.

Cinamominum à Cinamomo (quod basis huius unguenti est) nomen accepit, Ho-
die non præparatur.

DE NARDINO VNGVENTO. CAP. 76.

Nardinum ex Indicæ Nardi Spica, & aliis quæ à Dioscoride recensentur, fiebat. Nuncautem præparatur quibusdam demptis, & quibusdam additis medicamentis, uulgo Nardinum oleum uocatur: sed hoc odore & uiribus, eo quod olim fiebat, mul-
to ignauius est. Galenus Romano uocabulo Nardinum passim in suis libris, Spica-
tum à Nardi Spica, quam capit, appellat. Quidam uerum Nardinum unguentū hoc
effecerunt, quod ex Spica Lauendulæ distillatur, sed longè falluntur.

DE MALOBATHRINO VNGVENTO. CAP. 77.

Malobathrinum præcipuè Malobathro cōstabat: hoc ut Galenus libro tertio de
compositione medicamentorum κατὰ γένος refert, Romæ foliatum dicebatur, quem-
admodum Nardinum, Spicatum.

DE IASMINO VNGVENTO. CAP. 78.

*Hoc caput in nonnullis editionibus Dioscoridis desideratur.

In Perside Iasmini nascuntur flores, Violis quadantenus similes: Ab Arabibus
Iesem le

Iesemini & Zambach appellatur. Ex his unguentum illud conficiebatur, quod ab Arabibus etiā Oleum de Zambach nominatum fuit. Vnde imperiti putant hoc ex Sambuci floribus fieri maximo (& qui etiam pedibus palpari possit) errore. Iasmini autem flores hodie à quibusdam non tantum in Italia, uerum etiam Gallia & Germania, uitium modo sati, uiticulis suis pergulas & concamerationes hortorum ascendant & integunt, Iasmini uocabulo in Iesemini detorto. Non autem temere quidam huius unguenti odore delectati sunt, cum apud nos etiam cœlo multo quàm in Perside frigidior, nimia odoris bonitas delicatæ naris hominibus fastidium pariat. Itali primam literam quasi S consonantem pronunciant: unde quidam eo ignorantia perueniunt, ut Sefaminum semen & Sefeminum appellatum florem eandem rem esse credant, sed malè.

DE MYRRHA. CAP. 79.

Iamdudum de Myrrha incidit controuersia, negantibus etiam doctissimis uiris nos ueram Myrrham habere. Qui uerò res ipsas diligenter inquisuerit, non poterit nō uidere, quod non tantum mediocris, uerum etiā optima Myrrha afferatur, quam tris hoc fiat rariùs. Quod autem non frequentius contingat, sola in causa est aromas topolarum, quos hodie materialistas uocant, ignauia & inscitia. Hi enim cum partim etiam in Alexandriam nauigent, facile possent optima quæq; eligere & adportare, nisi sumptibus parcere mallent, quàm humani corporis salutem consulere. Verum hoc nequāquam omnium institutum est, cum nonnulli longè alium finem, scēdum uidelicet lucrum & priuatum commodum, sequantur.

DE BOEOTICA MYRRHA. CAP. 80.

Boeoticam Myrrham necesse est similiter lachrymam esse. Quemadmodum enim propriè uocata Myrrha, arboris sui nominis lachryma est, quæ in aqua dissoluitur: hoc addo ut à resinosis lachrymis, quæ in aqua minimè resoluuntur, distingui possit: sic etiam par est Boeoticam Myrrham, ex alicuius arboris parte aliqua manare. Non enim frustra, sed ob similitudinem substantiæ & qualitatis, quas cum Myrrha paulò minus quam easdem habet, Myrrha uocabulo appellata fuit. In hoc uerò Dioscoridis exemplari, quod Marcellus Virgilius interpretatus est, clarè legitur Boeoticam Myrrham nascentis cuiusdam in Boeotia arboris radicem esse, sed malè quantum mihi uidetur: nec hoc interpretis culpa, uerum exemplaris Græci uitio factum est, in quo sic scriptum reperitur, ἡ δὲ βοιωτικὴ σμύρνα δὲ δένδρεος τινὸς οὐ βοιωτικῆς γεννᾶται, hoc est, Boeotica uerò Myrrha est arboris cuiusdam in Boeotia nascentis radix incisa. Fuisse autè alium uerborum ordinem & sensum in hoc capite Serapio indicat, cum in Myrrha capite sic ait. Sed Myrrha quæ est ex terra, quæ dicitur Laptoteno (id est, Boeotia) abscinditur ex radice arboris quæ est in terris illis. Sic ille hoc Dioscoridis caput reddidit, nec dicit Boeoticam Myrrham incisam esse radicem, sed ex radice excindi, quemadmodum solent incisione elici reliqui liquores. Idem nobiscum sentit in suis commentariis Marcellus Virgilius interpres. Myrrha autem hæc hodie omnino non cognoscitur.

DE STYRACE. CAP. 81.

Styracis & Myrrhae arbores natura penitus esse diuersas in Stacte præmonuimus, quod etiam ad natales attinet, nihil prorsus commune habent: hæc enim in India & Arabia, illa uerò in Asia minoris Pisidia & Cilicia diuersi cœli regionibus prouenit. Si uerò substantiam ipsam quæ ex his emanat lachrymarum consyderauerimus, omnino diuersas deprehendemus. Lachryma enim quæ ex Styrace manat, præter omnes alias quas iam taceo notas, resinosa est substantia: cuius proprium est in sibi simili humore aliquo resolui, & minimè in aqua. Quæ uerò è Myrrhae arbore distillauerit lachryma, facillè etiam propter substantiæ similitudinem in quouis aquoso humore dissoluetur. Hæc ideo dico, ut sciamus liquidam Styracē nihil minus esse quàm Stactem, quod pluribus etiam demonstrare argumentis possemus, si huius loci esset falsas doctorum opiniones & iudicia confutare. Styracis autem triplex hodie habet

tur differentia. Est Styra³x calamita quæ in candicantes & rufefcentes grumos coëre-
uit. Est & liquida Styra³x, quæ in duas diuiditur differentias: altera enim resinosa
est pinguedo ex arbore quadam sponte destillans, aut coctura elicitæ: & altera, quæ
ex Styra³cis nucleis exprimitur: sed huius rarissimus apud nos est usus. Tertia diffe-
rentia Styra³x sicca est, à quibusdam etiam Thymia³ma uocata: estq; cortex in ruffo co-
lore nigricans, quem aiunt è Styra³cis arbore colligi. Quidam improprie siccam Sty-
racem etiam rubeam cognominant. Rubea enim Styra³x est Calamita Styra³x, quæ
non candidum sed ruffum colorem habet. Hodie autem Pharmacopola non ampli-
us Styra³x, sed Storax pronunciant.

* Nascaphthum, corticem improprie Storacem rubeum uocant: cum Styra³x ruber, non cortex, sed huius colo-
ris liquor sit.

DE BDELLIO. CAP. 82.

Substantia & qualitate Bde³llium cum Myrrha magnam habet cognationem, suis
tamen distingui possunt notis, quas etiam ipsi (ut uocant) Materialista ut plurimum
ignorant, quo factum est, ut hæcenus aliquot seculis Myrrham pro Bde³llo allatam
uendiderint. Nunc uero genuinum rursus affertur, iis, quibus ab authoribus descri-
bitur, notis cognoscendum. Nomen suum in Pharmacopolis retinet.

DE THVRE. CAP. 83.

* Diuerse
species thu-
ris, permix-
te nobis
adferuntur.

Thus etiam optimum nos habere nemo dubitare debet, neq; tamen inficias co, in-
terdum resina aliis quibusdam adulteratum afferri. Est autem Thus in Arabia nascen-
tis arboris resinosa substantia lachryma, candicans, pinguis, & interdum geminis
guttis testiculorum modo concrefcens, quod optimum est, & masculum uocatur:
Pharmacopolarum quidam Thus, quidam uero Olibanum, græca appellatione uo-
cant. Germanis quoniam in templis ad sacros suffitus accenditur, Weybraud/ quasi
consecratorius fumus nominatur. Aliud à thure est quod in inferiori Germania In-
censum uocant, quamuis etiam Thus à nonnullis Incensum nominetur. Quod enim
nostri Incensum appellant, Resina est Pini, aut alterius cuiusdam Pino cognatae ar-
boris.

DE THVRIS CORTICE. CAP. 84.

Thuris cortex una cum adhærente lachryma arbori suæ auulsus sæpe affertur, ma-
iore adstringendi & siccandi ui, quam Thus ipsum præditus.

DE THVRIS MANNA. CAP. 85.

Frequenter huius Mannæ in libris Galeni de compositione medicamentorum
mentio fit, & apud multos alios ueteres scriptores: ubi interpretes inter-
dum mannam Thuris scriptum inueniunt, ex una re diuerfas faciunt: ut, si scribatur,
Recipe Mastiches, Mannæ thuris, uirgula distinguentes. Quare quotiescunq; Man-
næ uocabulum Thuris nomen immediate antecedit aut sequitur, perpendendum an
sola Thuris manna, an utrunq; accipiendū sit. Nam interdum simpliciter Mannam,
nonnunquam etiam Thuris Mannam hoc medicamentum medici uocant. Est au-
tem hæc Manna tenuis ex masculo thure puluis & pollen, qui in grumorum attri-
tione resoluitur. Huius olim in Emplastris fuit usus, sed hodie paucissimi eam expe-
runt: nam eius loco contrito utuntur thure. Porro Mannæ nomine uulgo nunc æ-
rium seu roscidum mel, Manhu ab Israelitis olim appellatum, ostenditur: de quo plu-
ra, secundo huius operis libro in mellis capite, dicturi sumus.

DE THVRIS FVLIGINE. CAP. 86.

Fuligo etiam ex Thure quemadmodum ex omnibus resinosis & oleosis rebus
colligi potest, eo quo Dioscorides docet modo. Est autem Fuligo ex incensa pin-
gui quacumq; re resolutus tenuis fumus, imposito quodam concauo uase exceptus,
qui Germanico uocabulo Abam & Schmuze uocatur.

DE PINO

DE PINO ET PICEA. CAP. 87.

Magnam nonnulli Græcorum scriptorum controuersiam nobis reliquerunt in uocabulis *wirus* & *πύκνυ*. Non quod ipsi Græci tantum in horum significatione uariant, sed etiam interpres interdum *πίτυν*, Pinum: *πύκνυ* Piceam uertit; & Ruellius contra, interdum *πύκνυ* Pinum, *πίτυν* uero Piceam: quæ uarietas magnâ in demonstrandis & iudicandis rebus difficultatem parit. Theodorus Gaza in Theophrasto præterquam quod *πύκνυ* Pinum & *πίτυν* piceam uertit, etiam ipsam *πίτυν* laricem interpretatus est, quem sequutus est Plinius, & Pliniū Virgilius Marcellus, qui præterea *πύκνυ* Tædam interpretatur, sed malè. Non tamen est quod hanc culpam aliquis ad interpretum ignorantiam reiciat. Cum ipse Virgilius Marcellus (suo in hoc capite commentario fateatur & concedat) posse etiam aliam quam ipse interpretatus sit, horum uocabulorum significationem ex authoribus afferri, nec hodie tantum ista est in his uocabulis controuersia: nam olim quoque in ipsa Græcia & Macedonia sua nomina permutabant *πίτυς* & *πύκνυ* arbores. Laricem tamen *πίτυν*, *πύκνυ* Tædam interpretari absurdus est. Multum enim differunt *πίτυς* Larix, *πύκνυ* & Tæda. Ego autem potius Ruellium sequor multis argumentis rationibus adductus, & *πίτυν* Pinum, *πύκνυ* uero Piceam interpretandam esse censeo. Longum foret & non est huius instituti omnia afferre argumenta & rationes, meum tamen iudicium de huius generis arboribus hoc est: *wirus* est Pinus, quæ cum sponte prouenit *Pina*ster uocatur: nam aliàs etiam in hortis feritur. Hæc in Germania rarissimè feritur. Syluestris uero Pinus, seu (quod idem est) *Pina*ster, copiosè in alpihus nostris prouenit: eum patria lingua *Cirbelbaum* appellamus: *πύκνυ* est picea, quæ & ipsa duas habet differentias, una est longis fetis comosior, deorsum pendentibus ramis, hæc fructus fert in longo cono Pineis nucibus similes, minores tantum. Conus à *Pini* cono differt: quod Piceæ conus longitudine ferè dodrantem æquat, crassitudine autem manum propemodum complet: *Pini* uero conus multo breuior latiorq; existit: habetq; pyramidalem figuram. Alius etiam squamæ tenues sunt, & ab inuicem resolutæ, ita ut fructus siue nuces sub squamis uideri queant: *Pini* uero squamæ crassiores, longioresq; sunt & compactæ: propterea non uideri possunt nuces. Si uero *Pini* Conus in calido estuario, aut ad solè suspèdatur, resolutis magno fragore squamis dissilit, nucesq; spargit, quas *Cirbelnuss* appellamus. Picea autè quæ Pino similes nuces fert, à Germanis quibusdā eodē quo *Pina*ster nomine uocatur. Hanc arborē, in Germania ad alpes nasci scimus, & à quibusdā etiā *Pinū* uocari, sed malè. Picea uero syluestris Conū huic similem fert, & in eo minutum, & alarū nucleum, qui in minimo duroq; cortice contineatur. Hanc Germani *ein Fiechten* uocant. Abies quæ Græcis *ἐλάτη* uocatur, ea est sine dubio arbor quæ à nobis *ein Tanne* appellatur, similes Piceæ syluestri Conos ferens, sed torosiores. Huic similis est *Milax* arbor, siue *Taxus*: Germanicè *ein Tibe* uocatur: suntq; ex ea hodie, non minus quam olim, arcus & scorpiones. *Δάς* est propriè Tæda arbor, quam nos *ein Riuier* / *ein Rinbaum* & *Feuren* uocamus. Ex qua sumpta pinguißima materia, Tæda Græcis, *Rin* / *ein* Germanis similiter ut arbor ipsa nominatur. Vnde etiam faces *δάδες* à Græcis dicuntur. Huic similis est *Larix* Latinis, *ein Lerche*: Germanis appellata, Alpibus etiam iuxta Germaniā, & interiori quoq; Germaniæ familiaris: quam an Græci habuerint uel cognouerint, & quomodo eam appellent, nullus adhuc Latinorum aut nostrorum prodidit. Nos uero non sine ratione affirmamus Laricem eam esse arborem, quæ ipsis *κροβιλάτρυ* uocatur, quod tanquam obseruatu & cognitu dignum rerum studio si diligenter animaduertant.

*Picea, *Dechbaum*: Piceaster, *ein Fichte*: Pinus, *Cirbel*.

DE PITYIDIBVS CAP. 88.

Pitydis *Pini* & Piceæ nuces sunt, auellandarum propemodum magnitudine & figura, oblongiores tantum in Conis prædictarum arborum enatæ. Exempli corticibus suis nuclei ad nos ex Italia afferuntur, suum in pharmacopoliis nomen retinentes. Nunc uero *Pinearum* nucum frequentior est in medicina usus quam *Picearum*.

C. iij

Pityn sibi
Pinum ui-
deri, Pen-
cen uero
Piceam.

† Imò The-
odorus Pl-
nium, tot
seculis po-
sterior.

† al. (ligno-
siores)

† al. in mi-
num duro)

† al. Rin-
fer)

† al.
Rien)

DE STROBILIS. CAP. 89.

Strobili priuatim dicuntur in Pino cono inuente nuges ut à piceæ nucibus distingan-
tuntur. Totus etiã pini conus cum fructibus siue nucibus, Strobilus uocatur. Quæ
propter his hoc capite Strobilorum mentionem facit Dioscorides. Primum enim
exemptos ex Cono & purgatos fructus intelligit. Secundo totum cum nucibus Co-
num.

DE LENTISCO, [arbore Mastiches.] CAP. 90.

Lentiscus *Ξύλον* à Græcis uocatur. *Ξύλον* uerò eidem genti teretem aromaticum
luncum significat: quæ uocabulorum similitudo quosdam in errorem coniecit, alte-
rum pro altero apud authores accipientes. Ideo ne quis in similem errorem inci-
dat, utrumq; uocabulum suis literis scriptum posuimus. Est autem Lentiscus proces-
sa ex resiniferarum genere arbor: folia tamen differunt, quæ lenti similia sunt, sed
maiora. Nascitur præcipuè in Chio, aliisq; Græciæ locis. In Italia autem ab admodum
paucis in hortis plantatur. Germaniæ uerò incognita est arbor.

*Aliqui hodie Sandarachæ Mastichen adulterant.

DE LENTISCINA RESINA. CAP. 91.

Ex Lentisco resina in guttas concreta fluit: quæ priuato nomine *μασίχη* Græcis ap-
pellatur, quæ adhuc in usu est medicis. Nomen uerò ipsius corruptum mutata, *χ*, *Γ* in
calitera, *ch* ualente, in *x* Latinam, quo fit ut non amplius *μασίχη*, sed mastix uulgo hæc
resina nominetur.

DE TEREBINTHO. CAP. 92.

Terebinthus (quam Græci *τέρευνθος*, Arabes uerò Baton, Boton, uocant) etiam
ex resinam ferentium arborum genere est. Folia eius eodem quo in Lentisco ordine
in pediculis disposita sunt, multo tamen maiora, & ad Laurinorum magnitudinem
accedentia. Nascitur in Græcia, Cycladibus insulis, Petraa Arabia, Syria, Cipro,
Africa. Nobis omnino est incognita, præterquam quod frondes & fructus eius, si-
cut & Lentiscino nunquam ad nos afferantur.

DE RESINIS ALIIS. CAP. 93.

*Terebin- Resinæ ex multis arboribus fluunt, quæ autem ex Terebintho, Terebinthina La-
thinam ho- tinis uocatur, Arabibus Gluten Albotin. Hæc rarissime affertur, eius tamen loco La-
die uocant, ricis resina utimur, similiter Terebinthinam uocantes, sed malè. Quæ uerò ex Len-
tis- tisco fluit. Lentiscina Latinis, Græcis *μασίχη*, Arabibus Gluten Romanum appella-
tur. Pineæ ex pino destillat. Abiegna ex Abiete. Picea quoq; resinâ fundit. Strobi-
lina, nec ma- linam resinam malè pineam interpretatur Virgilius Marcellus. Antea enim eius men-
te illi sub- tio facta est sub *πινύνη* uocabulo, Pineæ autem resina differt à Strobilina. Pithyina
siue Pineæ est, quæ ex arbore sua sponte aut profundius inciso caudicis corticee ma-
nat. Strobilina uero in Strobilis, hoc est, in pini conis concreuit. Ex Colophone olim
ante tempora Dioscoridis liquida etiam resina afferebatur, quam uocabant Colopho-
niam, ea hodie non est in usu. Ipsi apud nos liquidam resinam copiosam habemus.
propterea etiam olim ex Germania in Græciam portabatur: habent tamen adhuc
Colophoniam nomine siccissimam resinam, quæ an Brutia, aut Cedri pix sit, nondum
ausum certò affirmare. Certe nostra adhuc ætate multi eam picem Græcam uocant:
Colophoniam uerò liquida fuit. Ex Gallia quoque in Græciam allatam esse resinam
liquidam testatur Dioscorides. Deinde subiungit: Affertur liquida & ex Galatia
quæ ad alpes est, (hoc est ex Germania) quam patrio uocabulo Larignam regio-
nis eius incolæ dicunt. Hæc adhuc à nobis Terchenhartz uocatur, ab Italis Larga-
tum. Porro quod Larignam resinam ex Germania in Græciam dicit allatam esse, sa-
tis indicat in Græcia non adeo frequentem esse Laricem, ex qua illic colligi pos-
sit. Hinc conicio non multis in Græcia cognitam fuisse: nullum enim nomen quo
eam indicent authores apud Græcos inuenire potuerunt. Nos uerò ante dixi-
mus

mus proprium eius nomen *κεδρελάτην* esse. Est & aliud resinae genus quod Galenus *κεδρελάτην* vocat, quasi pineum abscellum: non tamen in pino tantum hic abscellus excernitur, uerum etiam in abiete & aliis huius generis arboribus. Cum in abiete gignitur, a Germanis etiam *Tannenb. ater*, eadem significatione uocatur. Est autem extuberans abscellus, resina plenus, in resiniferis arboribus enatus. Ex cupressis etiam resina liquida fluit. Huius uero nostra aetate, nullus est in hisce regionibus usus. Coquebatur olim omnis liquida resina: cocta acrimoniam, odorem, & partium tenuitatem omnem deponit. Quare ea utebantur ad suffitus, quale Cyphi est, ut sua pinguedine facile accensa alia etiam facilius accenderentur, nulloque interim suo odore reliquorum aromatum fragrantiam retunderet. Eadem etiam odoratis unguentis substantiae crassitudinis causa miscebatur.

FVLIGO RESINAE. CAP. 94.

DE PICE LIQUIDA. CAP. 95.

Liquide picis nullus hodie uel rarus in medicina usus existit, quamuis copiose hodie apud nos & in septentrione ex Tæda arbore fiat.

* Aliud liquide picis genus est, quo currum axes ungunt. Vide mox in Bitumine.

DE OLEO PICINO. CAP. 96.

Nec hoc hodie preparatur. Si autem preparare quis uellet, poterit meliorem modo per destillandi (ut uocant) artem ex quacunque pice & resina colligere.

DE PICIS FVLIGINE. CAP. 97.

Quid fuligo sit, & unde colligatur, antea ostensum est in Thuris capite, quapropter non opus est ea hic repetere.

DE SICCA SIVE SPISSA PICE. CAP. 98.

Sicca pix omnibus nota est. Germani *Bech* & *Pech* uocant. Quomodo autem fiat, Theophrastus docet, noueruntque omnes qui Hercyniam syluam accolunt, praesertim has eius partes quae Bohemica et Thuringiaca syluae uulgo appellantur.

DE ZOPISSA. CAP. 99.

Ζωπίσσα est pix naualis, quam Graeci etiam *ὑπὸ ξύμα* uocant, alia est ab hac picena. * Schiffu-
uall, quae in Germaniae maritimis locis habetur. * Graeci enim naues suas resina & ce *bech* / *Yas*
ra illinebant. Nostri uero è piceliquida plerumque suam naualem picem coquunt, *bech*.
Quidam etiam Bitumine ad hoc utuntur.

DE BITUMINE. CAP. 100.

Bitumen Graeci *ασφαλτος* uocant, Germani *Erdbech* / quod substantia & uiribus
Picis cognatum sit, & in terra nascatur. Est autem ceu pinguis terrae adeps, Picis colo-
re, substantia, quo fit ut facile flagret, accensum. Sunt autem multae Bituminis diffe-
rentiae. Quod solidius & colore in nigro purpureum & splendidum est, Iudaei
cum a Iudaea ubi gignitur cognominatur. Gignitur autem plurimum in Asphaltitide
lacu, quem mortuum mare nominant. Hoc humanis ossibus in Alexandria & Al-
kairo Mangones illinunt, & pro Mumia uendunt, cum tamen Mumia nihil aliud sit
quam bituminis genus quoddam, ut paulo post referemus. Liquidum Bitumen
men quale in Sicilia reperitur, copiose etiam in Germania gignitur, maxime circa
Brunsvicum & Borchtorpium in Saxonia, quo ad axes ungendos, iumentorum sca-
biem & lucernarum lumina utuntur. Hoc Germanice *Toer* siue *Ther* uocatur: ab
aliquibus etiam a foetore *Teihseldre* nominatur. Est & liquida picis genus
de quo paulo ante diximus, quo similiter currum axes ungunt. Quod nequaquam
ad hoc liquidum Bitumen referendum est. Simile quiddam etiam ex Betula
arbore igne elicitur: quo coria Liوني & Russi ungunt. Hoc a Germanis *Deget*
& *Prenschder geschmack* uocatur, a Plinio Bitumen Betulae arboris, quam nos
ein *Bircke* uocamus.

C. 101.

Mumia Arabum.
Mumia iulgaris.

Pissasphaltus talis, qualem Dioscorides describit, non tantum in Cerauniis montibus, uerum etiam quibusdam Germanie locis, ut in Transylvania & alibi fluminum impetu est montibus defertur. Quod incolae haurientes a sordibus purgant, eoq; ad facies pro cera utuntur. Vnde etiam a Germanis *Ertrwach* & *Bergwach*, id est, in terra siue montibus genitacera uocatur. Notandum autem est hanc pissasphaltum idem esse cum Mumia. Nam Arabes scriptores in sua Mumia Dioscoridis caput de Pissasphalto citant. Differt tamen quae uulgo uenditur Mumia a Pissasphalto. Siquidem Pissasphaltus natua est, Mumia uero quae in pharmacopoliis uenditur, Iudaico bitumine fiat, sentit etiam Antonius Musa Brasauolus. Quidam enim ueram Mumiam esse dicunt quod in sarcophagis reperitur, Opobalsamo, Aloë, Myrrha, atque humano tabo commixtum. Nam istis aromatibus diuturnum cadauera in oriente antiquo more condiuntur. Haec autem Mumia, nunquam ad nos affertur, sed ea tantum quae Bitumine & humano tabo constat. At neq; haec genuina, sed quae industria fit cadauerum ossibus infuso & circumfuso in humanam figuram bitumine. Quemadmodum enim diuites Aloë, Myrrha & Balsami liquore inuncti reponuntur: ita pauperes bitumine conditi sepeliuntur. Talis est Mumia quae hodie affertur, quae ne tantillum quidem Myrrhae uel Aloës uel Balsami admixtum habet, quod colore, odore, & sapore manifesto deprehendi potest.

Petroleum.

* Item Caphora & Ambra.

Naphtha etiam Bituminis genus est: sed omnium liquidissimum, calidissimum, & tenuissimum substantia & qualitate. Quapropter cum simul etiam oleosa sit substantia facillime accenditur, ac ignis rapacissimum merito existit. Sunt autem tres Naphthae differentiae. Nigra enim quaedam, & candida quaedam, & flaua quaedam reperitur: illa, crassior: haec uero, aquae modo liquidae sunt. Gignitur autem ex Bitumine natura in terra & montibus accenso, tenuissimis eius uaporibus sursum elatis, & ad frigidiore saxa in tenuem liquorem resolutis: qui deinde per suos meatus est montibus fontium modo scaturit. Hoc autem Naphtha ab alio quouis liquido Bitumine differt, quod igne facta sit. Nam aliae liquidi Bituminis species absq; igne, aut Bitumine accenso, per se in terra gignuntur. Porro multum differunt in terra contenta diuersis locis Bituminis genera, quo fit ut ipsi etiam unde Naphtha generatur uapores magnam habeant differentiam. Ex crasso enim & terrestri Bitumine, crassa: ex tenui & puro, pura etiam & tenuis gignitur Naphtha. Hodie in pharmacopoliis Oleum petrae siue † petroleum uocatur: Germanicum eius nomen est *Steinöl*. Ad Bituminis autem genus etiam referri debent lapis Gagates, Thracius, Terra Ampelitis, Succinum, tam candidum quam fuluum *. Quod omnibus forte paradoxon uidebitur. Verum nequaquam sine certis argumentis & rationibus id affirmamus.

† Loco petrolei oleo latericio uti licet, Naphtham candidam efficacissimam aiunt: deinde fuluam: postremum locum nigrae tribuunt.

Chamaecyparissus.

Cupressus procera & semper uiuens arbor est, conos ferens Alni galbulis figura similes, magnitudine uero ad tædæ & laricis conos accedentes: in quibus rubentia & angulosa nascuntur semina, quae ex arefactorum conorum resolutis squamis, cum matura facta fuerint, excidunt. Quidam hos integros cupressi fructus, galbulos, pilulas, & nuces uocant. Posteriore uocabulo hodie pharmacopole utuntur. In Germania hanc arborem nusquam enatam uidimus sponte. In Gallia uero calidiore parte et Italia copiose provenit, unde ad nos eius coniferuntur: (quos ut diximus) pharmacopole nuces Cypressi uocant. Est & fruticulus Chamaecyparissus a Plinio uocatus. Hic apud nos in hortis & fictilibus ad coronas feritur. Est enim odorata, & semper uiridem seruat comam: hinc etiam hibernis coronis inseritur. Germani Cypressen ut ipsam arborem, uocant. Nonnulli tamen hanc Chamaecyparissum, Absinthium Santonicum esse opinantur, de quo suo loco dicemus.

DE IUNIPERO. CAP. 104.

Iuniperus arbor Græcis *Ἀγνυδία* dicitur: bacca eius, *Ἀγνυδία*. Sunt autem, ut auctores tradunt, duo eius genera. Altera ad iustæ arboris proceritatem se attollens, baccis auellanae parvæ magnitudine. Et minor altera, quæ parvum fert fructum, vulgari pisone qualem. Color utriusque baccis niger, non rufus ut Cedri. Nam quidam etiam docti viri eod erroris delabuntur, ut Cedrides, quibus fulvus est color, maioris Iuniperi fructum esse credant. Proceræ Iuniperus Germaniæ nostræ incognita est. Minor vero ubique copiose nascitur, asperis & editis locis, quam patria lingua *Wacholder*, *Wacholder*, *Wacholder* & *Krametsstauden* nominamus. Eius nos multorum annorum observatione duplexprehendimus genus: alterum floret & nullum fert fructum, alterum vero non floret, nihilominus tamen fructum parit: qui initio tertii anni demum ad maturitatem pervenit, quo fit ut vere in hac Iunipero triplices conspiciantur fœtus: iam iam nascentes alii, & iustæ magnitudinis alii, sed virides adhuc, & omnino maturi alii, quibus niger est color. Itaque verum est quod auctores tradunt, & vulgò fertur, Iuniperum videlicet parere usque ad tertium annum arbori suæ inhaerentem fructum.

Cedrides.

† Helvetij

Rechhol-

der, forte

quasi

Reuch-

holder, a

suffitu.

* Iuniperi maioris resinam, *Sandaracham* vulgò appellant. Sed pro resina melius dicitur *Sandarax*, pro metallo *Sandaracha*.

DE SABINA. CAP. 105.

Sabina, Græcis *Βγάδις*, recentioribus medicis *Sauna*, Germanis *Seidenbaum*, *Sagebaum* & *Saterbaum* vocatur. Est autem pumila & in latitudinem se diffundens arbor, cuius duæ sunt species. Altera miti, ceu *Tamarix*, est folio: altera cupresso simili & aculeato. Plinius negavit Sabinam fructum ferre, cum dicit: *Sabina herba propagine seritur & avulsione*. Et paulò post: *isdem modis Rosmarinum ferunt, & ramo: quoniam neutri semen*. Quam in re nemo temere Plinio fidem adhibere debet. Vtraque enim tam *Rosmarinus* quam *Sabina* semina ferunt, testante id annua experientia. At *Sabina*, de qua nunc nobis sermo est, non semina tantum sed & fructum fert, Iuniperi baccis colore & figura similem, sed paulò maiorem & gustu multo acriorem. Miror etiam quod herbam appelleret, Plinius Sabinam, cum omnibus constet arborem esse, non herbam.

†

Vtraque species est apud nos.

† Alias *Saterbaum*.

DE CEDRO. CAP. 106.

Cedrus, quam Arabes *Serbim* vocant, proceræ est arbor, Syriæ & multis aliis calidioribus regionibus familiaris, Germaniæ hæcenus incognita. Neque enim sponte provenit apud nos, neque feritur. In Italia autem nonnulli tanquam peregrinam in hortis suis excolunt. In Narbonensi vero Gallia etiam sponte provenire ex relatione Petri Bellonii Cenomanni novimus, non quidem proceram sed parvam. Nam quemadmodum in Iunipero quædam proceræ, quædam humilis est: ita etiam in Cedro, alia magna, altera humilis reperitur. Fert hæc fructus Myrtæ bacca: magnitudine, colore rufos, quos ad nos ferunt negotiatores, baccas Iuniperi maioris vocantes: cum tamen non sint Iuniperi, sed Cedri minoris fructus. Ruellius Cedrum Galiliæ suæ solo nomine cognitam existimavit. Hinc apparet cum Montis Pessulani agrum non perlustrasse, in qua parva *Cedrus* nascitur. Magna autem *Cedrus* Iunipero proceræ perquam similis est, caudice erecto, aculeatis foliis, fructus figura & magnitudine. In summa nihil aliud est quam peregrina Iuniperus. Hinc etiam nonnulli veterum, quemadmodum etiam recentiores, Cedrum cum Iunipero proceræ confundunt, utramque Cedrum appellantes. Sed eam quæ propriè Cedrus sit, & de qua nunc agimus, *ὄξυς* Græcis vocatur, quoniam duriora & spinosiora Iunipero folia habeat. Differt etiam materiæ soliditate, & spadiceo colore, a Iunipero: quin etiam fructu qui Cedro rufus, Iunipero niger datus est. Quos, cum nuper in Germaniam importarentur, nonnulli etiam doctissimorum virorum Iuniperi maioris baccas crediderunt, non animadvertentes, manifeste auctores Iunipero nigrum, Cedro vero rufum tribuere fructum. Quæ autem *κεδρία* Græcis, & Latinis *Cedria*, Arabibus *pix Alkyran* vocatur, liquida Cedri pix est, cum qua pariter dum uritur *pix aquosa* & serosis defluit humor, colore fulvus aut rufus, Cedrium ab authoribus dictus,

Oxycedrus.

Cedria.

ANNOTAT. VALERII CORDI

dictus, & Cedrinus liquor. Porro quemadmodum *Αγκυρίδιος*, Juniperi, ita etiam *Αγκυρίδιος* Cedri fructus nominatur, de quibus iam diximus.

* Galenus Cedrum, Juniperum appellat: & contra etiam, Gummi elemi uidetur Cedri lachryma: pro ea uti licet bit liquore. Deget Germanice dicto: de quo leges supra ad finem Capituli de Bitumine.

DE LAVRO. CAP. 107.

Laurus Græcis *Δάφνη*, fructus eius *Δάφνιδες* dicuntur. Germani *Loren* & *Lorberbaum*/arborem: fructus uero *Lorber* nominant. Arbor non magna est in calidioribus quam nostra est regionibus nascens. Itaque sponte apud nos non nisi fata provenit. Sunt autem geminae lauri differentiae. Altera enim latifolia, altera tenuifolia existit. Est etiam in fructu differentia. Siquidem alterius in rotundo modice oblongus est: alterius oblongus, gracilis, & utrinque ovato mucrone turbinatus.

* Laurus dividitur in sylvestrem & sativam: acursus utraq; in sylvestrem & sativam.

DE PLATANO. CAP. 108.

Platanus peregrina quondam ipsi Italiae arbor fuit, in quam primum ex oriente allata est: ubi in magna aestimatione, propter foliorum latitudinem solis aestum arcentem, habebatur. In Germania eam sponte nasci nemo speret. Quare non assentior illis qui *Ahorn* dictam Germanis arborem Platanum esse contendunt. Ea enim acer est: foliorum tamen figura ad Platanum accedit, reliqua discrepant. Platanum autem proprie appellatam, adhuc apud Hispanos, Siculos, & Constantinopolitanos in divitum hortis excoli scimus.

DE FRAXINO. CAP. 109.

Fraxinum Græci *Μελία*, Germani etiam *Asche* & *Esche* appellant. Est autem duplicitis generis. Altera quae simpliciter *Μελία* hoc est fraxinus: & altera quae *Βυβυλία*, hoc est, bubula fraxinus vocatur. Prior minoribus & angustioribus foliis & semine seu fructu graciliore. Altera uero latioribus maioribusque tum foliis, tum fructibus conspicitur. Eius frondes ad *Bouum* pabula quidam adhuc non minus quam olim respondent: unde *Bubula* cognomentum apud Græcos inuenit, quamvis etiam a magnitudine ita cognominari potuerit. Nouisse quoque legentes oportet, reitustica scriptores latifoliam & sylvestrem, hoc est, incultiore fraxinum, Ornum appellare. Ergo meo quidem iudicio † Ornus nihil aliud est quam magna illa latifolia Fraxinus, montibus familiaris. Ruellius aliam arborem Ornum esse putat, cui folia quidem sunt Fraxino posita non dissimilia, sed multo minora, cum Orno maiora tribuantur. Sed quia haec racemoso florum & fructuum habitu, acerbam, & foliorum figura forbo similissima sit, ad nullum aliud arboris genus, quam sorbi merito referri debet, quare paulo post hoc eodem libro dicturi sumus.

* Fraxinus alia Germanis dicitur *Eychesch*/alia *Steinesch*. Siliqua Fraxini, pharmacopole linguam auis nominant.

† Ornus, Fraxinus latifolia, etc. Sed alia Fraxini species uidetur, quae Orni nomen circa Romam hodieque seruat: in Germania non proveniens.

DE POPVLO ALBA. CAP. 110.

* Duæ sunt apud Dioscoridem Populi species: nigra altera, & alba altera, de qua nunc agimus. Nec immerito hæc alba cognominatur, cum inferior foliorum pars candore etiam cum niue certet. Propterea Græcis *Λεύκη*, Germanis *Weiß alberbaum*/ *Weisse popel* & † dalunt inferius candida vocatur. Porro quod ad lachrymam & prima germina huius arboris attinet, non ita efficaces in medicina vires habet, ut nigra, de qua iam dicturi sumus. Nascitur autem hæc arbor pingui fecundoque solo, & circa pagorum fossas. Falluntur qui albam populum esse existimant arborem, quæ a Germanis etiam *Aspe* nominatur. Hæc enim tertia est populi species a Plinio *Libyca* siue alpina, & a recentioribus Latinis *tremula* dicta: quoniam longis pediculis pendencia folia, afflatu leuissimæ auræ tremunt.

DE POPVLO NIGRA. CAP. 111.

Alba nigraque populis tria interponuntur capita, in uulgaribus Dioscoridis exemplaribus.

plaribus. Cum uero author hic non soleat cognatas res diuellere, post albam populum nigram statim recensere maluimus. Non enim uerisimile apparet, Dioscoridem eas interiectis aliis & minime cognatis rebus discreuisse. Est autem nigra Populus arbor, quam Græci *Αἰγαιον*, Germani Popel weiden & Popeln uocant; excusius recenter erumpentibus oculis unguentum Acopon fit, quod pharmacopolæ Populeum nominant. Veteres Latini utramque Populum Farfarum appellant. *Farfarus.* Est etiam herba Farfarus & Farfarella, à similitudine quam cum Populi foliis habet dicta; de qua alibi dicemus. Porro nigra Populi lachrymam ad Eridanum fluuium in electrum, quod succinum Latini uocant, denfari, ut poëta fabulati sunt, & plerique crediderunt, minime uerum est, ut suo loco ostendemus, cum de Lyncurio nobis sermo erit.

DE MACERE. CAP. 112.

Conuenit inter omnes propemodum doctos, Macer, corticosum illud aroma esse, à pharmacopolis Macis appellatum, ipsis Arabibus etiam id testatibus: qui in descriptione sui Macis, Dioscoridis caput de Macere allegant. Nemo autem miretur, cur hic author suum Macer arboribus misceat, cum potius inter aromata de eo agere debuerit. Venia dignus est in hac re Dioscorides, cuius etate res noua, nec penitus cognita fuit. Credebant tamen arboris corticem esse: quapropter hic inter arbores recensetur. Nostra uero ætate, quid re uera sit, cognoscere incepimus. Nam Arabes clarescunt corticem esse nucis Moschatae. Cum uero Moschata nux plures habeat (qui bus munitur) cortices, dubium est quotus in ordine Macer cortex sit. Idcirco quidam tradunt exteriorem esse, quod tanquam falsum ipsa experientia improbat. Possunt tamen qui hoc scribunt isto modo excusare. Noces Muschatas, ut hactenus ad nos allatae sunt, duabus corticibus uestitas conspexerunt, quorum interior qui nucleum ipsum proximè ambit, durus, lignosus & insipidus existit: qui uero hunc circumdat, Macer est. Tertium uero & extremum non uiderunt: itaque opinati sunt Macer exteriorem eius corticem esse. Nos uero cum integros Moschatae nucis fructus iam saepe uiderimus, non pigebit totius fructus habitum indicare. Est ergo nux Moschata iuglandi, adhuc in arbore cum omnibus corticibus hærenti, magnitudine & forma omnino similis, cortice foris carnosio crassoque: qualis est uiride illud & carnosum iuglandis putamen. Sub hoc Macer est: quod lignosum corticem, nucleum ipsum (hoc est, nucem Moschatam in se continentem) ambit. Inditotus hos fructus non aliter quam nos iuglandes purissimo Zacharo aut melle condiant, & conditos nobis mittunt. Tales fuerunt qui proximo anno M. D. XXXVI: à nato Christo Francofordiam ex India ab Hispano quodam ferebantur. Porro hi maxime errant, qui Cinamomum credunt Caryophyllos & noces Moschatas ferre. Neutrum enim fert, sed paruum fructum glandibus, in acetabulis siue caliculis adhuc hærentibus, similem, multò tamen minorem.

DE VLMO. 113.

Vlmus, quæ *πτελία* Græcis uocatur, magna & procera est arbor, lutosum amans solum. Folia habet Tilie & corylo non dissimilia. Eius duo sunt genera: alterum simpliciter *πτελία*, hoc est Vlmus; alterum uero *ὀρεπτελία*, hoc est, ut Theodorus Gaza apud Theophrastum conuertit, Montium Vlmus nominatur. Sunt autem Vlmi istæ arbores, quas Germani *Roßern* uocant: & alterum genus *Vlmen* siue *Pl. t. 88.* *men.* * Quid uero inter utranque sit discriminis fabri lignarii nouerunt, & nos quoque sterni, in historia arborum differentias earum indicauimus.

* Bast Germanis, Vlmi uel Tilie cortex fissilis est.

DE CARIE LIGNORVM. CAP. 114.

Vetustos arborum truncos, & intempestiuè caesa atque edificiis nimia uetustate corrupta ligna, uermes atterunt. Qui autem farinæ similis è foraminibus excidit puluis, Caries Latinis, Græcis *σάπρος ξύλον*, Germanis *Wurm* mel uocatur. Differt autem hæc secundum lignorum diuersam naturam. Papyrus grandis & triquetra herba est, in Aegypti palustribus locis iuxta Nilum iunci modo nascens. Ex hac chartæ olim fiebant, & quo

†Detrahta. quo Plinius docet modo, hinc nostris etiam & nuper inuentis chartis Papyri nomen mansit. Vidimus nos† detractos medulla papyri cortices ex Aegypto allatos: Vidimus etiā in uetustissimis Germaniæ Bibliothecis Papyri chartis scriptos libros.

IN NOSTRIS CODICIBVS HARVNDIO ET PAPYRVS. CAP. 115. 116.

DE TAMARICE. CAP. 117.

Tamarix Græcis *μυρίκη* appellatur. Estq; duum generum, satia & procera altera, in Aegypto nascens: & humilis altera, quæ diminutiuâ forma Tamariscus dicitur. Eius duplex genus in Germania inuenimus: alterum solidiore ligno, medullaq; admodum exili, & foliis tenuioribus, copiose ad Rhenum circa Argentoratum nascens: alterum ampliore medulla, foliis latiusculis, lignoq; non usque adeo solido, quod frequens in Danubii & Vuertachii ripis in Vindelicia prouenit, præsertim iuxta Augustam. Minoris autem Myricæ folia & cortices pharmacopolæ ad medicinæ usus seruant. Fiunt etiam hodie, non minus quàm olim, ex ligno eius circulis doliolorum modo circumdata apud nos pocula. Germani pariter Græcis minorem, *Tamarix* ten uocant. Male hætenus Grammatici Myricam eum esse fruticem interpretati sūt, quia Germanis *Deyde* appellatur: cuius flore, præsertim apud nos in Lunenburgensi solitudine, apes mel copiosum colligunt, sed minime generosum, ut Dioscorides proximo capite manifestè testatur.

DE ERICA. CAP. 118.

Erica absq; dubio est illæ Myricæ similis, sed minor frutex, quem Germani *Deyde* appellant: in Lunenburgensi solitudine ad duum & trium nonnunquam cubitorum altitudinem assurgens. Hunc Myricam hætenus aliqui opinati sunt, sed male, ut proximo capite indicauimus.

DE ACACALIDE. CAP. 119.

Non cognoscitur in hisce regionibus Acacalis, cum in Aegypto nascatur, neq; fructus eius amplius afferatur: nisi aliquis ex Myrobolanis Emblicum seu Belliricum hunc esse existimet: quod ut non affirmamus, ita etiam nondum negamus.

DE RHAMNO. CAP. 120.

Rhamnus etiam alba spina Latinis nominatur. Cautos tamen nos esse oportet, ne res diuersas hoc nomine confundamus. Nam præter Rhamnum spinam a borelescentem, in herbaceo genere duo Cardui, albæ spinæ nomine passim ab authoribus indicantur. Ouidius uerò sexto fastorum per spinam albam & uirgam lanalem, Rhamnum intelligit nec sine causa in hunc modum de Rhamno scribit.

Sic satus spinam, qua tristes pellere possit

A foribus noxas, hæc erat alba, dedit.

Et paulo post:

Virgæq; lanalis de spina sumitur alba,

Qua lumen thalamis parua fenestra dabat.

Cum ipse Dioscorides eandem Rhamno uires, quas Ouidius spinæ albæ seu lanali uirgæ tribuit, interprete Marcello, dicens: Fertur præterea Rhamnus, appositis pro foribus fenestrisq; ramis eius, omnium ueneficiorum arcere maleficia. lanalis autem uirga, Rhamni uirga dicitur. Quod Ianus eam Cranæ Nymphæ (qua potitus erat) contra Strigum noxas pro amuleto dederit. Sunt autem Rhamni præcipuæ species duæ: candida, & nigra, ut Theophrastus scriptum reliquit & nos aliquoties uidimus, quæ tamen non in Germania enatæ, sed ex Italia & Gallia allatæ nobis sunt. Quapropter non indicamus Germanicum eius nomen, utraque longis tenuibusq; aculeis horret. Fructus candidæ, candidus: nigræ, niger: quemadmodum & folium, quod oblongum paruumq; est. Fructui orbiculata est figura, qui in medio turget, in margine uero tenuior & ueluti foliaceus existit, in summa, uerticillo, quo ceu pondere fusis infixo utuntur mulieres, similis est, non tamen perforatus. Dioscorides & tertiam Rhamnum recenset, cuius semen in quibusdam Dioscoridis exemplaribus spondylis, in quibus etiam Asphodelo, comparatur, diuersis natura plantis. Nos spondylis, hoc est, uerticillo, similem esse etiam ostendimus: quare non Asphodelo, sed spondylis.

spondylis legendum censemus. Rhamnis quidam etiam annumerant Crispinam uiam ferentem spinam, sed cum foliis & fructu plurimum discrepent, sui generis ipsam esse credimus.

* Quidam Hercoresbehi esse putant, (uiam Crispinam puto) sed folia dissimilia sunt.

DE HALIMO. CAP. 121.

Halimus frutex maritimis locis provenit, gustu salus, unde et nomen inuenit. Nobis propterea incognitus est in mediterranea regione habitantibus. Quamuis autem Germaniam quoque spaciosissimum mare alluat, tamen quia nostrum litus septentrionem spectat, non temere in eo Halimum provenire quis credat, qui calidioribus et soliaduersis littoribus nascitur. Confuderunt aliqui hunc fruticem cum asphodelo, qui etiam Albucus dicitur. Hinc enim in hoc capite quoque Albuci vocabulum legitur, sed admodum male: non enim a Dioscoride, sed ab alio quodam imperito adiectum est. Videndum in hac planta erit, quomodo concilientur Dioscorides & Serapio: ille enim ait Rhamno simile esse Halimum, sed spinas non habere: hic autem plures illi quam Rhamno spinas tribuit. Vocatur autem ab Arabibus hac planta Molochia & Atriplex marina. Quare hoc nomine apud Serapionem querendum erit Halimon. Plinius ueterum quorundam autoritate, plures eius species describit.

* Halimus frutex est maritimus. Alimus uero, Asphodelus.

DE PALIVRO. CAP. 122.

Varia est apud authores Paliuri historia siue descriptio. Sunt enim multae eius species, uerum in tanta historiae diuersitate, quidquam certi sine firma ratione indicare, temerarium foret. Nos illud affirmamus uulgo non cognosci, neque in medicinae usu nunc esse paliurum. Est autem ut tradunt scriptores duplex paliurius. Altera procerior & arborescens, Africæ familiaris: & humilior altera, quæ spinis & agrorum pestibus adnumeratur.

* Klein Sta hel wicken / folijs similibus uicij.

DE OXYACANTHA. CAP. 123.

Oxyacantha, (quæ Theophrasto etiam masculino genere οξύανθῶ & οξύανθῆ nominatur), ab omnibus esse creditur spina illa fruticosa, rectis uirgis arborescens, binis, ternis, & nonnunquam quaternis aculeis ad puniendum infestis, ex intervallo armata: quam Arabes eorumque interpretes, & recentiores cum medicis tum pharmacopolarum omnes uno ore Amiberberim & Berberim appellant. Cui sententiae nos minime refragamur, sed potius conquerimur, confundi apud authores hoc nomine duos frutices natura diuersos. Quæ enim hic apud Dioscoridem extat Oxyacantha descriptio, nihil minus designat quam Berberim. Alia enim est Oxyacantha, cui Galenus adstringendi & pariter incidendi uires tribuit, ab hac spina quæ a Dioscoride sub Oxyacantha nomine describitur: quod iam ostendemus ab ipsa fruticis descriptione exoriri. Principio Oxyacantham suam Dioscorides Achradio, hoc est, syluestri piro, similem dicit, minorem tamen & spinosiorē. Similitudo autem semper ad formam & figuram rei refertur. At diuersissima est Berberi a piraastro figura, ut iam declarabimus. Piraaster enim plerumque singulari caudice assurgit, non ita recto, in diuaticatos & intortos ramos diuiso. Berberis pluribus uirgis fruticis modo se attollit, usque minime intortis, sed rectis. Piraastro, antequam omnino senescat, cortex est lenis, glaber, in flavo spadiceus, in cæsis candicantibus maculis uariiegatus. Berberi uero longæ diuersus colore, & in ipsa adolescentia rimosus & rugis contractus. Quare propter neminem esse credo, modo semel tantum utrumque uiderit, qui * Berberim Piraastro similem fructum eumque rubentem. Berberi quidem rubeus est fructus, sed Myrtæ bacca dissimilis. Hæc enim rotunda & globosa existit, ille uero oblongus & utrinque acuminatus. Oxyacantha deinde fructus οξύανθῆ, hoc est, friabilis describitur. Sed Berberis bacca, quoniam lenta, humida et succosa dicitur, sed bilis esse potest. Friabile enim lenta cute succulentam carnem continet, minime friabilis esse potest. Friabile enim facile ueluti in puluerem atteri queat, talis autem fructus Berberi non est, quare nemo ipsum friabilem dixerit. Reliquas notas cum aliis etiam

Pyra-
can-
tha.

communes an sint, nō discutimus. Censemur itaq; aliā esse spinam quā a Dioscoride describitur, ab ea quam Galenus & Arabes Oxyacanthē & Berberis nomine describunt. Qualis autem ea sit nunc declarabimus. Dioscorides inter Oxyacanthā synonima etiam *πυγία* numerat, cum uero apud nullum autorem hac uox extet, perperam esse exaratam suspicamur. Ipse tamen Dioscorides hoc eodem libro Pyracanthameminit in Mespili capite. Eam effecensemur quē hic corrupto nomine *πυγία* uocatur. Facilis enim lapsus est scribentium. Idcirco Dioscorides pro Berberi, quā uera est Oxyacantha, Pyracantham descripsit. Est igitur, ut nos iudicamus, hoc loco Oxyacanthā nomine descripta Pyracantha, hoc est, spina quē inter arbores a ueteribus Latinis simpliciter spina, a Gallis Aulbe spine, hoc est alba spina, Germanis *Dagedorn* & *Weißdorn* nominatur. Non tamen intelligimus Rubum syluestres ferentem rofas, qui abusu nobis *Dagedorn* uocatur, sed eam spinam, quam aliqui ex nostris Cornum esse falsō opinati sunt, sunt ex ea uiuā in Hestia sepes: hac enim habitu figuratq; Pirastro similis est, minor tamen spinosiorq;. Fructum fert Myrteis bacis equalem, rubentem, nucleos intus habentem, mollem, & omnis succi expertem, ideoq; friabilem. Idē testatur Plinius, cum dicit Aquisfoliē et spine baccas sine succo esse. Accedit etiam foliorum figura, quā Apio similia sunt: nam talia Pyracantha habere debet, Dioscoride Mespili folia Pyracanthae foliis comparante & Theophrasto Mespili folia Apio similia describente. Pronunciamus itaq; Oxyacantham a Dioscoride descriptam, esse Pyracantham: ueram autem Oxyacantham de qua Galenus scribit, Berberim esse. Nihil enim obstat quod quādam ex Dioscoride Galenus in suā Oxyacanthē descriptionem transfulerit.

Oxyacantham Dioscoridis, esse spinam albam uulgō dictam: Germanis *Dagedorn*. Galeni uero Oxyacantham, cui adstringendi & pariter incidendi uires tribuit, Berberim uulgō dictum esse, *Sawridh* / *Salsendorn*.

DE CYNOSBATO SIVE CYNORRHODO. CAP. 124.

*
Canbut-
ren.

Κυνός βατον. Canirubum Theodorus Gaza apud Theophrastum interpretatus est, idem frutex alio nomine Cynorrhodos, id est, Canis Rosa, uocatur. Est autem nihil aliud, quā syluestris & aculeata hamatus spinis rubus, Rosas syluestres ubiq; in campis proferens, Germani *Feltrosen* uocant. Suntq; tres aut quatuor eius differentiae: procerior una, & altera hirsutioribus foliis, cuius frutex totus suauissimum odorem spirat. Hunc Englendiram uulgus appellat. Tertia omnium minima est, nec multum a terra attollitur, quapropter a nobis *Erdrosen* quasi *Chamaerhodos* appellatur. Quarta maiora & lanuginea & incana habet folia & rosas in candido suauiter rubescentes. Plinius Cynosbatum cum uulgari rubo confudit. Quidam etiam hunc fruticem Arbutum esse credunt, sed malē.

*
Fortē lō-
giora, uel
lanuginea-
sa.

DE LIGUSTRO SIVE CYPRO. CAP. 125.

Ligustrum sine dubio arbuscula est, quā Græcis Cyprus uocatur. Propterea Plinius idem scripsisse nunquam poeniteat. Germanicē *Mundtweyden* siue *Keinweyden* nominatur, propterea quod falici similis sit, orisq; ulceribus medeatur, & in Rheni ripa copiose nascatur. Male haec crediderunt Virgilii commentatores ligustra Conuoluoli flores esse, quos Germani *Taunglocken* appellant.

* Arabice *Alkanna*, Henne, Germanicē *Rheinweiden* / *Mundtholz*.

DE TILIA, [uel potius Philyrea. Nam Tilia, Philyra est Græcis.] CAP. 126.

Quē hoc capite a Dioscoride describitur Tilia, omnino eadem est cū Ligustro †, si inuicem utriusq; descriptionem conferant. Galeni & Aeginetę etate talis Tilię historia in Dioscoride legebatur. Siue autem Tilia a Dioscoride sic descripta sit, siue ab alio hæc descriptio adiecta, falsa est, cum nullus neq; ex priscis neq; recentioribus historicis eam depinxit. Omnes enim manifeste describunt Tilię appellatione eam arborem, quē Germanis ob ligni lenitatem & molliciem *Lin* uocatur. Miror autem hoc nullum haecenus animaduertisse. Nam omnes qui post Dioscoridem de rebus scripserunt, aut alios interpretati sunt, usq; ad nostram ætatem eam controuersa igitur est hæc Tilię historia quā in hoc authore legitur.

† Refutat hanc opinionem Matthiolus: & Philyream a Ligustro diuersam pingit, Arabum (ut ait) *Mahaleb*.

DE

DE CISTO. CAP. 127.

Iamdudum ostensum à Leoniceo est, confudisse Plinium natura diuersas plantas, Ciston & Ciston, quantumuis frigidis argumentis Plinium defenderit Collinutius. Cistus autem in hisce regionibus incognita est. In Italia uero frequens nascitur. Scimus etiam in Gallia quibusdam locis tanquam peregrinum à Magnatibus in hortis feri, unde & nos semina accepimus: quibus satis enatus est frutex, omnibus quibus à Dioscoride describitur notis conspiciendus.

* Cistus est
tam in Ba-
uaria nasci-
tur.

DE HYPOCISTIDE. CAP. 128.

In Italia collibus, & alibi ubi copiose Cistus prouenit, sub ipso frutice ad radices eius nascitur quiddam, ex argumento Hypocistis dictum, quoniam non alibi quam sub Cisto proueniat. Est autem breuis herba, si modo herba dicenda est, ei quam caudam leonis appellamus non dissimilis, sine foliis, pinguis, carnosaque & tota uelut in Hyosciami utriculis aut punici mali cytinis constans: succo prægnans, qui expressione aut coctura elicitus & ad spissitudinem coctus, uel in sole densatus, herbae suae nomine in pharmacopoliis seruetur. An uero, quæ passim in pharmacopoliis habetur, Hypocistis omnis huius herbae succus sit, huius loci non est in dubium uocare.

Hypocistis est planta ex ea succus dicitur. Plantam eandem aut cognatam putant, quæ ab aliquibus cauda leonis dicitur, Germanis Onblat, quasi sine foliis: Dioscoridi Orobanche.

DE LADANO. CAP. 129.

Ladon Cisto similis frutex est, cui lenta, resinosa & odorata pinguedo adheret, quæ Ladanon dicitur. Hodie uero in pharmacopoliis Laudanum. Galenus Ladon nihil penitus à uulgaris Cisto differre credit, sed meliorem & calidiorem esse, quoniam in calidioribus regionibus nascatur. Quod an uerum sit, non ausim affirmare, cum ipse Dioscorides Ladanum ex calidioribus locis (qualia sunt Arabia & Lybia) damnet: ex Cipro uero, frigidiorè quàm Arabia uel Lybia regione, probet. Ergo non caliditate regionum à uulgaris Cisto diuersas uires nactum est Ladon. Porro substantia multum utriusque succi differunt. Hypocistis enim aqua resoluitur, Ladanon in oleoso liquore. Illa etiam Cisti radicibus adnascitur: hoc uero ramulis & foliis adheret.

DE EBENO. CAP. 130.

Incognita est hodie Ebenus nostris Medicis. Quidam tamen Guaiacum lignum, Ebenum esse contendunt. Quoniam pondere & densa soliditate Ebenum æmuletur. Nos ueram uidimus Ebenum Augustæ Vindelicorum apud Conradum Relingerum Patricium Augustanum: & Norimbergæ faciunt ex Ebena delicatioribus custellis capulos. Venditur tamen hodie non minus quàm olim, India & Aegyptia ex spinæ, hoc est Acatia materia pro Ebena, quæ propter similitudinem facile ementibus imponit. Porro illi maxime errant qui Ebenum putant eam esse arborem, quæ Germanis ein Eybe uocatur, de qua in Picea etiam est dictum. Ebenus enim calidissimis nascitur locis, qualis India est. Eybe uero frigidissimis ferè regionibus, & earum etiam frigidis & gelidis montibus. Qualis autem arbor sit quæ Germanis Eybe uocatur, in picea indicauimus, & libro quarto in Taxi capite repetemus. Porro ipsam Hebenum Germani Heben siue Eben appellant.

Ebena
Acacia

* Adfertur in Germaniam quoque hodie: & à diuitibus quibusdam Norimbergæ ac alibi possidetur.

DE ROSIS. CAP. 131.

Rosæ multiplices habent differentias, quibus ab omnibus dignosci queant: rubentes uero à medicis receptæ sunt, de quibus etiam hic agit Dioscorides. Debent autem tempestiue colligi, antequam penitus aperiantur, & cum adhuc clausæ, conifiguram imitantur, & in umbra siccant: sæpiusque, ne situm contrahant, uersæ ad suos usus reponi.

DE ROSEIS PASTILLIS. CAP. 132.

Pastilles, hoc est, Rosei pastilli, in pharmacopoliis Trochisci de rosis uocantur. Ast huiusmodi est & diuersa eos præparandi ratio nunc in pharmacopoliis, quàm olim cum

D ij

Dioscorides hæc scriberet. Possunt igitur uolentes aut ueterum aut recentiorum more habito morborum respectu Roseos pastillos componere. Quæ enim à Dioscoride traditur Rhodidum descriptio ad minuendū sudoris & hirci uirus inuenta est. Quæ uerò ab Arabibus descripta est, constringendi & confortandi uires habet.

DE LYCIO. CAP. 133.

Lycium è Pyxacantha, eo quo Dioscorides docet modo, conficitur. Conficiebatur & è Rhamno & aliis quibusdam similiter, ut Oxyacantha, adstringentibus spinis. Copiose quondam in Lycia fiebat, unde & nomē inuenit. Quod uerò hodie in pharmacopoliis habetur, neq; è Pyxacantha, neq; Rhamno, neq; Oxyacantha (nā ex hac quoq; non cōtemnendum confici potest) excoquitur: sed ex matrisylua t uocato frutice, qui sæpes & arbuta uitis modo ascendit, & ex aliis quibusdam plantis, nihil aut admodum parum adstringentibus. Falluntur qui Pyxacantham esse putant aculeatis undiq; & semper uiuentibus arborum foliis, Germanis, Dole, Gallis Hous, Latinis Aquifoliam dictam, ea enim sui generis arbor est, ut in Quercu dicemus.

†
Id est, Peris-
slymeno.

DE ACACIA. CAP. 134.

Omnes hodie magno errore persuasum est, Acaciā ueram Prunellorum agrestium, quæ Germanis Schlehē uocantur, succū esse. Est enim Acacia secundum omnes Græcos, Latinos, & Arabes scriptores in Aegypto nascens spinosa arbuscula, quam Theophrastus etiam simpliciter interdum Acantham uocat. Fert hæc spina lupino similes siliquas & semina, sæpe à me, in Gummi Arabico uocato, quod ex Acacia arbore manat, ut omnes Græci & Arabes testantur, inuenta. Quapropter non est dubium, quin Acacia careamus: quam facile habere possemus, nisi deesset mercatorum diligentia: si enim Acaciæ Gummi totæ naues onustæ ad nos peruenire queunt, cur non & succum è siliquis expressum expetimus?

Sethim in
sacris liti-
ris uoca-
tur.
Acantha
simpliciter.

DE GUMMI.

In Dioscoridis codicibus nostris nullum hic peculiare caput est de Gummi.

Gummi appellatione intelliguntur omnes arborum lachrymæ, quæ tamen non resinosa constant substantia. Quamuis enim interdum promiscuè hanc uocem ad omnium arborum & herbarum tam resinosas quam aqueæ substantiæ lachrymas referamus, proprie tamen Gummi appellantur, quales ex Acacia, ceraso, pruno & Amygdalo lachrymæ fluunt: ex quibus omnibus lachryma quæ ex Acacia manat, Gummi simpliciter, propter excellentiam, uocatur. Arabes uerò Arabici appellationem adiecerunt, et ubiq; in pharmacopoliis sub Arabici Gummi nomine uenditur. Errant uehementer qui Arabicum Gummi, Tragacanthæ lachrymam esse putant, uiriū similitudine decepti. Est enim longe diuersa ab hac Tragacanthæ lachryma, ut suo loco ostendemus.

DE AMURCA. CAP. 135.

Tritis & expressis Oliuis, qui defluit humor in tria discedit, quorum superius est Oleum, inferius autem quod crassius & feculentius est, fraces nominatur: quod uero inter utrumq; constitutum est, substantia aqueum, aliquantulum uinosum, acre & acetosum, Amurca Latinis dicitur. Est autem nihil aliud quam succus, qui præter Oleum in Oliuis gignitur, Cuius medicamenti apud nos nullius est usus.

DE VITICE. CAP. 136.

Vitex, quæ Græcis Αῖνος à castitate quam facit uocatur, copiose etiam in Germania provenit ad Oenum fluuium, non longe ab Oeniponte oppido, quod nos Insa prius nominamus, & aliis uicinis locis. Quinetiam in Italia nascitur, fructus eius in pharmacopoliis habetur, quem Agni casti semen uocant. Differt uitex multis notis à Silere, hoc est, à parua illa salice, quam quidā Viticē falsò esse credūt. Theophrastus etiam tertie speciei Agni quā Eleagnū uocant, quod mediā inter Oleam et Viticē figuram & formā habeat, mentionē facit, aitq; nasci circa Orchomenū lacum. Eadem Eleagnū copiose in Cauchorum paludibus inuenitur. Estq; tota odorata: Semen fert Piperi longo non dissimile, Cauchi quoniam lupulum pauci colunt, eius frondes & semina suæ cereuisiæ pro lupulo incoquunt: quæ somnū conciliat & cito inebriat. Vocatur

Siler.
Eleagnus.

Vocatur ab illis hæc arbuscula † *Alc* em a nonnullis etiā *Potiff* a Vuestphalis *Grut*.
 Nos totius arbusculę figurā & naturam, in arborum † & fruticum historia diffusius
 tractauimus: quod historiam eius legere uolentes remitto.

† *Alis* *Alta*
 sem.

†
 Non extat
 in ijs que
 habentur.

DE SALICE. CAP. 137.

Notæ sunt, & ubiq; in aquosis proueniunt Salices, quas Germani generali uoca-
 bulo *Weyden* nominant. Sunt autem plures Salicis differentię agricolis probè no-
 te. Genera eius sūt, Viminalis & Perticalis. Viminalis, ut Plinius est author, dicitur,
 quæ Viminum gratia in agris talea sesquipedali feritur, ut Vimina qua uites ligen-
 tur facile sine scalis detondeantur. Viminalis in Francia nostra copiose propter uites
 feritur. Perticalis in Saxonia, ad lupuli pedamenta. Perticalis est quæ longiore talea
 siue pertica pangitur, ea nō singulis annis putatur, ut Viminalis, sed quarto demum
 anno. Longiorem enim ætatem Perticę quā Vimina requirunt. Atq; hæc generum
 sunt nomina: specierum uero, quę certō demonstrari uetustis nominibus possunt, Vi-
 tellina & Gallica. Vitellina est, quæ Germanicę gelbe *Weyden* / & *Totterweyden*
 uocatur, frequens in Francia nostra, cum Perticalis, tum Viminalis, Gallica uero est
 quæ in obsoleto purpurea profert & omnium tenuissima Vimina. Nos *Harvey* = † *Aliqui* si
 de / hoc est, Capillares salices, a gracilitate uocamus. Porro qui salicum figuras
 ignorauerint, Leonharti Fuchsi herbarium consulant, qui plurimum specierum ima-
 gines delineari curauit.

† *Aliqui* si
 ler inter=
 pretantur,
Harvey
 de.

DE OLEA SATIVA ET SYLVESTRI. CAP. 138. & 139.

Olea arbor est, ex cuius fructu Oleum quod uulgo uocant oliuarum, exprimitur:
 nos et *Delbauum* nominamus. Ea duplex est: Sativa, & Syluestris altera, utraque
 calidis regionibus familiaris. Syluestrem de qua nunc sermo nobis est Græci *ἀγρίαν*
ἀλάαν & *κόρινθον*, Latini Oleastrum appellant: quæ delicatiora etiam apud nos confi-
 ciuntur opera. Materia constat crispa, maculosa & uersicolori.

DE COLYMBADIBVS OLIVIS. CAP. 140.

Nondum maturos oleæ fructus, cum adhuc flauī sunt, marina aqua & Thymo
 conditos, quoniam Muria innatabant, Græci *κολυμβάδας* uocant. Afferuntur au-
 tem ex Hyspania & Italia ad nos. Vulgo *Oliuen* appellantur, quæ grato sapore &
 salubri stomacho in cibo cum assis carnibus comeduntur.

DE OLEASTRI OLEO. CAP. 141.

Exprimitur etiam ex Oleastri fructu Oleum, quod ad nos non affertur. Est autem
 exurbana olea expresse acerbius. Nascitur etiam apud nos parua quædam & sylue-
 stris Olea, in Danubii, Vertachi, & Lyci ripis in Vindelicia: cuius baccis & aceto
 sum & acerbum exprimitur Oleum, ori, donec recens est, gratum, id uetustatem fer-
 re non potest. Existimamus autem hanc Oleam esse quam Columella Cilibracam ap-
 pellat. Nec nos latet pleroseq; Cilibracam Oleam credere eandem esse cum Chame-
 lea, quam Arabes *Mezereon* uocant: quem errorem in quarto libro cum locus re-
 quirit, detegemus.

Oleaster
 Germanis
 cus.
 Olea Cili-
 braca.

DE AETHIOPICÆ OLEAE LACHRYMA. CAP. 142.

Nascitur & in Aethiopia Oleaster calidioris temperamenti, e quo hæc fluit lachry-
 ma, quæ hodie incognita est. Quidam tamen eam esse credunt Gummi dictum Ele-
 mi, quod ut non negamus, ita etiam non affirmamus: Considerantibus autem no-
 bis hanc Aethiopicam Oleam & materiam circumspectantibus, nulla inuenta est
 quæ a quę eius habitum referret, ut lignum quod Rhodii aut Rhodii cognomine
 circumfertur, & sæpissime ignaris pro Agallocho, hoc est, Xyloaloe substituitur.
 Causas autem & argumenta quibus inducti sumus, ut statuamus Rhodium lignum,
 Aethiopicæ Oleæ materiam esse, antea polliciti sumus hoc loco nos allaturos, cum
 de Agallocho & Agallocho ageremus, id autem nunc præstabimus. Principio nouis-
 se legentes oportet, & probè perspectam habere, uulgaris (hoc est, alibi quā in
 Aethiopia nascentis) Oleastri materiam, eius autem figuram, quoniam multos non

† *Gummi*
 Elemi suspi-
 cantur ali-
 qui esse la-
 chrymam
 Cedri.
 Lignū Rho-
 dium uulgo
 dictū, Olea
 Aethiopi-
 cam uideri.

uidisse scimus, indicabimus. Est itaque Oleastri materia nodis tuberosa (quo fit, ut Hercules etiam clauam ex Oleastro casam tradant poetæ) densa, solida, intortis & sinuosis Venis seu pectinibus crispa: pallidis, subfuscis & spadiceis maculis uaria, aliquantulum odorata, gustu amara & acris & uetustati ferendæ maximè idonea. Eas autem omnes notas, si quis diligenter discusserit, in Rhodio ligno reperiēt. Est enim æquè nodosum, & in tubera conuolutum. Quinetiam densa soliditate uulgarem Oleastrum superat, nec immeritò, cum sicciori & calidiori loco proueniat. Refert etiam fluctuantibus uenis crispum Oleastri habitum, nec desunt totidem colores, & macularum uarietas. Est etiam acre & odoratum, atque gustu Oleastri acrimoniam & amaritudinem respicit, sed utranque uehementiorem. Quoniam terra & cœlo sitienti & seruido enatum est. Differt autem tenuitate sola à uulgari Oleastro, quoniam alimentificopia in sitienti solo & cœlo desuit. Quapropter cum omnes huius ligninotæ Oleastro conueniant, & manifestè constet id ipsum ex Alexandria Aegypti, Aethiopiæ uicinæ, afferri: & authores tradunt Chamelææ materiam & radices nonnunquam pro Xyloaloe uendi, neminem profecto futurum arbitramur, qui neget Rhodium lignum Aethiopicæ Oleastri materiam esse. Porro quod Aethiopica Olea, etiam Chamelæa dici possit, antea in Agallocho ostendimus.

DE QUERCIV. CAP. 143.

Non habent Latini quo glandiferarum arborum genus comprehendant uocabulum, quemadmodum Græci, qui *ἄρκυς* appellatione non Quercum tantum, uerum etiam omnes alias glandes propriè dictas ferentes significant. Quamuis Theodorus Gaza credat Roboris nomen apud Latinos æquè latam significationem ut apud Græcos *ἄρκυς*, habere. Sed nos non meminimus hoc aliquem è probatis authoribus dixisse. Quare non est quod Gazæ hac in re assentiamur. Sunt autem diuersæ huius generis arbores, partim etiam apud Latinos suis nominibus distinctæ: ut sunt, Quercus, Robur, Cerrus, Esculus, Ilex & Suber. Eas omnes Græcis nominibus indicare, ualde operosum esse omnes intelligent, qui Theophrastum de his agentem considerauerint. Nos uerò rerum ad historias collatione, & Gazæ uersione freti nostram de eis sententiam ferre non detrectabimus. *ἄρκυς* est uulgaris illa ramosa in latitudinem diffusa glandifera arbor, caudice neque adeò procero, neque recto, crasso tamen, eam Latini propriè Quercum uocant, Germani etiam *Eiche*. Theodorus nunc Placidam, nunc Quercum apud Theophrastum uertit. *ἄρκυς* specialiter uocata robur est (siquidem Theodoro credendum) nisi enim ita Robur Græci appellarent, non temere aliud nomen esset reperire, quæ ea gens eam arborem indicaret. Caudice assurgit Robur recto, procero, paucisq; ramis brachiato. Italis adhuc Rouer uocatur, Germanis etiam *Steineiche*, à soliditate, quasi lapideam Quercum dicas, frequentissima est hæc in Hælia arbor. *ἄρκυς* Cerrus est, Roboris figuram referens, sed hæc etiam eo tum rectior, tum procerior existit, ramosq; non nisi in summitate habens, Germanis etiam *Tanneiche* uocatur, quoniam Abietis modo recto proceroq; constet caudice. *ἄρκυς* est, quam Esculum Latini, & *Hasel* Germani appellant, Saxonice syluis in plano familiaris, huic latissima folia, unde & apud Græcos nomen. Hæc sunt glandiferæ arbores, quæ hoc capite *ἄρκυς* πᾶσι σα à Dioscoride nominantur, & propriè uocatas glandes ferunt.

GLANDES. CAP. 144.

DE PHEGO ET ILICE. CAP. 145.

Mirabuntur fortasse complures, quòd non fagum potius quam phegum Græcorum *φύλον* uerterimus. Cum fagum non tantum recentiores authorum interpretes, uerum & ipse Plinius per *φύλον* intellexerit. Nos illud minimè later, est aliud quod nos nomen mutare compulerit. Græci enim suam *φύλον* glandiferis arboribus adnumerant, quibus dissimillima est quæ à Latinis Fagus dicitur arbor. Quid enim commune Fagus cum Quercu aut Illice habet? profecto nihil. Quare diligenter notent rerum studiosi, *φύλον* longe aliam arborem esse ab ea quam Latini Fagum appellant, quamuis Latinum nomen à Græcorum *φύλον* deductum uideatur.

deatur. Nam ut alia omittamus omnia, quibus discrepant, Græci suæ phego Glandes tribuunt, non aliarum modo oblongam, sed rotundā Fagus uerò Latinis dicta, glandem proprie non fert, sed in Echînatis pericarpis castanearum more pingues & oleosas nuces, easq; triquetras & acuminatas; quæ figura è diametro cū rotunda pugnat. Qui uerò phegum nouisse uoluerit, montanas lustret sylvas, in quibus prouenit hæc arbor. Figura illi non dissimilis Quercui, sed strigosior & tristior. Glandes fert omnibus agrestibus notas, figura rotundas: qua nota tanquam præcipua ab aliis Glandiferis distinguitur. Porro non licuit hætenus rescire, quo nomine nostri agrestes hanc Phegum appellent. Glandes uerò, adiecto rotundarum cognomento, à reliquis distinguunt. At quæ Romanis Fagus appellatur, proprii & simplicis generis arbor est. Et diligenter quidem à Theophrasto Oxyæ nomine descripta, unde uolentes historiam eius petere possunt. Est itaq; ^{Oxyæ} Quercus species, quam nos Phegū, ut à Fago distinguatur, uocamus. Fagus uerò simplicis generis arbor, quæ Theophrasto ^{Fissimā} ^{Ilex.} ^{negives?} nominatur. Theodorus ^{Ilex.} scilicet uertit: quoniam materia eius facile in tenuissimas laminas findatur. Ilex autem quæ Græcis ^{negives?} est, & ipsa glandiferis adscribitur: quo autem nomine Germanis nota sit, fatemur nos nondum rescire potuisse. Sunt præter has glandiferas & aliæ arbores, in quorum numero est quæ ^{Suber.} ^{phellos.} ^{Rogbaum.} Græcis, Latinis Suber, Germanis ^{Arachbaum} nominatur, Pyrenæis montibus familiaris. Cortex ad calcamenta & alios usus expetitur, ideo in copia etiam ad nos uenit: est autem rarus, leuis & fungosus, eum nostri ^{Arach} uocant à ^{baum.} crepitu quem sub pedibus edit calceis insutus.

*Fagum nostrum, seu Latinorum, Theophrasti Oxyam scilicet: Phegum uerò Græcorum, arborem Quercui non dissimilem, strigosiorē: quæ glandes rotundas proferat, etc.

*Ilex alia est aquifolia, Germanis Holo uel Hulo.

DE CASTANEIS CAP. 146.

Castanea arbor sui nominis fructus fert, omnibus notos, qui Græcis ^{Αἰὶς Βάλανος}, ^{Σαρδανὰς Βάλανος} ^{δοπία} & ^{κάρων} uocantur. Germanis Castanien & Kesten. Plinius numerosam facit earū differentiam. Apud nos triplex habetur genus: unū syluestrium, & duo satuarum. Syluestrium syluæ sunt in ulteriori Rheni ripa in Trebochis supra Argentoratum, & in toto illo montano tractu. Proueniunt etiam in ceteriore ripa, sed parcius. Satuarum quædam sunt minores, quædam uerò grandes è Narbonensi Gallia, primum ad nos allatæ, quas Marones appellant.

DE GALLA. CAP. 147.

Multa præter fructum glandiferæ ferunt arbores: præsertim Quercus, Ilex, & Robur: in quorum numero etiam Gallæ sunt, medicis, librariis, & artificibus quibusdam expetitæ. Eæ pediculis, ut glandes, surculis adherent. Ferunt etiam in foliis similes Gallis pilulas, sed rariore corpore: in quibus ueluti Muscæ quædam & Culicæ gignuntur. Hæ quamprimum deciderint, flaccescunt: decidunt autem ut plurimum citò, nec Gallæ modo in parente sua indurantur. Ipsæ autem Gallæ ^{Gallæ} ^{oppel} & ^{Eychoppel} uocantur. Pilulas uerò Gallis similes, & foliis adnatas ^{Dauibe} ^{Galloppel} nominamus, quasi surdas, fatuas, & inanes Gallas. Suntq; optimæ Asiæ, quas hodie Turcicas nominant.

*Galla alia inanis est, quæ folijs adnascitur. alia solida: cuius tres species adferuntur: Turcica, Ibrica quæ parua sunt, & nostrates magnæ.

DE RHV. CAP. 148.

^{Poë} frutex paruus latum ferens & lentibus similem fructum, eumq; copiosum, confectum & corymbaceis racemis coherentem, qui Arabico uocabulo hodie in phar-macopolis Sumach appellatur. Theodorus Gaza Rhun fluidam interpretatus est, apud Theophrastum nomen illi à ^{ῥῆν} factum esse existimans.

DE PALMA. CAP. 149.

Palma arbor est quæ palmulas fert, quas hodie Dactylos uocant. E quibus fit

D iij

purgans medicamentum, quod Diaphœnicon à palmulis nominant. Sunt autē multa & Palmae & Palmularum genera. Plinius quædam Nicolaos uocat, earum quaternæ cubiti longitudinem habent, quæ uerba malè intelligens Hermolaus Barbarus in magnum errorem incidit, scribens Nicolaos palmulas, quaternum cubiterum habere longitudinem. Auxit itaq; Barbarus decies & sexies earum mensuram. Locutus est in Corollario huius capitis. Palmulas autem Germani Dacteln uocant, corrupto Latino nomine. Palma autem procera est arbor: materia rara fungosaq; quæ tota ueluti teretibus & sinuosis neruis per medullam transeuntibus, & ceu fluctuantibus constat. Cortice uestitur carne & capillatis neruis concreto, qui ex intervallo ueluti in orbes, circulos & uerticillos extuberat; quibus se ascensuris ueluti gradibus ad hoc natis scanilem præbet. Folia profert longa, uenosa, harundinea, quorum singula gemina, & ceu complicita conspiciuntur, fiunt ex cortice funes. E foliis funes, sportæ & tegetes, quibus inclusæ quædam peregrinæ merces ex India & aliis calidioribus locis afferuntur. Trabes è palma cæsæ, etiam in asseres serra secantur: iis cistas componunt, quibus inclusum saccharum ex India occidentalis Insulis nostri mercatores reuehunt. Vidimus nos palmæ frondes, materiam & corticem, adeoq; magnos corticum circulis adhuc circumdatos truncos: quod ideo referimus, ne ex relatione aliorum hæc scripsisse, aut ex Plinio excerptis uideremur. Porro nequaquam silentio prætereundum existimamus, quod principio huius capitis Dioscorides Arabica Myrobalani mentionem faciat, ut rerum studiosi etiam hoc scirent, quid per eas intelligat hic author. Nos itaque censemus Arabicas Myrobalanos eos esse fructus, qui adhuc in omnibus Pharmacopoliis Myrobalani appellatione cognoscuntur, non tamen omnes quinque intelligimus, sed tres præcipuas; uidelicet Indam, Citrinam & Chebulam, quæ tres differentiæ non in diuersis, sed una eademq; arbore nascuntur, ut palam ostendimus in peregrinorum medicamentorum historia: ubi docuimus Indam Myrobalanum primum fructus rudimentum esse, quam Plinius Oliuæ nucleo comparat, atq; Adypson appellat, & Citrinam maturefcentem, Chebulam uerò maturum fructum.

Myrobalanus Arabicus.

PALMÆ THEBAICÆ. CAP. 150.

DE PALMÆ ELATE. CAP. 151.

Elata, siue *Σωείλη*, oblongum, mucronatum & squamatum compactile florentium & adolefcere incipientium palmularum tegmen & operimentum est, pingue, crassum & odoratum, quo antiquitas ad spissanda unguenta usa est: nunc uerò nostris medicis non expetitur. Vidimus aliquoties cum palmulis casu allatam, sed aridam & inueteratam.

DE PVNICIS MALIS. CAP. 152.

Mala punica hodie granata, à granis quæ intra se claudunt, uocantur. Habent hæc suas ex sapore differentias. Inueniuntur etiam, & arte sic nasci coguntur, quæ nullum in acinis semen habeant; ea græcis ex argumento *Ἀσώγωνα* uocantur. Atqui non tantum in Aphrica apud Pœnos, à quibus nomen inuenerunt, Punica mala nascuntur, proueniunt etiam copiose in Hispania, Gallia, Italia, aliisque pluribus locis atq; in ipsis alpinis soli aduersus, & in decliuius campis imminuentibus, quæ Germani Italianam attingit. Nos hæc mala Granatopffel & Marie Magdalene opffel nominamus.

Punica mala alia sunt syluestria, alia satia: hæc rursus, uel dulcia, uel uinosa, (quæ Muxa nominant, quasi *μύξα*) uel acida.

DE CYTINIS ET BALAVSTIIS. CAP. 153.

Cytinos Punica flores esse tradit Dioscorides iam sequenti capite: Balaustia quodque Punica sed syluestris flores esse dicit. Nos uerò non temere arbitramur alio modo differre Cytinos & Balaustia. Cum enim utriusq; Punica flos eandem habeat formam, Balaustium & Cytinus diuersam, necesse est aliam subesse differentiam, quæ talis est. Cytini sunt Punica tenelli fructus, qui statim post flores decidunt, ut in omnibus malis fieri uidemus. Quod enim Dioscorides scribit Cytinum florem esse Punicae, non intelligendum esse de toto flore censemus, sed de posteriori eius parte, quæ fructus

fructus rudimentum est. Nam hæc etiam Balauſtia nomine in pharmacopoliis cognoscitur. Balauſtium uero est flos sylueſtris Punica, quæ decedit sponte: quoniam inter pediculum & floris folia non habet caput, ex quo fructus fiant. Tales abortini flores in multis arboribus & herbis uidentur, præsertim in Cucurbita & Cucumeratis omnibus generibus, & hæc est uera Balauſtia à Cytino distinctio, quam neminẽ spero temere reprehensurum, si ea quæ de abortiuis floribus dixi intellexerit, uiderit, & animaduenerit. Possunt tamen tam in sylueſtri, quàm satiuâ Punica & Cytini & Balauſtia nasci.

DE SIDIO. CAP. 154.

Σίδιον, uel in plurali numero *Σίδια*, Punici mali cortices, Græci uocant: Latini Mallicorium. Veteres enim Sidam Punicum Malum nominabāt. Est & herba palustris fructum huic similem ferens, quæ Sida appellatur: cuius etiam Nicander in Theriacis suis meminit. Sidium uero hodie corrupto nomine † Sidia uocatur in Pharmacopoliis. † Psidia.

DE BALAVSTIIS PRIVATIM. CAP. 155.

Quemadmodum Cytini à Græco uocabulo *κύτις*, profundum uasculum significante, propter figuræ similitudinem, dicti sunt, ita etiam Balauſtia à uerbo *βάλλω* nomen suum sumpsisse nobis uidetur. Decidunt enim hi, & à matre sua tanquam abortiuu excutuntur. Quicumq; enim Punica flores posteriori sui parte inter floris foliola, & quo furculis adhærent peciolum, non habuerint oblongum & tuberosum capitulum, steriles sunt, ideoq; tanquam excrementum quoddam superfluum ueri fructus alimentum consumens, expelluntur. Quare si quis horum Balauſtiorum figuram considerauerit, deprehendet, ea non Cytino aut oblongo uasculo simili tuberculo, sed dilata ueluti basi foliola sua complecti. Est autem figura Balauſtio, Rosa non dissimilis, sed multo pluribus foliolis stipatus est. Differunt autem colore Balauſtia, ut Dioscorides etiam testatur, ad nos uero ut plurimum feruntur, quæ rosas etiam colore imitantur. Habentur passim in omnibus pharmacopoliis, & nomen suum retinent. Quanquam nonnulli non simpliciter Balauſtia, sed flores Balauſtiorum appellant.

DE MYRTO. CAP. 156.

Μύρτις Græcis, Myrtus & Murtus Latinis uocatur, frutex celebris poetarum carminibus, uerum uiribus quas in medendo præstat multo celebrior, qui quoniam nusquam apud nos sponte provenit, Germanico nomine destituitur. Non enim est exiguus ille fruticulus, quem Germani † Heydelstrauch, & cuius baccas Heydel- † al. Hei-ber appellant, ut hactenus falsò pleriq; crediderunt etiam docti: Vera autem Myrtus duplex est, candida & nigra. Illa candidas, hæc uero nigras baccas parit: unde & Heydel- † Heidel-Quidius de ea sic scriptum reliquit. *Myrtea sylua subest bicoloribus obsita baccis.* † Heidel- Prouenit autem copiosè in Narbonensi Gallia, maxime in eius parte maritima, quæ Prouincia uocatur. Seritur etiam à plarissq; in hortis, etiam in Italia. Est autem in aliquam proceritatem, si studiosè colatur, adoleſcens frutex, aut etiam arboreſcens: foliis Lentisco uel Buxo similibus, acuminationibus tantum, gustu aliquid aromatis præ se ferentibus & odoratis, quæ hodie cum fructu ex Italia afferunt. Habent sane ueri Myrtilli insignes differentias quibus à nostris baccis, quas Heydelber uocamus, dignosci possunt.

DE MYRTIDANO. CAP. 157.

Myrtidanum Myrti adnatum siue accidens est: † quod ad nos non adfertur: propterea in nullo usu apud nos habetur. † Tut Cist. Hypocist. lis.

DE CERASIIS. CAP. 158.

Cerasi arboris multe sunt forma et facultate distantes species, quapropter earum etiam fructus diuerſas in cibo et medicina uires habet: austera et maiora, quæ nō ita in magnis arboribus nascuntur, è Pōto primū in Italiā Lucul. attulit: Quæ uero dulcia sunt et in proceris arboribus nascuntur, sponte sua ubiq; in Germania proueniūt. Proueniūt etiam sponte

A cornuum similitudine Grecis *νεπάρια* hi fructus uocantur, Latinis uero *Siliques* quoniam leguminum siliquis similes sint : in pharmacopolis corrupto uocabulo *Xylocaracta* & *Xilōcataracta* pro *Xyloceratia* uocantur. A Germanis autem *Jo-hansbroet* quoniam credunt diuum Iohannem Baptistam hoc fructu loco panis in

DE MALIS OMNIBVS, ET PRIVATIM COTONEIS. CAP. 160. ET 161.

DE MELIMELIS. CAP. 162.

Infanti Melimela fatuasq; Mariscas.
Nam mihi quæ nouit pungere Chia sapit.

Qualia Epirotica siue orbiculata mala sint, hodie nō facile indicauerit quis. Apud nos tamen habentur in latitudinem compressa mala, quæ ab orbiculata figura patrio sermone *Σφειρόσφι* nominamus, idem significante uocabulo quod Latinis orbiculata. Succus is uinofus & gratus palato. An uerò eadem sint cum Epiroticis, nō ausum affirmare, in tanta Malorum diuersitate.

Agrestia mala ubiq; nascuntur, habentq; multas etiã ut satiuã differentias. Faciunt ex his & pyris agrestibus & sylvestribus prunis, omnibus cõtusis per se expressis, aut affusa aqua, multo similẽ potum, qui Hesiã incolunt rustici, quem Appeltrant/ hoc est, c̃ malis confectum potum appellant.

†Pisif Persica mala, quæ Germanis **Pferstien** nominantur, omnibus cognita sunt. Dis-
ferunt tamen à Persæis. Genera eorum plura: quædam parva sunt, quædam grandia,
& crocea carne constant, quæ omnibus saporis bonitate præferuntur.

Ex Persicorum genere sunt & Ameniaca, minora tamen & ori suauiora, colore
 sublato, & cito maturefcentia, quapropter precoqua & praecocia à Romanis uocan-
 tur. A Germanis uero † Marcellen / Sommerpersien † Malathey / & Golt-
 ps † fides. Arbor cum foliis & floribus mediam inter malum persicam & minorem
 cerasum figuram & magnitudinem habet.

DE ME-

DE MEDICO MALO. CAP. 167.

Medicum malum Assyrium, Persicum, Citreum, Cedromalum & Citrinum uocatur. Grande est & oblongum ouata figura malum, lentam habens carnē, & in medio acetosum circa semina succum, ex quo Syrupum de acetositate Citri dictum faciunt: Corticem habent colore citrinum, unde & nomen inuenit. Porro hoc malū in Cedro non nascitur. Propterea uidendum est ne diuersæ arbores confundantur. Sunt etiam huius generis Limones, Poma Adami, & Arangia, ab Italis Naranzia, Germanis **Pomerangen** appellata. Ea omnia aurei mali nomine comprehenduntur. Habetur ænigmaticum de his malis carmen, quod est: *Medica mala quidem nec mala, nec medica: quod quiuis profodia gnarus facile intelligit.*

*Germanis tres species nominantur Citrinaten / Limonen / Pomerangen.

DE PIRIS. CAP. 168.

Pira non pauciores quam mala differentias habet, quod quidem ad formam attinet. Facultate tamen omnia, sed alia aliis magis, astringunt: Germanis **Piren** & **Biren** uocantur.

DE PIRASTRO. CAP. 169.

Agrus uocatur Græcis, **Piraster**, hoc est, **Pirus sylvestris**: Quamuis autem Dioscorides Achradem certam sylvestris speciem esse dicat, tamen quia Theophrastus simpliciter **Pirastrum**, Achradem appellat, nos quoque Achradis uocabulo quamcunque **pirastrum** significari censemus. Sunt enim diuersæ eius differentia.

DE MESPILO. CAP. 170. 171.

Mespilus arbor eiusdem nominis parua mala † producit. Sunt autem duæ præci- † *Mespila.*
pue eius species. Prima **Tricoccus** Græcis, & proprie **Mespilus** uocatur: Italis atque Arabibus **Alzarola** siue **Azarola**. In Germania hæc arbor incognita est. Altera uero **Mespili** species, Græcis **Epimelis** & **Hamamelis** uocatur, quod iuxta malos soleat *Epimelis.*
nasci. Hæc copiose in Germania & fata & sponte provenit. Cum uero sponte, semper *Hamamelis.*
uicinam habet agrestem malum: unde & nomē a Græcis illi factum existimo. Huius fructum Itali etiam **Vnedonem** uocarunt, propterea quod præter unum nemo comedere & deglutire possit, antequam mollescat: adeo enim fauces adstringit. Non melater arbuti etiam fructum a quibusdam **Vnedonem** uocari, quod tantum unus esitari debeat. Sed ipse Galenus **epimelida**, **Vnedonem** ab Italis rusticis appellari, testatur. Sed male illi arbuti uicia assignat. Cuius fructus etiam a quibusdam **Vnedo** uocatur, stomacho noxius & capitis dolores excitans, quæ uicia immerito **Epimelidi** adscribit Galenus. Cum constet experientia **Epimelida** (quæ **Mespilus** in Germania etiam uocatur) stomacho non inimicam esse, nec capitis dolores facere. Porro quæ a Germanis **Mespeln** uocantur, **Vnedones** sunt, hoc est, **Epimelidis** fructus, non propriæ uocatæ **Mespili** ut hæcenus omnes credunt. Eum errorem nescio an aliquis ante nos deprehenderit. Ut cumq; se res habeat, nouisse legētes oportet, **Mespilo**, **Apio** similia folia tribui, & singulis fructibus ternos nucleos. Vocata autem uulgo **Mespilus** nequaquam incisa & **Apio** similia, sed indiuidua, oblongaque, ut **Malus**, folia habet, angustiora tamen. Prætereā non ternos, sed quinos semper nucleos singula eius mala cōplectuntur, nisi fortē interdum præter naturam aut plures aut pauciores contineat. Quod autem Galeno non assentiamus, **Epimelidi**, **Memæcyli** uicia adscribenti, nonnulli fortasse malè interpretabuntur qui in unius magistri uerba iurauerunt.

DE LOTO ARBORE. CAP. 172.

Commune est & multis plantis proprium **Loti** uocabulum. Hoc autē loco de **Lo-**
to arbore sermo est Dioscoridi: quæ plurima in Aphrica, eiq; adiacentibus insulis provenit. Sunt autem plures **Loti** arboris species, ut uolentes apud Theophrastum inquirere possunt. Latini **Celtim** hanc uocant. Quo uero nomine nunc cognoscatur & quid sit hæc **Lotus**, non conuenit inter authores: Nam quod Ruellius, Barbari fretus testimonio, scribit eam esse quam **Calamum Cenomanni** appellent, haud induci

Cerasi
species.

induci possum ut credam. Idem Pongeracum, Visciolum & Ciceraginem ab Italis uocari scribit, Gallis Alysam & Alyserum: quod æque falsum esse cognoscet, quicumque arborē, quam his nominibus appellat Ruellius, nouerit. Est enim Cerasi species cuius Baccæ recentioribus Visciola, Germanis uerò Weyßeln dicuntur. Est autem arbor non tantum Italice aut Gallie familiaris, uerumetiam Germaniæ, in qua etiam frequentius sponte nascitur, quam in hortis seratur. Itaque nos plurimum inter hanc & Lotū interesse censemus. Siquidem hæc frigido sub Septentrione celo, lotus uerò torrida & semper æstuantis Aphricæ prouenit: quinetiā huic Cerasi folium est, loti uerò illicis tribuitur, hoc est, figura Quercus per ambitū profundius incisum sinuosumque. Differt etiā utriusque materia plurimum. Nos autē iis subscribimus qui Lotū arborē Sandalum esse arbitrantur, quod multis argumentis demonstrare & obtinere possemus, nisi breuitati consuleremus. At non quamuis Sandalum intelligere legentes oportet, sed eam tantum quæ rubæ cognomentum in pharmacopoliis habet, quæ & ipsa habet plures differentias, quemadmodum de Loto scribit Theophrastus. Eo autē libentius hoc pronunciamus, quoniam Sandali rubæ folia uidimus Nurembergæ apud Georgium Ollingerum pharmacopolam, qui mirò cognoscendarum rerum studio tenetur. Figura iis erat eadem quæ Quercus & Illignis, sed concinnior & pulchrior: magnitudo uerò minor & in angustum contracta, substantia densa, qualem Laureæ habent. Quare non aberraturos se uereantur, qui Sandalum rubeam accipient, ubi ueteres Loti materiam requirunt: quæ eumque uires à Græcis Loto adscribuntur, eas etiam Arabes suæ rubæ tribuisse neminem ignorare putamus.

*Sandalum
rubrum aut
Lotum esse
se, aut sal-
tem pro ea
recte in us-
um uenire
posse.

DE CORNO. CAP. 173.

*Pyracan-
tha, aliud
quàm Cor-
nus.
† Alij feri-
bunt Korn-
lebaum.
‡ Kornle-

Cornus nequaquam est, ut hactenus plerique crediderūt, arborescēs illa Spina quæ ueteres Græci (ut antea retulimus) Pyracanthā, Latini Spinam, Itali Spinū albū, Galli Aubepine, Germani Weißdorn & Nagedorn uocāt. Quod quilibet palpabit qui Theophrasti & huius authoris uerba de Cornu, cum Italarum Spina albo & Germanorum Nagedorn conferet. Vera autem Cornus duplex est: syluestris, & sativa: utraq; in Germania nascitur, & à nobis Latino uocabulo † Cornelbaum uocatur. Nam Corna, id est, fructus eius † Cornel in uocamus. Habemus & alia nomina præter Latinum quibus eam iudicamus, ut Dirlen, Dornfirsen & Herlizen: fructum fert Oliuæ mediocris quantitate, cibo & medicinæ propter suam adstringendi uim, idoneum. Nascitur syluestris Cornus pinguibus montanis locis: distinguitur etiam alio modo, siquidem altera mas, altera fœmina existit. Mas apud nos montibus familiaris, quinetiam in hortis seritur: statim ueris initio flores lutei coloris producit. Fœmina etiam in plana descendit: florem in pallido candicantem serius emit, & serius fructum percoquit. Inuenitur fœmina Cornus, quam Græci θύλακον uocant, plurima inter Danubii Vuerdam oppidum & Augustam Vindelicorum.

*Corni maris lignum est solidum, fœminæ rariius. Cornum syluestrem aliqui interpretantur Saulholz/ Saulbaum: sed in alijs locis alios frutices aut arbusculos iisdem nominibus appellant.

DE SORBIS. CAP. 174.

† Alij
Spor-
bium /
Sperera-
ling.
Sorbis
torminal-
lis.

Sorba non sunt, ut quidam falso credunt, syluestria mala, quorum antea ab hoc auctore mentio facta est, suum enim propriū ab his genus habent. In Italia ferè omnibus cognita Sorbus arbor est. Fructus eius in una specie ouatus, in alia rotundus & globosus, in alia turbinatus est. Germani parum deflexo uocabulo & transpositis literis Sporöpfel & Sorböpfel ac Eiböpfel uocāt. Nascuntur tum sponte in montanis quibusdam tractibus, tum etiam in uineis sata. Plinius Romana auctoritate quartum statuit Sorbi genus, quod Torminale uocat. Constat hæc arbor, ut ipse refert, folio Platani, & Pomo, si prioribus conferatur, minime. Eam arborem Theophrastus ē Mespilorum genere esse putat, nec immerito, siquidem fructus & figura & sapore Mespilaceus existit: æmulatur etiam folio ueram Mespilum, nisi multo maius esset. Proprio autem nomine κέρταρον eam Theophrastus appellat. Porro quantum nos iudicare possumus hæc torminalis Sorbus est, quam Germani Eibgenbaum

Crategus.

baum/ & cuius fructus *Elzber* nominant, quibus tanquam singulari & presenti remedio contra tormina utuntur, qui Hercynios montes accolunt rustici. Conueniunt historiae, flores, fructus, eorum fauaceus & racemosus habitus quemadmodum & folia. Itaque neminem futurum arbitramur, qui huic nostrae contradicatur sit sententiae.

† Nobis placet etiam quintum Sorbi genus his addere, quod Aucuparium cognominamus: quamuis merito quartum in numero esset, quoniam tota figura, foliis, & flore uerae Sorbo tam similis sit, ut non facile a quouis dignosci queat, nisi pomo, quod omnium minimum & Piso maius est, colore rufum, gustu austerum, quemadmodum alia Sorba. Nostri aucupes fructu eius auribus insidiantur, qui eos *Vogelber* nominant. Ruellius hanc arborem Ornum esse credit, ut ante etiam retulimus. Sed alia, ut praemonstrauimus, ab hac est Ornus.

† Sorbus aucuparia
Ebera
† Quir
Schelber
Stolberge.

DE PRUNO. CAP. 175.

Prunus arbor uaria habet genera: unde etiam fructus diuersa magnitudine, figura, & temperamento constare necesse est. Sunt enim quaedam alium sistentia: sunt & soluentia, quae uis facile gustu deprehendi potest. Quaecumque enim dulcia sunt, alium soluunt: quae uero acerbata & austera, eam cohibent. Damascena etiam pruna ad huc in Pharmacopoliis exiccata habentur. Quemadmodum etiam magna illa Hungarica, ab ipsis Hungaris Damascena, & a Germanis grosse *Swertschen* & *Vingerrische* *Pflaumen* uocata. Quidam his pro Damascenis utuntur. Pruna autem omnia generali uocabulo nobis *Prunum* nominantur. In Hestia quoque *Prannen*, quae uox a *Prumno* deducta uidetur. Nam sic Galenus syluestre *Cocymelea*, hoc est, syluestrem prunum in Asia uocari testatur. Exiccata etiam pruna ad nos ex Hungaria, Bohemia, Austria, Transyluania & Morauia afferuntur, quae omnia communi uocabulo *Swertschen* nominamus. Sunt & cerea pruna quae *Spilling* Germanis dicuntur. † *Brabyla* quidam prunum interpretantur *Briechen*.

Prunus
Cerea pruna

DE ARBUTO. CAP. 176.

Kwaxop Graeci arbutum uocant: in Germania nondum sponte natum conspeximus: non enim est syluestris Rosa frutex, quem Cynosbatum esse antea diximus. Vera autem Arbutus in Italia nascitur, folio crasso, Laurini figura, crassiore tamen, minore & pro sua magnitudine latiore. Fructum fert mediocris siue parui pruni magnitudine: figura Fragi, intus similiter, ut fraga paleacea & acerosa grana habentem, gustu inuicundum. Respexit autem ad Arbuti & Fragi similitudinem quam inuicem habent. Ouidius cum ait: *Arbutos socius montanae Fraga legebat.* Plura lege supra in Mespilo.

DE AMYGDALIS. CAP. 177.

Amygdala duplicis est differentiae. Fert enim quaedam dulces, quaedam amaras nuces. Appellatur etiam alio nomine Graeca nux Amygdalus. Cognita omnibus haec est arbor apud nos, maxime qui Rhenum accolunt populis. Primas autem in Germania nascentibus tribuitur in Spirensi agro natis. Germani arborem ipsam *Wandelbaum* uocant. Fructus uero *Wandeln*. Notae autem omnibus haec nuces sunt. Expressitur ex utriusque nucibus oleum, quod in suos usus seruatur a Pharmacopolis.

DE PISTACIIS. CAP. 178.

Pistacia, uel ut Nicander uocat, Pistachia, quae & iam Phistica † & uulgo in Pharmacopoliis Pistacia dicuntur, nuces sunt in Syria natae, lento & ueluti osseo putamine munitae, quae eodem nomine adhuc ab omnibus medicis & Pharmacopolis cognoscuntur.

† Pistacia
uulgo.

DE IVGLANDIBVS. CAP. 179.

Nux regia siue Persica, uel simpliciter nux uocata notus omnibus est fructus, in procera & ramosa arbore nascens: quae lata & odorata habet folia. Germani simpliciter siue *Welsche Nuss* uocant. Persica autem cognominatur, quoniam ex Perside primum in alias translata est regiones.

E

Ponticæ nuces quas alio nomine Græci *Λεπτοκάρυα* uocant, Latinis etiam Auellanae dicuntur. Sunt uero duplicis differentiae: quædam sponte ubiq; in Corylo uulgari nascuntur, quæ à Germanis *Haselnuß* nominantur: quædam uero in hortis feruntur arbore Corylo simili, sed fructu oblongiore & toto ceu barbato putamine uestito: nucleus ruffa ut plurimum membrana cingitur. Plinius has nuces barbatus in Xyli descriptione appellat. Est & tertium Auellanae genus in hortis satum, syluestri simile, sed maius nucleo, & gustu suauius. Quartum genus est, quod in Macedonia nascitur, arbore non quemadmodum apud nos multiplici, caudice fruticosa, sed singulari, procero, & iustam arborem æquante: foliis latis, nucibus in grandedem racemum pingui magnitudine congestis. An autem ueteres hanc cognouerint, neq; negare neq; affirmare ausim. Certè apud eos qui nunc extant authores, nulla extat descriptio quæ eam referat. Inuenerunt autem hanc Corylum in Macedonia & Hæmo Thraciæ monte legati quidam è Buda Constantinopolim missi, inter quos fuit & Paulus Rubigallus qui hæc nobis retulit.

Morus omnibus nota est arbor, quæ Germanis *Waulberbaum* nominatur: fructus uero, id est, Mora + *Waulber*. Nascuntur etiam in Rubo mora his quæ in arbore nascuntur similia, sed minora & sui generis. Nam Rubus multum à Moro arbore differt. Conficitur ex utriusq; mori succo medicamentum, quod Diamoren appellant, oris & faucium uiciis accommodatum. Porro duplicis est differentiae Morus: altera nigra, altera candida fert Mora: sed quæ candida fert, in Germania non ita frequens habetur.

Sycomorus, siue quod idem est Sycaminus, copiose in Aegypto nascitur & aliis quibusdā locis: apud nos uero incognita est arbor, quemadmodum etiam altera Sycomorus quæ in Cypro gignitur. Habetur in Italia planta multifidis & fissis foliis, in cuius summis furculis baccis simile pomū est, nucleo intus ligneo & anguloso: eam Sycomorum esse quidam Itali credunt: & nobis quidem eius missa sunt semina: quæ terra obruta singula quinas emiserunt plantas. Sed nihil minus est quam Sycomorus: parua enim est, & fructus in extremis fert furculis: cum Sycomorus magnitudinis iustæ arbor sit, fructus suos non furculis, sed ipso caudice producens.

Ficus uulgaris est arbor, cuius fructus Ficus dicuntur Latinis, Græcis *σῦκα*, Germanis *Feygen*. Multæ Ficuum apud ueteres sunt differentiae. Hodie tantum tres in hisce regionibus nouimus. Afferuntur enim flauæ quædam in sparteis corbibus compactæ, quas Germani *Korbfeyyen* nominant. Aliæ etiam in cistis laurinis foliis commixtae ad nos ueniunt, quas à foliis *Laubfeyyen* nominamus. Tertium uero genus ex Massiliensi Prouincia affertur, minutis & turbinatis sparteis corbibus inclusum: hæ parua quidem sunt, sed suauitate præstantes: Germanis *Wartilsche feygen* uocantur. Quidam etiam Caricas siccitas Ficus nominant, quam uocem Virgilius Marcellus malè in Dioscoridis contextum posuit: habent enim Caricæ ficus suum peculiare genus, ut ex Plinio colligimus: & Hermolaus Barbarus in corollario huius capituli testatur.

Est & syluestris Ficus, quam Græci *Ερινεόν*, Latini Caprificum appellant, Germaniæ incognita: Romæ frequens prouenit, in uetustotū ædificiorum ruinis & muris.

ὀλῳδοι, quos Latini Grossos & Grossulos uocāt, Caprifici fructus sunt, Ficis multo minores.

DE LIXIVIA E CREMATIS FICI RAMIS. CAP. 187.

Fit Lixiuiā macerato in aquā utriusq; Fici cinere, quā admodum acris existit. Nō stri medici perquam rarō ea utuntur.

DE PERSEA ARBORE. CAP. 188.

Persea arbor plurimum differt à malo Persica uulgari, quamuis & ipsa Persica uocetur, & utraq; ex Perside in alias regiones translata sit, tamen Persica etiam Septentrionalibus plagis cito & ante frigora fructum suum percoquit. Persea uerò etiam in Rhodo calida regione, ad florem tantum peruenire potuit, ut authores tradunt. Qui uerò plura de Persea legere uoluerint, Theophrastum consulant, qui historiam eius diligenter absoluit.

LIBRI PRIMI CONCLUSIO.

Primum hunc Dioscoridis librum Perseæ caput claudit: quamuis in quibusdam exemplaribus etiam aliquot herbe sequantur, ut Iberis & Halicacabus, ab imperitiis adiectæ. Nam Iberis idem est cum Lepidio, quod in secundo libro describitur. In capite etiam Halicacabi, quod Hiberida sequitur, tres herbe confusæ sunt, ut Halicacabus, Solanum somnificum & Dorycnium. Propterea hæc capita imposita sunt & non genuina.

VALERII CORDI SIMESUSIJ, in Pedacij Dioscoridis ANAZARBEI SECVNDVM DE ME-

dica materia Librum, Annotationes.

Libri secundi partes sunt tres. Prima, De animalibus, & eorum partibus.

Secunda, De Frumentaceis.

Tertia, De Oleribus & condimentarijs herbis.

IN PRAEFATIVNCVLAM, QVAM DIOSCORIDES SECVNDO LIBRO preponit, Annotatio.



DNUMMERAT AVTHOR QVO ORDINE RES IN PRIMO LIBRO descripserit, & quo in hoc secundo libro pergere uelit ordine. Nullam autem mentionem facit quod Herbacea quaedam & acrimoniam habentia præter aromata in primo libro recensuerit. In secundo uero se de Oleribus & acrimoniam habentibus herbis scripturum pollicetur. Cum ergo Iberis oleracea sit & acrimoniam habens herba, ut in secundo libro describatur necesse est. Nihil enim commune habet cum aromoribus, quare inter has describi debeat. Sed ne quis à dictione, acrimoniam, causam cauillandi arripiat, necesse est ut indicemus, qualem acrimoniam cum Dioscoride hoc loco intelligamus, ne quis nobis hac ratione persuadeat, bene describi in primo libro Iberida, cum multa alia acrimoniam habentia in eodem recensantur: ut Acorus, Meon, Cinamomum, Costus, & alia quaedam manifestam resipientia acrimoniam. Verum ad hanc objectionem respondemus, Dioscoridē de huiusmodi acrimoniam, quam prædicta aromata habent, hoc loco non locutum esse, non enim eadem omnibus plantis est acrimoniam: quædam enim solam eam habent, adiecta inter dum amaritudine, dulce dine, & quibusdam aliis saporum differentiis. Tanta

B

ANNOTAT. VALERII CORDI

autem sunt Allium, Cepa, Sinapi, Nasturtium, Eruca, Lepidium siue Iberis, & quæcunque his similem præferunt gustu qualitatem. Hæc simpliciter acria dicuntur: suntque omnia ista oleraceæ herbæ: de his autem in secundo se scripturum dicit, Longè uerò aliam acrimoniam habent, Acorus, Costus, & reliqua quæ in primo describuntur. Non enim eam in terrestri habent corpore ut exulcerare ualeant, quemadmodum illa oleracea: sed omnia præter lenem & gratam acridinem, etiam partium tenuitate constant, quia facile per corpus penetrare possunt: non enim sui saporis & facultatis uim uni loco imprimunt, nec eidem diutius inhaerent, propterea exulcerare minimè sunt apta. Partium etiam subtilitate gratum & iucundum odorem coniunctum habent: & quæ talia sunt, aromata dicuntur. Differunt tamen hæc ipsa secundum diuersorum elementorum diuersam mixturam: quare facultatem etiam eorum diuersam esse necesse est. Hinc est quod Costus ferè solus ex aromatis ruborem cuti impositus excitet, quoniam suam acrimoniam magis in terrea substantia quam cætera aromata habeat. Porro quamuis Piper atque Zinziber etiam aromatis adscribantur, tamen quia horum maior in culina quam medicina usus sit, maluit ea acrimoniam habentibus & olerum condimentis, quam aromatibus adscribere Dioscorides, & bene quidem, cum hæc duo inter omnia aromata plurimum acrimonie & parum aromaticæ qualitatis habeant. Si quis igitur hæc probè intellexerit, facile iudicabit Iberis da non primo, sed secundo libro, describi debere. Simile etiam de Halicacabo intelligendum est, quæ non arbor sed herba est, & ad deleteria refertur. Quare in primo librum non erat ponenda, sed in quartum, ubi ex professo de ea in deleteriis & frigidis simplicibus agit. Antea enim promisit se forma & facultate cognata coniuncturum.

DE MARINO ERINACEO. CAP. 1.

Εχίνον θαλάσσιον, quem Latini Erinaceum marinum, Germani ein Meerjgel uocant, nouerunt qui maritimis locis habitant. Terrestri similis est, rotundior, minor, & brevioribus aculeis circumuallatur.

DE TERRESTRI ERINACEO. CAP. 2.

Ex terrestrium Erinaceorum genere etiam Hystrix est: quod animal Africa & India gignit, magnitudine semestris porci, pedibus ursinis similibus: dentibus, & labiis lepori, sed his crassioribus, pinguioribus & fuscis, longis & in ceruice erectis setis, à collo usque ad scapulas uestitum. Cætera, præter uentrem, pede longioribus, candicantibus, & nigro distinctis, aculeis munitum, quos irritatum contra lacessentes uallimodo prætendit, & nonnunquam ei aciculatur tanto impetu, ut sagittarum modo parietibus affixi hæreant: talis est Hystri formæ & naturæ. Circumferunt Hystrices, Mimi & circulatores, inter alia, quæ lucri causa oppidatim circumducunt. Habet etiam præter eas quas recensuimus alias proprietates, quas breuitatis causa præterimus. Non enim huius instituti est, exactam omnium rerum historiam scribere. Hystricem Hispani Porcapie, Germani ein Stachelsau uocant, quasi aculeatum porcum. De hoc autem Erinaceorum genere hic non scribit Dioscorides, sed de minoribus, qui in tumulorum cauernis latitant: quorum Germani duplicem statuunt differentiam. Est enim alter, cui caninum sit caput: alter, cui suillum: hunc nos Schweinjgel: illum uerò Hundsjgel à capitum similitudine uocamus. Porro apud nos Erinaceorum nullus est, neque in sanitate neque in medicina usus.

DE HIPPOCAMPO. CAP. 3.

Nomen hoc grandem Erucam (insectum uidelicet) significat, cum tamen paruum sit animal in mari uiuens. Quoniam uerò uulgaribus Erucis grandibus simile sit, nomen suum inuenit, Nobis in continenti habitantibus incognitum est.

PVRPVRAE. CAP. 4.

BVCCINA. CAP. 5.

CRONIA.

CIONIA, id est, Purpurarum & Buccinorum mediae partes. CAP. 6.

DE MITVLIS, TELLINIS, HIATVLIS. CAP. 7. 8. 9.

Μύαες, Τελμύαες & Χήμαες omnes Concharum species sunt, sed singulas suis nominibus non facile quis indicabit. Referuntur etiam ad hoc genus quae ex Hispania à Sancto Iacobo feruntur Conchae. Item illae ex quibus in maritima Germania calx uritur.

DE CONCHVLA INDICA. CAP. 10.

Indica conchula oblongi unguis formam habet, quapropter à Graecis ὀνύφη appellata est. Plures haec differentias habet: quarum uisissima hodie in Pharmacopoliis habetur sub Blaccæ Bizantiæ nomine. Erat olim in Thymiamatū cōfectionibus huius Conchulae frequens usus, ut etiam sacrae literae testantur.

DE TERRESTRIBVS COCHLEIS. CAP. 11.

Cochlearum quas aliqui Limaces uocant, quaedam terrestres, quaedam marinae, & quaedam fluuiatiles sunt. Omnes Germanice Schnecken nominantur. Singulorum autem generum multiplex differentia existit, quare ex magitudine & formae diuersitate dignosci facile possunt: in quibusdam regionibus terrestres & marinae eduntur. Quae uero ex terrestribus, fruticibus adherent, priuatim Σείριδοι à Graecis uocantur. Fluuiatiles uirum habent, quapropter à nullis eduntur. Quod si quis fluuiatiles Conchas manu aliquandiu clausas teneat, uehementem Vrticæ modo excitabit pruritus, quod quidem nos in paruis experti sumus. Sunt etiam Limaces, qui Conchis siue testis carent, colore nigri aut rufi, herbosis hortorum & sylvarum locis gramine uiuentes, quos Germani Schneigel appellant.

DE CANCRIS. CAP. 12.

Noti sunt omnibus fluuiatiles Cancræ, de quibus hic agit Dioscorides, ideoque non est operæ precium longius de iis disserere. Marini uero, quamuis & ipsi ad mare habitantibus cogniti sint, difficile suis nominibus, quae quidem apud Aristotelem & Plinium extant, indicari possunt. Nos ne omnino rem intractam prætereamus, nostri iudicium de uno atque altero efferemus. Qui proprie Marini appellantur Cancræ, fluuiatilibus dissimiles sunt, exceptis Chelis & pedibus: caudam enim non habent: & corpus non oblongum ut fluuiatiles, sed rotundum. Horum apud Graecos præcipua genera: quos etiam Plinius Masas uocat. Itali Granceporos & Granceualos: Germani Weerpuen: hoc est, marinas araneas appellant, quoniam rotundo corporis habitu, & pedibus in orbem ferè exeuntibus. Aranei similitudinem referant. Hi ab Italis alio etiam modo distinguuntur: dura testa præditos, Masanecos; molli uero, Molleccos uocantibus. Quae quidem differentia temporis referenda est: eiusdem enim sunt generis Masanecci & Mollecci: sed Mollecci dicuntur qui deposita ueteri testa nouam, tenuem & mollem induerunt: Masanecci, qui eam nondum deposuerunt, & testam nondum induerunt. Inueniuntur tamen quibus cæteris duriorem testam natura dedit. Grandes autem Cancræ forma fluuiatilibus similes, quos Germani Weerfrob & Seefrob appellat, quo nomine à Graecis indicentur non reperio. Nam Astacus esse nequit, quem Gammarum Theodorus apud Aristotelem interpretatus est. Astacus enim Carabo non multo maior est, quantum ex Aristotele colligere possumus. Igitur quoniam nec Astacus, neque Carabus, neque Caris est, non temere quis apud Graecos nomen eius reperiet. Nos autem iis subscribimus, qui Leonem Plinio dictum existimant. Quemadmodum enim Leo aliis terrestribus animantibus uiribus præstat, ita etiam hic robore & corporis magnitudine quoscunque alios Cancros superat. Nam inuenitur sæpe cubitali & bipedali longitudine, idque in nostro mari: nec dubito alibi etiam maiores capi. Qui autem καράβοι dicuntur Graecis, rectè meo iudicio, Locustas in Aristotele uertit Theodorus: omnia enim quae Carabis tribuit Aristoteles, Locustæ habent. Germani Græco uocabulo parum corrupto Crabben appellant. Locustæ autem Latinis dictæ nobis uidentur: quoniam saltu

E ij

ANNOTAT. VALERII CORDI

terrestres Locustas æmulantur. Porro *xapides* dictæ sunt, quas Latini Squillas nominant, nostro etiam mari familiares.

DE TERRESTRI SCORPIONE. CAP. 13.

Terrestres Scorpiones in Germaniæ calidioribus locis gignuntur quidē, sed admodum pauci. In Italia uerò & similibus regionibus magna illorum copia est: nos tutius eorum frequentia caremus. Macerantur in oleo, additis quibusdam alis: quod olei Scorpionum nomine in Pharmacopoliis seruatur.

MARINVS SCORPIO. CAP. 14.

DRACO MARINVS. CAP. 15.

DE SCOLOPENDRA MARINA. CAP. 16.

Terrestris. Marinam Scolopendram an uerum studiōsi uel piscatores cognoscant, nondum comperi. Terrestris uerò Scolopendra, sine dubio est utrinq; (triremis modo) multis pedibus ingrediens insectum, colore spadiceum, minimi digiti longitudine: quod noctu cum in humido pavimento repit, ut ei in dela lucet, non tantum adhuc uiuum & integrum, uerum etiam in partes minimas comminutum, modo uiua dissecetur: Idem si digitis attrectetur, pruritum, ut marina Scolopendra excitat. Germani *eitt* *Ossel* siue *Nossel* nominant. Inuenitur in humidis domorū partibus, nonnunquam etiam hortorum areis & æstate siccatis paludibus.

† Scolopendræ terrestres si in domo sint, ad puluerem Sacchari Thome congregantur.

TORPEDO. CAP. 17.

DE VIPERAE CARNIBVS. CAP. 18.

* *viperas* Vipera qualis sit serpens, & quibus à reliquis serpentium generibus differat, diligenter Nicander, Aristoteles, Galenus, & Aëtius scripserunt: nihilominus tamen eo ignorantia peruenimus, ut multis sæculis ignota fuerit. Nicolaus uerò Leoniceus solidæ doctrinæ uir, constanter affirmat in Italia frequentes esse, & uulgo Marassos siue Scurziones appellari. Nobis uerò hæcenus eas in Germaniā uidere non licuit. Carnes eius coctæ in pastillos conformantur, qui in Andromachi Theriacam ingrediuntur.

DE SENECTA ANGVIVM. CAP. 19.

Pulchra est apud Nicandrum de anguina senecta fabula. Est autē anguina senecta, siue, ut Plinius nominat, uernatio, serpentium exterior similis membranæ cutis, quam primo uere lapidū uel fruticū angustis exuunt. Germani *Schlangenhaut* appellant.

DE VTROQUE LEPORE. CAP. 20. 21.

Duplex leporum genus inuenitur: alterum in terra syluas incolit: alterum uerò in mari uiuit. Hic an cognitus sit, neq; affirmare neq; negare audemus. Terrestris uerò omnibus est notissimus, cuius coagulum aduersus uenena medicinam facit. At totus, nulla dempta particula, in cinerem crematus, calculos frangere dicitur.

DE PASTINACA MARINA. CAP. 22.

Τρυγὼν, hoc est, Pastinacam marinam Otho Brunfelsius esse credit latum illum piscem, quem nos *eitt* *Xochen* uocamus: sed cum hic Raia sit, alius est circumspiciendus cui Pastinacæ nomē imponamus. Talis autem est quæ Germanis *eitt* *schwarzer* *Xochen*, hoc est, Nigra Raia, uocatur. Raia figura non admodum dissimilis est, nigrior & longiore cauda conspicuus.

† Querendum de hoc nomine diligentius: dubitari enim potest, cum radij non meminerit.

DE SEPIA. CAP. 23.

Germanicè *Blackfish*. Sepia à putredine habet nomen. Est autem Marinus piscis, sanguine atro ceu putridi tabo plenus, qui à quibusdam Sepiæ atramentum dicitur. Germani *Blackfish*, quasi

quasi atramentarium piscem nominant. Habet Sepia in dorso spina loco, longum, latum & candidum os, quod facile in puluerem friatur: eo Aurifabri ad annulorum fufuram, Medici uero ad dentifricia utuntur. Vocat id nostri *fischbein*, estq; omnibus cognitum.

DE MULLO PISCIS. CAP. 24.

Mullus quibusdam esse creditur, quem Barbum & Barbionem uocamus, quoniam Barbam habeat, quæ Mullo tribuitur. Cum uero Mulli in mari uiuant, & in uiuariis piscinisq; non crescant, (ut Plinius ait) hoc ipsum non affirmamus. Non tamen inepte quis Barbionem, fluuiatilem Mullum appellabit.

DE HIPPOPOTAMI TESTICVLIS. CAP. 25.

Hippopotamus in magnis fluuiis & calidis regionibus uiuit, qualis in Aegypto Nilusest. Hodie Caballus marinus, siue Aquaticus uocatur ab his qui Aphricam terra marisq; perlustrarunt. Est autem equo, dorso, iuba, et hinnitu similis: unde & nomen inuenit. Eius testes, quemadmodum & fibri, contra uenena medicinam faciunt. Apud nos uero in pharmacopoliis non habentur.

DE FIBRORVM TESTICVLIS. CAP. 26.

Käsup Græcis, Fiber Latinis, uocatur animal anceps, in terra & aquis degēs, quod Germani etiam *Biber* nominant: Castoreum uero *Bibergeyleu* hoc est, fibrinos testes, Vbiq; cognitum animal est, eiusq; testiculi frequentem usum habent.

DE MUSTELA DOMESTICA. CAP. 27.

ταλῖ Græcis, Mustela Latinis uocatur, quadrupes animal, quod nos etiam *Wifel* nominamus. Cuius duo genera quidam faciunt. Sunt enim syluestres quædam: & quædam in domibus nostris habitantes, Gallinis infestæ, maxime hæ, quas *inridles* Græci dicunt. Hæ procul dubio sunt, quæ in rusticis ædibus & uillis oberrantes Gallinis insidiantur, a nobis *Jltes* nominantur, non multum a Græco abludente uocabulo.

DE RANIS. CAP. 28.

Ranæ omnibus notissimæ sunt. Hoc autem loco de uiridibus & uocalibus sermo habetur, quæ edendo sunt & in fluuiis & stagnis uiuunt. Reliqua enim genera uenenosa, ut *өгүн*: quæ Aristoteles *өгүн* appellat, Latini rubetæ, Germani etiam *Krote*. Et muta uulgaris Rana, in herbosis hortorum locis uiuens, colore pallida. Atq; muta palustris Rana, Rubetæ similis, sed minor: Buffo recentioribus Latinis, Germanis etiam *Pfälkrote* uocata, hoc est, Rubeta palustris. Hæc autem quamuis muta cognominetur, uocalis tamen est, sed breuem, tristem, & minime canoram aut argutam aliarum modo edit uocem, ideoq; mutam appellant. In fine uero huius capitis alias uirides Ranas intelligit, quas Græci *βεῖφαντες* & *καλαμίτας*, Germani *Laubfrosche* uocant, ut ex Galeno indicare possumus, qui de simplicium facultatibus libro decimo de sanguine harum idem scribit quod Dioscorides. Cum uero aliquando harum sanguini descriptas uires experiri uellet, facto periculo, deprehendit eas promissa non præstare.

DE SILURO. CAP. 29.

Qualis sit Silurus piscis hodie non certo doctis constat. Idq; ideo, quoniam nulla extat ne apud Aristotelem quidem, quæ figuram eius indicet historia, Plinius alibi Nilo familiarem dicit: alibi Mæno, Germaniæ amni, in quo præcipue grassetur, etiam innatantes equos sepe demergens prope Lisboum. Difficile igitur est hunc indicare. Tradit tamen authores maximè esse omnium fluuiatilium piscium, & Thynnos etiam equare qui marini sunt. In nostris autem fluminibus Hauso, Sturio, & quem patria lingua *Wels* uocamus. Sed Hauso Germanis dictus (quod sciam) nō nisi in Danubio apud nos capitur, in quem è Ponto meat. Non temere ergo quis opinetur alterutrum è reliquis duobus Silurū esse. Nam Mænus quoq;, ut Plinius refert, Siluros habet, in quo scimus nunquam maiores capi aut cerni pisces quam sturiones & *Wels*, idq; raro. Nō enim uicq; adeo profundus est amnis, præterquā qua Rheno misce

ANNOTAT. VALERII CORDI

tur è regione Moguntiaci. Certe ferociam & lasciuam, quæ Siluro tribuitur, in sturione omnes nouerunt piscatores. †

† Gesnerus Velsum uulgo dictum piscem, omnino Silurum esse, in Aquatiliū historia monstrat.

SMARIS. CAP. 30.

MAENA. CAP. 31.

GOBIVS. CAP. 32.

DE THYNNO ET OMOTARICHO. CAP. 33.

Θύννος, hoc est, crudum falsamentum falsa Thynni caro est: quæ aliis ueteribus simpliciter τύννος, hoc est falsamentū uocatur. Qualis autē sit Thynnus piscis, doctis non constat: marinum esse certum & quidem grandem. Tradunt Aristoteles et Plinius, Thynnos Pontū uerno tēpore gregatim intrare, nec alibi foetificare. Quæ cōiectura colligimus eos dulci aqua delectari. Pontus enim est reliquo mari dulcior, quoniam in eum maximus fluuiorum numerus se exoneret. Quo fit ut suspicemur. Thynnū esse quem Germani etin Hausen appellant in Danubio, quem aduersus è Ponto petit dulcedine aquarum allectus. Nolumus tamē quidquam certi affirmare: Nouimus enim probē Plinium, ubi maximos omnium pisces recenset Danubio etiā Marionem tribuere (si modo integer locus est) qui fortasse idem cum Thynno esse poterit: sed hoc statuere ualde ambiguum est, cum multi sint cetacei in Danubio pisces præter Hausonem, qui è Ponto in eum ascendunt.

† Fallitur. Nam Huso uulgo dictus, Antaceorum seu Oxyrhynchorum generis est.

DE GARO. CAP. 34.

* Germanis La-cfe.

Garum Latini pariter ut Græci, appellant falsorum piscium succum, sale & piscium sanguine constantem. Expetebantur autem ad confectionem eius præcipue exta & uiscera, quæ aliās abiicienda erant. Nomen uero inuenit à Garo pisce, è quo primū cepit fieri. Purissima & clarissima Garipars liquamen uocabatur. Turbida uerò, crassa & feculenta Halex, à sale, ut nos credimus, in fundo cophinorum subsidente. Erant autem multæ Gari differentiae, ut uolentes apud Plinium & Barbarum inquirere possunt, nobis satis est quid sit indicasse. Porro ijs nequaquam adhibenda fides est, qui Gelatum, & aromatis præsertim croco conditum recentium piscium ius, Garum esse contendunt: recentiores etiam Muriam appellāt, sed malè. Etsi enim falsi Thynni liquorem ita appellet Barbarus, fretus obscuro quodam Plinii testimonio, omnes tamen probati authores cum medici, tum rei rusticæ scriptores, rem longè aliam à Garo Muria uocabulo intelligunt, quemadmodum & ipse Plinius, ut suo loco indicabimus. Nos qui exquisito hoc Garo caremus, eius loco Haringorum Garo uti poterimus. Quamuis autem omnes alii piscium falsorum liquorem hoc nomine appellent: Dioscorides tamen ad carnes etiam transtulit non impropriè, ut nobis uideatur, cum ex carnibus etiam falsamenta fiant, qui mos etiam apud nos uetus est.

DE RECENTIVM PISCIVM IVSCVLO, CAP. 35.

Iusculum hoc, ut ipse Dioscorides hoc capite ait, sit è recentioribus saxatilibus piscibus cum aqua, sale, Oleo & Anetho coctis. Ita enim Græci præparabant. Nostri uero alio modo, eoque multiplici, parant. Porro quos recenset Saxatiles pisces Dioscorides quales sint, & quibus nominibus nunc cognoscantur, ingenue fatemur nos cum multis eruditis ignorare. Percas tamen seu Percides solas ex hiis cognitās habemus. Earum plures in amnibus nostris & lacubus differentiae, sed omnes generali uocabulo Perstēn Germanis nominantur.

DE CIMICIBVS. CAP. 36.

Cimices, Græci Κέρας, Germani Wanzen/ siue Wandluse/ hoc est, parsetinos pediculos, uocant. Notum omnibus & inuisum foetore suo animalculum est. Barbarus hic lectorum cimices dici putat, ad differentiam syluestrium in Malua nascentium. Sunt

Sunt autem quos Barbarus sylvestres Cimices appellat proprio nomine Buprestides dicta insecta, ut paulo post referemus, figura & foetoris fastidio Cimicibus similia.

DE MULTIPEDIBVS. CAP. 37.

Multipedes, Græci καβαρίδες, ὄντες & δεισῆες, Germani *Waldsechen*: Itali nunc Porcelliones uocāt. Parua sunt animalcula, colore liuido ceu asini, unde etiā nomē; multisq; pedibus ingrediuntur. Inueniuntur in humidis muris, sub lapidibus & aquariis uasibus. Atqui Scolopendra etiā Latinis centipes & multipes interdum uocatur. Videndum igitur ne synonymis decepti, res natura diuersas confundamus.

DE BLATTIS. CAP. 38.

Σκαβ Græcis, Latinis Blatta uocatur, insectum ex Scarabæorum genere, quod a Germanis ein *Wotkefer* & *Wälkefer* appellatur. Circa furnos & cistas quibus farina reponitur, uiuens. Eius plura sunt genera, magnitudine, figura & aliis proprietatibus quibusdam dignoscenda. Vnum est quod antepaucos annos Nurenbergæ apparere cœpit. Nurenbergenfes *Schwaben* uocant, hoc est, sueuos, quoniam ab hac gente in eam urbem allatum credatur. Est & aliud genus ex acuta clune & odoris tedio inuisum. Frequens hoc in cubiculis tenebrosis, non in sublimi, sed in terra extructis, et libero aere nō perflatis. Altis hoc pedibus, lentoq; graditur incessu. Ottho Brunfelsius ratus est, Blattas esse uocales illos & totas noctes circa fornaces in aestuariis & focos dormienti familiæ obstreperentes Gryllos, quos Germani *Heimen* & *Heimi* pariter Latinis, *Grillen* appellant, sed hi suum genus a Blattis diuersum habent.

DE MARINO PVLNONE. CAP. 39.

Marinus Pulmo ex eorum est genere, quæ Græci *Ζωόφυτα* uocant. Est autem partim pulmoni, partim spongiæ similis. Exiccatus contrahitur, aquæ uerò immersus mirum in modum intumescit. Affertur interdū ad nos cum spongiis. An uero in nostro quoque mari nascatur, nondum comperimus.

SVILLVS, AGNINVS, VRSINVSQVE, PVLMONES. CAP. 40.

DE VVLPINO PVLNONE. CAP. 41.

Vulpinus Pulmo in omnibus pharmacopoliis repositus, seruatur ad humani pulmonis uicia. Fit ex eo Eclegma, uulgo lohoch de pulmone uulpis dictum, ad eadem utile.

DE IOCINORIBVS. CAP. 42. 47. 48. 49. 50.

Asinatum, Aprinum, Hircinum, canis rabidi & Mergi iocinora, de quibus deinceps diuisis capitibus in quibusdam exemplaribus agit Dioscorides, nullum hodie in medicina usum habent. Vulpinum uero hepar, in omnibus pharmacopoliis reponitur, hepatis humani infirmitatibus quibusdam expetitur.

DE MARIS CERVI GENITALI. CAP. 43.

Cerui genitale uulgo in pharmacopoliis medicinæ gratia non seruatur. Principes uero quidam, nobiles, & uenatores, id tanquam singulare medicamentum aduersus pestem, morbum comitalem & ad excitandam emortuam uenerem, repositum custodiunt.

DE ASINI CAPRARVMQVE VNGVLIS. CAP. 44.

Nota sunt hæc animalia eorumq; ungulæ, de quibus hoc loco Dioscoridi sermo est. Vtuntur iisdem suffitis nonnulli contra muliebrum locorum strangulationem.

DE EQVORVM LICHENIBVS. CAP. 45.

Λέχη, siue ut Latini uocāt impetigo, in superficie cutis serpens exulceratio est, quæ a Germanis *Flechhen* dicitur. Simile his in equorum cruribus infra genua nascuntur lichenes.

ANNOTAT. VALERII CORDI

lichenes, qui calli speciem & duriciem habeant, & odore uirosi sentiantur: quos non nulli equites *Gallen* appellant. Eos etiam ueteres ad Medicinam recipere non dedignati sunt.

VNGVLÆ CAPRINÆ. CAP. 46.

DE VETERVM CALCEAMENTORVM CORIO. CAP. 51.

Calceamentorum ueteri Corio & soleis in cinerem uistis uulgus quoque adhuc contra intertrigines & humentes infantium in feminibus exulcerationes utitur.

GALLINACEI CAP. 52. 53.

DE OVIS. CAP. 54.

Otorum diuersa genera quemadmodum & auium inueniuntur: Hoc tamen loco Gallinarum oua intelligenda sunt, quibus quotidie in sanitatem, & pariter in aduersa ualitudine uescuntur homines.

CANDIDVM OVI. CAP. 55.

DE CICADIS. CAP. 56.

Cicadæ in Germania non nisi calidissimis regionibus reperiuntur, præsertim in superiori Pannonia, sed non frequentes. Nequaquam enim sunt in fœno salientia insecta, quæ Germani *Hensdreck* en uocant. In Italia uero Cicadarum magna est frequentia. Germani eas *Baumzigen* & *Hauerbocke* / iocularibus nominibus appellant, quasi arboreas capras & Auenarios capros, quæ nomina illis à militibus nostris qui in Italia res gesserunt sunt indita.

DE LOCUSTIS CAP. 57.

Quoniam autem aliquam similitudinem cum Cicadis Locustæ habeant, has illis statim subiungit. Sunt autem diuersa Locustarum genera. Vulgares illæ, quæ multiplicem habent differentiam, Germanis *Hensdreck* en uocantur, quoniam per fœnum ambulantes repentinò ac improviso saltu terreant. Sunt & peregrinæ nobis in Aphrica & Oriente, quibus diuersæ gentes uescuntur: hæ gregatim sublata, diuinitus ultrices scelerum nostrorum poenæ, in varias orbis partes feruntur tanta frequentia, ut solem arceant & totas regiones cum se demiserint, obtegant, uiuentem segetem, & quidquid tenerum & herbaceum, depascentes. Venerunt hoc autumno etiam ad nos in Germaniam: quod ideo referimus, quoniam antea inauditum & nulla historia traditum fuit. Suntque hæ nostratibus multo maiores, formaque & habitu insolentiores: alasque plures & latas habent, quibus non ex interuallo ceu salientes uolant, sed continue aliarum auium instar per aëra feruntur. Quotquot autem in Germaniam uenerant, pruinis oppressæ perierunt, magna putredine & fœtore regiones inficientes. Metuebant agrestes ueris initio multo numerosiorem sobolem ipsos parentes secuturam, sed sine causa, gelu enim siderata earum oua impossibile fuit adulescere.

DE OSSIFRAGO AVE. CAP. 58.

Φωνι, Romanis ossifragus & ossifraga uocatur. Est autem ex Aquilarum genere, quo autem nomine Germanis appelletur, & an in Germania reperiatur, nondum comperimus.

DE GALERITA AVICVLÆ. CAP. 59.

Κορύδαλος Græci, Latini Galeritam & Gallico uocabulo etiam alauidam auiculam dicunt, quam Germani et in *Lerdche* nominant. Eius non unum est genus, sed plura. Quædam in Ericetis, quædam in agris uiuunt. Aucupes suis nominibus ea diligenter distinguunt. Nam *Sandlerchen* uocant Canoras illas ex agris in cœlum euolantes, *Heydelerchen* / quæ in Ericetis agunt, non ita uocales & canoras;

DE HIRVNDINE. CAP. 60.

Hirundinum species omnibus cognitæ sunt: Germani eas *Schwalben* uocant, generali

generali omnes uocabulo. Sunt urbanae in domibus nidificantes, sunt Murariae & Littorales, quae ripas et cliuos excavant. Quaedam etiam Apodes dicuntur, breuibus admodum pedibus, quibus neque ingredi, neque attollere se ualent: itaque sine pedibus creduntur. Sunt haec nigriores reliquis & torosiores. Eadem uenenosae à quibusdam creduntur.

DE EBORE. CAP. 61.

Soli Elephantorum dentes Ebur sunt. Fuit hoc omnibus saeculis preciosissimum. Hodie uero non raro Marinarum quarundam belluarum dentes pro Ebo restenduntur: sed facile fraudem ostendit rarior & fungosior materia, cum Ebori uero (unde pectines & alia quaedam delictiora opera) densior & compactior, atque ueluti * remulata sit. Germani Ebur *Welffenbein*/ hoc est, Elephanti ossa appellant.

DE SVIS TALO. CAP. 62.

Talus os est in iunctura pedum, quod Germani *ein Kote* uocant. Non tamen quous animalia Talos habent, sed bisulca tantum.

DE CERVICORNV. CAP. 63.

Ceruorum cornua omnibus nota sunt. Plurimum tamen refert (ut credunt) quo tempore Ceruis decidunt aut reponantur, si quis in medicina uti uoluerimus. Habent autem multas & efficaces in medicina uires: & praestaret eo potius contra uenena uti, quam ostentato unicornis Indici cornu, quod nunquam uerum uulgo habetur. Vna est in Germania Respub. quae integrum habet. Fertur & Venetos duo in Theauris suis habere.

DE ERVCIS. CAP. 64.

Erucae nomen insecto & oleri commune est. Hoc autem loco de herbas erodentibus Erucis sermo habetur, quae Germanis *Kaupen* uocantur.

DE CANTHARIDIBVS, BVPRESTIBVS, ET PICEARVM

ERVCS. CAP. 65. 66.

Κανθάρω Græcis Scarabæum significat: unde diminutiua forma *κανθαρίδες* dicuntur, parui & in uiridi aurei coloris & oblongi Scarabæi, qui Germanis *Goltke* per appellantur, quorum adhuc est in medicina usus: frequenter haec in fraxino & ligustro apud nos reperiuntur, nam harum foliorum pastu mirum in modum alliciuntur. Sunt autem foedi odoris insecta. Pinerucae uero, quae Græcis *πινυράκια* dicuntur, Erucæ sunt in Pino genitæ, quarum hodie nullus est usus. *Βύπρηστις* uero sine dubio est ueluti syluestris cimex, qui Germanis *ein Qualster* uocatur, quo deuorato boues rumpuntur: unde & nomen illi à Græcis factum est. Formam hoc animal Scarabæo cuidam paruulo, sed multo magis Cimici similem habet, altis ingreditur pedibus, & foetore ipsos Cimices superat: qui etiam frondes & fructus inficit, si quando per eos repserit. †

† *Buprestis* etiam est herbae genus, nostra *Berenflaw* / ut quidam putant.

DE SALAMANDRA. CAP. 67.

Salamandra reuera est pigrum illud & ignauum lacertarum genus, quod Germani *ein Molch* siue *ein Olm* uocant. Multis hoc demonstrari argumentis posset, nisi breues annotationes & non integram rerum historiam scriberemus. Viuit umbrosis & roscidis conuallibus, solo pingui, praesertim circa fontes, color illi uariis, lucis & nigris maculis distinctus, cum irritatur lacteum uirus sudat. *

DE ARANEIS. CAP. 68.

Αράχνη, hoc est, Araneorum multa sunt genera, eum uero qui retia ad capiendas Muscas praetendit *Αγέρας*, id est, Venatorem Græci uocant. Aliud genus sunt qui non ita artificii labore rudes telas in domibus texunt. Germani omnes Araneos generali

† *Μόλχη*, Græcè, quod cum Germanico conuenit. * Sues eis libenter uolunt.

ANNOTAT. VALERII CORDI

generali uocabulo *Spinnten* uocant. Græci etiam *Phalangia* interdum *Araneos* uocant, quamuis præter *Araneos* etiam diuersum *Phalangiorum* genus reperiatur, *Lacertis* paruis potius, quam *Araneis*, simile, quod † *Tarantula* ab *Italis* uocatur.

† *Tarantule* nomen ab alijs in *Italia* *stellioni* tribuitur, ab alijs *Phalangio*, *Cordus* diuersa animalia confundere uidetur.

DE LACERTA. CAP. 69.

Σάυρα Romani *Lacertum*, & *Lacertam*: Germani † *Heideren* uocant: notus omnibus repens in terra quadrupes serpens est, colore ut plurimum uiridi.

DE CHALCIDICA LACERTA, SEV SEPE. CAP. 70.

Chalcidicam *lacertam* siue *sepem* *Nicander* & *Dioscorides* *lacertis* similem esse dicunt. *Seps* autem à putrefaciendo dictus est, putrescit enim saniemq; olidam emittit illius morfu factum uulnus. *Chalcidice* uero nomē habet quod non uiridis sit, ut *ceteræ* *lacertæ* sed *grei* coloris. Est etiam aliud serpentū genus quod similiter *seps* uocatur, sine pedibus, uiperæ simile, cuius *Aëtius* meminit, diuersum penitus à *Chalcidica* *lacerta*,

DE SCINCO. CAP. 71.

Scincus terrestris *crocodili* genus est, magnitudine *lacertæ*, quo multis annis carui mus. Sed iam quorundam diligentia factum est, ut rursus ex *Aegypto* ad nos perferatur. *Pharmacopolæ* quos *materialistas* uocant, paruas quasdam aquatiles *lacertas* *Salamandris* similes, pro *Scincis*, *Scincorum* *marinorum* nomine uendunt, quarum usum omnes cauere optârîm, quoniam idem quod *Salamandræ* uirus habent. Quo circaneq; antidotis neq; uenerem cōciliantibus medicamentis miscendas suademus.

DE VERMIBVS TERRAE. CAP. 72.

Terræ uermes Græci *ἔντερα*, hoc est, terræ intestina, Latini *Lumbricos*, Germani *Erdwürme*/ siue *Regenwürme* uocant, qui omnibus noti sunt.

DE MURE ARANEO. CAP. 73.

Murem *Araneum* Græci *μυγάλη* uocant, quod mediam inter *Mustelam* & *Murem* magnitudinem & formā habeat, non quod ex *Mustela* & *Mure* nascatur, ut quidam credunt: quoniā natura inimicitie sunt inter *Mures* et *Mustelas*. Quo autem nomine Germanis appelletur, non certo affirmare audemus. Suspiciamur tamē magnos illos *Mures*, quos *Ätten* Germani uocant, *Mygalas* esse. Sunt enim uenenati et eadem morfu nocumenta inferunt quæ *Mygalæ*. † Quinetiam *urina* eorum eodem quo uulnus modo conspersos afficit. Quapropter à *Felibus* non nisi maxima fame appetuntur.

† *Gesnerus* in *Quadrupedum* historia, *Murem* *araneum* esse ostendit, qui Germanicè *Spizmauß* uel *Mügger* appellatur.

DE MVRIBVS. CAP. 74.

Præter *Araneos* *mures*, sunt etiam *marini*, *aquatici*, & in *agris* nati *mures*. Hoc uero capite de *urbanis* siue *domesticis* *muribus* sermo habetur, qui ab omnibus cognoscuntur.

DE OMNI LACTE. CAP. 75.

Notum est omnibus *Lac*, cuius facultates secundum animalium differentias uariant. Constat autem omne *lac* *caseo*, *sero*, & *Butyro*.

SERVM LACTIS. CAP. 76.

† SCHISTVM LAC: ET RECENS. CAP. 77.

LAC MVLIEBRE. CAP. 78.

DE CASEO OMNI. CAP. 79.

Multæ sunt *Casei* secundum *lactis* qualitatem differentie & facultates. Differunt etiam

etiam eiusdem animalis lacte formati pascuorum diuersitate:

DE HIPPACE. CAP. 80.

ἵππικον, hoc est, Hippace ipso nomine originem suam proficitur. Est autem Equi no lacte confectus caseus, Scythiarum inuento, ut Hyppocrates scribit. Quidam Hippacem equinum coagulum esse dicunt; sed id hoc loco non uult Dioscorides, nullius enim animantis coagulum ad cibos & alimenta expetitur, substantia tamē coagulum à caseo nihil differt.

DE BUTYRO, EIVSQVE FVLIGINE. CAP. 81.

Notum omnibus Butyrum est: quod quamuis à bobus nomen habeat, quoniam ex bubulo lacte conficiatur præcipue, non minus tamen ex ouillo quoq; & caprino, eo quo rustici nouerunt modo paratur. Quapropter nō est quod Galenus Dioscoridem miretur, ex ouillo caprinoq; lacte Butyrum fieri dicentem. Fuligo etiam ex accenso Butyro colligitur, oculorum medicinæ utilis. Nouimus mulieres quæ etiam è suo lacte caseum & Butyrum fecerunt: eratq; Butyrum hoc admodum flauum & liquidum.

DE LANIS. CAP. 82. 83.

Lanæ succidæ neq; crudæ, neque usitæ in nostris pharmacopoliis usum habent, quamuis multas in medicina uires habeant.

DE OESYPO. CAP. 84.

Earum tamen sordida pinguedo adhuc præparatur, quam Græci δισυτον uocant. Hodie uerò corrupto uocabulo Ysopus humidus appellatur, ut ab Hyssopo distinguatur. Hyssopum enim herbam hodie Ysopum siccam nominant.

DE QVORVNDAM ANIMALIVM COAGVLO. CAP. 85.

Concretum in lactentium quorunq; pullorum uentriculis lac, coagulum est, à coagendo seu cogendo Latinis dictum: quod Græci πύρρον, Germani pariter Latinis à cogendo seu concresecendo Lapp & Kanne uocant. Videtur autem obscurus esse contextus Dioscoridis, animalia à quibus sumendum coagulum est, enumerantis. Recenset enim Leporem, Equum, Hædum, Agnum, Hinnulum, Dorcadem, Platycerota, Dorcum, Ceruum, Vitulum, Bubalum, & Phocam. Vnde legentes facile inducuntur, ut credant omnia quæ enumerat suum peculiare genus habere, sed hæc opinio absurda admodum est: nam quamuis Lepus, Equus, Hædus, Agnus, Hinnulus, Vitulus, Bubalus & Phoca unumquodq; sui sint generis animalia, reliqua tamen non ita distinguuntur. Non enim ullum est animal Neß, hoc est, hinnulus. Neq; Dorcas, aliter à Dorco quam sexu differt. Itaq; per hinnulū, Dorcadem, Platycerota, Dorcum & Ceruum, quamuis quinque sint nomina, tria tamen animalium genera tantum intelligenda sunt, Neß enim, hoc est, Hinnuli generalis est appellatio, & ad Dorcadem, Platycerota, Dorcum et Ceruum refertur. Sūt enim Grecis Neßois, Latinis Hinnuli, pulli animalium omnium quibus ramosa cornua sunt, quales sunt cerui, Platycerotes, Damæ & capreæ, adde etiam Alces. Quare coagulum intelligendum est Hinnuli Dorcadis et capreæ foemelle. Idcirco coniunctio quæ sequitur uocabulum Neß, superflua esse in contextu uerborum non immerito putatur. Præteriuertunt hæc silentio in suis commentariis Barbarus & Marcellus, nobis uero digna uisa sunt ut explicarentur. Porro animalia hæc partim omnibus nota sunt, ueluti Lepus, Equus, Hædus, Agnus, Caprea foemina, Caprea mas, Ceruus & Vitulus. Platyceros uero, Bubalus & Phoca non perinde cognoscuntur. Itaque opere præcium, nos etiam hac parte facturos arbitramur, si nostram de ijs sententiam attulerimus. Platyceros ceruorum genus est, media inter Capreas et Ceruos figura, magnitudine ceruo nonnunquam æqualis, huic cornua sunt ueluti in palmas dilatata, e quibus ceu digiti exeunt, unde & nomen animali apud Græcos: eadem non ita tuberibus exasperantur, neque fusca sunt ut ceruorum, sed lenia & candida. Germani unum Platycerotis genus etiam Dammbir si appellant, alterum etiam Kene/ qui in Suecia boum & ceruorum modo iuncti magna celeritate ingredienti, currus, rhedas, trahas & esse ne.

ANNOTAT. VALERII CORDI

da trahunt, præsertim hyeme, cum mare quo Codanus sinus ad Septentrionem desinit gelu constiterit, tum enim recta negotiatores per glaciem hinc inde iter facere consueverunt. Bubalus, seu ut Græci dicunt *βαβυλός*, nostratibus bobus non dissimile animal est, labro superiori & naribus aliquantulum resupinis: pilo uestitur in cinericio liuido. Germani corrupto Latino uocabulo eum *Büffel* appellant. Tradit Plinius etiam Vris ab imperito uulgo Bubalorum nomen imponi, sed Vri diuersum à Bubalis genus habent, omnibus nostris qui ad Septentrionem habitant noti, & aliarum ferarum modo insulis uagantur. Bubali uero aliunde ad nos mittuntur. *Φόκα* marinum est & quadrupes animal, quod Latini pariter Græcis Phocam & Vitulum marinum, Germani *Wohlfalo*, Sueci *Wölen* appellant. Frequens in nostri maris insulis & Noruegiæ & Sueciæ scopulosis littoribus. Est autem amphibium animal, in terra marisque uiuens, Catulorum Phocæ pelles ad uestes & puluina nostra expetuntur, Pili hic teneri breues atque aurei coloris & fulgoris.

Bubalus.
Sed fallitur
Cordus, ali
us enim est
ueterum
Bubalus.
Phoca.

DE ADIPE. CAP. 86.

Adipis, seu ut Græci uocant *στέαρ* uocabulo, quorumcumque animalium pinguedinem in genere intelligunt, siue dura & concreta, siue liquida & fluida fuerit. Ita hac uoce Dioscorides hoc loco utitur & Galenus libro primo de facultatibus simplicium medicamentorum. Differunt tamen, si quis proprie loqui uelit adipes tum apud Græcos, tum apud Latinos, suis nominibus distinge: qui enim solidior existit, et difficile liquefit, & liquefactus statim concreuit, Græcis proprie *Στεας*, Latinis sebum, Germanis *Wischel* / *Wigel* & *Told* uocatur, qualis est bouum, Hircorum, Caprarum, Ouium, Ceruorum & similium adeps. Qui uero difficile ad ignem liquefit, & difficillime rursum densatur, aut fluidus permanet, Græcis *πικνόν*, Latinis pinguedo, Germanis *Fet* & *Schmalz*, hoc est, pinguedo & liquamen nominatur: ut est Vrsorum, Melium, Canum, Gallinaceorum & eiusmodi animalium quæ natura calidiora existunt. Porro eam differentiam ex nostro arbitrio non ponimus, sed Galeni sententiam sequimur, qui undecimo libro de simplicium medicamentorum facultate, ad hunc modum pinguedinem à Seuo distinguit. Quanquam interpretis pro Seuo speciei nomine, Adipem generis uocabulum reddiderit, sed improprie.

† Facillime.

CAP. 87, ET SEQUENTIA CAPITA SEPTEM, DE VARIIS ADIPIBUS, eorumque uiribus, curatione & apparatu agunt.

DE MEDULLIS ANIMALIUM. CAP. 95.

Sunt Græcis duo uocabula quibus medullam significant, nempe *ἐντέριον*, & *μυελός*: sed quæ inter se differant. Illo enim arborum medulla, & facta in fructibus quibusdam semina indicantur: hoc uero quæ in spina & ossibus animalium continetur medulla, quam Germani *Ward* appellant.

DE OMNI FELLE. CAP. 96.

Notus omnibus amarissimus est humor, folliculo quodam hepatis adnato inclusus, qui Græcis *χολή*, Latinis Fel, Germanis *Gall* uocatur.

DE SANGVINE ANIMALIUM. CAP. 97.

Præter Hircinum sanguinem nullum in pharmacopoliis ad medicinæ usum, hoc tempore in Germania reponi comperimus.

DE ANIMALIUM FIMO. CAP. 98.

Non opus est animalium excrementa in pharmacopoliis seruari, cum semper & ubique cuiuscunque animantis (quorum hic fit mentio) si necessitas requirat, fimum habere liceat, excepto Crocodili terrestri: quæ si eo ad extergendas & tingendas genas mulieres carere noluerint, ex Aegypto perant. Non prætereundum silentio arbitramur etiam uulgo agrestes homines Ciconiarum fimum contra comitiales potu assumere. Murscerda autem priuatim dictum est Latinis Murium fimus. Eius duæ apud nos differentię & uulgaris

Crocodili
terrestri
fimus.
Ciconiarum.
Murscerda
duplex.

vulgaribus, & omnibus cognitis Muribus alterum; & è singulari muris genere alterum admodum odoratum & Moschi æmulum, quod in montanis locis colligentes rusticæ mulieres uestibus suis Moschi uice, odoris gratia, interponunt. Idem tere odor ipsis muribus est, ob id eos nostri *Bijam meise*/hoc est, Moschatos mures appellunt. Porro Crocodilifimi, quod Crocodileam Plinius uocat, etiã Ouidius meminit de medicamine faciei, cum dicit nigror ad Pharii confuge piscis opem. Pharii enim, hoc est, Aegyptii piscis nomine Crocodilũ intelligit, quamuis Crocodilea non è pisce Crocodilo, id est, fluuiatili, sed terrestri sumatur, qui Stincus & Scincus uocatur: de quo supra dictum est.

DE VRINIS. CAP. 99. 100.

Notæ uulgo omnibus Vrinæ sunt, de quibus hoc capite scribit Dioscorides. Autri Gluten quomodo ex Vrina & Cyprio are fiat, infra libro quinto inter metallica medicamenta indicabit. Lyncis uerò urina quid sit, & an sit in rerum natura, multis sæculis dubitatum est: scribunt enim Lyncem proiectam urinam terra obtegere, tanquam hominibus tam salutare medicamentum inuidentem, quæ deinde in lapidem Lyncurium dictum indurescat, sed fabula tantum est, quapropter bene Dioscorides quoque illam damnat: & recte inquit idem esse Lyncurion cum Electro. Quod ex Plinio etiam discere possumus libro octauo, cap. xxxviii, in hunc modum scribente: Lyncum humor ita redditus, ubi gignuntur, glaciatur, arefcit, in gemmas carbunculis similes, & igneo colore fulgentes, Lyncurium uocatas, atque ob id succino à plebis ita generari prodito. Quæ enim alii de Lyncurio scripserant, alii de succino prodidere, nec immerito, cum nullum inter ea discrimen sit, ut alibi etiam Plinius refert lib. xxxvii, cap. iii. post Succini historiam his uerbis. De Lyncurio proxime dici cogit authorum pertinacia: quippe etiam si non electrum id esset, Lyncurium tamen gemmam esse contendunt: fieri autem ex urina quidem Lyncis, sed egestam terra, protinus bestia operiente eam, quoniam inuideat hominũ usui: esse autem qualẽ in igneis succinis colorem, scalpique. Nec folia tantum aut stramenta ad se rapere, sed æris etiam ac ferri laminas: quod Diocles quidem & Theophrastus credidit: ego falsum id totum arbitror, nec uisam in æuo nostro gemmam ullam ea appellatione. Quod autem dicit falsum id totum esse, non de succino intelligendum, sed de Lyncurio, quatenus gemmam esse contendunt. Sed & ex hac Lyncurii historia palam sit idem id esse cum succino, quia quæ Lyncurio tribuuntur, alii de succino prodidere. Quin & illud hanc sententiam confirmat, quod tradunt Lyncurium non tantum folia & stramenta, sed & æris & ferri laminas ad se rapere. Si enim id quod ista ad se rapit Lyncurium uocatur, nihil in rerum natura reperitur quod Lyncurium esse possit, præter succinum. Id enim non tantum folia, paleas, stramenta, & id genus alia, nec æris & ferri solum laminas, sed et auri, argenti & cuiuscunque metalli, uti esse experti sumus. Nihil enim unquam reperire licuit quod non attraheret. Nam quod solos Ocimi furculos ab eo non rapi feribunt auctores, falsum comperimus. Idem Plinius libro eodem dicit, Demonstratum succinum Lyncurium uocasse, fierique ex urina Lyncum bestiarum: è manibus, suluum & igneum: è feminis, languidius & candidum. Quod testimonium prorsus confirmat, quod hoc loco obtinere conamur: neminem colores succino sunt, quos Demonstratus Lyncurio tribuit, quod idem esse cum succino eo manifestius est, quod ipse Demonstratus, ut Plinius refert, Succinum Lyncurium uocauerit. Porro cum nihil à succino Lyncurium differat, fabuloso nomine in omnibus officinis Lyncis lapides, falso dicti, ostenduntur, habitus, figura & materia diuersi: alter enim pallida est gleba, & nonnunquam fusca, candidis maculis (lapidis calamitatis & fornacariæ cadmiæ modo) distincta, terra durior, & lapis de mollior: quæ si historia conferatur, non multum à Phrygio lapide distabit. Alter lapis est teres, oblongus in turbinem desinens, colore alibi ferrugineus, alibi fuscus, alibi succini modo fuluus & pellucidus. Gigni hos in Pomerania & Prussia: fusciorẽ uerò & ferrugineum in Saxonia, Germaniæ regionibus, nouimus. Nam & ipsi eos obiter in itinere inuenimus, & industria effossos collegimus. Germani hos Alpes scissos uocant, quasi Incubi sagittam, creduntur enim incubo aduersari, non quidem hoc

Dactyli
Idci.

minum sed equorum, & iumentorum. Quidam etiam Donnerstein uocant, hoc est, tonitruum cuneos. Vulgo enim de cœlo cum fulmine cadere creduntur. Plinius autem hos lapides Idæos Dactylos appellasse nobis uidetur. Porro ista de Lyncurio dixisse sufficiat. At cum de succini rei omnibus notissima materia & origine uariet, & diuersa ceu data opera scribant authores, uisum est nobis peculiarem de eo commentarium subiungere.

DE SUCCINO.

+ Glesin.

Succinum, quod Græci ἤλεκτρον & fabuloso nomine λυγκέριον, Arabes Karabe & Kakabre, Galli Ambram seu Ambrā citrinam: Germani ueteres Glessum / Recentiores Agtstein & Bernstein / Sudani Gentar appellant: inter præcipua numeratur quæ Deus ad hominum usum cōdidit, medicinæ pariter & luxui multisq; aliis usibus materiam præbens: quamuis nostra ætate magis tuendæ sanitati quàm luxuriæ inseruit. Nostri succino à proprietatibus quas habet nomina indidere. Siquidem ueteres Germani Glessum id appellabant, quod si interpretæris uitreum sonat: quoniam uitri instar lucem transmittit. Vitrum enim Glas / & uitreum Glesin dicimus. Agtstein autem, id est, Gagatem lapidem id uocamus: quoniam à Gagate nigro, materia, uiribus, & aliis proprietatibus nihil differat. Bernstein uero, hoc est, ardens lapis nominatur, quoniam accensum ardeat. Est autem res omnibus cognita & paratu facilis, præsertim careum & pellucidum, quod Romani à uini colore Falernum cognominant. Candidum uero, cui olim nulla fuit authoritas, quoniam parcius gignitur, nunc auri precium æquat. Vera sunt quæ Plinius libro naturalis historiæ trigesimo septimo, capite tertio de succino prodidit: excepto eo, quod Pinei generis arborum resinam esse credat, ut paulo post ostendemus. Nam quod ad originem, hoc est, materiam & generationem eius attinet, nullus unquam authorum uera tradidit. Ideo rem iucundam maximeq; necessariam & cognitu dignissimam prodituros nos arbitramur, si de natalibus, causis & origine eius nostram quoque sententiam protulerimus: de qua cum multis doctis, præsertim Georgio Agricola Medico, naturalium rerum omnium sagacissimo & prudentissimo indagatore, multos iam annos contulimus, eamque longa deliberatione utrinque ita perpendimus, ne quidquam de origine eius temere pronunciaremus. Aediturus est prope diem Georgius Agricola inter alia quæ de ortu & materia fossilium rerum conscripsit, etiam suum de succino iudicium, cui nos hoc commentario subscribimus. Existimamus autem nobis hominibus Germanis succinum in nostro orbe gentium quotidie attrectantibus, eiusque naturam quotidiano usu & experientia cognoscentibus, potius alias gentes fidem habituras, quàm Græcis: qui relicta Philosophica in consideratione eius methodo, ad figmenta absurdissima & aniles & plusquam pueriles fabulas sunt conuersi: rem longe pulcherrimam, cuius cognitionem ingenio assequi desperabant, ludibriis & leuibus figmentis conspurcantes. Qua quidem in re non tam hominibus imposuerunt, quam suam in confingendis nugis leuitatem, & electri ignorantiam prodiderunt: quamuis Grai ingenium, quamuis Grai ore rotundo Musa loqui dederit. Etsi autem palam sit, ubi reperitur succinum, tamē quia et loca & natales perspecta habere ad rei cognitionem non parum faciat, decreuimus hoc de electro commentario, primum indicare ubi legatur, & ad quæ littora plurimum, & quomodo feratur: deinde ostendemus non esse succum, neq; Gummi, neq; resinam, quomodocunq; eas appellent, arborum: postremo materiam eius, & quid sit, explicabimus. Et hæc quidem ea qua licebit breuitate, ne si longius de eo disseruerimus, commentarius hic finem suum modumq; excedat. Codanus sinus appellatur Plinio immanissimus, à sæuo immenso monte, nec Riphæis iugis minore, qui ad Cimbrorum usque promontorium excurrens, refertus est insulis, quarum clarissima sit Scandinauia, incomperata olim magnitudinis, nunc uero classibus nostris negociatoribus & militibus cognita & perlustrata tota: qui non insulam, sed peninsulam pluribus Isthmis coherentem affirmant. In eo sinu inter Cimbricam Chersonesum & Scandinauiam sparsæ sunt insulæ: Burchana, Austrauia, Actauia, olim uocata: ad quas fluctibus pelli electrum Romanæ olim

olim classes deprehenderunt. Ideoq; eam quam Germani Austraiam uocabant, Ro-
mani Glesariam, hoc est, Electridē dixerūt. Quinetiam præter hanc plures alię Gles-
sarie nominatę sunt. Vniuersum autem mare quod Codanus sinus complectitur,
Succinum habet, quod fluctibus hunc retro ad Scandinauia, Noruegia, Suecia &
Gothia littora agit: nunc ad insulas, ut ipsi etiam deprehendimus: nam & nos quo-
que illud in Burrhanę, Austraię, & Scandinauia littoribus inuenimus. Nunc
ad nostra littora, uidelicet Cimbrica Cherfonesi, ducatus Mechelburgiaci, Pome-
rania, Prussia, Samelandia & Liuania. Sed quamuis toto hoc nostro maritimo
tractu non raro legatur succinum, exiguum tamen id est, in paruas micæ concre-
tum. Plurimum uerò, & maximis glebis constans, ad Samelandiam expellitur,
quę Prussia uicina est regio, & Prussia Duci paretiad eam tanta copia tempesta-
tibus fertur, ut toti terrarum orbi satisfacere possit, quantumuis multis usibus ex-
petitum. Atqui non ad totum Samelandia littus tanta uis Electri expellitur,
sed ad eum tractum tantum, quem Germani das Granawisdye uocant, non lon-
ge a pago Sudauis & Samelandis Kraxte pelle dicto, quod retinctum significat. Nu-
di enim homines retia uenienti Succino prætendentes, sæpius fluctibus retincti
obruuntur, unde Pago nomen patrialingua fecerunt. Locus autem quo tanta
eius copia colligitur, patet tantum decem milia passuum, hoc est, duo Germani-
ca miliaria. Habent eius piscationis gnari sua signa & indicia, quibus uenturi
Electri copiam æstimant. Sunt alię quędam diuersi generis, sed maxime quę-
dam cordis exigui imaginem referentes, & uellicarum modo inflatę: quę si copio-
sę ad littus ferantur, plurimum succini aduentare certum, his enim inuolutum tan-
quam retibus capitur. Cum uerò parcius hæ algę littus appulerint, minus succini in se
quitur. Fluctibus deinde ereptum, Dantiscum uehitur: quę urbs præter quā quod to-
tius Prussia caput sit, etiam celeberrimum est emporium. Vbi primum certis uen-
ditur negociatoribus, ex pacto præcium pro certa mensura, secundum glebarum
magnitudinem, Principi numerantibus. Rude adhuc ut colligitur, asperum sca-
brumq; est tota superficie, nec quidquam attrahit, quantumuis calefiat: leuigatum
uero & politum, primum rapere incipit, qui ex attritu calefacto admouentur sur-
culos. Nam alia quacumque ratione præter confricationem incallescens, perinde ut
rude, rapere nequit, quas proprietates neminem antea prodidisse scimus. Nos
autem id ideo affirmamus, quoniam sæpius eius rei periculum fecimus. Porro lon-
gum foret, omnia statuta legesq; succini gratia latas enumerare, quia alii ex nostris
hęc attigerunt. Nos autem quę antea tradita sunt relinquentes quod illi præterea
uerunt indicabimus. Nam neque hoc referre necessarium existimamus, quot ha-
beat succinum colore differentias, & quantam utilitatem hominibus adferat, non
in medicina tantum, in qua magnum usum habet: uerum etiam in mechanicis
artibus, in quibus multo maiorem. Nunc autem antequam quid sit explicemus,
quid non sit ostendendum duximus: aliis succum, aliis Gummi, aliis Resinam, a-
liis terram, aliis lapidem esse contendentibus. Nam hæ opiniones multa iam sa-
cula hominum mentes detinent. Sed lecturos istarum opinionum confutationem
prius nouisse oportet, succi, gummi, resinę, terrę, & lapidum, differentiam,
materiam, qualitatem, & alias quas habent proprietates: ita facilius dicta intel-
ligent & diiudicabunt. Succum autem cuiuscunque arboris aut plantę non esse suc-
cinum, sed neque urinam alicuius animalis, succi & urinę substantia & qualitates
ostendunt. Constat enim utrumque aqueo humore: qui etsi solis aut ignis calore
densetur, aquę tamen qualicunque infusus diluitur, ideoq; in mare delapsa quam-
primum dissoluerentur. Succino uero contraria est natura, nam liquidum in ma-
re primum influit, mox densatur. Athi locum non habet quod dicitur, salē ad-
stringere & densare succos, quod nemo concedet cui salis natura perspecta est. Sa-
li enim arido densandi facultas, sed non tanta ut liquidum succum denset: atque
ea densandi uis nequaquam est propter adstringendi qualitatem, sed propter im-
bibendi aqueum uel similem humorem potentiam. Salis enim propriissima na-
tura est facillime aquam, uinum, uel tale quippiam imbibere, & in tali quopiam hu-
more dissolui. Quapropter quod conspersas carnes & caseos densat, & solidos

Succinum
non esse suc-
cum aut uri-
nam.

res reddit, per accidens fit, non propria aut adstringendi facultate, sed quia carnes & casei recentes, aquoso succo turgentes, succum suum sali combibendum dimittunt, quo fit ut hæc deinde sicca duraque & ideo densiora euadant. Succus uero aliquid cum nihil habeant terrenæ consistentiæ, qualem carnes & casei, sed totiaqueo humore consistit, sale humorem quem appetit imbibente minime densantur, sed sui similes permanent, si serena sit, nec calida aeris constituto: si uero turbida & humida, etiam liquidiores euadunt, sale humidum aerem imbibente & succo cui mixtus est communicante: quod manifeste omnes, etiam densati coctura aut sole, ostendunt succi, si sal admisceatur. Continuo enim humescunt & disfluunt, maxime humida & frigida aeris constitutione. Ergo si aridus sal succos etiam spissos liquidiores reddit, quanto magis liquidus sal, ceu mare est, liquidos succos dissoluit & penitus dissipat. Si etiam densatus succus esset succinum, aquæ incoctum dissolueretur, ceu Aloë uulgaris, Hypocistis & eiusmodi: sed etiam si quis integro uero in aqua aut uino decoquat, nihil penitus tamen eliquari potest. Adipi uero aut Oleo incoctum dissoluitur, quod alienissimum est à succis qui aquei sunt. Est itaque succino pinguis substantia & à succis diuersissima.

Quod non
sit Gummi.

Quod autem etiam Gummi non sit, ostendunt argumenta quæ iam de succis attulimus. Nam hæc quoque, cuiuscunque sint generis, in quouis aquoso humore dissoluntur, in Oleo uero minime: eadem, perinde ut densati succi, turbida & humida aeris temperie humescunt & disfluunt, nec sine ratione, cum uiscoli & concreti calore succi existant. Quid quid enim siccitate densatur, humido resolui potest.

Quod non
sit resina.

Qui uero Resinam esse contendunt, propius ad materiæ similitudinem & naturam eius accedunt. Quemadmodum enim Resinæ pingues sunt, & accensæ flagrant, oleo incoctæ dissoluntur omnes, ita etiam succinum flamma accensum ardet, & in Oleo si coquatur resoluitur, & accensum flagrat.

Resinam tamen non esse, statim forma glebarum ostendit. Resinæ enim partim paulatim distillant, & in paruas micæ guttasque concrescunt, ut Lentisci, Iuniperi proceræ, quam Sandaracam Arabes uocant: thus masculum, & quod Orobas ab erui figura & magnitudine uocatur. Partim ex pluribus guttis longo temporis intervallo collectis in massas scabras, porosas, & cauernosas concrescunt, ut Pini, Abietis, Piceæ, Piceastris & eiusmodi arborum: quamuis & hæc frequenter in paruas micæ densentur. Succino uero diuersus est à resina habitus: neque enim in guttas oblongas densatur, quæ ex arbore se pependisse indicarent, neque in scabra, cauernosaque, & guttis compacta fragmenta coalescit, sed solidas glebas. Glebarum etiam magnitudo resinam esse negat: siquidem Plinius Romam allatam scribit tredecim librarum pondere, per libræ duodecim uncias intelligens. Nos uero scimus multa maiores interdum inueniri: & nonnunquam etiam in continente ultra uiginti milia passuum à littore aratris excitari: & in fundamentis ædificiorum effodi, quibus nostra memoria inueniæ librarum fuit septemdecim & unciarum quatuor. Hæc autem grandes glebæ poculis splendidioribus à magnatibus apud nos expetuntur, quemadmodum olim apud Romanos ex Oriente Murrhinum: quod & ipsum sine dubio ad Succini genus referri debet, ut Georgius Agricola in suis libris de rebus metallicis indicabit. Puerile autem est credere, in tantas glebas concrecere resinam aliquam: ac multo puerilius, credere tantum ex arboribus defluere posse resinam, ut maria & lit

Murrhinum.

† Georg.

Agricola in

libris à mor

te Val. Cor

di editis

Murrhinum,

lapidæsa-

cit, qui ex

Onyx Plin-

io dica-

tur: et Chal-

cedonium

uulgò dictū

interpretat-

ur.

Reclamat etiam experientia, nullæ enim prorsus in nostro littore sunt Pinei generis aut resiniferæ arbores, à Cimbrorum extremo promontorio usque ad Scandinaviæ Isthmum, quo Asiæ maiori cohæret, hoc est, toto illo immani sinu Codano, nullæ enim temere in littore arbores, præter Alnos & Corylos, uisuntur. Oderunt etiam natura resiniferæ omnes salisum, aut mari irriguū, solum. Simili modo neque in Noruegiæ, neque Scandinaviæ mari, neque Sueciæ littoribus ullo uisitur resinifera aut Pinei generis arbor, quatenus nos eam oram lustrauimus, & quatenus militibus & negociatoribus nostris cognita est, qui quotidie totius legunt Scandinaviæ littora. In montibus uero procul à mari magnæ sunt Tædarum, Abietum & Piceastrorum syluæ. Sed ex his impossibile est

est ad mare delabi resinam. Præterea si in inuiis cautibus starent hæc arbores, ut alii qui ueterum prodidere, in terram & rupes delaberetur resina. Et si maximè ex rupibus æstu raperetur, ut Plinius credidit, sordidum totum esset, calculis, arenis, foliis & aliis rebus mixtum, sed rarissimè reperitur quod tale quippiam cõplectatur. At neque hoc rationi consentaneum est, ex arboribus præcipitiis in mare procumbentibus destillare: tum enim paulatim & guttatim destillaret, & in paruas tantum guttas densaretur: sed impossibile est, tot in præcipitiis stare arbores, ut tantum resinæ fundant. Adde si hoc modo distillaret, neque ranas, neque lacertas, neque formicas, muscas, culices, aut quidquam tale complecteretur. Mirum etiam esset si resina sit, non inueniri in eo Pinci generis folia, cum in aliis resinis sua folia frequenter deprehendantur. Esset etiã præternaturam eo loco resinam in tantam soliditatem densari, cum quæuis aliæ resinæ siue frigida siue calida aqua densatæ, maximè salsa, aridæ friabilesque euadunt, ac sponte dissiliant. Quod si olfactum consulas, exactè nullum resinæ odorè percipies, sed medium quendam inter Bitumen & Ambram, quæ res in terra gignuntur. Quod autè paleas et alia similia attrahit, magnū est argumentū, multum id à resina differre. Nulla enim id præstat res ipsa. Differunt etiã uiribus resina, & succinū. Nam hoc præter alia, quibus ab illis discrepat, etiã comitiales suffitu deprehendit, & eos collapsos excitat, quod in nulla unquam deprehensum est resina. Facit etiam ad nostrum argumentum coloris diuersitas: nam si certæ alicuius arboris resina esset, eundem semper colorem haberet, ut Terebinthi, Laricis, Lentisci, Abietis, Pini, & aliarū resinarū, quæ semper sui sunt similes. Succino uerò nunc Sero similis, nunc cereus, nunc fuluus, nunc turbidus, nunc omnino pellucidus, nunc niueus, nunc ex quibusdā eorū aut simul omnibus mixtus, & ceu conuolutus, nunc omnino niger est color. Nam Gagates ille lapis paleas attrahens, nihil est aliud quam nigrum succinum: quare eodem eum Germani uocabulo, quo aliud succinum, appellant, adiecto coloris discrimine. Necesse igitur est, rem diuersissimam à resina esse. Quapropter non possum non Græcorum uanum commentum carpere, qui etiam certa nomina arboribus succinum ferentibus indidere, eas alias Electrides, alias Aphitacoras nominantium, quo uocabulo Indis prædulcis suauitas significetur. Omitto reliquas fabulas, quibus ipsi suā uanitatē & inconstantia palam fecerint. Qui autè resinam non esse cõcedunt, lapidē esse contendunt, quoniā uulgò Germanis lapidis nomine ueneat: sed nihil in eo est quod cū lapide cõmune habeat: lapides enim omnes terreni sunt, nec quicquā in igne amittunt, nisi alterius cuiusdā rei participes sint: neque acceduntur, neque in pinguedine aliqua dissoluntur, aut igne in sublime feruntur, neque leues sunt, ut aquæ innatent: quæ omnia Succino sunt propria: quod usque adeo tenuitate à terrena lapidum materia distat, ut certa ratione totum in uaporem & liquidissimum oleum dissolui queat, quod nemo ante nos inuenit aut tentauit: uariis enim ingressi uis sumus, ut naturam, originem, & materiam eius inuestigaremus. Præter eos qui lapidem esse credunt, sunt & qui terram esse dicant: quod ne per somnium quidem alicui in mentem potuisse uenire sperassemus. Quoniā uerò hæc opinio his annis à multis est accepta, iisdem est confutanda argumentis, quibus lapidem non esse probauimus: quamuis id paucis uerbis egerimus, cum non existimemus sanæ mentis & iudicii homines eo erroris delabi posse, ut lapidem esse credant. Decessit hoc anno, cum hæc conderemus, admodum confectus ætate Gregorius Dunckerus, uir haud uulgari experientia præditus: qui multa etiam in Succino obseruauit, quæ nostrum de eo iudicium confirmant: tamen in eum errorem incidit, ut crederet Succinum ueteribus Samiam terram fuisse dictum, regionum nominibus deceptus: nam hæc Germani ora, qua Efflui habitant, hodie Sameland nostris hoc est Samia regio uocatur, perinde ut Samus Insula in Aegæo mari sita. Nihil enim commune succinum cum figulina creta habet, qualis est Samia terra, ex qua Samia uasa fiunt. Nam ut alia prætereamus argumenta, Argilla tenax est Samia terra, ex qua factæ ollæ, igne in lapidis duriciem coquuntur, nulla sui amissa parte, ut alia quæuis figulina terra: Succinum uerò ignis impatientissimum existit: flamma enim accensum eò usque flagrat, donec totum in fuliginem abeat: prunis autem impositum æque ut flamma accensum consumitur, siquidem totum in uaporem resoluitur.

Quod non sit lapis.

Quod non sit terra.

Quod sit
liquor ē
terra in ma-
re fluens.

Succinum
etiam in
Aphrica.

Porro hæcenus eorū cōfutamini opinionones, qui Succinū, aut succum, aut Gummi, aut Resinam, aut terram, aut lapidem esse tradiderunt; quamvis plurima quæ ad rem facerent reliquerimus; maxime quod ad diluendam scriptorū authoritatem pertinet. Nos uero minime nuda authoritate, sed rationibus & argumentis rem tractandam esse censemus. Nam quod Solinus scribit, Germanico Cæsare omnes Germanicæ oras scrutante, compertam esse arborem Pinei generis, cuius medulla autumnī tempore succino lachrymet, falsum penitus est, ut ea quæ antea diximus testantur: quem admodum & hoc quod tradit, Germanicum Cæsarem omnes Germaniæ oras scrutatum esse. Quæ Solinus de Succino scripsit, ē Plinio excerptis, quibus suum addit commentum. Restat igitur nunc, ut nostram de materia & origine eius sententiam rerum naturæ studiosis communicemus, qui semper credidimus, succinum liquorem esse ē terra in mare fluentem, arcanas ac nondum compertas ob causas paulatim in eā quam præferit soliditatem durescentem, quod Georgius Agricola etiam sentit & Gregorius Dunckerus, cuius modo mentionem fecimus, omnino affirmat, natione Samelandus, qui in eo littore, ad quod maxime expellitur, ultra quinquaginta tres annos uixit, maximaque cura tota uita sua eo incubuit, ut originem & materiam eius perdisceret. Nam hic eos quoque reprehendit, qui arborum lachrymam esse prodiderunt, clarisque uerbis dicit, liquidum primo esse liquorem ē terra in mare fluentem. Quod tanquam certissimum omnibus est amplectendum. Ad stipulantur nostræ sententiæ etiam ueterum nonnulli ceu Nicias, Philemon, Asarubas & Mnesias, quos Plinius citat. Nicias enim solis radiorum succum esse succinum tradidit, quos circa occasum uehementiores in terram actos credidit, pinguem sudorem in ea parte Oceani relinquere, qui deinde in Germanorum littora eiceretur, haud absurda opinione. Non quod hic succus ipsis solaribus radiis nihil præter qualitatem existentibus insit, sed quod radiorum seruire, pinguis ille terræ sudor foras eliceretur. Quod plerisque in locis apud nos estatis calore, & ueris, autumnique tempore in liquido bitumine deprehendimus: cuius speciem succinum quoque esse diximus. Bitumen enim hoc in terræ poris latitans, paulatim foras sole terram calefaciente, & pinguedinem eius eliquante in lacus, puteos & riuulos emanat; hyeme uero præclusis terræ meatibus & densata pinguedine nihil prorsus emanat. Philemon fossile esse & in Scythia erui prodidit, candidi, cerei, & fului coloris: proculdubio comperta scribens. Nam in Parthia quoque & Germania Murrhina, quæ absque dubio succini genus sunt ē terra effodiuntur, quæ nullus unquam resinam credidit. Quare cum fossile sit succinum, quæ est amentia resinam id esse contendere, cum apud nos quoque sæpissime grandes glebæ inter arandum excitentur, & ē puteorum & ædificiorum fundamentis eruantur, multis à littore passuum millibus. Nos tamen eas ibi minime natas, sed in terra, mari ut plerisque in locis contigit, longius à continente recedente, relictas iudicamus, quamvis plerique ibi genitas credant, in quorum numero etiam fuit Gregorius Dunckerus. Asarubas, qui Plinio scribente adhuc uixit, apertius rem prodidit, tradens: iuxta Atlanticum mare esse lacum Cephisida, quem Mauri electrum uocent, hunc sole excalefactum ē limo dare electrum fluitans. Asarubæ subscribit Mnesias, locum quendam Aphricæ, Sicyonem uocans, & Cratim amnem in Oceanum affluentem ē lacu, ibi eadem ratione nasci quam in Cephiside lacu Asarubas tradidit. Nos utrumque uerissimum scripsisse credimus, non uanis argumentis inducti: primum quidem, quoniam apud nos eodem modo sole excalefactæ lacunæ & putei, ē limo emittunt Bitumen aque innatans. Deinde quoniam certo comperimus etiam in Aphrica reperiri succinum: idque ea parte qua Canarias spectat insulas. Nam eam Aphricæ oram Atlanticum mare alluit: Misit ad nos ex Antuerpia Aphricani succini unam atque alteram glebam Gruningus natione Frisius, (qui ea loca lustrauit, & ipse id in ripa fluminis cuiusdam ibidem legit.) Nostrati adeo similem ut dignosci nequeat, quas inter cætera quæ chara nobis sunt eo libentius reposuimus, quoniam & Mnesiæ & Asarubæ fidem & authoritatem firmam nobis faciunt. Quare immerito Plinius eorum tradita aliorum Græcorum commentis adnumerasse uidetur. Gigni autem in terra Aphrica num succinum quoque nec esse arborum resinam, uel inde perspicuum est, quoniam nostrati simillimum colore, substantia, & qualitatibus cum sit, eandem quoque originis causam habere necesse est. Si igitur Piceæ aut

celi aut Pinei generis arborum resina esset, quales arbores in Septentrione uisuntur, necesse esset etiam in ea Africæ ora easdem nasci arbores, quæ similem & eiusdē species resinam lachrymarentur. Cum uero experientia constet, nullas ibi resiniferis similes provenire arbores: non male raciocinamur, id resinam minimè esse. Quæ enim ibi proveniunt arbores, nostratibus dissimilimæ sunt, ut referunt qui ea loca inspexerunt. Præcipue autem abundant Sandali, Prasili, Guaiaci, & eæ quæ sanguinem draconis dictam lachrymam fundunt: multæq; aliæ nostris, quia nondum usus alicuius gratia expetuntur, incognitæ. Et si autem Gregorius Dunckerus quoq; deprehendit, e terra fluentem liquorem esse, non tamen explicat, cuius generis cuiusue substantiæ aut naturæ sit hic liquor, quod nobis est nunc dicendū. Liquores omnes seu fontes qui e terra ac montibus fluunt, ad duo præcipue referuntur genera: aut enim aquei sunt, aut olei modo pingues. Aquei autem multum differunt secundum terræ per quas fluunt diuersas qualitates, hinc alibi dulces, alibi nitrosi, alibi salsi, alibi Chalcantho infecti sentiuntur: ad nullum autem horum referri potest Succinum: quare necesse est ad alterum liquoris genus id pertinere, quod pingue existit, & olei æmulum. Liquor autem hic pinguis suum apud authores nomen habet, nempe Bituminis, cuius species, solidum & liquidum, quæ & ipsæ in plures differentias diuiduntur. Esse autem Bituminis genus Succinum eius materia, colores, odor, medica uis, & ignis rapacitas, manifestè conuincunt. Substantiam enim si consideres, deprehendes pinguem, flammam facile cōcipientem, æque ut Bitumen. Atqui antea à nobis dictū est pingue terræ liquorē Bitumen esse, talē autem consistentiā Succinū habet. Quamuis præter Bitumen etiā aliud quippiā in terra genitū pingue sit, uidelicet Sulphur. Sed ad hoc referri nō debet, quoniam metallicū est medicamentū pluribus à succi nō diffrens. Colores etiam totidē succino, quot Bitumini: est enim nigrū quoddā, Gagates & Thracius lapis dictū, ut uulgare Bitumen: est fuscum in purpura, ut Iudaicū Bitumen. Est fuluum & perspicuū quoddam, ut Naphtha fulua, quæ liquidissimum est Bitumen. Et candidum quoddā, ut candida Naphtha. Si autem olfactū consulas, manifestè Bituminis qualitatem odore percipies. Quod uero suauius oleat alio Bitumine, puritati substantiæ referendū est, quæ tantum à uulgari differt. Vires etiam originem & materiam eius produnt. Nam ulcera glutinat, mollit, suffitu, olfactuq; uulnæ strangulatione correptis mulieribus succurrit. Comitiales prunis impositum deprehendit, & deprehensos rursum restituit. Menses cit, uenenis aduersatur. Concretum in thorace sanguinem discutit & resoluunt: dysenteria laborantibus succurrit. Tussis & à capite in subiectas partes destillationes suffitu sistit: dentium dolores mulcet. Omnes deniq; facultates nostri in succino celebrant, quas ueteres Bituminis speciebus adscripserunt: præterq; has alię etiam succino tribuuntur, quas consulto præterimus, quoniam eas ueteres non nominatim recensuerunt, sed in genere indicauerunt. Quod enim factos calculos excernit, & lictericis medetur, Succinum, ex incidendi, extenuandi, abstergendi, aperiendi, & discutiendi facultatibus procedit: quas Bitumini authores assignant. Quinetiam quotidianus eius in re domestica & mechanicis artibus usus, Bituminis genus esse testatur. Hoc enim statuo clauorum capita, ac alia ferramenta, in nigrum colorem tingebantur, in quem usum multi nostrorum ubi abundat Succinū recipiunt. Expetuntur etiam lucernarum luminibus, ut Bitumen, ramenta eius. Præterea rapax admodum est ignium, ut Bitumen. Et certū eius genus, ut Callistratus Plinio citante prodidit, Chrysolectrū uocatū, quod sit rapacissimum ignium, & si iuxta fuerit celerrime exardescens. Quod de nulla unquam alia re authores tradiderunt, quam Naphtha, quæ Bitumen est liquidissimū: in hunc enim modū de Naphtha Dioscorides quoq; scriptū reliquit: *ἀνναμύχρον ἀρωματικὸν ἔν τῷ πυρὶ, ὡς καὶ τὰς διασχυαλὰς ἀρωματίζει*. hoc est, uim habet rapacē ignis: adeo etiā ut ex intervallo rapiat illum: idcirco cū Callistratus id succino tribuat, quod Naphtha sit propriū, quis alii quā Bituminis generi adscribat. Accedit postremo nataliū uicinitas, ubicunq; enim Succinum, ibidē etiā Bitumen gignitur, ut in Perside, Parthia, Carmania, Aegypto, Mauritania, & nostro Septentrione. Omnium autē argumentorum, quæ iam adduximus, firmissimū est quod interdū molle adhuc & flexile inueniatur: interdum omninō liquidum in superficie solum tenui crusta uestitum. Inuenta est ante paucos annos in Prussiae littore

Quod sit
Species Bituminis.

Consistentia.

Color.

Odor.

Vires.

littore oblonga gleba furcæ figura, cuius alterum cornu molli cere inftar flexile fuit. Quin & ipsi Lipſie apud auunculum noſtrum Ioannem Rallam Pharmacopolam in Succino e Prussia recenter allato, ſeptimo hinc anno, inuenimus glebam, in qua con- cluſa, ut in ouo ueteraſcenti, humidus adhuc fluctuabat liquor. Ducti itaq; rei antea non comperta nouitate glebam confregimus, tenui cruſta lepidiſſimum & prorsus li- quidum humorem continentem: deprehendimus autem cruſtam Succino uulgar ſi- milem, liquorem uerò Naphthæ ſuluæ, id eſt Petroleo ſimilem, paulò tamen craſſio- rem, odore ſuccinum prunis impoſitum omnino referentem, & nihil minus quàm re- ſinæ alicuius habitum præferentem. Cogitantibus igitur nobis per quam reſolutio- nem partes quibus conſtat ſuccinum ab inuicem diſcretæ palam fieri poſſent: tandem hoc anno artē inuenimus qua id fieri poſſet: deprehendimus igitur in hac arte in par- tes & elementa ſua reſolutum magna ex parte in Bitumen tranſire, uero Iudaico Bitu- mini adeò ſimile, ut neq; colore, neq; pondere, neq; ſubſtantia, neq; odore, nec qua- cunq; alia nota ab eo diſtingui poſſit. Quin & ipsi nos iſta dignoſcere haud poſſe- mus, niſi Iudaici Aſphalti glebulis miſceretur: ut autem alia omittamus, etiam con- fractum, ceu alatū & pennarum fibras Iudaici modo oſtendit. Quapropter cum, ſubſtantia ſimilitudo, colores, odoris qualitas, uirium proportio, ignis rapacitas, na- talium uicinitas, quotidianus uſus, & manibus noſtris attrectata, ſenſibusq; diiudica- ta materia, & ſingulari arte deprehenſum in eo Bitumen, Succinum Bitumini cogna- tum eſſe teſtentur, nec ulla ſit nota quæ repugnet: clarum tandem & perſpicuum eſt, neq; reſinam, neq; gummi, neq; arborum ſuccum, neque urinam, neque lapidem, ne- que terram eſſe: ſed puriſſimum, leuiſſimum, optimum, & x. & ſui generis Bitumen. Quemadmodum & Ambra & Camphora, quod huius loci non eſt multis argumen- tis demonſtrandum. Porro qua ratione lacertas, ranas, culices, muſcas, & alia infecta quæ in eo tranſlucent, atq; metallica etiam medicamenta quædam, ceu aluminis, chal- canthiſq; uenas, quas ipsi in eo deprehendimus, inuoluat & complectatur, hoc com- mentario præterimus: quemadmodum & hoc, an in ipſo maris uado, aut littore, an utroq; loco eius ſint fontes.

† id
† ſi
Concludit.

DE MELLE. CAP. 101. 102. 103.

Mellis uocabulo & propria eius ſignificatione dulciſſimum illum liquorem intel- ligimus, quem apes ex arborum, fruticum & herbarū floribus colligunt: & cera com- poſitis fauis reponunt, omnibus cognitum, & medicinæ & hominum etiam in ſani- tate uſui expetitum: cuius multæ ſunt differentiæ, ſecundum ſorum, & quibus colligitur qualitates uariantes. Omnium autem odoratiſſimum, & maxime aromaticū eſt, quod eſt Thymo, Thymbra, Satureia, Serpillo, & id genus herbis collectum fuerit: ideoq; primam bonitatis notam Attico & Hyblæo authores adſcripſerunt. In Ger- mania uulgaſiſſimum eſt, quod ex Ericæ ſugitur floribus, granulofum, guſtu nō adeò ſucundum, ideoq; non multifaciendum, in medicina ſaltem, eſt Luneburgenſis ducatus Ericetis allatum. Quod uerò Saxones Arndehonig/ alii Juncſſrawen honig appellant, id eſt, aromaticum & uirgineum mel, nō multum ab Attico differt. Suauis- ſimum uerò eſt cum guſtu tum olfactu, eſt Prussia, Liuania, & Lithuania allatū, quod fere eſt ſolis Tiliæ floribus apes colligunt. Eſt autem hoc quoq; ut iam dictum eſt, a- romaticum, ſolidum & denſum, ſed multò candidius. Sardinium uerò mel, cuius Dio- ſcorides meminit, ad nos non perſertur, id amarum eſt: quoniam Abſynthio ſcaterit ſula, à qua nomen habet. Sentiant etiam apud nos quidam tractus Abſynthio abun- dantes hoc uicium, maxime in Hungaria. Ponticum poſtremo uenenatum cum ſi- ueſcentes interimunt, aut ad infantiam adigit. Colligitur id eſt Nerii & Aegolethri flo- ribus, natura uenenoſis, & certis temporum conſtitutionibus maius uirus contrahen- tibus. Tale autem eſt proprie uocatum mel, quod ſit apibus ſorum ſuccum ſorben- tibus. Sunt & alia quoque duæ inſignes mellis ſpecies Αβέριον & Σάραρον, non ab apibus collectæ, ſed quarum altera ex aëre deſcendit, altera uerò in harundinibus quibusdam Indiæ atque ſœlicis Arabiæ concreſcit, de quibus iam dictū ſumus. Porro mellis uocabulū tranſfertur etiā ad fructuum quorundam, tam dulces quam medicos ſuccos, coctura in mellis ſpūſitudinem denſatos, ut eſt mel paſſulatum, mel palmu-

palmularum, mel Anacardinum, &c. Non quod proprie mella sint, sed quia substantiæ similitudine, consistentia, & dulcedine, proximè ad mellis naturam accedant. Ex his Anacardinum sola consistentia melle mulatur, sapore uerò plurimum differt.

DE SACCHARO. CAP. 104.

*Sal Indus, idem Saccharo. Sed olim non poterant succum exprimere, & lachrymam tantum usurpabant.

Σάκχαρον siue Σάκχαρος, quod Arabes Zachar & Zuchar, alii Salē Indum, Mel Calaminū & Mel Canne appellant: mel est in Arabiae foelicis & Indig harundinibus quibusdā in grumos & micas cōcrescens. Cuius duæ sunt præcipuæ differentia. Alterū enim sponte sua in harundinibus istis concreuit, de quo hīc Dioscorides agit. Alterū earundē harundinum expresso & igne densato fit succo: illud hodie rarissimè affertur, ideoq; medicis in nullo est usus: hoc uerò in tanta copia aduehitur, ut nemo esse possit qui rem non cognoscat. Nihil enim differt nostrum Zacharum à Zacharo antiquorum, præterquam quod nostrum igne artificiali densatur: illud uerò sole natura succum elicente & elicitum densante. Itaq; nos non pudet cum Gentile, Herculano, Nicolao Castellano, & Vincentio Capili pronunciare, idem esse nostrum Zacharum cum antiquorum Zacharo, sola autem efficiente causa ab eo differre. Quantūvis Manardus repugnet, ut abiq; ulla controuersia in omni disciplinarum genere doctissimus & exercitissimus, rerūq; insuper cognitione haud uulgari insignis, qui pluribus locis epistolarum suarū obtinere contendit, Zachar antiquorum à nostro Zacharo, materia efficiente, forma, fine & uiribus differre, & prorsus rem diuersam esse, haud contemnendis rationibus & argumentis inductus, quibus non paucos traxit in suam sententiam. Nos uerò cōtrarium semper credidimus, & adhuc adstruimus. Quare si quid rescito cognoscendæ gratia dicturi sumus, id ueritatis amor, nulla erga uirum doctissimum & uita iam defunctum similtas, dicere nos compellet: ex animo enim semper complexi sumus eius scrip̃ta, plena reconditæ eruditionis, & maximæ utilitatis, ut ob id solum charus nobis esse debeat Manardus: nisi multo charior nobis redderent obsequia, candor, & amicitia quibus parentem nostrum familiariter prosecutus est, cum quondam Ferrariæ medicinam proficentem ipsum atque Nicolaum Leonicum præceptores haberet. Ostenfuri igitur nostrum Zacharū ex eadem fieri Cannā, quā ueterum Zachar colligebatur, atq; idē prorsus cum hoc esse, quod materiam, consistentiam, qualitates & facultates attinet: operæ precium diximus hoc uti ordine, ut primum argumenta, quibus nititur in confirmanda sua opinione Manardus, enumeremus. deinde ea cōuincamus. Ultimo uerò ut nostram sententiam firmiter argumētis defendamus. Argumentis autem eius hinc inde ex epistolis medicinalibus in unum collectis, positionum disputandarum modo numeros adscribemus, ut legentes clarius uideant contra quod quoquo loco disputemus. Sunt autem quæ sequuntur.

I.

Zacharum uulgare non modò Galeno, sed & omnibus medicis eo uetustioribus, & nonnullis qui per multos annos eum secuti sunt, penitus fuit incognitum: quoniam id silentio præterierunt.

II.

Nonnulli nomenis quidem mentionem habent:

III.

Alii nomināt quidē, nō tamen uulgare hoc intelligunt, quod plantæ succus est, sed melleum rosē supra harundinis folia conglobatū, à Manna uocata parum differentē.

IIII.

Utrumq; enim (hoc est) Manna & antiquorū Zacharum sub roscido, seu (quod idem est) aëreo melle tanquam genere continetur.

V.

Nam Zacharum non est cannæ succus: sed Indus & melleus ros, in harundinibus coneretus, ut Galenus etiam putauit.

VI.

In hoc tamen Manna à Zacharo differt: quod Manna super alias plantas & petras cadit: Zacharum uerò super harundines in India & foelici Arabia,

Zacha-

Manardus
opinio res
fuitur.

Argumenta
ta Manardus
di numero

24.

VII.

Zachari autem ueterum & nostri uulgaris differentia est; quod ueterum Saccharum supra ueræ harundinis folia in India, fœlici Arabia, & monte Libano concresecat. Nostrium uerò in plantæ cuiusdam pulpa latitet.

VIII.

Differunt etiam, quod nostrum priusquam coquatur, colore potius sit nigricans & subruffum, quam candidum. Nec dentibus fragile, sed per succum, non per dentium attritionem, deglutendum.

IX.

Differunt quoque causa efficiente: siquid nostrum efficiens est, primum forma, uisque plantæ suæ ex qua premitur: secundum artifex calore ignis cōcoquens & defæcans: Veterum uerò Zachari noctis primo frigus adglutinans: dehinc superueniens solis calor obdurans.

X.

Differunt præterea, quod antiquo Zacharo materia eadem sit quæ melli, hoc est, (ut ipse dicit) Ros: nouo uero seu nostro, plantæ cuiusdam succus.

XI.

Differunt postremo etiam forma. Antiquum enim, salis: nouum, inspissati liquoris formam habet.

XII.

Quin etiam succus è cannis expressus, hoc est, nostrum Zucharum, nullum cum antiquo Zacharo, præter dulcedinis consortium habet.

XIII.

Non tamen penitus Galeno incognitus fuit Succus Indicæ harundinis radicibus pressus, cuius Varro meminit, si ad memoriam reuocauerimus, id quod quarto libro de simplicibus medicamentis scriptis mandauit: radices scilicet, calamorum, præcipue Aegypti, dulces esse.

XIII.

Neque tamen Galenus, neque Varro, neque Solinus, (qui harum quoque cannarum mentionem facit,) succum per earum pressionem elicatum, Sacchar uocauerunt, aut esse scripserunt.

XV.

Differunt quoque cannæ utriusque Sacchari: nam cannæ in quibus Saccharum antiquorum concresecit, ueræ sunt harundines, leues, duræ & intus uacuae: cannæ uerò ex quibus nostrum Saccharum exprimitur, ueræ cannæ non sunt, quoniam exteriore tantum specie harundinibus similes sunt, intus uerò minime cauæ, sed pulposæ, graues, molles, & succi plenæ, atque Milio potius Indico (quod Melicam uocant) quam harundini similes.

XVI.

Secundum Auicennam Zucharum Alhufar (quod est Manna cadens super planam Alhufar) idem est cum antiquorum Saccharo: easdem enim uires ei Auicenna tribuit, quas ueteres suo Saccharo adscripserunt.

XVII.

Eadem igitur est materia Mellis apum, Mannæ, & Sacchari antiquorum, etiam secundum Auicennam.

XVIII.

Veteribus etiam qui Mellis speciem Zucharum esse tradiderunt, Alexander Aphrodisæus secundo problematum suorum libro in hæc uerba subscribit. Quod Zachar Indi appellant, mellis coagulum est, sole cogente, conuertenteque ad mellis dulcedinem, quod idem etiam in monte Libano fieri certum est. Fit Sacchar id proximum salis glebulis, candidum, fragile, &c.

XIX.

Serapion et si annos sexcentos Galenum sequutus sit, dum quatuor aut quinque Zachari genera enumerat, uulgare hoc penitus præterit.

XX.

Vincentius Caprilis de materia Sacchari aliquid tangens, narrat potius quam probe ex

bet ex eadem materia (hoc est harundine concisa) utrumque constare, uidelicet aut iquorum Saccharum & nostrum Zucharum.

XXI.

Repugnat etiam Vincentius Caprilis omnibus antiquis medicis quod dicit: Licet inter mella à Dioscoride, Plinio & aliis antiquum Zacharum enumeretur, non ideo tamen hoc factum, quod eiusdem materie putauerint, sed quia consueuerunt cognata congeneribus adiungere.

XXII.

Consuevit quidem Dioscorides diuersarum rerum capita, ob quandam uel naturæ uel figuræ uel alterius rei similitudinem, inuicem copulare, ut toto eius libri progressu uideri potest: sed uno eodemque capite de diuersis toto genere rebus nunquam eum uidebis tractantem.

XXIII.

Quum igitur uno capite, libri uidelicet secundi lxxiiij. cui titulus unicus est, de melle, cum tribus mellis generibus de Saccharo scribat, clarum est quod mellis speciem putauit, quod ipse etiam modus loquendi, uerbaque aperte monstrant.

XXIII.

Postquam enim egit de melle Heraclio, subdit: uocatur & quoddam Saccharum, quod mellis genus est in India foelicæ Arabia concretum.

Prima autem positio Manardi eatenus tantum locum habet, quatenus factitium (hoc est) expresso cannarum succo coctum Saccharum intelligit, quo omnes utuntur. Ea enim exprimendi ratio antiquis medicis incognita fuit: Varroni uero, Statio atque aliis probe nota. Antea enim lectorem monuimus, duplex esse Zacharum, alterum sponte in harundinibus concrefcens, sole cannarum succum eliciente, & in salis spissitudinem densante. Alterum uero, quod postea coepit ex iisdem harundinibus exprimi, & igne densari, humana industria naturæ uestigia sequente. Quemadmodum enim natiui Sacchari efficiens est solis calor: ita factitii, hoc est, nostri Zachari efficiens est ignis. Materia uero utriusque eadem existit, uidelicet cannarum istarum dulcis succus, in natiuo paulatim inuento circa oculos meatu erumpens, tum per se, quia turget: tum etiam solis attrahente facultate elicitus. In factitio uero Cylindri ab aqua obiter uersati, ut in quibusdam locis fieri comperimus, aut alia quapiam uiolentia expressus. Cum itaque & solis & ignis calori idem sit in densando affectus, utrumque eandem naturam materiam, eandem efficere necesse est: à sole uero elaboratam suauiore & tenuiore euadere, quam quæ ab igne facta fuerit, omnibus puto notum esse. Concedimus igitur Manardo nostro, factitium Zacharum Galeno, eoque uetustioribus medicis, incognitum: natiuum uero quod sola efficiente causa ab eo differt probe notum fuisse. Sed circa hanc positionem non uersatur summa disputationis. Nam præter id quod dicit Manardus noster, uulgare Saccharum Galeno, eoque uetustioribus medicis ignotum fuisse, totis uiribus obtinere conatur, res penitus diuersas, (non tantum efficiente, sed & materia, forma, fine & uiribus) esse: quam opinionem à ueritate maxime alienam esse sigillatim in sequentibus positionibus conuincemus, ea tamen modestia & temperantia id fiet, ut nemo bonus & ueritatis amans calumniari possit, nos tanti uiri auctoritatem, famam, ac fidem incelsere: quem nos impenitus semper amauimus, quam quiuis alii qui honorificentissimam eius in scriptis suis mentionem faciunt. Quod autem in hac prima positione dictum à nobis est, eandem esse materiam antiqui Sacchari & uulgaris, & utrumque ex earundem harundinum succo fieri, postea suo loco ostendemus. Secundum argumentum neque Manardi opinionem firmat, neque nostram destruit. Etiam si enim nonnulli ne nominis quidem meminissent, non tamen inde constat diuersum penitus esse ab antiquo Saccharo nostrum uulgare. Quod uero in tertia dicit quosdam nominare quidem Saccharum, non tamen uulgare hoc intelligeret: Saccharum hoc natiuum, melleum esse rorem, à Manardo uocari, parum differentem: certissimis inditiis moti, pernegamus. Nullus enim unquam ueterum eius rei suspicionem nobis in scriptis suis reliquit. Sed solus Manardus noster Alexandri Aphrodisei diuersas res quodam loco confundentis, erronea opinione deceptus & seductus, id longis scriptis adstruere conatus est. Quod autem Alexandri Aphrodisei Saccharum cum Manna confundentis opinio falsa sit, & quod

Resolutio
argumenti
primi Manardi.

G

Sacchar antiquū nō sit ros melleus, in hac tertia positione simul declarabimus, sum-
 ptis argumentis à materia, & consistentia, forma, sapore, quantitate & aliis quibuscūq;
 differentiis, utriusq; uidelicet Sacchari & Mannæ. E quibus si aliquot non compro-
 bata certis rationibus reliquerimus, ea omnia repetemus, cum quid sit Saccharum an-
 tiquorū in calce huius commentarii dicturi sumus. Dicimus igitur Sacchari antiquo-
 rum materiam succum esse suæ cannæ, & non melleum rorem, quod postea experien-
 tia confirmabimus. Consistentia autem Sacchari solida est, dura, & licca, quemadmo-
 dum sal fossilis, ideoq; similiter dentibus contritum crepitat, & corruptioni non est
 obnoxium, si in sicco seruetur loco. Mellei uerò roris iam densati, laxior, friabilior,
 humidiorq; est consistentia: quare neque inter dentes crepat, neq; uetustatem ferre
 potest: sed citò bonitatem amittit, & tandem putrescit, amissis colore, saporis gratia,
 & uiribus, & ascitis alienis quantumuis diligenter reponatur, qualitatibus, nigro co-
 lore, *acoro & acrimonia. Rorem autē melleum non esse Saccharum, ipsa etiam for-
 ma indicat: Melleo enim rori cum in micæ concreuit, forma est rotunda, & globosa,
 quemodmodū singulis roris & aquæ guttis: ut omnes quibus ueram Mannā uidere
 licet, deprehendent. Saccharū uerò nunc oblongam, nunc globosam, nunc Mannæ fi-
 gurā habet, ceu Mastiche, Thuris micæ, & aliæ quædam plantarū densatæ lachrymæ,
 ut manifestè appareat harundines id lachrymasse, & nō à cœlo descendente melleum
 rorē excepisse. Sapor etiam Saccharo non est idem qui melleo densato rori, hoc est,
 Mannæ. Saccharū enim syncerū admodū, & minime mixtū saporē præseferit, & totū
 in ore saliuā dilutum liquefcit. Mannæ contra non syncerus, sed mixtus est, ueluti si
 quis melle exceptam Similaginem gustet, ut etiam sacra scriptura testatur, nec ita
 facile liquefcit, sed inter dentes lentescit, Sed obiiciet fortasse nobis quispiam: etsi
 Tutrumq; materia melleus est ros: saporem tamen, consistentiam & formam utrisq;
 diuerfas accidere posse, ijs ipsius Manardi uerba obiciemus. Saccharū ab alia Man-
 na eo tantū differre dicentis, quod illud supra harundines cadat, hæc uerò super alias
 quasq; plantas & petras: quæ Manardi uerba si uera sunt, necesse est neq; materia,
 neq; forma, neq; magnitudine, neq; sapore, neq; aliqua alia qualitate ista inter se dif-
 ferre, præterquam rerum supra quas se demittunt diuersitate. Sed illud discrimen nul-
 lus unquam inter Saccharū & Mannam posuit præter Manardum, cui (etiamsi nihil
 nobis esset quod responderemus) in hac re fidem minimè habituri essemus, cum ipse
 huius causæ sit actor, & ad causæ suæ defensionem solus id dicat quidem, sed non
 probet. Magnitudo præterea apertè indicat Saccharum nullum rorem esse posse. Si
 quidem omnis ros paruis decidit guttis: & si melleus sit, in paruas concreuit micæ:
 Saccharum uerò in multo maiores quàm ros aliquis micæ concreuit: ut etiam non
 rarò maximæ auellane magnitudinem æquet. Forsitan hic quoque obrudetur no-
 bis in Manna frequentes esse micæ, Fabarum & auellane quantitate. Respondemus
 nobis certo constare Mannam in tantas micæ concretam non natiuam, sed dolo im-
 postorum confectam esse. Nam uera Manna exiguis constat granis. Micarum quo-
 que Sacchari paucitas declarat, id rorem non esse aut fuisse. Ros enim cum decidit,
 numerosis densisq; guttis decidit, omnia latè obtegens & conspergens, instar prui-
 næ, ut etiam sacra litera testantur. Sacchar uerò si melleus esset ros, non tantum in
 harundines caderet, sed in alias quoque uicinas arbores, frutices, herbas & gramen.
 Cum igitur nullus authorum id testetur, neq; experientia comprobet, sed in solis ha-
 rundinibus inueniatur concretum, ros esse non potest. Cur enim hic in harundie-
 nes tantum caderet præteritis tot aliarum plantarum generibus, maiore spacio facia-
 lius hunc excepturis. Sed dicit Manardus noster aptiora esse harundinis folia ad
 tolerandum maiora Sacchari frustra. Atqui si robur foliorum harundinis causa est,
 ut in hac decidat hic melleus ros, quæso respondeat cur non in plures alias arbores
 & herbas se demittat, quarum folia & robore & latitudine multo maiora esse cōstat
 quam harundinis. Nos uero in uniuersum non concedimus Saccharum in foliis ha-
 rundinū inueniri. Nemo enim id unquam prodidit præter Manardum, qui hoc ex li-
 bito absq; ulla probatione dicit. Inuenitur enim (quod experientia sensibus nostris
 exploratū habemus) Saccharū nō in foliis, sed in ipsius culmis, qua oculi & germina ē-
 geniculis prodeunt concretū, Si autē ros esset, non ab erectorum culmorū superficie
 ad la-

quod de saccharo
 sit melleus ros.

Tutrumq;

N. d. Manna.

ad latus uergente exciperetur, sed foliorum latitudine cœlo expansa, si modo ea res panda essent. Quoniam uerò maxima eorum pars (ne dicam omnia) recta mucrone suo in altū attollitur, ueluti in nostris paludibus Tiphæ & Caricis folia, minime apta sunt cœlo decidentem melleum rorem excipere: nisi quis ea mucrone suo, hunc intercepte causetur, quod planè absurdum est. Sed hîc quoq; obiscetur nobis, Manardū de uera harundine loqui, cuius panda sint folia: nos uerò de Canna Zuchari nostri, quæ plurimum inuicem differant. At nos paulò post demonstrabimus non differre Cannas nostrum Saccharum fundentes, à Saccharum antiquum ferentibus harundinibus. Rorem postremo non esse Saccharum cōcretionis & resolutionis causa (quam Physica nos docet) clare ostendit. Melleus enim ros omnis diurno calore in pingue liquorem excoctus, nocturno frigore in micas densatur & concreuit. Notum autem calore rursus dissolui quicquid frigore concreuerit: utrumq; hoc melleo accidit rori, ut etiam ex sacris literis dicere possumus, quæ manifestè testantur rorem illū melleum, ubi sol in caluerit, liquefieri. Si igitur eadem materia constaret Saccharū & melleus ros, & eadem ex causa concreuerent, necesse esset Saccharum similiter sole incalescente aut alio calore quopiam sicco dissolui. Sed hoc non tantum non dissoluitur, sed durius solis calore euadit. Quod autē Saccharū efficit & densat, melleū rorē dissoluit & destruit. Quapropter Saccharū nihil minus est quam melleus ros cœlo in harundines delapsus. Quod autē scribit Manardus parum à Manna differre Saccharū, neminem persuadebit, cui hæc que modo diximus, probè intellecta fuerint. In quarta autem positione, non opus est refellere quod tradit tam Saccharum antiquorum, quam Mannam sub roscido seu quod idē est aëreo melle tanquam genere contineri: siquidem iam ostendimus Zacharum non esse rorem. Porro si Saccharum roscidis mellis species non est, nemo illud sub hocce genere contineri affirmabit. Quod autem in quinta dicit Zacharum non esse Cannæ succum, postea falsum esse ostendimus, cum quid reuera sit Saccharum dicendum uenit. Rorem uerò non esse iam ostensum est. Omnium autem maxime inuiti legimus, Manardum affirmare etiam Galenū putasse Saccharum melleum esse rorem: cum tamen nusquam hoc uel minimo iudicio prodiderit. Si enim Saccharum melleum rorem esse putasset, proculdubio de alimentorum facultatibus libro tertio eius mentionem fecisset, ubi satis prolixè de roscido melle disserit, Saccharum omnino præteriens: libro uerò septimo de simplicium medicamentorū facultatibus in mellis capite seorsim de Saccharo, tanquam re diuersa à roscido melle agit his uerbis: *καὶ τὸ ζάκχαρ δὲ καὶ μέλιον, ὅπως ἔστιν ἡ δὴς τε καὶ τὸ φησὶ αἰνόμενον ὅτι ἀραβίας νομίσεται, περιωήνεται μὲν, ὡς φασὶ καλὰ μοῖσι, ἐστὶ δὲ τι καὶ αὐτὸ μέλι τ' εἶδος*, quorum sensus est. Et Sacchar uocatum, quod ex India & felici Arabia affertur, ad densatur ut aiunt circumfusus harundinibus: est autem & hoc mellis species. Quibus uerbis nō innuit Galenus, rorem esse de cœlo cadentem supra harundines: sed quomodo rorē putare potuit, rem, cuius origo eum latuit: Dum enim dicit (ut aiunt) dubitat an addensetur in harundinibus Saccharū. Sed quod maxime urget, est quod Galenus dicat mellis esse speciem. Nam ita argumentatur Manardus: Mellis materia est ros: Saccharū est mel: Ergo Sacchari quoq; materia ros est. Per mel autē in maiore positū mel apum intelligit. Verum ad hoc respondemus, nō ualere argumentationē a specie ad speciem. Sed nondum cōstat, mellis ab apibus collecti materiā rorē esse. Et si Plinius id affirmare uideatur, & Galenus cōgenerem rori mellis materiā credat, de qua re post dicturi sumus. Esto autē, quod mellis generali uocabulo hæc mellis species cōtinentur, Mel apū, Mel roscidū & Saccharum, non tamen necesse est omnes eiusdē generis species ex eadē fieri materiā. Exempli gratia: si quis Diphryges metallicū medicamentū sibi proponat, quod tanquam genus tres habet species, sed materiā plurimū differentes. Primæ enim materiā lutū quoddā est: secundæ Pyritis lapidis feculenta & terrestris substantia: tertiæ ipse Pyrites lapis. Sed non solum singulæ eiusdē generis species diuersa nonnunquam materiā constant. Apū enim examina non solū nasci constat ex Iulorū in salice, Populo, Alno, Corylis nascentiū luteo succo, sed poline in fauis reposito, uerum etiam ē strangulato & putrefacto uitulo, ut Vergilius quoq; scriptū reliquit: Quare nō est mirum aliam esse materiā Mellis apū, & aliā Sacchari: quod tamen nō proprie, sed æqui uoce mel uocatur, quoniam instar apum

mellis dulce sit, quemadmodum Vrtica piscis, non quod herbe Vrtice similitudinē
 6 habeat, aut eadem materia constet, sed quia Vrticæ modo tactam cutem urat. Man-
 nam uerò in hoc tantum à Zacharo differre, quod illa super alias plantas & petras ca-
 dat: hoc uerò super harundines, ut in sexta dicit, antea quoque negauimus. Sed præ-
 terquam quod Manardo in hac credendum non sit, quoniā primus & solus id di-
 cat ad suæ opinionis defensionem, multa sunt quæ ostendunt, alias eorū differentias.
 Videlicet, utriusq; materia, consistentia efficiens, forma, sapor, quantitas, concretio-
 nis causæ & alia de quibus supra diximus, cum ostenderemus Sacchari materiā nō
 7 esse melleum rorem. Saccharū uerò antiquorum à nostro distinguens in septima, per-
 inde nobis non satisfacit: præsertim quod dicit, id supra ueræ harundinis folia con-
 crescere. Sed cum tot sint harundinum species, quæ lingulæ ueræ sunt harundines,
 miror ualde quamnam ueram ipse intelligat. Veteres simpliciter harundinem esse di-
 xerunt, & non speciem indicauerunt, in qua Sacchar gignitur. Multo autem magis
 miror quod dicit etiam in monte Libano, Sacchar supra harundinum folia concre-
 scere, cum tamen nullus prodiderit unquam, ex eo monte Saccharum petiit, nedum
 in harundinibus cōcretum, quibus natura est montes euitare, & in planis, aquosis &
 palustribus locis nasci. Sed decepit Manardum Aphrodiseus, Saccharum cum roscido
 melle confundens. Roscidum enim mel, hoc est Mannam, crebrò in Libanū mon-
 tem delabi etiam Galenus testatur, quod multum à Saccharo distare antea indicauit
 8 mus. Octaua positione in Manardo nostrum Saccharum ab antiquorum distin-
 guente, æquū iudicē desyderamus. Debebat enim ambas res iam perfectas & formā
 suā adeptas, inuicē conferre, & non crudum succū & rudem materiā nostri Sacchari
 antiquorū Saccharo cōferre. Postquam enim & nostrū formā suam acquisiuit, perine-
 decandidū dentibusq; salis modo fragile euadit: ut non opus sit per succū, sed etiam
 cum dentū molestia attritū, deglutire. Differentiam utriusq; Sacchari per efficientē
 causam ponens, impegit uehementer Manardus, quod dicit, uetus Saccharum primo
 nocturno frigore adglutinari, dehinc superuenienti solis calore obdurari. Quod quā
 uerū sit ipse melleus ros sole incalescēte tactus docet: nocturno frigore enim con-
 cretus superueniente solis calore rursus dissoluitur, & diffuens perit, ut omnes no-
 uerunt, qui matutino tempore serenis æstatis diebus in syluas prodeunt. Testantur
 etiam sacræ literæ, sole tactam Mannam, quæ idem est quod melleus ros, liquefieri.
 Quare absurdum admodum est, inde rem aliquam indurari, qua emolliatur & de-
 struatur. Sole autem non indurari, constat, quoniam Israëlita eam mane antequam
 sol accederet colligere, & in umbram referre cogebantur, alioquin delapsū succum
 & minime rem indurata inuenturi. Porro contraria causa Mannam seu melleum
 rorem efficit: ascendentes enim è terra dulces halitus in aërem eleuati à terreno pur-
 gantur, atque serenis diebus calore solis in dulciorem succum excocti sequenti noctis
 frigore concreti, ante diluculum alterius, roris aut pruinae instar decidunt: ut Gale-
 nus etiam ipse indicat libro tertio de alimentorum facultatibus in capite mellis, ubi
 aerei quoque mellis meminit, dicens: peritis naturæ interpretibus uisum esse, hali-
 tus è terra atq; aquis prodeuntes, solis calore exacte attenuatos accoctos, à frigore
 sequentis noctis in unum cogi ac densari. Debuisset ergo Manardus altius rei natu-
 10 ram & efficientem causam considerare. Differentiam autem inter antiquum & no-
 strum Saccharum à materia sumptum ponens, ideo suam non probare posse senten-
 tiam nobis uidetur, quoniam argumentum sumit à re, cuius origo authoribus exa-
 ctè non constat. Dicit enim, antiquo Saccharo eandem esse materiā quæ sit melli:
 Mellis autem materiā rorem esse contendit. Sed nos contrā probauimus, Sacchari
 materiā non esse rorem. Forma nostrum Saccharum ab antiquo distinguens, se-
 digna haudquaquam scribit: quis enim unquam uidit densatū aut sole aut igne
 succum, aut liquorem aliquem cuiuscunque plantæ, forma nostro Saccharo simi-
 lem? Omnes enim succi & liquores cum igne, ut Saccharum uulgare densantur, spissi-
 si, glutinosi, lenti, tenaces, minimè friabiles, ad contumendum contumacissimi & ni-
 griores euadunt, ceu succi Glycyrrhizæ, Gentianæ, Centaurii, utriusq; Lycii, Hypocis-
 stidis, & quotquot alii igne densantur: Saccharum autem in omnibus his densatis
 succis.

succis aduersatur: friabile enim, contusu facile, & candidum est. Præterea aspectu, candore, splendore, & crepitu ipso inter dentes adeo Sali est simile, ut non possit esse similius: de bono autem loquimur, quale est & Canariis Insulis aduectum, & quodcumque aliud a fine nomen habet: & non de foeculento, impuro, & industria ab impostoribus adiecta spuma sua adulterato: res enim ad perfectionem perductæ & formam suam iam adeptæ, inuicem conferri debent. Addit succum & cannis expressum, hoc est, nostrum Saccharum, nullum cum antiquo præter dulcedinis consortium habere, quod tam infirmum est argumentum ut seipsum dissoluat. Si enim dulcedine consortium habent, necesse est etiam temperamento & uiribus non discrepare. Ex sapore enim maxime rerum temperamenta & facultates iudicare, Galenus nos docuit. Quare si uiribus perinde ut dulcedine sibi hæc respondent, non dulcedine tantum consortium habent. At nos addimus etiam materiæ consortium habere. Vtrumque enim succus eiusdem est plantæ, ut postea indicabimus. Quod uero credit Manardus Galeno nostræ Saccharæ cannæ succum non penitus incognitum fuisse dicenti, calamorum, præsertim Aegypti, radices dulces esse, libro quarto de simplicium medicamentorum facultatibus, a ueritate est alienum. Minime enim sermo illi est de Cannis Saccharum ferentibus, summa propemodum dulcedine, ut mel, præditis: sed de uulgaribus harundinibus atque certo eorum genere dulciore, & de aliis quibusdam rebus aqueam dulcedinem (dum uirides sunt) præferentibus, inter quas etiam Gramen est, & plerarumque arborum germina. Quod autem per dulces Aegypti harundines, non intelligat Canas Sacchari, perspicuum fit Theophrastum (ex quo hoc de Aegypti harundinibus sumpsit Galenus) legentibus libro sexto de caulibus plantarum, cap. xvi. ubi causam indicat, quare nonnullis herbis dulces sint radices, reliquæ uero earum partes, quæ supra terram attolluntur, insipidæ existant, his uerbis: *ἡ πάλιν διὰ τὴν ὀνύχην τῶν αὐτῶν καὶ τὰ πρὸς τὴν γῆν καὶ ἐπὶ τῆς αὐτῆς τὰ καλαμῶν. ἡ γὰρ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς τὰ κατὰ τὸ δένδρον, ἐν γῆ καὶ ἐν αὐτῇ. Quorum sensus est: Aut econtra propter siccitatem eorum quæ sunt superiora: quemadmodum gramen & simpliciter omnia harundinacea: sicca enim sunt horum partes superiores, inferiores uero humidæ. Hæc autem Theophrastus de uulgaribus harundinibus in Europa cognitis scribit: atque iis etiam quæ harundinibus non sunt dissimilia, aut foliis, aut geniculatis culmis, aut utrisque, ut Sisyrinchium, Gladiolus palustris, &c. per inferiora autem earum herbarum Theophrastus intelligit radices, quæ dulces sunt. Per superiora uero culmos & folia. Hunc autem locum ideo ex Theophrasto exscripsimus, ut sequentia de Aegypti harundine facilius intelligantur, de qua in hunc modum scribit. *Διὸ καὶ ὁ πορ πλείων ἐν τροφίᾳ, καὶ τὰ αὐτὰ φέρεται ἐν γῇ, ἐν δὲ τῇ γῇ: κατὰ τὴν αὐτὴν αἰγὺ τῇ τῷ καλαμῷ τῷ οὐ τοῖς ἐλεσιρ. ἔχει μὲν γὰρ τινὰ γλυκύτητα ἐν αὐτῇ, καὶ τῶν ἄλλων, ἀλλ' ὅτι βαρὺ καὶ παύω. ἐκείνη δὲ ἐστὶ τῇ τροφίᾳ ἀπαλὸς γ' αὐτὴ πλείον ἐν γῇ καὶ γλυκύς. ἔχει δὲ καὶ τῇ γλυκύτητα, μέχρις ὅτε αὐτὴν φέρει τῇ σιρ: αὐτὰ φέρει τῇ σιρ δὲ ἐκείνη, quod est: Propterea etiam ubi plus est boni alimentii, etiam superiora eorum quæ natura sicca sunt, esui apta fiunt: quemadmodum in Aegypto harundinis, eius uidelicet quæ est in paludibus: habet enim quandam dulcedinem, etiā alioqui summitas, sed per exiguam, omnium: hæc autē propter alimentii bonitatem & copiam, tenera præ ceteris est, ac dulcis: habent autē & radices eam dulcedinē usquequo exiccentur, resicata uero minimē. Quibus uerbis Theophrastus docet, Aegyptiam illam harundinem natura siccam & insipidam esse, quod ad folia & calamos attinet: quoniam uero in paludibus nascatur, alimentii bonitate fit, ut parte sua superiori, tenera & dulcis euadat. Nili enim aqua natura dulcis est: quo fit ut plurimarum herbarum in paludibus eius & circa nascentium radices edendo sint & dulces. Itaque si eadē harundo extra paludes proveniret, dulcedinem illam in summitatenō haberet. Sed ut res se habeat, constat hanc Aegyptiam harundinem non esse eandem cum Sacchari canna, quoniā illa per accidens propter alimentii dulcedinem dulcis euadit: hæc uero natura talis est: illam Theophrastus dicit aliquam habere dulcedinem, hoc est, non magnam nec insignem: hæc uero maximam & cum melle certantem: illa minimē tota dulcis est & breui admodum parte in summitate qua tenera adhuc est, & humidā: hæc per totum calami diffusam dulcedinē habet: illius radices eō usque dulces manent, donec humide sint, exiccatæ uero dulcedinem amittunt: canne uero Sacchari cum radices tum ca-**

lami etiam exiccatæ dulcedinem suam feruant. Quapropter nobis non persuadet Manardus, Theophrastum aut Galenum per Aegyptias harundines Saccharicannas intellexisse. Quod uerò neque Solinus, neque Galenus, neque Varro succum cannarum Saccharum uocauerint, aut esse scripserint, nihil impedit quo minus eadem cannæ tam factitium quam natium Saccharum fundant. Illud etiam ex libito dicit, nulla neque autoritate, neque experientia fultus, quod scribit harundines, in quibus antiquum Saccharum concresecat, ueras esse harundines, duras, leues, & intus uacuas. Putat enim Manardus ueras esse eas harundines tantum, quæ apud nos in Europa nascuntur & concuæ sunt. Sed meminisse debebat Manardus etiam inter uulgares Europæ harundines (quas ille tantum ueras esse credit) certum genus, quod non cauum sit, sed solidum densumq;: qualis quæ uas Græcis à soliditate, & Latinis Sagittalis uocatur. Authores autem simpliciter & indefinite tradiderunt in harundinibus Indiæ & fœlicis Arabiæ Saccharum concrescere: nec dixerit nostras aut uulgares esse harundines, sed Indicas, etiam Varone scribente:

Harundo
sagittalis.

Indica non magna nimis arbore crescit arundo,
illius è lentis premitur radicibus humor:
Dulcia cui nequeunt succo contendere mella.

Porro Theophrastus ubi res in India nascentes enumerat, scribit nullâ omnino arborem, nullum fruticem, nullam herbam in India comperiri similem his quæ in Græcia proueniant, paucis exceptis, quod Alexandri, res in India gerentis comites, reuersi retulerunt. Quapropter haud mirum alicui uideri debet, Indicas etiam harundines non per omnia in Europa natis similes esse. Habet tamen India eadem arborum, frumentorum & leguminum genera, quæ apud nos proueniunt, ut tradunt authores: fert enim Nucem, Ficum, Vitem, Oleam, Castaneam, Palmam, Triticum, Hordeum, Milium, Fabam, Lentem, Lupinum, Smilaces satiuos, & alia pleraque quæ ad nostrarum plantarum genera referuntur, sed specie & magnitudine à nostris differunt. Minime igitur absurdum est harundines quoque Indiæ à nostris differre, quamuis Cannæ Sacchari, tantum succi dulcedine, crassitudine & crebrioribus geniculis à Nasto uocata in Europa harundine distent. Plinius t̄ certè adeo non dubitauit diuersas esse à nostratibus Indiæ harundines, ut etiam prodiderit singula eius internodia, alueo nauigabili ternos etiam homines ferre: aliam eis naturam quam nostris & arboream amplitudinem tribuens: at ne fabulam scripsisse uideatur, addit: quales uulgò in templis uidemus. Res enim peregrinas uisui raras & insolitæ magnitudinis publicis locis reponi solent: quemadmodum apud nos quoque uidere est in templis Indiæ testudinis immanes testas, ac horrendæ uasitatis Balænarum ossa. Ratiocinatur etiam in hunc modum Manardus: Zucharam Alhusar est Manna cadens supra plantam Alhusar, cui easdem uires Auicenna tribuit, quas Græci suo Saccharo. Ergo idem est cum Zuchara Alhusar Græcorum Saccharum: ex quibus adhuc colligit Saccharum melleum esse rorem. Sed miramur uehementer ipsum suffragia ab Auicenna petere, quem usque adeo detestatur, & cuius nullam facit autoritatem, nec si qua sit admissurum se protestatur, nisi id in gratiam amici faciat. Nos uerò haud temere Auicennam hoc dicentem reiciimus, etiam si contra nostram sententiam scribere uideri possit. Ideo autem hoc Manardi argumentum reiciimus, quoniam per Hahoscer, quod idem est cum Alhusar Auicennæ, non eandem omnes plantam intelligunt, aliis rectam & proceram quamdam plantam, aliis certam Tithymali speciem sic uocantibus. Præterea non conueniunt inter se in definiendo Zucharo Alhusar authores. Auicenna enim dicit id Mannam esse, quæ cadat supra plantam Alhusar. Serapio contra autoritatem Abrionisæ, scribit Zucharam Hahoscer egredi ex oculis ramorum suæ plantæ, & à locis foliorum eius, hoc est, quæ folia à planta sua & oculis enascuntur. Quare cum ille Mannam esse dicat, hic uerò lachrymam ex Hahoscer emanantem, nondum composita controuersia nullum suggerit Manardo argumentum. Nos tamen credimus Hahoscer plantam esse, cannæ Sacchari non dissimilem: quæ perinde ut Sacchari canna Saccharum ab oculis emittat, sed sui generis & minus dulcis, quam uerum Saccharum, atque adstrictione & amaritudine etiam ab eo differens.

† Lib. 16.
cap. 35.

Zuccharū
Alhusar.

Hahoscer.

rens: Si autem contingit etiam Mannam supra Hahoscer cadere, poterit hæc Manna Albusfar uocari, ut etiam Anticennæ salua maneat fides & autoritas. Quod uero eadem sit materia Mellis apum, Mannæ, & Sacchari antiquorum, haud quaquam concedendum putamus. Diuersa autem à Manna esse Saccharum antiquorum materia, antea ostendimus. At hoc loco demonstrabimus aliam à melle apum materiam habere, atque adeo etiam ipsum apum mel non esse rorem, sed plantarum succum. Saccharum est singularis & cuiusdam certæ harundinis oculis instar Gummi & lachrymæ alicuius erumpit. Mel apum uero non in una aut certa, sed omnis generis plantis gignitur, tam arboribus quàm fruticibus & herbis. Saccharum in sole positum durius euadit, Mel apum solis calore liquefcit & diffuit. Saccharum cum ad formam suam peruenerit, salis modo in minutissimum puluerem redigi potest. Mel apum in puluerem haud quaquam tundi potest. Præterea sol in unam eademque materiam unam & eandem imprimit operationem. Clarum autem est solem aliam in mellis apum, aliam in Sacchari materia operationem exercere. Illud enim in liquidum coquit succum: hoc uero in durum, solidum, crepituque dum confringitur, aut dentibus conficitur, dissilientem, ueluti salelem, conuertit. Quare si eadem esset materia Melli quæ Saccharo, alterum alteri simile esset, & utrumque aut liquidum aut durum euaderet. Nam ubi omnes aut præcipuæ causæ sunt eadem, idem etiam effectus sequitur. Propterea unum idemque cum sit & mellis & Zachari efficiens, solis uidelicet calor, eadem etiam consistenteria & Melli & Zachari esset, si eadem materia constarent. Iam uero quia alia Mellis, alia Zachari est consistentia, etiam natura materiam horum inuicem differre necesse est. Postremo si utriusque materiam rorem ueteres esse credidissent, haud quaquam Mannam, *Δροσμέλι*, id est, mel roscidum uocassent. Nam dum Mannam uocant roscidum mel, ad differentiam mellis apum, sumunt apum mel rore non constare ut Mannam: (nūcad alteram propositi partem uenimus, ostensuri mellis apum materiam:) Rationes uerò & argumenta, quibus id demonstrant, non afferunt, quod enim Plinius ea de re scribit libro undecimo, nulli Philosopho altius mellis naturam perferutanti satisfacit. Quod autem diuersa sit mellis apum materia à rore, multæ mellis & apum proprietates palam ostendunt. Mel enim semper quocunque ueris & æstatis tempore in floribus reperitur. Mellei autem rores non semper, sed rarissime apud nos decidunt. Mel tam noctu quam interdiu in floribus reperitur: Melleus ros tempore tantum matutino. Mellis circa Meridiem plurimum in floribus deprehenditur: Melleus ros incalecente sole statim perit: Mel dum in floribus continetur semper est liquidum: Ros melleus concretus est. Mel apum in floribus continetur: Ros melleus super folia plantarum decedit: Mel uetustatem non tantum per se ferre longam potest, uerum etiam omnia alia quæ hoc excipiuntur in multos annos conseruare, quod Theriaca, Mithridatium, & alia huiusmodi confectiones clare ostendunt. Ros uerò melleus, hoc est, Manna, ne solus quidem incorruptus unum atque alterum annum durare potest, nedum alias res à corruptione tueri. Itaque in fauis etiā, aut fauis expressum mel, breui corrumpetur, si melleus ros apum mellei materiam præberet. Præterea in Septentrione apud nos maxima mellis est copia, ut in Lithuanîa, Liouonia, et uicinis regionibus, in quibus tamē rarissimi mel lei rores conspiciuntur. Porro si ros est mellis materia, quærimus quid fiat, quod hic in flores tantum decadat. Cœlo enim delatus in ea potius se demitteret quæ lata & expansa sunt, ueluti folia plantarum, & minime in tantillos flores: quoniam uerò mel non in foliis plantarum sed floribus reperitur, atque ijs non totis, sed absconditis eorum anfractibus & posteriori tantum parte atque recessu, haud uerisimile est mellis materiam rore constare, quomodo enim his præteritis latissimis etiam foliis, in florum ultima penetralia tanquam furtim irrepens atque ex industria in latebris se abscondum recipere potest? Postremo constat omnibus, qui usque ad extremam senectutem apum naturam scrutati sunt rusticis, apes ipsas mellificaturas, tantum è floribus collectum liquorem in fauis reponere. Rores uerò melleos cum decidunt, haud quaquam ad fauos reuehunt: quod ipsi quoque uerum esse deprehendimus. Præ

Quod ros
neq; Sac-
chari mate-
ria sit, ut
predictum
est: neq;
Mellis, ut
dicitur.

T
quo tem-
pore,

G iiii

terea mellito rore delapso ad hunc frequentes quidem conuolant apes, minime ut eū in aluearia reuehant, sed tanquam ad cibum & pastum: quo adeo se replent, ut prorsus inertes et iguauē reddantur, multę emoriantur. Itaq; rustici dicere solent, mellitos rores bonū quidem pastum apibus prebere, sed ad mellificationē minime cōducere. Interim enim dum roris suauitate allectę cibi auidę detinētur, nihil ad aluearia conuehunt. Quapropter nemo nobis persuadebit, rorē, mellis apum materiā esse. Cū uerō res ipsa constet, necesse est alicunde materiā & originem trahere. Nos quidem credimus, haud absurdis rationibus moti, Mel quod apes colligunt, nihil aliud esse quā dulcissimum cuiuscunq; plantę succum, a sole ad extremas eorum partes (quales, flores sunt) elicitum & perfectē excolatum & excoctum, dum per tantum spacium ad flores trahitur. Itaq; cum tempestiuos imbres serena cœli constitutio sequitur, plurimum mellis gignitur, imbre succum & materiā plantis præbente, sole uerō in dulcem liquorem excoquente. Nonnunquam uerō cum melli gignendo aptissimus fuerit annus, mel non tantum in floribus latitat, uerumetiam ē furculorum dependens apicibus, oculis & nodis destillat, ut aliquoties in Malo & Quercu obseruauimus: & ut certō sciremus an hoc mel in ipsis gigneretur furculis, uel an ros esset melleus furculis exceptus, mel ab iisdem furculis pluribus diebus abstergentes, singulis diebus inuenimus renascenti melle eosdem furculos madefactos, etiam cum nulli caderent mellei rores. Postremo rursum abstergos furculos incidimus, et intra corticem lignumq; eundem liquorem deprehendimus. Nihil autem ab alio melle florum, do-liolis & calicibus contento distabat hic liquor. Quapropter non est, quod credamus mel, quod apes conuehant, rori cognatum esse, aut ex rore materiā sumere. Sed longius quā locus postulabat hac dere diximus. Quoniam uerō nōnihil ad rei cognitionem hæc facerent, & Manardi argumentum diluerent, celare ea legētes nolui-mus. Alexandri uerō Aphrodisei autoritas haud quaquam confirmare potest opinionem Manardi, contendentis, Saccharum rore constare, siquidem mancum, mutilum & confusum chaos, eius est exemplar, & prorsus sui dissimile, tum quod ordinem, tum sententias attinet. Tres enim Alexandri huius problemata interpretati sunt, uidelicet Georgius Valla, Theodorus Gaza, & Angelus Politianus, sed singuli diuersum nacti sunt exemplar. In duobus quidē eorum, a Georgio Valla et Angelo Politiano uersis, prorsus non leguntur hæc sequentia uerba a Manardo & Fuch-sio in subsidium uocata. Quod Sacchar Indi appellant mellis coagulum est, sole co-gente rores, conuertenteq; ad mellis dulcedinem, quod idem monte etiam Libano fie-ri certum est. Fit Sacchar id proximum salis glebulis, candidum, friabile. Solus autē Theodorus hæc in suo exemplari inuenit. Sed non pertinere ad id problema hæc uer-ba, manifestē testatur problematis argumentum quod querit. Cur mel commendetur quod acrius sentiatur: & cur amarius, incallescens reddatur: ad cuius questionis so-lutionem nihil prorsus facit meminisse Sacchari & *albanorū mellis, uiresq; eorum recensuisse. Adiectitium igitur est quidquid ultra questionem eiusq; solutionem pro-blemati adscriptū est. Quin & ipse Theodorus eorū uerborū quibus Manardus niti-tur interpres, palām indicat in præfatione ad Nicolaum, qui tum summum pontifi-cem agebat, hoc opus non esse Alexandri Aphrodisei, sed alicuius multo recentio-ris. Quapropter cum minime constet, ad quem authorem hæc problemata referri de-beant, & cum exemplaria uariant plurimum, ut prorsus sibi dissimilia sint, quis credet notha hæc Alexandri uerba Manardi opinionem confirmare posse? Serapionem uero quatuor aut quinq; Zachari genera enumerantem, uulgare hoc penitus præte-rissem nemo concedet, qui nouerit quid sit Zacharum Tabarzet, ita enim appellant fa-citium aliquoties despumatum, donec purissimum, solidissimum & candidissimum e-uadat. Porro Vincentius Caprilis haud quaquam Plinio & aliis antiquis repugnat, Sacchari antiqui & uulgaris eandem esse materiā dicens: & ueteres non ideo Sac-chari in mellis capite meminisse, quoniam eadem hæc materiā constare crediderunt, sed quia cognata congeneribus adiungere consueuerunt, hoc enim Vincentii Capri-lis iudicium nobis admodum placet. Quemadmodum enim nullus ē ueteribus dix-it Saccharum rorem esse, ita etiam nullus eorum eandem materiā utriusq; Saccha-ri esse negare potuit, quoniam natiui tantum meminerunt. Vulgaris uero faciendi ra-tionem

Alexandri
Aphrodisei
problemata.

mulla

Mel gignit.

tionem ignorauerunt. Quod uero Dioscorides uno eodemque capite nunquam agat *Saepe eodē*
 de diuersis toto genere rebus, ut Manardus causatur, palam falsum deprehendunt, qui *communi*
 apud eum authorē caput Brassicę, Sisymbrii, syluestris Cymini, Libanotidis, Lonchi *nomine a-*
 tidis, Cannalis, Polygoni, Symphyti, Tribuli, Graminis, Tragii, & Aconiti, legent & *pud Diosco-*
 intelligent. Quid enim simile cū alia quauis Brassica, marina Brassica habet, quam Sol *ridem res*
 danellam uocant, seu florem, semina, radices, uiticulas, folia spectes; aut saporē consy *toto genere*
 deres: herba enim est lacte manās et toto genere à Brassica differens, nullūque preter no *diuersas nū-*
 minis consortium cum ea habet, preterquam quod nonnunquā in cibos recipiatur ut *cupari: dū-*
 medicamentū potius quam alimentum. Ad eundē modum alterū Sisymbrium Car- *modo leuis*
 damine cognominatum, toto genere à primo uero Sisymbrio dissidet: cui solo nata *aliqua simi-*
 li idem est, figura uero & qualitatibus diuersissima, quid enim quāso Nasturcium *liudo eis*
 cum menta commune habet? Multo magis etiam à syluestri Cymino differt alte- *contigerit.*
 rum syluestre Cyminum, quod Cornuetiam Galli uocant. Quippe uerē Nigellę
 species cum sit, semenque suum in Corniculis contineat, quam similitudinem cum Cy-
 mino umbellifera herba habere potest? Quid etiam ultimam Libanotidem, cuius
 Theophrastus meminit, uerę & umbellifera Libanotidi cognatam facit: Nihil pror-
 sus certē quod ad figuram uiresque attinet: est enim è lactuca genere, nec quidquam
 habet, quo umbelliferas plantas imitetur. Idem multo magis apparet in Lonchitide,
 cuius altera species longo assurgit caule: altera eo prorsus caret, illa folia Porri, hæc ue-
 ro Polypodii habet: quibus haud potest magis dissimilis esse figura. Cannabis sylue-
 stris quoque quoniam Altheę similis est, nihil prorsus eum cannabe commune habet, pre-
 ter corticis lentore Polygonon quoque mas à scemina Polygonon usque adeo figura dif-
 fert, ut non possit magis differre. Idē Symphyto accidit: cuius altera species Serpylli et
 Origanī, altera uero Buglossę potius similitudinē refert. Tribulus quoque terrestris so-
 lo fructus aculeo palustre emulatur, reliquis notis prorsus dissidet. Idē in Gramine ui-
 dere est: siquidē aliud quod uis longo, angusto, acuminatoque constat folio ceu harundi-
 nes: Parnalium uero hederaceorū figuram habet. Parimodo toto cœlo differūt Tra-
 gium Creticum, & alibi natū: illud enim, ut alia omittamus, Lentisci, hoc uero Scolo-
 pendrii foliis constat: utriusque uero nominis causam præbuit Hirco similis odor. Postre-
 mo manifeste etiā Aconiti species id ostendūt. Pardaliāches siquidē Cucumeris: Ly-
 coctonon, Platani folia refert. Illud longa, & tenui, & geniculata constat radice: hoc ue-
 rō longē dissimili. Illud breuem, singulārē, & in nullos ramulos aut adnata diuisum
 profert caulem: hoc uero multiplicē ramosumque. Quapropter cum pleraque iisdem ca-
 pitibus toto genere diuersa à Dioscoride describantur, nullius est momēti quod con-
 tra Vincentiū Capilem pretendit argumentū Manardus noster. Quemadmodū igitur
 iam enumeratę herbe, quauis aliis, cū quibus idē nomen habent figura & reliquis
 accidentibus, dissimilime sint, nomen tamen ideo earum adepta sunt, quoniam aut ui-
 ribus, aut natalibus, aut odore, aut alia quadam singulari natura illis respondeant. Ita
 etiam Saccharum, quoniam non tantum dulcedine, uerum etiam uiribus melli cogna-
 tum sit, multo aptius mellis nomen sortitum est. Itaque quod Dioscorides post alias
 mellis species etiam Saccharum recenseat, minime probat eadem materia & mel &
 Saccharum constare. Hactenus Manardi argumenta diluimus, cuius uestigia
 etiam Leonhardus Fuchsius ingressus est, pariter ut Manardus contendens, non tan-
 tum efficiente, forma et uiribus, uerum etiam materia differre nostrū uulgare ab anti-
 quorum Saccharo: nostrique Cannas Sacchari non esse eas harundines, in quibus uete-
 rum Saccharū concreuit. Sed quia eadem illi sunt quę Manardo argumenta, iisdem
 etiam rationibus quas antea attulimus dissoluenda præterimus. Restat autem
 ut probemus ex eadem fieri harundine & ueterum & nostrum Saccharum, qua qui-
 dem in re minime per longas ambages ingrediemur: cū antē ulterius quā cōmen-
 tariū magnitudo postulet, sermonem protrahere coacti fuimus. Sed omissis pluribus
 quę ad confirmandam nostrā sententiam facerent, statim quid res sit dicemus. Pro-
 nunciamus igitur easdem Cannas & ueterum & nostrum Saccharum gignere: illud
 quidem natura ceu lachrymam aliquam expellere, hoc uero industria humana ac ui-
 lentia prelas funderē. Quod palā sit Auicennę caput de Saccharo legentibus, utriusque
 enumerantis. Tabarzet uidelicet et quod ueluti Gummi ab harundine assumitur. Per
 Tabarzet

Quærendū
hoc an uerē
dicatur.

Saccharum
Dioscoridē
mellis no-
mine uocat
se non quod
substantia
ei cognatū
sed dulcedi-
ne et uiri-
bus.

Leonhardus
Fuchsius.
Probat Sa-
charum ue-
terum et
nostrum, ex
eadem har-
undine esse.

Tabarzet enim intelligitur ē Cannis expressum prorsus depuratum & candidissimum: per hoc uero quod ueluti Gummi ab harundine assumitur natium, cuius ueteres meminerunt. Interim enim dum scribit assumptum sicut Gummi, indicat alterum uidelicet Tabarzet non esse Gummi seu lachrymam, sed succum eiusdem Cannæ, in qua natium cōcrescit, quod manifeste declarat uerborum contextus, series et ordo. Sed non multifacienda fortasse quibusdam innato odio aduersus Arabes medicos exacerbatis, Auicennæ authoritas uidebitur, quibus ipsam experientiam omnes controuersias conciliantem, & ueritatem certissime indicantem, opponemus. Accepimus autem à plerisque qui Canarias uocatas insulas aliasque regiones perlustrarunt, etiam Ideotis in nullius gratiam dicere paratis, ē Sacchari Cannis erumpere liquorem, qui solis calore sponte in Saccharum conuertatur, interdum pellucidum ut candum factitium uocatum Saccharum: interdum uerò candicans, & non pellucidum, sed uulgo negligi, quoniam nō magna eius copia proueniat, quod quidem nos ex relatione aliorum accepimus, ante aliquot annos, sed altero hinc anno cum missam rassel, qui id quod iam diximus, retulerant. In oculis enim Cannæ atque ea parte qua foris genicula amplectuntur, concretas Sacchari micas pisi magnitudine deprehendimus, itaque haud uulgari gaudio affecti, hanc Cannæ partem ad alia, quæ chara nobis sunt, reposuimus. Quapropter quia oculis nostris id conspeximus, manibusque palpauius, certò affirmamus eandem esse materiam & nostri & ueterum Sacchari, & solo efficiente differre. Vulgare enim igne & industria humana, ueterum uerò natura & solis calore excoctum perficitur. Porro hæc de Sacchari, Mannæ, & Mellis materia dixisse sufficiat.

In aqua. Cera est apum simplex fauus, in cellulas digestus, quæ excolato omni melle, in qua per se liquata in orbes funditur, omnibus nota, Medicinæ & rei domesticæ ad multa utilis. Sequitur autem Cera mellis sui naturam, unde aliud Sardoæ, aliud Ponticæ, aliud uulgari est temperamentum. Candida autem Cera, quam Plinius puniceam, nonnulli Tyrrenam uocant, qua ratione fiat, Dioscorides docet: fit autem plurima Venetiis, unde ad nos affertur.

DE CERA. CAP. 106.

* Cera alba, alia factitia est: alia naturalis, quam apes nouelle conficiunt, Juncfrawen wachse.

Fuit quondam magnus Propoleos in medicina usus: nunc uero omnibus incognita est. Arabes Mum uocant. Sed male eorum interpretes per eam sordes alueorum intelligunt, multum enim ab his differt. Sordes enim in fundo reperiuntur, suntque derafa apum pedibus à fauis ramenta. Propolis uerò nihil est quam Betulæ & populi lachryma ab apibus collecta, ut aluearium conuernosas partes exaequant, & foramina contra frigus obturent. Germani Bet & Stropwachs uocant. Est autem insigne medicamentum, in omnibus aluearibus repertu facile, odore styracis. In quo non uulgare officium apes nobis præstare natura uoluit, quia enim tenuem harum arborum lachrymam difficillimum fuit hominibus propter paucitatem colligere, illarum industria res utilissima nobis constat. Efficacior uerò Cretica & Pisidica est Propolis, cuius maiorem partem apes ex styracis lachryma & ladani pinguedine colligunt.

DE TRITICO. CAP. 107.

Enumeratis animalibus, eorumque partibus, & uictui & medicinæ utilibus, ad ea quæ frumentacea dicuntur sermonem uertit Dioscorides. Sunt autem frumentacea, quæcumque geniculato culmo & harundinaceis constant foliis, semenque panificio & pulibus aptum in spicis aut iubis producant, ceu Triticum, Hordeum, Milium, Panicum, & quotquot his similia existunt. In tanto autem frumentorum numero, nominumque ancipite significatione, authorumque in ijs indicandis ac nominandis inconstantia, difficillimum est omnia hæc suis nominibus proprie appellare. Quare cum omnes ueteres authores & ipse etiam Galenus nihil certi nobis reliquerint, arbitramur nos quoque ueniam mereri si in appellandis omnibus defecerimus: præcipua tantum quorum frequens per Europam usus est suis appellationibus ostensuri.

Princi-

Ordo Dioscoridis.
Frumentacea que.

Aliqui
Sunt
hæc.

principem autem locum inter omnia Europæ frumenta triticum tenet, quod præcū
 dubio est quod Germani Weizen / Græci *πρωψ* uocant, Galli frumentum, generis
 uocabulum speciei tribuentes : quanquam plerique etiam far, frumentum appellant.
 Sunt autem Tritici species, Robus & Siligo. Robus uocatur densius, solidius, et pon
 derosius. Siligo rarius, & leuius pondere: sed candidius Triticum. Est & alia Tritici
 distinctio: semestris, et trimestris: illud ante hyemē, hoc uero initio Veris seritur, qua
 re alterum Winter weizen / id est, hyemale Triticum : alterum Sommer weizen / id
 est, æstiuum Triticum Germani uocant. An uero idem sit Robus cum semestri, neq
 negare, neq affirmare ausumus. Credimus tamen haud sine causa non differre Robū
 a semestri, nam a semestri non distinguunt id authores, neq Columella cum species
 Tritici recenser, semestris meminit, sed Robi, quasi idem cum eo crediderit & ipse.
 Quemadmodum quoq Robus Siligini præfertur pondere & magnitudine, ita etiā
 Semestre Trimestri, quod & Sitonium dicitur, & Siliginis species existit, †

Triticum.

Robus.
Siligo.†
Similago
hic est spe
cies farina
ex tritico.

DE HORDEO. CAP. 108.

Hordeum, absq ulla controuersia, est quod Germani Gerste / Græci *κριθή* uocant,
 eius species apud Columellam sunt: Hexastichum, Galaticum nonnullis uocatum.
 Est autē Hexastichum quod hodie uocant Hordeum sine tunica: quoniam in folli
 culis nudum gerit granum, figura & colore tritico non dissimile, feni sunt spicis semi
 num ordines, seu uersus, unde & nomen apud Græcos inuenit, Germani Welche &
 Römische Gerste / hoc est, italicum & Romanū Hordeum uocant, quoniam ex Ita
 lia primum ad nos allatum est. Distichum Hexasticho, quod ad granum attinet, non
 dissimile existit: sed binis tantū uersibus semina spicam constituunt, quod nomine et
 iam præfert, quod autē uersuum numero decedit, culmorum multitudo restituit:
 qui frequenter uiceni, triceni, quadrageni ē singulis granis exeunt. Nos etiam plures
 quam sexagenos uno semine emissos uidimus. Germani Fasel gerste / hoc est, fœcun
 dum Hordeū uocant. Virūq apud nos Vere seritur, & nō ante hyemem. Præter hæc
 duo Hordei genera, adhuc quatuor in Germania rustici nouerūt. Primum candido,
 ponderoso, omnīq maximo grano constat, Hells Andach dictum. Secundū hoc
 paulo minus granum fert, & pauciores uersus, atque semestre existit: ideoq nostris
 Winter gerste / hoc est, Hyemale hordeū nominatur. Tertium Vere seritur, æstate
 perficitur: quapropter Germani Sommer gerste / hoc est, æstiuum Hordeum id ap
 pellant. Quartum proprie Trimestre dici potest: quoniam præcox est, & tertio men
 se maturefcit. Germani hoc Kleine Gersten / & Feyer gerste (seu, ut Saxones dicunt,
 Firtgerste) hoc est, paruum & temporale Hordeum appellant. Seritur æstatis ini
 tio, tertio die ante & post Pentecosten.

HÆC HACTENVS EX SECVNDÆ, EMENDATA ET AVCTA AVTHORIS E
 ditione. Quæ uerō deinceps sequuntur, quoniam ab authore (opinor) morte præuento, perfici non potuerunt, ex pri
 mæ editione, quæ Francofordiæ olim publicata est (cum Gualtheri Riniij Dioscoride) continuauimus: ita ut ea quoq
 emendatiora & magis illustra demus, cum alijs, tum ex breuissimis quibusdam ipsius CORDI postremis in quinq
 Dioscoridis libros Annotationibus, quas manus scriptas accepimus.

ZYTHVM ET CVRMI. CAP. 109. 110.

Zythum & Curmi ueteres appellabant ex frugibus facta pocula, qualia illa mul
 ta sunt ceruissæ genera in Germania.

ZEA. CAP. 111.

Zea Latinis Zea, Germanis Dünckel uocatur.

* Zea simplex, Einkorn / Zea dicoccus, Zweikorn.

CRIMNVS. CAP. 112.

Crimnus crassior farina Tritici & Zeæ est, quamuis etiam ex alijs frumentaceis
 fiat. Vnde plus postea conficitur, * (ueteres polton & poltarion uocant.) Germa
 mani Griesch uocant.

OLYRA. CAP. 113.

Olyra, ni fallor, uulgare illud est frumentū, quod Germani Rocke / siue Rogge / uo
 cant.

ANNOTAT. VALERII CORDI

cant. Hoc si non fuerit apud ueteres, Olyram non habemus, & quid *Xocken* sit, ignoramus.

ATERA. CAP. 114.

Athera est ex tenuissima farina liquidior facta pultricia, quā Germani etiam *Saisf* uocant.

TRAGVS. CAP. 115.

* *Samel-*
fern, Tragus quale sit frumentum, & quo nomine appelletur, non cuius cognitum esse puto.

AVENA. CAP. 116.

Auena duas habet differentias. Vna enim frumentum est, quod *Habern* Germanis dicitur. Altera ab hoc ipso autore in quarto lib. Græcè *βρωμῶ* appellatur, quæ a fruge differt, & a Vergil. Sterilis auena uocatur.

ORYZA. CAP. 117.

Oryza frumenti genus est, quod a recentioribus *Rizū*, & Germanis *Reis* uocatur: in plaustribus & uliginosis locis nasci *ὀρύζα* Dioscorides ait. Nostra uero Oryza ex India in alias terras translata est, & in multis locis Europæ feritur. Quare necesse est aliam quoque Oryzæ speciem inueniri, quæ etiam in Europa sponte nascatur. Nam Dioscorides simpliciter palustribus locis eam nasci ait, nec adiecit peregrinæ alicuius regionis nomen. Porro inuenitur apud nos in palustribus & uliginosis locis frumentum, quod *Schwaden* uocamus. Hoc proculdubio illius species est. Habet enim folia, culmos, spicam, & semen omnino maiori Oryzæ similia, semen tamen quamuis eandem proportionem, saporem & usum habeat, minus est. Sed hoc nihil impedit, quominus Oryzæ sit species. Hi autem uehementer errant, qui *Schwaden* Sefamum esse putant. Quid autem Sefamum sit, statim sequetur.

HALICA VEL ALICA. CAP. 118.

Chondrum Græci Latinorum Alicam uocant. Veteres duas res hoc uocabulo intelligunt, nempe ex Zea, quæ *Diazeas* uocatur, certo modo factam farinam, & peculiare frumenti genus, quod Latini Far, siue Adoreum uocant. Sed quale hoc sit, nō dum planè compertum habemus.

MILIVM. CAP. 119.

Conchion Latini Milium, Germani *Hirtsen* uocant: notum est frumenti genus, harundineis foliis, & in harundinea iuba semen ferens.

PANICVM. CAP. 120.

Ελνυμ & *καὶ μιλόν* Græcis, Latinis Panicum uocatur. Panicum ab omnibus autoribus Milio simile esse dicitur. Quare in maximo errore uersantur hi, qui Panicum illud frumenti genus esse putant, quod Germani *Heydenfohn* appellant. Verum cum *Heydenfohn* hederacea folia, & minime harundineum caulem habeat: Panicum uero harundineum culmo & folio constare describatur, Panicum nequaquam *Heydenfohn* esse poterit. Sed nō opus est multis argumentis. Propterea quid reuera Panicum sit, indicabo. Verum itaque Panicum milio simile est, frumentum, quod Itali adhuc *Panigo*, & Germani *Fuchsichwan* uocant: aliqui *Pfenich*, alii *Fench*.

SESAMVM. CAP. 121.

Sesamum a multis esse *Schwaden* creditur, quod in Oryza negauimus: & hoc loco multis certissimis argumentis id ipsum demonstrari posset, nisi breuitati consuleremus: propterea unum tantum afferam. Scribunt autores Sesamum semen suum in uasculis papaueris modo continere, *Schwaden* uero in spica siue iuba *Milia* cea suum semen fert. Ergo *Schwaden* nequaquam Sesamum esse potest. Miror autem uehementer, quo argumento moti sint, ut illi opinioni tam firmiter adhereant, cum adhuc uerum Sesamum ex Aegypto ad nos copiose afferatur, una cum oleo ex semine

semine expresso. Nam peregrinum nobis Sesamum est. Schwaden uero sponte apud nos prouenit. Porro sunt qui sesaminos flores, quos Itali Sesminos pronunciant, a Sesamino semine non distinguere ualeant, ob eam causam quam in sesmino unguento indicauimus.

* Leindotter quidam interpretatur.

† Vbi hoc scribatur, iam non occurrat.

LOLIUM. CAP. 122.

Ἀλφειοῦ Græci, Latini Lolium unumquodque degenerans frumentum appellant: quod cum in Hordeo nascitur, Tualch a nobis, propter insaniam quam facit, dicitur. In Olyra uero Treipe / alias Trese Dorp. Est & alia herba parua & quinquies liaz rosa similem habens florem, eumque rubentem, & nigrum in uasculo semen, quod nos Xaden uocamus. Hoc etiam a quibusdam Lolium esse creditur: Cum uero auctores Lolio spicam tribuant, Xaden uero uasculum habeat, nihil affirmo. Hi autem magnopere errarunt, qui Xaden Nigellam esse crediderunt.

AMYLUM. CAP. 123.

Nota omnibus res est Amylum, sic dicta, quod sine mola conficiatur. In pharmacopoliis, una mutata litera, Antidium uocatur. In Germania uero Stetche et Krast mehl.

FOENUGRÆCVM. CAP. 124.

Fœnugræcum leguminis genus est, quod Græci τῦλη, Germani Zigenhorn / Boctshorn & Sibengezeite uocant. Sunt tamen qui posterius hoc uocabulum ad lotum satiram etiam referant. Zigenhorn uero genuinum Fœnugræci nomen est. Nam sic Germani Græcorum Aegoceron interpretantur. Semen autem Fœnugræci eodem nomine in pharmacopoliis habetur.

LINUM. CAP. 125.

Vescebantur ueteres Lini etiam ut Fœnugræci semine. Propterea leguminibus coniunguntur. Est autem Linum omnibus nota herba, quam Germani Flachsh uocant. Semen uero solum Lein.

CICER. CAP. 126.

Ἐπίβρυτος Græcis, Cicer Latinis, Germanis Kichern hoc legumen uocatur. Colore habet triplicem differentiam. Est enim quoddam genus rufum habens semen, & quoddam candidum, quod columbinum dicitur. Et tertium genus nigrum semen habet, quod priuatim arietinum nominatur, quoniam arietino capite semen eius simile sit.

* Ziser / Candida semina in Austria.

FABA, LEGVMEN. CAP. 127.

Cyamum Græci, Latini Fabam uocant, Germani Bonen / de quo non opus est dubitare, cum omnes ab autoribus Fabæ adscriptæ notæ huic legumini conueniant, quod nos Bonen uocamus. Differunt Fabæ secundum colorem & magnitudinem.

* Non esse nostram Fabam hanc, ex Aeginetæ lib. 6. cap. 24. & ex Galeni capite de Aphace patet.

FABA AEGYPTIA. CAP. 128.

Aegyptia Faba in inundatis Nilo campis nascitur, cuius radicem Aegyptii Colocasia uocant, solo semine hæc nostrati Fabæ similis est. Quod enim ad cæteras eius partes attinet, omnino dissimilis esse cernitur. Nobis autem hæc est incognita.

LENS. CAP. 129.

Φαρις Latinis Lens, Germanis Linen appellatur. Est autem Lens duplicis differentiae. Quædam enim legumen est, de qua hoc loco agitur. Altera stagnantibus undis innatat, de qua infra sermonem habebimus.

Distinxerunt Phaselum à Phasiolo, qui post Dioscoridem scripserunt, ita ut Phaselus sit legumen simpliciter nunc uocatum ab Italis Phasiolus, Phasiolus uero idem cum Dolicho. Sed istam differentiam nullus author adhuc, neq; ipse Dioscorides obseruauit. Nam hic Phaseolum uocat id legumen, quod adhuc Itali Phasiolum uocant. Quapropter cum uideam à multis diuersas has herbas confundi, distinguam eas, & notas quibus ab inuicem dignosci possint, ostendam. Sunt enim ambæ legumina, magnam in foliis, floribus, siliquis & seminibus affinitatem habentia. Hic Phaseolus igitur quem Dioscorides hoc loco recenset, & ab aliquibus etiam distinctionis gratia Phaselus, seu ut Itali dicunt, Phasiolus uocatur, legumen est, absq; adminiculo seu pedamento per se subsistens, folia habet in uno pediculo tria, hederacea, mollia, quarum spina ex interiore parte candicat. Flores profert candidos, & post hos in siliquis teretibus candida & oblonga semina, media inter fabas uulgares & pisas forma & magnitudine, quibus nigrum quiddam eo loco, quo siliquis annectuntur, inest. Hic est Phaseolus, siue Phaselus ut quidam dicunt, de quo hoc loco scribit Dioscorides.

Altera uero eius species est huic forma foliorum similis. Circunuoluitur hæc arbutis & hastis, suntq; ex ea coronæ æstate, longiores hæc quam prædictus Phasiolus siliquas fert. Propterea ab aliquibus Dolichus appellatur, & fructus eius Lobi, quoniam insignes sunt siliquæ in quibus figurâ Phaseli semina nascuntur, non tantum candido colore. Nam inueniuntur nigro, croceo, rufosq; colore, & mixtus etiam pluribus coloribus simul. Hic Phasiolus Smilax leuis et satiuæ etiâ appellatur. Quoniam uero hæc duæ Phaseolorum species inuicem similes sunt, nomen etiam commune habent. Cum uero propriè loqui uolumus, legumen illud prius descriptum, Phaselum siue Phasiolum uocamus: postremò uero descriptum Dolichum, Smilacem leuem siue satiuam, & Siliquas eius Lobas. Porro utrunque Germaniæ peregrinum fuit legumen, & Phaseolus, siue Phaselus, siue Phasiolus, qui absq; adminiculo erigitur, à paucis in Germania pharmacopolis & herbarum studiosis feritur. Dolichus uero à plurimis non tantum ciuibus, uerum etiam rusticis umbræ & ostentationis causa. De Dolicho autem statim post sequetur proprium caput.

Orobon Græci, Romani Eruum appellant. Peregrinum hoc Germaniæ hætenus legumen fuit, quamuis omnes Orobum uocent eam leguminis speciem, quæ Germanis Wicken appellatur, sed errore seducti. Nam Wicken est Latinorum Vicia, & Græcorum Aphace, seu Βικία, unde Germanica uox deducta est: Veruntamen Eruum nunc à quibusdam in Germania feritur.

Latini *ῥαπὺν* Lupinum, Germani *Feiqbonen* & *Wolfschoten* uocant. Notus omnibus pharmacopolis eodem nomine Lupinus est.

ῥαπὺν, siue *ῥαπὺν*, Latini Rapum, Germani *Rüben* appellant. Nota omnibus cum herbarum radices eius sunt, quibus uescimur. Duplicem habet Rapum differentiam. Sunt enim satiuæ quædam, de quibus hoc capite scribitur: & sponte in aruis præuenientia quædam. Videndum tamen est, ne Raphanum agrestem, cum syluestri Rapo confundamus. Sunt enim ualde similes inuicem herbar, sed Rapum fruticosius est, & multas alas ramulosq; ad latera spargit, in quibus sunt lutei flores: nascitur pinguibus aruis. Raphanus uero syluestris pallidiores habet flores, & paruas radices. Rapum uero pollicem crassas.

* Rapum agreste, Wilde Rüben. De Raphano agresti, paulò post leges.

Rapum agreste.
Raphanus agrestis.

NAPVS. CAP. 136.

Napi rapis congeneres sunt, densiores tamen, acriores, & minores. Inueniuntur etiam luteo & croceo colore Napi in Bordueldiano Brunsvicensis ducatus agro, quibus præcipua laus & autoritas attribuitur. Græci hunc Napum *Βαρύκαλα* uocant, Itali Nauoni, Germani *Napen* uel *Nopen* & *Stidel Rübem*; Saxones uero Brunsvicenses suos Napos *Bordfeldische Rübem* appellant, ab oppidulo *Bordfeld* ubi nascuntur.

RAPHANVS. CAP. 137. 138.

Raphanum Latini radicem, aliqui etiam radiculam, Germani *Rettich* uocant, siue *Rübe Rettich*. Est & alia herba, quæ à Latinis *Lanaria radícula*, siue simpliciter etiam *radícula* dicitur, à Græcis *Struthion*, sed diuersa à *Raphano*. Quare uidendum est, ne alteram pro altera accipiamus. Raphani autem duæ sunt species. Vna feritur, & in Turingia cubitali longitudine & crassitudine, quæ utraque manu amplecti nequeat, prouenit. Quare non ineptè Plinius scriptum reliquit, *Raphanum in Germania infantium magnitudine nasci*. Altera uero sponte in aruis prouenit, quam Germani *Deyder etich*, id est, syluestrem *Raphanum* uocant, Latini *Armoraciam*. [†]Recentiores *Raphano* etiam adscripserunt acrem istam radicem, quam nos *Werrrettich* appellamus, & ea utuntur, ubi prædicto *Raphano* uti debebant: sed male. Non enim habent aliquem ex ueteribus autorem, qui *Werrrettich* / *Raphani* speciem esse innuat. Quid tamen *Werrrettich* sit, paulo post audiemus. [†]*Vide etiam superius in Rapo.*

SISER. CAP. 139.

Σισέριον Latini *Siser* uocant. Serebatur hæc herba olim in Germania cibi causa, & optimè in hac frigida regione proueniebat, qua causa eam quotannis à Germanis flagitauit Tiberius Cæsar, ut inquit Plinius. Hodie uero quid sit *Siser*, ignoratur. Brunfelsius tamen in tertio Herbarii sui Tomo scribit, quod *Siser* sit illud olus, quod Germani *Sierle* uel *Serele* / *Sirgele* uocant: cui omnino subscribo. Helli uocant *Älter gelmden*; alii *Grizelmören*. Estq; omnium radicem, quæ uescendo sunt, saluberrima *Siseris* radix.

*Sapore *Pastinacæ*, Venerem stimulat.

RUMEX, SEV LAPATHVM. CAP. 140.

Ῥόμης, Latini *Rumex*, Germanis *Ampffer* dicitur. Herba est quinque sub se habens species, quapropter prædicta trium gentium uocabula in genere omnibus speciebus communia sunt. Quidam *Rumex* satius est, hunc nos *Gartenampffer* uocamus. Agrestis etiam quidam est, qui à pharmacopolis *Lapathum* nunc dicitur, à Germanis *Nasenampffer* / *Gassenwurz* & *Butter ampffer* / *Butterlatti* quoniam rustici *Butyrum* eius foliis inuolutum in urbem uenale ferant. Non desunt etiam qui *Buglossum* eam uocent, *Myssenorum* & *Vuitenbergensium* Saxonum Germanico uocabulo decepti. Tertia species *Ῥόμης* Græcis, Latini *Rumex acutus*, uel, ut nunc, *Lapatium acutum*, Germanis *Spitzampffer* dicitur. Nascitur humentibus, syluestri similis, nisi angustiora & acutiora folia haberet. Quarta *Ῥόμης* Græcis, Latini *Acetosa*, Germanis *Saurampffer* uocatur. Quinta omnium ^{CAP. 141} maxima est. Nascitur aquis & palustribus locis, unde à Græcis *ἰππολόμης*, siue *ἰππολόμης*, & Germanis eadē significatione *Wassampffer* & *Wasserampffer* nominatur. Hæc sunt *Lapathi* genera ab antiquis descripta. Est & sextum, *acetosæ* forma & sapore simile, multo tamen minus, in agris nascens.

LAPSANA. CAP. 142.

Lapsana agreste olus est ex *Brassicæ* genere, Germanis *Reinföl* appellatum. Hoc se apud *Dyrhachium* uisitalle milites Cæsari in triumpho exprobrauerunt, ut apud Plinium & Suetonium est uidere.

BLITVM. CAP. 143.

Blitoners & insipidum olus est. Quo autem nomine iam appelletur, ^{superius}

cuum est inquirere, cum nullas habeat medicas vires.

* Quidam Meyer interpretantur, et recte: alij Güter Heinrich / quæ potius Atriplex quædam sylvestris est.

MALVA. CAP. 144.

Græcorum Malache, Latinis Malua, & Pappeln Germanis appellatur. Vna eius species in hortis feritur, quæ à nobis Admische Pappeln uocatur, sinuosa crispitudine per ambitum foliorum insignis. De hac & sylvestri uulgarì hoc capite agitur. Sunt enim & alia sylvestres Maluæ, ceu Althea & Alcea, de quibus infra sermo erit.

ATRIPLEX. CAP. 145.

Ατρίπλεξ Græcis, Atriplex Latinis, Melde Germanis hoc olus uocatur. Duplicem habet differentiam. Est enim sylvestris & satiuæ. Satiuæ rursus duplex, est enim uiridi & ruffo folio: Sylvestris plures habet discriminum notas. Hæc quod in stercore rariis nascatur, Distmelde appellatur.

BRASSICA. CAP. 146.

Κράμβη Latinis Brassica olim dicebatur, nunc uero Caulis, unde Germani suum Kål desumpserunt, aliqui per excellentiam uocant Kraut. Multæ sunt Brassicæ species: Est enim uulgaris quædam, quæ simpliciter caulis, & Germanis Blaßl nominatur. Est & crispa quædam, omnibus etiam nota: utriusq; folia ad purpuram colore inclinant. Est etiam alba Brassica, quæ in capita concreuit, unde capitata & sessilis uocatur, à Germanis uero Cappestraut / quod nomen ab Italis ad nos uenit. Illi enim capitulum sessilem hanc herbam nominant. Habent huius capita in quibusdam regionibus, ut Bohemia, ruffum colorem. † Est & marina Brassica, quæ hodie Soldanella in pharmacopoliis appellatur. Porro sylvestris Brassicæ plures sunt differentie:

† CAP. 147. De Brassica sylvestri nihil dicit.

BETA. CAP. 149.

Τιτθλόη Græci, Betam Romani, Beyßßöl / Admischeßöl / Komgraf / & Mangolt / Germani hoc olus nominant. Duplicem habet colore differentiam. Est enim nigricantibus in purpura foliis quædam è ruffa radice. Hæc nigra Latinis dicitur, Germanis Rot mangolt / siue Koterriben. radices enim rapis magnitudine & forma similes sunt. Candida huic omnino similis est, sed colore differt, quem folia eius in candido uiridem habent, (aliqui Siclam uocant.) Nigræ Betæ radices arte incrementum sumere coguntur, quæ condiuntur & assatis carnibus apponuntur. Candidæ uero Betæ radices minime curantur.

PORTULACA. CAP. 150.

Ανθράκωυ Græcis Portulaca uocatur, Germanis Portzel. Notum est acetarium hoc olus. Est & sylvestris Portulaca, in asperis littoribus nascens: de qua alibi agemus.

ASPARAGVS. CAP. 151.

Asparagus pharmacopoliis Sparagus, Germanis Spargen appellatur. Foeniculo foliis simile olus est, cuius radices & semina in pharmacopoliis seruantur. Dicuntur etiam Asparagi omnium olerum, tam sylvestrium quam satiuorum, primo uere tenelli & recentes caules, quales in Rapo & Bryonia uidemus.

* Satiuus omnis fuit sylvestris. Est autem sylvestris alius simpliciter dictus, alius Corruada uel Corrudage.

PLANTAGO. CAP. 152.

Αρνόγλωσσον Latini Plantaginem, Germani Wegbreyt uocant. Tres habet hæc herba differentias. Est enim latifolia quædam, & angustis oblongisq; foliis quædam, tertia latifoliæ similia habet folia, multo tamen minora, & leniter hirsuta.

SIVM. CAP. 153.

Sion ex Apii genere olus est, quod Germani Klein Wassermerck uocant, quoniam Palu-

Paludapio simile sit, sed minus. Nascitur glareosis & perennibus rivulis, ut Plinius etiam observavit.

* Wasser Eppich, Romæ utuntur in acetiarijs, & ranellam uocant.

SISYMBRIVM. CAP. 155.

Primum Sisymbrium Mentæ species est, quam Germani *Fischmünz* uocant. Est quæ hæc duplicis differentię. Vna enim nigricantem habet caulem, & ubiq; in aquis nascitur, *Bachmünz* Germanis appellata. Altera hirsutioribus est foliis, nec tantum iuxta riuos, uerum etiā in siccis prouenit (in moribus odorator) Hęc Balsamita à pharmacopolis nominatur. Confunduntur tamen ab imperitis hæc duæ Sisymbrii species.

Alterum uerò Sisymbrium solo nomine prioris simile. Nam Nasturtii potius quā illius species est. Quapropter etiam à Græcis *Καρδαμύνη*, Nasturtiaria, & à Germanis *Brunntress* uocatur. Notum est & salubre olus, quo Helli frequenter uescuntur. Recentiores hoc aquaticum Nasturtium, maximo errore Senecionem uocant, ut in Senecionis cap. audiemus.

BATIS. CAP. 157.

Κρηδύον, Latini Batini dicunt. Marinum est olus, quod etiam in hortis serebatur. Nomen tantum in pharmacopoliis nostris habetur. Res enim quæ hodie sic apud nos uocatur à pharmacopolis, diuersa penitus à Bari est.

CORONOPVS. CAP. 158.

Pro Coronopode malè hæcenus ranunculi quadam specie uisum sumus. Nunc autem uera Coronopus à quibusdam feritur. Est enim acetarium olus, folia habens pedibus & unguibus cornicis similia, & hodie ab Italis herba *Stella* uocatur. Quidam etiam Cornuceriunum appellant, à foliorum figura.

SONCHVS. CAP. 159.

Sonchum Latini Cicerbitam & Lactucellam, Germani *Sewmelcke*, & *Hasenköhl* appellant. Ex Intybi genere hæc herba est.

* Tertius ubiq; nascitur in agris.

INTYBVS. CAP. 160.

Serin Latini Intybum uocant. Multiplex Intybi genus est, hoc tamen capite duo satia, & unum syluestre describit. Satium Intybum ab Italis adhuc *Endiua* satia appellatur, estq; per omnia syluestri simile, tenerius tamen & latioribus foliis. Syluestre, quod Cichorium & Picris ob amaritudinem uocatur, & Amarago à Gaza in Theophrasto interpretatur, in pharmacopoliis Cichorea, & à nobis *Hindteleufft*, *Megwart* & *Sonnenwirbel* nominatur. Flores habet cœruleos, qui fere semper solem uersus inclinantur. Vnde etiam à quibusdam *Solsequium*, siue *Heliotropium* appellatur: quamuis *Heliotropium* diuersa sit ab Intybo siue Cichorio, & sui generis herba.

* Intybum uerum aliqui *Endiua* Romanam uocant.

CHONDRILLA. CAP. 161.

Χονδρίλλη quoq; intybacea est herba, habetq; duas species: quarum prima Cichorio est similis, multo tamen tenerior & minor, florem interdum cœruleum, interdum etiam candidum ferens. Germani *Klein Sonnenwirbel* uocant: nascitur in uitis, quæ solidum & gipsofum habent solum, quales sunt in lenensibus collibus. Altera Chondrilla in pinguib; & lutoxis agris, præsertim in hordeacea segete nascitur. Luteum habet florem, & à Germanis *Sewditzel* uocatur: quod nomen fere omnibus etiam intybi speciebus commune est.

CVCURBITA. CAP. 162.

Cucurbita, *Κοκκινύλα* Græcis, Germanis *Kürbis* appellatur, cuius duæ sunt potiores differentię. Vna longos fert fructus, altera latos et sessiles: semine eius Medici utuntur.

H iij

ANNOTAT. VALERII CORDI

CUCUMER SATIVVS. CAP. 163.

Σινω, siue Cucumis satiuus, à Germanis *Gurcken* appellatur: quod nomen ab anguria deductum est. Sic enim Itali quandam Cucumeris speciem uocant. Semina eius in pharmacopoliis eodem nomine habentur.

*Huius species sunt Pepones & Melones.

PEPO, PEPONES QUIDAM MVSCATELLINI VOCANTVR. CAP. 164.

LACTVCA CAP. 165.

Lactuca, quæ Græcis *ογίσλας* appellatur, duplicem habet differentiam. Est enim sativa altera, & agrestis altera. Satiua à Germanis *Lattich* / *Welchering* / *Salat*. & *Schmalztraut* appellatur, præsertim in Hestia, ubi illa in acetariis cum aliquato butyro, quod pro oleo affundunt, uescuntur homines; unde & *Schmalztraut* dicta est.

*Species eius sunt, tenuifolia, crispæ, capitata.

CAP. 166. Agrestis uerò Lactuca ea est, quam Itali *Serriolam*, uel (ut quidam durius pronunciant) *Scarriolam*, quoniam dorsum folii serræ modo asperum sit, uocant. Quidam etiam hanc ipsam *Endiuam* appellant: nam in hisce regionibus hac herba pro inrybuntur Medici & pharmacopolæ. Germani hanc ipsam *Genßdissel* / siue *Genßzen* appellant, quod spinosum folii dorsum anserinis dentibus simile sit. Porro nemo offendatur, quod hanc *Endiuam* Lactucam agrestem appellem. Nam omnes inrybi species ad Lactucæ genus referri debent.

GINGIDIVM. CAP. 167.

Gingidion, Syriacum est olus: nuper etiam ad nos ex Syria allatum, per omnia descriptioni respondens. Quidam Carui de Syria uocant. Porro eò ignorantie quidam peruenerunt, ut *Senecionem*, qui nobis *Creinztraut* appellatur, *Cerefolium* etiam nominent.

*Aliqui *Cerefolium* pro *Gingidio* habuerunt.

SCANDIX. CAP. 168.

Scandix etiam agresti *Pastinacæ* simile olus est, sponte in pinguibus aruis proueniens, Candidos & paruos in exiguis umbellis flosculos habet, ex quibus singuli, & ceu acus longi apices sursum enascuntur. Quapropter à Latinis etiam *acicula*, & à Germanis *Ladel* / *mözen* uocatur.

CAVCALIS. CAP. 169.

Caucalis *Dauco* similis herba est, non tamen cuius *Dauco* (sunt enim plures eius species) sed illi tantum, qui in Germania *Pimpinella* uocatur. Hirsutioribus tamen constat caule & foliis, Germani *Kauch* / *Bibenellen* uocant. Nam uulgò dicta Germanis *Pimpinella*, est ueterum *Daucus*.

*Nobis non uidetur.

ERVCA. CAP. 170.

Ερβω, Latini *Erucam*, Germani *Weissen Senff* uocant, quoniam simile per omnia sinapi sit, præterquam semine, quod sinapi nigricans est, Erucæ uerò candicans.

*Errat Cordus: nam quod *Sinapi album* Germani uocant, omnino *Sinapis* species est. Eruca uerò nomine Italico nobis noscitur, *Rocfelen*.

OCIMVM. CAP. 171.

Οκίμω Latini *Ocimum*, recentiores *Basilicon* uocant: Germani posterius nomen cum Latinis commune habent. Est autem *Ocimum* duplicis differentie, quodam enim altius adolefcit, & maioribus nigrrioribusq; constat foliis. Quoddam etiam præ-

am prædicto minus, ramosius, & minoribus foliis inuenitur, & Caryophyllos odore imitatur, unde Ocimum Caryophyllatum hoc appellare cōsueuerunt Latini & Pharnacopolæ, Germani uerò *Carapf Basilicon*.

*Recentiores & Arabes faciunt Ocimum quoddam simpliciter dictum, aliud Nabathi, & tertium Citratum: quæ tria nobis cognita sunt. quartum addunt Caryophyllatum.

OROBANCHE. CAP. 173.

Orobanchen Theodorus Gaza apud Theophrastum Eruangam interpretatus est. Nomen inuenit ex eo, quod Eruum strangulet: pinguis est, & sine foliis herba. Germanis *Sommerwurß* appellata.

*Diuerfa ab hac est Theophrasti Orobanchæ.

HIRCI BARBA. CAP. 173.

Τραγοπόριον, Latini Hirci barbam, Germani *Bocksbart* appellant. Nascitur campestribus locis, nonnunquam etiam pratis & aggeribus, pingui solo congestis.

ORNITHOGALVM. CAP. 174.

Ορνιθόγαλον, Germani *Klein Erdnuß* appellant. Porro duæ sunt in agris nascentes herbae, quas Germani hoc nomine indicant. Vna candidum habet, aut luteum, qualem hoc capite Dioscorides describit, florem. Altera purpureum, quæ an ab hoc authore descripta sit, ignoro.

**Kickelkern*. Vide mox in Tuberibus.

TVBERA. CAP. 175.

Tubera radices rotundæ sine germine sunt, quæ fungis similiter in terra nascuntur. Græci *ὄδρα* uocant. An etiam in Germania proueniant, nondum comperi. In Italia copiosè proueniunt, ubi etiam Tartosle uocantur. Sunt & tubera, quæ *ἀγέχυστα*, ab Araco legumine dicantur: de quibus huius instituti non est dicere.

*Tubera, quidam *Sirschy* uisunt interpretantur: alij Cerui boletos sic uocant, *Arachidna* Theophrasti quidam *Erdenuß* interpretantur. Cordus supra Ornithogalon *Flein Erdnuß* appellauit.

HORTENSIS SMILAX. CAP. 176.

Smilax hortensis, siue lenis, quem Dolichum etiam Græci appellant, nonnulli etiam Phasiolum, Germani *Windbönen* / *Welsche bönen*, & *Sprengelbönen* uocant: De hoc legumine in Phaseoli capite etiam disseruimus.

**Türksische*, oder *Römische bönen*. Semper contra Solem uoluitur.

MEDICA. CAP. 177.

Medica à Media nomen habet. Nam ex ea regione per bella Persarum in Græciā allata est, unde postea in Italiam translata, ad iumentorum pabulum ferebatur. Propterea nemo speret eā sponte in Germania prouenire, ut ii faciunt, qui se omnes plantas, quas Dioscorides describit, nouisse & indicare posse, uana quadam iactantia & persuasione gloriantur. In Italia autem adhuc à quibusdam feritur. Vidi ego herbam hanc à Georgio Agricola ex Italia allatam.

APHACE. CAP. 178.

Aphace uicia est, quæ sponte in aruis nascitur, quam Germani *Feldtwicken* appellant. Theophrastus intyhacei generis herbam Aphacen nominat, quæ diuerfa est ab hac nostra Aphace. **Vogelwicke*.

PORRVM. CAP. 179.

Notum omnibus Porrum est, quod Græci *ραβον*, Germani *Lauch* uocant. Porro sub eodem genere hæc omnia continentur: Allium, Vlpicum, Scorodoprasum, Ampeloprasum, Porrum, Ophioscorodon, Cepa, Gethyum & similia.

*Porrum aliud est capitatum: aliud sectium, *Schnittlauch*.

AMPELOPRASVM. CAP. 180.

Nascitur sponte etiam in aruis & uineis, teretibus foliis Porrum, quod Græci *Ampeloprason*, Germani *Wilden lauch* appellant.

CEPA. CAP. 181.

Κεράμυον, Latini Cepam, Germani *Zwibeln* & *Zippeln* nominant: Notæ omnibus cum germine suo radices sunt.

ANNOTAT. VALERII CORDI

*Cepæ alie sunt candidæ, alie ruffe. Item alie Gordiæ, utring; acuminatæ. Scifiles, Gleißlauch. Ascalonie, Asphlauch.

ALLIVM. CAP. 182.

Σκόροδοξ, Latini Allium, Germani Knoblauch appellant. Est etiam sylvestre Allium Ophioscorodon appellatum, lata habens folia, ut Lilium conuallium. Hoc Germani Kampen / siue Kempfen / & Kamferen nominant. Estq; inuisum pastoribus, quoniam lac Allii odorem acquirit, si eo uescantur pecora. Vrsinum Plinio.

SCORODOPRASVM. CAP. 183.

Σκοροδόπρασον sylvestri Allii genus est, mediamp inter Allium & latifolium portu figuram & temperamentum habet. Vnde ab utroque nomen inuenit, Germani Feldknoblauch / siue Wildknoblauch appellant. Hactenus hac herba eiusq; semine pro scordio usi sunt Pharmacopola, & adhuc magno errore utuntur. Nō enim est sylvestre siue agreste allium scordium, sed proprii generis herba, ut suo loco indicabimus.

SINAPI HORTENSE. CAP. 184.

Σινάπιν, Latini Sinapi, Germani Senff appellant. Nota omnibus cum semine suo herba est. *Satiūm à sylvestri cultura solum differt.

NASTURTIVM. CAP. 185.

Κάπρινον, Latini Nasturtium, Germani Kressen / & Gartengkressen uocant. Hoc capite de fatuo Nasturtio agitur.

*Est & sylvestre quoddam, Cynocardamon, Hundskresse.

THLASPI. CAP. 186.

Thlaspi minus, Germani Däschelkressen uocant, uel groß Deschenkraut & Wegkresse. Differt tamen à Bursa pastoris, quæ klein Däschelkraut nominatur. Maius uerò Thlaspi sine dubio ea est herba, quam nos Merrettich appellamus, & Arabes Nasturtium album, à candore radice. Grandibus hoc radicibus & magnifolium describitur. Vergilius autem Marcellus in hoc capite non bene in comparatiuo gradu interpretatus: maiore radice, & latioribus foliis. Ita enim intelligeretur maius Thlaspi minori secundum proportionem maius esse. Sed Dioscorides hoc non uult, neq; uerba eius hoc indicant. Nam in Græco nulla comparatio legitur, sed simpliciter πλατύφυλλον, καὶ μεγαλύτερον.

ARABA. CAP. 187.

Quædam exemplaria Arabam, alia Drabam, quædam etiam Arabida appellant. Est autem Nasturtii genus, quod Arabes orientale uocant, hodie ignotum: quamuis Ruellius id cognouisse uideatur. Verum non temere è Ruellio crediderim, cum plantas ad historias ui torquere soleat. Cæterum non malè ait Virgilius Marcellus, nullam esse apud alios authores herbam hoc nomine. Plinius tamen eius mentionem facit sub nomine Dryophoni:

IRIO. CAP. 188.

Ερύσιμον, Latini Irionem, Germani Schnödsenff / aliàs Schutsenff / Steinsenff appellant. Theophrastus alterius Erysimi genus inter frumentacea recenset, quod diuersum est ab hoc. Imperiti Irionem, quia Dioscoride hoc loco describitur, fœminam Verbenam etiam uocant, uerum magno errore. Nam Irio sinapi cognata herba est, propterea hinc inter acrimoniam habentia describitur. Verbenaca autem nihil cum sinapi neq; Irione commune habet.

PIPER. CAP. 189.

Piper nouerunt omnes. Habet autem triplicem differentiam. Est enim longum, rotundum seu nigrum, & albū. Longum nigro & candido omnino dissimile existit, cum hæc duo parua & rotunda sint grana. Illud uerò oblongum & betularum grossulis simile. An uerò ueteres rectè de eius planta, & quomodo nascatur, scripserint, non est huius loci disputare.

ZINGI.

Zingiber quod hodie Zinziber nominant Latini, Germani Ingber. Diversæ à pipere plantæ radix est. Cur autem non potius in censu aromaticum descriptum sit Piper & Zingiber, in præfatione huius libri indicauimus.

Hydropiper parens meus in suo Botanologico ait esse mordacæ Perficariam, quæ à Germanis Wasser Pfeffer & Schmerzen appellatur, cui sententiæ Musa non aduerfatur. Ruellius uerò eam negat esse ueram, quoniam nigram maculam Perficaria in foliis habeat, qualem authores Hydropiperis foliis inesse non dicant. Ait etiam Perficariam exiccatis paludibus emergere, Hydropiper uerò in lacustrium marginibus adolescere. Addit præterea, Hydropiper mentæ foliis describi, sed Perficariam Perfici folia habere. Antequàm tamen Perficariam Hydropiper esse neget, indicat Hydropiper eam esse herbam, quæ Eupatorium appellata est hæcenus falsò. Cùm igitur antea admonuerim, cautos esse Ruellianos lectores oportere, propterea quòd non raro inuitas plantas ad historias & descriptiones detorquere soleat, suadeo etiam hoc loco, ne illi continuo fides habeatur, uiro aliàs insigniter docto, & qui nò ex industria male iudicet, sed qui, cùm homo sit, præter opinionem in errores aliquando præcipietur. Necessè est igitur aut parentem meum, aut Ruellium perperam iudicasse. Quapropter utriusq; iudiciũ discutiedũ, & cum Hydropiperis historia conferendũ erit.

Principio igitur Ruellius negat Perficariam Hydropiper esse, quoniam Perficaria purpurei coloris maculam in foliis habeat, quam si Hydropiper haberet, in descriptione authores non omisissent. Ad hoc argumentum breuiter respondeo: Duplex genus esse Perficariæ. Vna quæ maiora nigrioraq; habet folia, purpureis maculis distincta, quæ nullam omnino acrimoniam in gustu habet. Altera uerò huic similis, candidioribus & minoribus tantum foliis, quibus nullæ insunt purpurei coloris maculae: hanc dixit parens meus Hydropiper esse, non illam. Quare nullam uim hoc argumentũ habet. Diluendũ igitur nunc erit illud, quo infert dissimiles etiam habere natales Hydropiper & Perficariã, quoniam hæc exiccatis paludibus, quod Hydropiper nò faciat, emergat. Illud uerò in lacustrium marginibus adolescat, ut historia & descriptio clarè ostendit. Ego uerò Perficariã nò tantum in exiccatis paludibus nasci uidi, uerum etiam iuxta leniter fluentes aquas, idq; sæpissimè: nec ego tantũ, uiderunt etiã plures alii quibus monstrabam, ne fortasse commentum me dicere quidam existiment. Et econtrã, illam herbam quam Ruellius Hydropiper esse existimat, in palustribus exiccatis non semel nasci uidi. Et quamuis Perficaria exiccatis tantum paludibus nasceretur, minimè tamen hoc solo argumento negare aliquis posset, eam Hydropiper esse, cum nò omnino siccatis nascatur, sed semper sub sita aqua. Nec Dioscorides illi tribuit, quod tantum circa leniter fluentes undas proueniat, & non in aliis aquosis. Propterea enim à Græcis Hydropiper appellatur, quod aquosis locis emergat, siue sint palustres, siue leniter fluentibus undis uicini. Præcipue tamen & plerumq; huiusmodi natalibus, quales Dioscorides recenset, Hydropiper nasci scribitur: quam notam in mordaci quoq; Perficaria non solus neq; semel obseruaui. Quapropter neq; hoc argumentũ negare potest Ruellius, quod Perficaria mordax Hydropiper sit. Propere mus igitur ad illud quo ait, Hydropiper Mentæ foliis ab authoribus describi, Perficariam uerò Perfici foliis cõstare. Ad hoc respondemus, nullam similitudinẽ tam perfectam esse, quæ non habeat aliquam dissimilitudinẽ. Igitur quamuis Perficariæ folia longiora sint, quàm Mentæ, non tamen continuo sequitur, eam Hydropiper nò esse. Nam nò raro magnitudo pro longitudine tantum, & econtrã accipitur. Si igitur tam stricte hanc notam Ruellius intelligit, illius falsò uocatũ Eupatoriũ multo minus habet folia, Mentæ similis: nam & ipsa etiam nò proportionaliter maiora sunt, quàm Mentæ folia, sed similiter ut Perficaria longiora & nigriora quàm Mentæ folia, cum Hydropiperi candidiora quam mentæ adscribantur. Igitur neq; hoc argumentũ parentis mei sententiã confutabit. Cum uerò adhuc constet, Hydropiper Perficariam mordacẽ esse, necessariò sequitur, Ruelliũ à ueritate aberrare, quod falsò uocatur Eupatoriũ Hydropiper esse iudicauerit. Hoc itaq; probare nunc incipiemus. Principio igitur uidendũ est, quale nã falsò uocatũ Eupatoriũ intelligat. Tres enim sunt plantæ, quibus

quibus falsò id nomen inditum est. Vna scilicet quam Mesue describit: altera quæ
 dodrantali altitudine inter arbusa nascitur, Mæte foliis, & Lupuli odore. Harum nul-
 lam intelligere Ruellium certum est, quoniam utraq; sicis nascitur locis. quam uerò
 ille Eupatorii nomine indicat, circa aquas nascitur, estq; omnino ea, quam nostrates
 etiam Pharmacopolæ Eupatorii uocant, Germani Wasserostien. Hoc an Hydro-
 piper sit, iam uidendum erit. De Hydropipere itaq; sic Dioscorides scribit: Nascitur
 plerumq; circa stantes aquas, & leniter fluentes: quæ nota pulcherrimè conuenit. No-
 lo enim respondentes notas omittere, ut Ruellius in Persicaria fecit, cuius Piperi si-
 milem acrimoniam præterit. Quamuis igitur hæc unica nota per omnia conueniat,
 non tamen sequitur, quod hæc herba Hydropiper sit. Plures enim plantæ in eodem
 natali proueniunt, tametsi cæteris notis Hydropiperi minimè respondeat. Cum igitur
 sola hæc nota conueniat historiæ, fallere potest. Si uerò quæ nunc sequuntur, si-
 militer conuenirent, ipse non inuitis pedibus in Ruellii sententiam currem. Sequi-
 tur itaq; in Dioscoride: Caulem ex se mittit geniculatum solidum. Quas notas Ruel-
 lius malè falsò uocato Eupatorio tribuit. Non enim geniculatum habet caulem, Persi-
 caria uerò mordax euidenter tumentibus geniculis intercepta est. solidum etiam cau-
 lem eadē Persicaria qualitate habet, Eupatorii uerò falsò sic appellati caulis non tam
 qualitate quam quantitate solidus. Procerus enim est, & magnum foliorum florumq;
 onus sustinet. Quapropter necesse est eum robur contra uentorum impetum habere.
 Persicariæ autem caulis quamuis paruus sit, non tamen paruam soliditatem adeptus
 est, atq; id qualitate, non quantitate seu magnitudine. Nam omnia quæ proceris con-
 stant caulibus, robusta etiam à diuina prouidentia facta sunt. Quæ nunc de foliorum
 forma & colore dicenda essent, paulò ante relata sunt. Quare ad saporem eorum con-
 uertamus orationem, de quo sic Dioscorides scribit: *ἀκριὰ γὰρ γένεται ὡστερὶ τὸ πῖπερι*,
 quod est: sapore acris, ut Piper, Eupatorium autē acrimoniam nullam habet alios sa-
 pores excellentem, sed tantum amaritudinem magnam. Propterea Ruellius etiam
 huius Eupatorii folia meram Piperis amaritudinem respere scribit. Differunt autem
 plurimum amarus & acris sapor, & Piper tantum acre, & minimè amarum est. Eupa-
 torium uerò falsum sic uocatum, solam amaritudinem respicit. Ergo quislibet etiam ma-
 nibus palpare potest, hoc loco Ruellium scribere, quod in rerum natura non inuenia-
 tur. Si igitur sapor non conuenit, à quo Hydropiper appellata est hæc herba, iam pla-
 nè iudicandum erit, Eupatorium, de quo hic agimus, Hydropiper minimè esse. Ne ta-
 men alias notas refugere uidear, pergami eas omnes membratim historiæ conferre:
 Sequitur autem in textu: *καρπὸν δὲ ἔχει ὡς κλωναρίου μικρῶν ἐκ φύλλων παρὰ τὰ φύλλα συ-
 νεχθὲν καὶ βοτρυώδην φέρει καὶ αὐτὸ*: quod est, si de uerbo ad uerbum uertas: Semen uerò
 habet in ramulis paruis enascens iuxta folia, continuum & racemosum, acre & ipsum.
 Ex quibus notis ne una quidem falso uocato Eupatorio conuenit. Nam hoc in sum-
 mo tantum caulis uertice, non in ramulis iuxta folia latos potius corymbos, & um-
 bellis similes, quam racemos fert. Hydropiperis uero caulis circa se alarum cauitates,
 & paruos ramulos habere debet, & non in summitate tantum, quod optimè mordaci
 Persicariæ conuenit. Eupatorii etiam semen sensu deprehendi non potest, neq; ali-
 quam saporis acrimoniam habet, & demum in pappos resolutum auolat, propterea
 difficilimè colligi potest. Hydropiperis uerò semen non minorem quam folia in gur-
 stu acrimoniam respicit. Propterea unā cum illis ad Medicinæ usum olim colligebatur,
 quæ omnia in Persicaria acris euidenter apparent. Constat igitur falso uocatum Eupa-
 torium Hydropiperis historiæ minimè conuenire, Persicariam uerò, quæ maculis pur-
 pureis caret, per omnia respondere: quamuis sola foliorum similitudo à longinquo
 peratur. Sed sine dubio ipse Dioscorides hanc foliorum comparisonem largo modo
 intelligi uoluit. Non tam diu in hac una herba immoratus fuisset, si Ruellius suum
 de Hydropipere iudicium tantopere non probauisset, & alios, qui hoc uerum esse in-
 ficiarentur, ueritatis cæcos non appellasset. Porro in Piperitide & Siliquaastro iudi-
 cando, similiter errat Ruellius. Non enim est herba siue Mentha diuæ Mariæ. Ve-
 rum hunc errorem huius loci non est confutare, quoniam in Dioscoridis libros anno-
 tationes, & non in Ruellii errores reprehensiones scribimus. Plinius de Hydropipe-
 renihil scripsit, de Piperitide autem siue Siliquaastro, non pauca. Differt enim pluri-
 mum à

mum à Piperitide Hydropiper. Quapropter utranque plantam (ne ab aliquo confundi possint) suo nomine indicabo.

Hydropiper est, de qua iam disputauius, Persicaria, cuius folia & racemosum semen acrem Piperis saporem habent. Piperitis uero sine dubio ea est herba, quæ in Italia & Germania fictilibus uasculis scriitur, caule circa alas rubro, foliis laurinis, flore candido, & post hunc semine in oblongis uasculis ceu siliquis (unde Siliquastrum etiam appellatum est) albo & tenui. Itali eam Piper Hispanum uocant, Germani Schotters pfeffer, id est, Siliquaceum Piper, ut sic interpreter.

PTARMICA. CAP. 192.

Ptarmica à sternutamentis, quæ olfacta proritat, appellata est. Ruellius eam paruum illud ac syluestre Pyrethrum esse affirmat, quam herbam probè cognita habeo. Cum uerò non unà tantum sit quæ reclamet nota, nolo quicquam in hac re affirmare.

RADICVLA, SIVE LANARIA HERBA. CAP. 193.

Longè diuersa est à Raphano, qui similiter radícula uocatur, ut antea etiam, cum de Raphano ageremus, indicauius.

*Alia est quæ Meisterwurz & Ostrutium uulgo dicitur. Aliqui Saponariam esse putant, Znabenfrauz, Seissenfraut.

CYCLAMINVS. CAP. 194.

Cyclaminus rotundam habet radicem, & plerumq; latiusculam, quam Pharmacopolæ eodem adhuc nomine appellant: quamuis etiam ab aliquibus Panis porcinus nominetur, & à Germanis Erdseiben.

ALTERA CYCLAMINVS. CAP. 195.

Altera Cyclaminus in Pharmacopoliis non habetur. Qualis autem sit herba, & quo nomine iam appelletur, ignorare me fateor. Ruellius eam cognouisse uidetur. Verum illius decreta cum iudicio legenda esse, suprà monui.

*Cyclaminus altera, Perichlymenum, & Vitis syluestris, uidetur una herba, tribus capitibus descripta: quæ & Caprifolium dicitur, Speck liliën.

DRACUNCVLVS MAIOR. CAP. 196.

Δρακοντία, siue ὀφάγος, Latinis Dracunculus & Serpentaria uocatur. Hanc magno errore Bistortam esse haecenus credidit tota ferè Medicorum & Pharmacopolarum multitudo. Cum uerò Bistorta, quam nos Latervurz appellamus, frigidū omnino habeat temperamentū, Dracunculus autem calidum uehementer, nullo modo Bistorta Dracunculus esse potest. Veruntamen Dracontia in Italia, Gallia, & Germaniæ locis quibusdam habetur Ari similitudine, cuius etiam species est, ut ueteres omnes tradiderunt.

*Dracunculus est genus ad Dracunculum maiorem, & minorem, Aron & Arisaron. Dracunculus maior, dicitur Loph crispum.

DRACUNCVLVS MINOR.

Minor Dracunculus, qualem hic Dioscorides describit, nescio an cognoscatur. Mihi enim haecenus eum uidere non licuit.

*Loph planum. Est & alia species quæ à Plinio describitur, Wasser Aron, quæ tot habet genicula, quibus ab alijs distinguitur, quot annos.

ARVM. CAP. 197.

Ἀρον, Latini Arum, in secunda declinatione uocant. Hodie usus inualuit, ut in terra Aron, aronis, flectamus. Est autè herba ubiq; pingui solo, in umbrosis & antiquis syluis nascens, quam Germani pariter Gracis, Aron / Pfaffenpinc & Teufelskewer uocant. Vulgares etiam Herbarii pedem Vituli, propter foliorum similitudinem, dicunt.

*Loph minus, hoc uti tuto possumus loco Loph. Cyrenaicum uescendo est. Aron in calidis regionibus mitius est, in frigidis, acrius, sicut & Iris.

ARISARVM. CAP. 198.

Arisaron ab Aro & Isaro, id est, Dracunculo nomen inuenit. Figura enim Aro, & temperamento Dracunculo simile describitur. Hodie incognita est herba. Dicitur etiam Aris, diminutiua forma, quoniam Aro minor sit. *fiem Aron.

ASPHO

ASPHODELVS. CAP. 199.

Magnus in Asphodelo error commissus est hactenus. Vbiq; enim pro eo sylvestre Liliū, quod Hemerocallen Græci, & Germani Goldewurtz appellant, accipiunt Pharmacopola. Verus tamen Asphodelus in quibusdā Italiæ locis habetur. Suntq; radices eius Pæoniæ radicibus similes, ut authores scribunt, & nos etiā uidimus. Hemerocallis uerò radix, quæ iam pro Asphodelo in usu est, Liliū radicis, & minime Pæoniæ similitudinem habet.

BVLBVS QVI EDENDO EST. CAP. 200.

Βύλβος, quemadmodum olim omnibus cognitus fuit, ita hodie omnibus incognitus est.

BVLBVS VOMITORIVS. CAP. 201.

Qualis herba uomitorius sit Bulbus, hodie nō quiuis dixerit. In quarto libro Narcissus etiam hoc nomine appellatur.

SCILLA. CAP. 202.

Σκίλλα, Latinis Scilla, Pharmacopolis Squilla uocatur. Cepæ cognata est planta, cuius radices in frequenti sunt usu Medicis.

*Merzwibel. Nascitur locis siccis & salis

PANCRATIVM. CAP. 203.

Pancration minor Scilla est, quæ hodie raro ad medicinæ usum affertur: quantitate & uiribus maiori inferior.

CAPPARIS. CAP. 204.

Capparis spinosus frutex est, cuius saliti flores, nondum aperti propriè, et fructus, eodem nomine appellantur, & cum assatis carnibus mensæ apponuntur, Germani Kappern uocant.

*Flores alij magni, alij parui, tanquam duplicis generis, adferuntur.

LEPIDIVM. CAP. 205.

Lepidium, Iberis etiam uocatur, & falso à quibusdā diuersæ herbe creduntur. Quapropter malè in fine primi libri caput de Iberide legitur. Est enim una eademq; herba, quæ tamen duas species habet. Maius Lepidium Laurino, sed maiore constat folio, gustu acri. Hoc Arabibus Seitaragi, & Germanis Ingwer kraut / Pfefferkraut / Römische Kresse / uocatur. Minus uerò Lepidium Gauchsblium / Waldkresse.

BATRACHIVM. CAP. 206.

Batrachium, Latini Ranunculū, Germani Froschpfeffer / Hanensfig / & Spiegblumen uocant. Plures eius sunt quàm Dioscorides descripsit species. Omnes tamen flammulae appellatione hodie ueniunt, ob igneam in gustu acrimoniam sic dictæ. Est etiam frutex quidam, qui similiter à quibusdā flammula appellatur, qui ab his diuersus est.

*Ranunculo Sardo excepto, reliqui omnes apud nos nascuntur.

ANEMONE. CAP. 207.

Anemone agresti Papaueri non dissimile est, hodie autem in nullo usu habetur.

*Teufelsaug.

ARGEMONE. CAP. 208.

Duplex est Argemone, sed utraq; etiam Papaueri agresti, siue Rheoadi similis est: Neutra hodie cognoscitur, quamuis lenæ copiosissime proueniat, ea quæ à Dioscoride describitur figura. Nomen eius in Agrimoniam detortū est, quæ appellatione uerum Eupatorium hodie indicatur: de quo errore in Eupatorio sermonem faciemus.

De Argemone altera caput supposititium quidem est, reperitur tamen herba talis, qualis hic describitur. Wilde Garbe / Wilde Grensing.

ANAGALLIS. CAP. 209.

Latini pariter Græcis Anagallidem uocant. Pharmacopolarum quidam Anagallum, Germani uerò Brundtheyl & Jochtheyl, alias Gochtheyl. Male quidam hanc & Auriculā muris cōfundunt, natura diuersas herbas. *Est & Anagallis aquatica. Pungit

HEDERA.

HEDERA. CAP. 210.

Hedera sine dubio est, muros, turres, & arbores scandens frutex seu arbor, quæ à Germanis *Ebber* uocatur. Quare sine rationibus & argumentis quidam nos Hedera neque nouisse, neque habere contendunt.

CHELIDONIUM MAIUS. CAP. 211.

Chelidonium nomen inuenit quod circa hirundinum aduentum erumpat. Germanicè *Schelkraut* uocatur.

CHELIDONIUM MINUS. CAP. 212.

Minus Chelidonium eandem etiam ob causam nomen accepit, forma uerò priori dissimile est. Habet aurei splendoris flores, & in foliis purpureas maculas, quas Dioscorides non descripsit. Vergilius uerò diligenter in quarto Georg. depinxit, cum Amellum florem his carminibus indicat. (Est enim sine dubio eadem herba Chelidonium minus & Amellus.)

Est etiam flos in pratis, cui nomen Amello
Fecere Agricole, facili querentibus herba.
Nunc, uno ingentem tollit de cespite syluam
Aureus ipse, sed in folijs, quæ plurima circum
Funduntur, uiolæ subluet purpura nigrae.
Sæpe Deum nexu ornatæ torquibus aræ,
Asper in ore sapor, tonsis in uallibus illum
Pastores, & curua legunt prope flumina Melle.

* *Erdersten / Scharbocksfraut*. Est autem *Scharbock* species morbi Gallici.

OTHONNA. CAP. 213.

Othonna quid fuerit, neque ueteribus constitit, neque nobis. Hodie nomen cum re amissum est.

MURIS AVRICULA. CAP. 214.

Quædam exemplaria duo capita de Muris auricula habent, quædam etiam unum tantum, nempe posterius, quo propriè uocata Muris auricula describitur; de hac etià hoc loco agimus. Nam quæ priori capite describitur, Alline est: & in quarto statim Helxinem, in quibusdam exemplaribus hoc loco unum tantum de Muris auricula caput habentibus, sequitur. Vera itaque Muris auricula Scolopendrio siue Polypodio similia habet folia, minora tamen, quæ singula murium auribus similia sunt, Germani quoque *Wenssöhelen* uocant. Est & alia quæ similiter ab omnibus Auris *Pilosella* uocatur, etiam Germanis quibusdam & Italis *Pilosella*, nostris quæquiritibus *Wagelkraut*. Sed hæc minima quædam Intybi species est, quod ex floris forma, colore & lacteo foliorum liquore facili colligimus.

ISATIS SATIVA. CAP. 215.

Isatis sativa copiosè in Turingia ad tingendas uestes seritur. Germani *Weydt* uocant, Latini *Luteam* & *Glastum*. In huius herbae caulis longitudine uariant exemplaria: quædam enim cubito eum altiore, quædam uerò duobus prociorem esse indicant. Prior tamen lectio mihi magis placet. Ea enim altitudine in pingui etiam solo Isatida nasci uidi.

* Species uidetur *Brassicæ sylvestris*.

ISATIS AGRESTIS. CAP. 216.


Agrestis Isatis eandem cum sativa formam habet, & ab illa nihil differt, præterquam quod non feratur. Germani eam *wilden Weydt* uocant. Nascitur in spisso & giposo solo.

TELEPHIUM. CAP. 217.

Uidetur corruptum esse hoc caput, & dubitatur an hoc loco legi debeat. Nam in quarto eandem herbam aliter describit: & aliter in capite Aizoi minoris, quod Telephium diuersum ab hoc esse, secundum hanc descriptionem, necesse est. Ego nullam hactenus herbam uidere potui, quæ huic historiae conueniret. Quapropter in minoris Aizoi annotationiunculam sermonem de Telephio reuicimus.

VALERII CORDI SIMESUSII, in Pedacii Dioscoridis
ANAZARBEI TERTIVM DE MEDICA MATERIA Librum, Annotationes.

AGARICVM. CAP. 1.



AGARICVS FVNGI GENVS EST, ARBORIBVS ADNASCENS: nomen suum in Pharmacopoliis adhuc retinet, & à Germanis, quoniam plerumq; in abiete nascitur, Danienischwamm uocatur.

*Potius Lerchenschwamm à Larice uocandus.

RHA PONTICVM. CAP. 2.

Habentur in Pharmacopoliis duæ radices, Quarum unam Rha barbarum, alteram Rha Ponticū uocant. Verum neutra est ea, quæ hîc à Dioscoride describitur. Nam Rha Ponticum, quod hodie sic uocant, huic historię minimè conuenire potest. Est enim ponderosa & succosa, nec aliquem Croci ex se colorem remittit. Rha Ponticū uerò, quod Dioscorides describit, fungosum & leue est, & Croci colorem manducatum remittit. Ergo quilibet uidere potest, nequaquam uerum esse Rha Ponticum, quod hodie eo nomine uenditur. Neq; enim in Ponto hoc nascitur, sed in Italia, unde ad nos adfertur. Quid autē sit ea radix, quæ hodie pro Rha Pontico in usu est, statim post audiemus. Nunc uerò quid Rha Ponticum reuera sit, indicandū puto. Omnes Arabes cum de suo Rha barbaro seu Rauedseni scribunt, Dioscoridis caput de Rha Pontico citant. Vnde necessariò sequitur, Dioscoridis Rha Ponticum, quod in Ponto nascitur, idem esse cum Rauedseni Arabum. Cum uerò Rauedseni ualde odoratū esse ipse sensus testetur, & Rha Ponticum sine odore, (hoc enim Græcis ῥοσμή significat) à Dioscoride describatur, necesse est diuersas radices esse, nostrum seu Arabum Rha barbarum, & Græcorum Rha Ponticum. Propterea antea à me dictum est, neutram radicem Dioscoridis esse Rha Ponticum, quod non simpliciter à quoquam intelligi debet. Nam Rha Ponticum, quod in Ponto nascitur, inodorum est: quod uerò in India prouenit, odoratum propter cæli & regionis calorem gignitur. Nam idē genus habent, & eandem formam, Rauedseni & Rha Ponticum Græcorum, odore tamen & uirium præstantia Indicū præcellit. Certum igitur est, nostrum Rha barbarum cum Dioscoridis Rha Pontico idem esse genere, & tantum differre natalis loci diuersitate. Propterea minimè errāt Arabes, quod Dioscoridis caput de Rha Pontico in recensendo suo Rauedseni adducant. Subscribo itaq; hoc meo de Rha barbaro iudicio Manardo, qui in Epistolarum lib. 6. Epistola 5. ad Leonicenum scripta, idē quod ego de Rha barbaro iudicat.

Seritur hodie in plurimis Germaniæ locis herba quædam, quam uerum Rha barbarum esse credunt, quoniam luteum colorem radix eius habet: sed magno errore. Est enim nihil aliud, quam Lappathi uel Rumicis species, quod quilibet ex radice, caulis, foliorum, florum & seminum figura & uiribus iudicare potest. Nequaquam enim continuo Rhabarbarum erit, etsi luteum colorem radix habeat. Nam uulgaris quoque Rumex similem colorem in radice ostendit. Propterea superuacuum est, quod tanta cura eam herbam excolant.

GENTIANA. CAP. 3.

Gentiana à Germanis Bitterwurz & Encian uel roter Encian appellatur. Notat hoc nomine omnibus Pharmacopoliis & Medicis radix est. Nascitur copiosissimè in Sueuiæ & Brisgoiæ montibus.

ARISTO.

ARISTOLOCHIA. CAP. 4.

Tria sunt Aristolochiæ genera. Longa, rotunda, & altera longa, quæ Aristolochia clematidis uocatur. Hanc hodie simpliciter longam uocamus, cum tamen prior illa sic appellanda erat, quæ incognita nobis hæcenus fuit. Iam uero ex Italia ad nos rursus affertur. Radicem habet dodrante non multo longiorem, ut etiam historia indicat. Quæ uero hodie longa à nobis appellatur, & ueteribus Aristolochia Clematidis, ab hac diuersa penitus est. Longissimam enim & uitis sarmento similem radicem habet, unde apud Græcos nomen inuenit. Germani eam *Österlucet* uocant.

Rotunda Aristolochia radicem rotundam, instar globi, habet: nonnunquam etiam tuberibus inæqualem. Hac etiam caruimus hæcenus, & male eius loco usi sumus ea radice, quam Germani *Holwurcz* appellant, quæ nihil habet præter radice rotunditatem, cur Aristolochia dici possit. Omnes enim Aristolochiæ hederaceo constant folio. *Holwurcz* uero Rutæ & Fumo terræ folia similia habet. Omnes etiam Aristolochiæ eundem saporem & odorē habent. *Holwurcz* autē ab Aristolochia utrumque diuersum. Porro male in omnibus Dioscoridis exemplaribus Clematidis Aristolochiæ folia, minoris Sedi, id est, Vermicularis foliis comparatur. Etenim cum longa & rotunda Aristolochia, hederaceis constet foliis, par est etiam tertiam eius speciem eiusdem formæ folia habere, qualia etiam in ea nasci cernimus. Propterea corruptus est hic locus apud Dioscoridem, cum ait: *φύλλοις ὑποσχογιάνοις ἀεὶ ὡς μικρὸν τοῖσδε*. & pro *ἀεὶ ὡς*, legendum est *ἐστὶν*. Sic proculdubio etiam Dioscorides scripsit, & ipsa re natura indicat. *Μικρὸν* uero expungendum est. Ipse uerborum contextus uidetur à Dioscoridis stylo & loquendi forma in comparationibus plantarum abhorrere. Factum itaque est quorundam diligentia, ut omnes tres ueræ Aristolochiæ differentias habere possimus. Quid autē sit *Holwurcz*, quam male rotundam Aristolochiam uocamus, in Fumi terræ capite indicabimus, ne quicquam relinquere uideamur.

DULCIS RADIX. CAP. 7.

Glycyrrhizam Germani *Süßholz* & *Süßwurcz* appellant. Eadem est cum Scythica, quæ comesta aliquot diebus sitim famemque tolerare Scythas posse, authores tradunt. Plantatur hæc in Germania etiam ad annonam & uetigal. Plinius errauit, quod dicit sine dubio inter aculeatas esse Glycyrrhizam, foliisque eam echinatis describat, id est, aculeatis. Decepit Plinium duorum istorum uocabulorum similitudo, *γύριον* & *ἐχίνιον*. Nā facilis est ex uno in alterutrum lapsus. Dioscorides folia Glycyrrhizæ *γύριον*, id est, Lentisco comparauit. Vidi autem ego Lentisci & Glycyrrhizæ folia: estque his mira in figura, positu & ordine similitudo. Quapropter monendi sunt Pliniani lectores, ne hoc loco Plinii potius auctoritatem, quam naturæ ueritatem, & oculatam fidem sequantur.

CENTAURIUM MAIUS. CAP. 8.

Inuenit olim utrumque Centaurium, & a se appellauit, Chiron Centaurus. Hodie uero quale sit hoc maius Centaurium, omnino incognitum fuit, & adhuc paucissimis, quid reuera sit, notum est. Porro si huius historiæ quis conferat radicem istam grandidem, quam hæcenus improprie Rhaponticum uocarunt Pharmacopolæ, haudquaquam ire inficias potest, idem esse eam cum maiore Centaurio. Neque uero radix tantum descriptioni conuenit, conueniunt etiam caulis, folia, flores & semina. Quapropter non opus fuisset Antonium Musam hoc negare.

CENTAURIUM MINUS. CAP. 9.

Minus Centaurium ob amaritudinem Fel terræ etiam à Latinis appellatur: quam appellationem male ad maius Centaurium transtulit apud Theophrastum Gaza. Non enim amarum gustu percipitur, ut minus. Est autem minus Centaurium ea herba, quam Germani *Tausentguldin* & *Aurin* uocant. Quidam etiam *Fibertraut*. In Pharmacopoliis Centaurea appellatur.

*Cognata huic uidetur Gratiola, sed efficacior.

CHAMAELEON ALBUS. CAP. 10.

Chamaeleonem quidam eum Carduum esse dicunt, qui a nobis Viehdissel appellatur. Alii etiam Marianum Carduum ueluti lacteis maculis in foliis conspersum Chamaeleonem uocant. Sed neutra pars probabile quiddam asserit. Nam Chamaeleon duplicem habet differentiam. Est enim candidus & niger. Ille nullum omnino caule habet: hic uero tantum dodrantali longitudine. Sed Viehdissel & Mariendissel proceros habet caules, qui interdum supra hominis proceritatem excrescunt. Neque hac tantum nota hi Cardui a Chamaeleonibus differunt, carent etiam odoris grauitate, propter quam niger Chamaeleon Ocimoides & Cinozolon uocatur. An autem apud nos etiam nascatur albus Chamaeleon, non facile quiuis dixerit. In Italia uero prouenit, unde allatas radices uidi. Ixia uenenum huius radicibus interdum & in quibusdam locis adnascitur, uisco quo aures capiuntur simile, unde & apud Grecos nomen inuenit. Appellatur etiam ipsa herba Ixine ab hoc uisco, ut apud Theophrastum & Plinium uidere est. Apud Plinium tamen lib. 21. cap. 16. male Helxine pro Ixine scriptum inuenitur.

*Carlina candida maior, quae ex Gargano monte adfertur.

CHAMAELEON NIGER. CAP. 11.

Chamaeleonem nigrum uulgo ignoramus. Mihi tamen ea Cardui species uidetur esse, quae a Germanis Eberwurze appellatur: & historiae enim omnes notae conueniunt, & eosdem habet in curandis malignis ulceribus usus. Sed obiceret quispiam, Nigri Chamaeleonis radicem uenenatam esse intra corpus sumptam, ut Galenus ait: radicem uero, quam nos Eberwurze nominamus, egregiam uim contra pestem & omnia uenena habere. Nos autem respondemus: Non semper huius Chamaeleonis radicem uenenata esse, neque in omnibus locis, sed iis tantum, quibus uisco simile quiddam, quod Ixiam uocant, in radice producit, quod si non habeat, non est uenenata. Nam albi etiam Chamaeleonis radix si sine Ixia sit, intra corpus contra uarios morbos sumitur. Cum uero adnatam Ixiam habuerit, uenenata redditur. Sciendum est illud etiam, in nigro Chamaeleone Ixiam interdum inueniri, ut Plinius lib. 22. cap. 18. circa finem ait, additque omnium generum Chamaeleonis radices scorpionibus aduersari. Quare non sineratione nos quoque nigri Chamaeleonis radice, quam Eberwurze uocamus, contra pestem & uenena utimur. Porro accusare aliquis Plinium posset, quod nigri etiam Chamaeleonis genera uiscum ferre dixerit. Verum cum uiderim in ea radice, quam Eberwurze uocamus, Ixiam nasci, Plinium uera dixisse, & Eberwurze nigrum Chamaeleonem esse, probare possum. Itali nigrum hunc Chamaeleonem Carlinam uocant. *Carlina nigra.

CROCODILIVM. CAP. 12.

Crocodilum nigro Chamaeleoni simillimum est, & saepe legentes fallit. Germani wild Eberwurze uocant. In Pharmacopoliis hodie non habetur.

*Quidam Rhaponticum Germanicum interpretantur, nescio quam herbam sic appellantes.

LABRVM VENERIS. CAP. 13.

Labrum Veneris Graeci Dipsacon, Pharmacopola Carduum fullonum, Germani Wolffstrahl / Weber distel / & Weberkarten appellant. Notus est omnibus Cardius, cuius echinatis capitibus fullones pannum uellicant & exasperant. Dupliscis autem est differentiae. Quaedam enim sponte ubique prouenit, quaedam etiam in agris seritur, quae fullones utuntur. Non desunt qui hanc Cardui speciem Virgam pastoris uocent.

SPINA ALBA. CAP. 14.

Spina alba, de qua hic agitur, ex Carduorum censu est, & ab Arabibus Bedeguar appellatur. Nondum tamen inter doctos conuenit, quo nomine a nobis appelletur: Quamuis Fuchsius Marianum carduum, cuius folia lacteis maculis distincta sunt, Spinam albam esse certo affirmet. Cum uero ueteres hanc albam Spinam simpliciter albo colore descriperint, & non candidis maculis conspersam, quales in Mariano Carduo uidemus, nihil affirmo.

ARABI.

ARABICA SPINA. CAP. 15.

De Arabica Spina, quam Arabes Suchaha uocant, non parua etiam inter doctos & Pharmacopolas contentio habetur, quam componere non est nostrum.

SCOLYMVS. CAP. 16.

Scolymus non est uulgaris ille & incultus Carduus, purpureū habens florem: sed satius ille, quem ueteres Rei rusticae scriptores simpliciter Carduum uocant, Itali hodie & Galli Artocochum. Pulcher est Carduus, cuius fructu siue capite in cibis uestuntur. In Germania nuper etiam feri coepit, non tamen ad libidinis luxum, ut in Italia & Gallia. *Carduus Hispanicus.

POTERIVM. CAP. 17.

Poterion Cardui species est, quæ hodie non cognoscitur: non, ut quidam putant, arbuscula illa, quæ Germanis *Schlehen-dorn* appellatur. Dioscorides Poterion grandem esse fructicem scribit. *Schlehen-dorn* uero frutex non est, quoniā in iustam arboris magnitudinē adolefcit, si non præcidatur. Poterion longos, molles, uiliū modo lentos, graciles, & hircinæ spinæ similes ramulos producit. *Schlehen-dorn* uero non ramulos à terra mittit, sed crassum, durū, inflexilem, & si flectatur continuo fragilem caudicem erigit. Vidi ego Hircinæ spinæ ramulos, qui graciles mollesq; sunt, ut carduorum & aliarum herbarum ramuli. Sed nihil omnino commune cum hac arbore habebant. Poterion totū multa, tenui, lanosaq; lanugine uestitur. *Schlehen-dorn* uero nulla lanuginis uestigia habet, nisi fortē aliquis in uetustis illius caudicibus muscum & uillosam caniciem lanuginem appellare uelit. Sic autem nequaquam intelligit Dioscorides. Multum enim differunt Muscus & Lanugo. Muscus etiam in crassiss tantum arborum partibus inuenitur. Poterion uero totum tam ramulis minimis, quam maximis lanuginem ostendit. Poterion semen siue fructus odoratus, sed medicina inutilis est. *Schlehen-dorn* uero inodorum & medicinæ ualde utilem habet. Postremò Poterion sunt radices neruosa, quæ in terra sectæ gummi lachrymantur. *Schlehen-dorn* uero ligneas habet radices, quæ in terra sectæ nullum gummi emittunt. Certum igitur est, arborem quam nos *Schlehen-dorn* appellamus, Poterion non esse, neq; à Dioscoride describi. At si eam descripsisset, in primo libro, ubi Prunū & alias arbores recenset, quærēda esset, ac minimè inter Carduos in hoc tertio, in quo de radicibus, herbis & seminibus se scripturū in præfatione huius libri pollicitus est.

Non est
Prunus syl-
uestris.

ACANTHIVM. CAP. 18.

Acanthion diminutiuum est ab Acanthio nomen. Est autem sine dubio Carduus, quem Benedictum uocant, Pharmacopola Itali Carduncellum diminuto à Carduo nomine, & Germani pariter Latinis *Cardobenedictum*, & proprio uocabulo *Spinennidistel*, quasi araneæ carduum, propterea quod aranearum telis capita ipsius simili septa sunt lanugine.

ACANTHVS. CAP. 19.

Ex Carduorum etiam genere Acanthus est. Itali eum Brancam ursinam Romanā uocant. In Germania à quibusdam spectaculi causa in hortis colitur. Differt à uulgo hic uocata Branca ursina, umbellifera herba plurimū, quæ à Nicandro & Plinio *Bupleuron*, & à ueteribus Græcis etiam *Buprestis* appellatur. Est & *Buprestis* ex *Cantharidum* genere, de qua in Secundo dictum est.

*Branca ursina Romana, alia syluestris est, alia satiuā.

SYLVESTRIS ACANTHVS. CAP. 20.

Qualis sit syluestris Acanthus, nondum comperi.

ONONIS. CAP. 21.

Ononis ab Italis Remora aratri, Restra bouis, & Acutella, à Germanis uero *Hawhechel* & *Stallfrant* appellatur. Longissimas habet radices, quæ boues & aratra in arando remorantur, unde etiam ab Italis nomen inuenit.

LEVACANTHA. CAP. 22.

Antea habuimus Carduum, qui duobus discretis nominibus *καρδα λευκή* appellabatur. Hic uero composito ex duobus uocabulis nomine, *λευγκανθα* uocatur. Quales autem Carduus sit, hodie ignoratur.

TRAGACANTHA. CAP. 23.

Tragacantha Latini Hirci spinam uocant, cuius lachryma quæ ex secta manat radice, adhuc in Pharmacopoliis Tragaganthum appellatur. Falluntur aliquot recentiores, qui gummi Arabicum Tragacanthæ lachrymam esse putant.

ERYNGIVM. CAP. 24.

Eryngion, quod hodie quidam Centumcapita, & Germani Wallendistel / uel *Kadedistel* uocant, omnium Carduorum pulcherrimum est, propter foliorum specabilem formam, & capitulorum posituram, quæ alibi candida, alibi pallida, & in quibusdā locis cœrulea spectantur. Radices eius in Pharmacopoliis siccatæ & Zacharo conditæ seruantur.

ALOE. CAP. 25.

Aloe omnibus Pharmacopoliis notus est succus, cuius frequentissimus est in Medicina usus. Affertur autem ex India. Herba ipsa etiam apud nos studiose in hortis colitur, ea qua à Dioscoride describitur figura. Quidā Semperuiam Indicā appellant.

* Aliqui Sedum maius uocant. Inspida apud nos est: sed in hypocaustis suspensa, amarescit, uiuif. ac uret. *Suotrina* à loco Succot cognominatur quædam. Prefertur Hepatica. Vilis & arenosa est Caballina.

ABSINTHIUM. CAP. 26.

Absinthium Germani *Wermut* / & *Elsem* uocant. Multas habet quæ statim insequuntur differentias. Hoc loco tamen de uulgari & ubiq; nascenti agitur. Errant qui album Abrotanum, Ponticum Absinthium esse dicunt. Errant etiam qui Cupressum herbam (quam nos *Cypressen* / Græci *Chamecyparissum* nominant) *Scriphid*, id est, marinum Absinthium esse contendunt.

* Nostro Absinthio quia parum adstringit, admisceri potest Rosa.

MARINUM ABSINTHIUM. CAP. 27.

Marinum Absinthium à Scripho Insula etiam Scriphium dicitur. Nascitur maritimis locis, unde nomen inuenit. Pharmacopolæ eius semen habent, quod Alexandrinum semen uocant, quidam etiam Sanctum semen, quod nomen à Santonico deductum est. Nam hoc marino Absinthio simile est, semine tantum exiliore. Nascitur hoc in Gallie & Germaniæ quibusdā locis, & semen eius ab Italis Sandonigo, à Pharmacopoliis Zinæ semen, uel semen Sanctum minus appellatur, Germani utrumque *Wurmsemen* / & *Wurmtraut* uocant.

* Huius semen aliqui semen Zedoariæ uocant. Absinthium marinum aiunt etiam in Germaniæ ora, ut Seebergi, inueniri.

ABROTONVM. CAP. 29.

Abrotonum duplex est, scilicet nigrum & candidum. Illud mas, hoc uero scœmina intelligitur. Mas apud nos in hortis plantatur, & Germanis *Stabwurtz* / *Barthrim* / *Ebreiß* / candidum similiter in hortis seritur, sed interim multis in locis sponte gignitur, propterea à nobis *Wilde stabwurtz* & *Weisse stabwurtz* appellatur: Mas apud nos raro floret, ob nostri cœli frigiditatem.

HYSSOPVS. CAP. 30.

Hyssopus sine dubio est ea planta, quæ adhuc ab omnibus hoc nomine dicitur: quamuis multis argumentis contendere aliquis posset, nos Hyssopo carere. Sed ea argumenta facile dilui queunt, Germani *Jiop* uocant.

* Nascitur circa hunc fruticem Cuscuta, multo reliquis subtilior: qua pro Epithymo, si opus sit, recte utemur. Iena in montibus syluestribus etiam Hyssopus prouenit.

STICHAS. CAP. 31.

Stichas in Stichadibus Insulis è regione Massiliæ olim serebatur, unde & nomē inuenit.

uenit. Huius loco hodie Arabica Stichade utuntur pharmacopola, quæ omnino eadem est, sed densiorem spicam habet. Porro omnibus hodie ignotum est, quidnam sit ueteribus illa herba, quam nos Lauendulam maiorem, siue Spicam, appellamus. Quidam tamen Nardum Celticam esse affirmant: quorum opinionem in Celtica Nar-do confutauit. Alii Rorismarini genus quoddam existimant, inter quos Leoniceus, Manardus & Parens meus fuerunt. Verum neque horum opinioni assentiri possum, salua tamen semper doctissimorum uirorum autoritate, & chari parentis reuerentia. Cum uero ab illorum sententiis omnino recesserim, meam opinionem de Lauendula ista, seu Spica, ut proferam necesse est, ne uidear temere & absque ratione a doctissimorum uirorum iudicio recessisse. Mihi autem omnino persuasi, Spicam istam Stichados speciem esse. Nam nascitur & plantatur iisdem locis, quibus Dioscorides Stichada nasci ait. Sed leue est hoc argumentum. Consulamus ergo omnes alios sensus, qui si integri nobis fuerint, nunquam in iudicandis plantis errare & falli possumus. Iamdudum itaque in ea opinione hæsitauit, quod crederem Spicam istam Stichadis speciem esse. Noli tamen quicquam certi pronunciare, antequam utramque plantam uiam uidissem. Curauit igitur Arabicum Stichada, nostro orbi peregrinam plantam, mihi afferri, allatumque ex Narbonensi Gallia semen terræ mandauit aliquoties: & è semine prodiit planta ramulis, foliis, odore, sapore, & ramulorum foliorumque posita Spicæ Lauendulaceæ per omnia similis. Fragrantior tamē est Arabica Stichas, quam Spica. Neque tamen his notis contentus fui. Animaduerti etiam flores & semina in utraque similima esse, quæ utraque in oblongis spicis gerit. Arabica tamen Stichadis Spica breuior est & densior, quam Lauendulæ siue spicæ.

Huius etiam generis est uulgaris ista Lauendula, quæ ex maiore illa in eam quam uidemus degenerauit. Porro Mesue uehementer errat, quod scribit Arabicam Stichada semen non habere, cum illi satis manifestum & perspicuum sit,

ORIGANVM OMNE. CAP. 32. 33. 34. 35.

Origanum multæ sunt species, ut Heracleoticum, Onitis, Origanum syluestre, et Hircina origanum. Heracleotica uero plures adhuc differentias habet, inueniturque una eius species, quæ forma foliorum & capitulorum Maioranam imitatur. Hæc iam ex Creta à quibusdam allata est, odore iucundissimo. Omnibus illis speciebus nos in nostro orbe caremus, sola syluestri Origano excepta, quæ copiose in nostris montibus gignitur, & à nobis Costen & Wolgemüt appellatur. Hæc iam in pharmacopoliis habetur.

PVLEGIVM. CAP. 36.

Nouerunt omnes Pulegium, quod humentibus locis sponte gignitur, & à quibusdam in hortis & perforatis fictilibus plantatur, propter miram germinandi facilitatem. Nam etiam minutim incisum satumque prouenit & germinat. Germani Poley uocant.

DICTAMNVS. CAP. 37.

Iamdudum à doctis deprehensum est, nos uera Dictamno carere, & diuersissimam ab ea radicem in eius locum recepisse, quam magno errore Dictamnnum nominamus. Constat uera Dictamnus Pulegii foliis, nostra uero, qua pro Dictamno utimur, Fraxini folia habet, quæ longè à Pulegii foliorum similitudine recedunt. Vera Dictamnus etiam foliis Medicinam facit tantum, radices enim lignosæ sunt, propterea rarus illarum usus fuit. In nostra uero solæ radices medicæ uim habent. Dictamni præterea folia densa lanugine utrinque uestita sunt: nostræ autem folia omnino glabra cernuntur. Quapropter in Dictamno hac ualde erramus. Ne autem calumnias & conuicia audire cogar, quod à cōmuni persuasione recedā, indicabo ubi nā uera sit Dictamnus: Georgius Agricola primus in Germaniam Dictamnnum ueram attulit, cum ex Italia rediret. Vidit hic uiuam Dictamnnum cum Scordio in fictilibus uasculis Venetiæ ex Creta allatam. Post hunc magnā illius copiam Olingerus Norimbergā Venetiis ad uexit, à quo peritiores etiā pharmacopole emūt. Nūc autem quorannis magnæ eius facinæ ex Creta Venetiis, à Venetiis Francofordiā afferuntur. Et tam graphice ab omnibus descriptā historiam exprimit, ut non possit melius. Verū minime caule caret, ut

ANNOTAT. VALERII CORDI

Theophrastus scribit. Minimè etiam flore, ut Dioscorides putat. Habet enim purpureum florem. Quapropter hac in parte potius Vergilio, quam Theophrasto & Dioscoridi crediderim, qui caulem & flores purpureos Dictamno tribuit. Sed uenia dignos illos pronuncio, cum multæ herbæ quibusdam temporibus & locis neque caulem neque flores habeant. Non tamen id à proprietate illis inest. Simile in Cynoglossa Dioscorides commisit, quæ quibusdam locis & temporibus caulem & flores minimè producit, cum tamen alibi utrumque producat. Plures sunt herbæ, quibus neque caulem, neque flores, neque semina Dioscorides esse dicit. Ego tamen multis nunc annis hoc obseruare uolens, tale nihil inueni, sed deprehendi eas herbæ, quibus ille caules omnino negat, interdum, ut antea dixi, sic nasci. Illud tamen animaduerti uerum esse, nullam Filicem Filicique cognatam herbam, caules, flores & semina ferre. Thelypteris autem quamuis caulem ferat, flores tamen & semina minimè gignit.

* Vulgarem Dictamnum, Itali Fraxinellam uocant: quod nomen aliqui sigillo Salomonis non rectè adtribuunt.

PSEUDODICTAMNVS. CAP. 38.

Pseudodictamnus antedictæ similis describitur, sed humidioribus locis gignitur. Necessè igitur est, maiorem priore fieri, quod ad folia & caules attinet. Viribus uero multo inferior existit. Non affertur hæc. Satius enim est nobis priore uti, quæ uiribus hanc superat.

CRETENSIS DICTAMNVS. CAP. 39.

Non apportatur ad nos hoc Dictamni genus. Quidam credunt nostram Dictamnum illud esse. Sed hæc ubique nascitur, propterea non opus fuisset, ex Creta eam in Græciam afferri.

SALVIA. CAP. 40.

Eleisphacum Latini Saluiam uocant, Germani Salbey. Optima est quæ minora habet folia. Vehementiorem enim saporem remittit. Nota omnibus Saluia est.

* Saluia cruciata est, de qua Dioscorides sentit, minor. Maior uero, Sphacelus Theophrasti.

MENTHA SATIVA. CAP. 41.

ἡ δὲ ὄσμορον siue μινθώ, Germani Krause müntz appellant, Saxones uero Krause minchen, pharmacopolæ Mentham crispam. Satiua hæc Mentha est, & nisi sæpe transferatur, Sisymbrio similis fit.

MENTASTRVM. CAP. 42.

Mentastrum agrestis Mentha est. Germanicè Pferds müntz appellatur. Serpit per terram hirsutioribus & grauius olentibus foliis, quam satiua Mentha. Sed nemo aquaticam Mentham me intelligere hoc loco credat.

NEPETA. CAP. 43.

Nepeta tres habet species. Est enim montana, agrestis, & fruticosa. Montanam nondum uidi. Agrestis priuatim à Latinis Nepeta uocatur: quod nomen malè nunc tertiæ speciei, quæ omnium ignauissima est, tribuitur. Habet uera Nepeta Pulegii similitudinem aliquam, & nobis Kornmüntz uocatur. Tertia species fruticosa & proceræ est, Germanicè Katzenmüntz uocatur, quoniam feles ea delectantur. Ob eandem causam ab Italis Mentha cataria dicitur. Græci omnes has species Calaminthas uocant. Recentiores pharmacopolæ ueram Neperam Calamentum & Mentham non odoriferam dicunt, ut distinguatur à satiua & odorata Mentha. Verum inepta est hæc distinctio, cum Calamentum etiam ualde odoratum sit.

* Nepeta alia est montana, Steinmüntz, alia propriè dicta, in aruis & humidis locis, Kornmüntz, alia falso dicta Nepeta, Katzenmüntz.

THYMVM. CAP. 44.

Thymus in multis Germaniæ locis in hortis plantatur, & à nobis Tymchen uocatur. In calidioribus regionibus sponte gignitur. Is uero qui in Creta nascitur, spicata habet capitula, & fragrantissimum spirat odorem. Nonnunquam etiam ad nos affertur, & à pharmacopolis Thymus aromaticus appellatur.

THYM=

THYMBRA. CAP. 45.

Thymbra sylvestris, & sativa est, utraq; Cunila à Latinis dicitur, sativa uerò Satureia tantum. Hæc à nobis Saturey & Gartenfunel dicitur. Nemo credat, Columellam Thymbra à Satureia diuersam facere herbam, cum ait: Et Satureia Thymi referens Thymbraeq; saporem. Satureia enim uocabulo satiuam Cunilam intelligit, Thymbra uerò sylvestrem. Quasi dicat: Satureia quæ Thymbra sativa est, medium habet inter Thymum & sylvestrem Thymbra saporem. Sylvestris autem Satureia, quæ proprie Thymbra uocatur, & ipsa iam affertur ex Creta pro Polio, sed falso, habetq; circa se cuscutam Epithymi modo, quam Paulus Aegineta, Epithymbum uocant.

SERPILLVM. CAP. 46.

Serpillum quoddam satiuum, quoddam etiam sylvestre est. Satium hodie non temere cognoscitur. Errant itaq; qui nostrum Pulegium illud esse credunt. Sylvestre uero ubiq; in asperis nascitur, & à nobis Quendel funel & Feldtkunel uocatur. Quidam aded inertes sunt, ut Feldtkunel & Feldtkümmel eandem rem esse credant: cum hoc uocabulo Caron agreste, illo uero Serpillum sylvestre Germani intelligant. Porro magnam similitudinem Cunila cum Serpillo habet. Propterea hoc illius etiam nomen sibi apud Germanos adoptauit.

SAMPsvCHVM. CAP. 47.

Sampfuchus siue Amaracus, Latinis Maiorana, Germanis Meyerott uocatur. Omnibus nota est herba, illud tamen reticere nolo, Amaraci nomine etiam aliam herbam Galeno, Dioscoridi, & aliis Græcis significari. Nam Galenus libro tertio *de med. fac.* Amaracum non boni odoris esse indicat, propterea eam delicati cuiusdam emplastro miscere noluit. Quid uero sit Amaracus, quam eo loco intelligit, postea eodem hoc libro in Parthenio indicabimus.

* *Sampfuchum aliud semine feritur: aliud surculo, quod fruticescit.*

MELILOTVS. CAP. 48.

Melilotum Latini Sertulam Campanam uocant. Non idem Melilotum omnes pharmacopola habent. Quidam enim humi stratam trifolii speciem, (Heluetii uocant Gäle Taubenröppie) quæ luteos habet flores, pro Meliloto accipiunt, sed male. Neq; recens enim, neq; sicca aliquam odoris bonitatem habet: Melilotum uero fragrantissimum habere debet, præsertim siccum. Propterea hoc Dioscorides cū Sampfuchio inter alias odoratas herbas describit, li tamen melius faciunt, qui Steinleuc appellatam Loti siue Trifolii specie, pro Meliloto accipiunt. Odorata enim est ualde, præsertim quæ luteos habet flores: hi siccati melius etiam olent.

* *Melilot uera gratissimum habet mellis odorem: eius uera effigies exhibetur à Eufasio.*

MARVM. CAP. 49.

Maron olim omnibus nota fuit herba, propterea (ut in re nota sit) forma eius descripta non fuit. Hinc factum est, ut hodie omnino ignoretur.

ACINOS. CAP. 50.

Acinos nisi Ocimum Cariophyllatum fuerit, quod Germani Krauß basilien uocant, omnino incognita est hoc tempore.

BACCHARIS. CAP. 51.

Bacchar siue Baccharis, coronaria est herba. Cuius caput in quibusdam exemplaribus malè Afari capiti commixtum est, & ab imperitis additum, ut supra, cum de Asaro ageremus, dictum est. Bacchar uerò quo nomine iam appelletur, ignoratur. Ruelius eam nouisse se putat. Ego uerò qualem ille herbam intelligat, non scio.

RVTA. CAP. 52.

Rutam Germani Rauteu/siue Weinrauten appellant. Omnibus nota est herba.

Habet

Habet autem suas differentias. Vna enim sativa est, de qua nunc agitur. Altera sylvestris, odoris & saporis acrimonia sativam superans. Hanc Arabes Harmel siue Ar-mel uocant : pro cuius semine Cicutæ semen magno periculo hæcenus in usu fuit, quem errorem alii ante nos animaduerterunt.

RUTA SYLVESTRIS. CAP. 53.

Parens meus in suo Botanologico ait, nostrum uulgare Hypericum siue Perforatam, Afcyron, id est, alteram Hyperici speciem esse. Antonius Musa uerò negat, & scribit nostram Perforatam omnino eam esse, quæ hoc loco à Dioscoride Ruta sylvestris uocetur. Miror autem quomodo in tam peruersum iudicium incidere potuerit, uir ille aliàs acerrimus simplicium censor. Quòd autem hac in re falsum iudicium tulerit, nunc conabimur ostendere, à temperamento Rutæ sumpto initio. Certum est secundum Galeni, & omnium Medicorum sententiam, atq; ipsa experientia comprobabat, sativam Rutam in tertio iam completo exsiccantium ordine siue gradu esse, stris uerò Ruta integro gradu in caliditate & siccitate satiuam excellit: quo fit, ut non sine nocumento intra corpus sumatur. Qui igitur hæc probè considerauerit, nullo modo iudicabit Perforatam sylvestrem esse Rutam: quippe cum Perforata in secunda uæ Rutæ, nedum sylvestris temperamentum habere. Qui hoc credere noluerit, ipseprehendit. Sed dicent aduersarii, & errorum eorum affectores (ut sunt ad calumnias prompti) cœli temperamentum in causa esse, ut Perforata apud nos in calore deficiat. Eos suo gladio iugulabo. Nōne idem cœli temperamentum etiam ipsam Rutam in calore integri gradus intervallo satiuam rutam nō assequatur, minime uerum esse potest, quòd Musa ait Perforatam rutam sylvestrem esse. Nec animaduertit Rutæ sylvestris uersa sylvestris Rutæ historia hoc capite in quibusdā exemplaribus legitur, ac malè si bi ipsi totum caput cohaeret. Necesse igitur est unam ex illis notam & adiectitiam esse. Quæ autem illa sit, ipsa ratio & meliorum codicum fides docere potest. Siquidem in principio huius capituli tota Hyperici historia legitur, quæ malè ab imperito quodam huic capiti preposita est. Quilibet enim hoc, qui legere tantum Græcas literas potest, iudicabit. Nam de uerbo ad uerbum totum Hyperici caput huic loco accreuit. Hæc tulit, non animaduertens Hyperici descriptionem esse, neq; hoc loco in probatis & sinceris codicibus legi. Abiecta igitur adulterina hac historia, uera & genuina sequetur, quam ille neglexit. Eam autem Rutæ speciem à quibusdā in Italia feri uidit hæc aliquot cum foliis, floribus & seminibus ramulos secum ex Italia attulit, eos ego diligenter inspexi, & historiae contuli. Cui postquam per omnia respondere sunt uisi, ipsa me rei ueritas pronunciare cōegit, ipsos de Ruta sylvestri decerptos fuisse. Hæc uero Ruta omnibus ignota est pharmacopolis. Porro amicis hæc scripsimus. Nam si necesse foret, ualidiora adhuc allaturi essemus argumenta. Hæc candidis ingeniis sufficiant.

*Nostrum Ligusticum habet candidum semen, quia est sativum: Dioscorides de sylvestri loquitur.

CAP. 54. Moly, Galeno & Hippocrati Myle est.

PANACES HERCVLEV. CAP. 55.

Panaces Herculeum malè apud Theophrastum Ligusticum interpretatus est Theodoros Gaza. Sunt enim natura diuersa, non tamen penitus dissimiles ferulaceæ plantæ, quod ad radicem, caulem & semina attinet, folia uero plurimum discrepant. Ipsa herba

herba apud nos non nascitur sponte, in Italia uero à quibusdam ostentationis gratia eam feri audio. Ex radice incisa liquor manat, qui opoponax & opoponacum uocatur, cuius adhuc est frequens in medicina usus. Atqui non queo satis admirari præcoces eos & temerarios in demonstrandis plantis iudices, qui quàm primum unica tantum nota & similitudo historię siue descriptioni conuenerit, tam facillè plantam aliquam, hoc uel illud esse pronunciant, reclamantibus interim plurimis descriptioni notis. In eorum etiam numero Itali quidam sunt, qui nostram uulgarem Brancam urfinam Panaces Herculeum esse putant, nobisq; Germanis semen eius ceu rei exoticæ mittunt, cum tamen apud nos nihil illa uulgarius ex ferulaceis herbis inueniatur.

PANACES ASCLEPIVM. CAP. 56.

Panacis hoc genus ab inuentore suo nomen inuenit. Hodie uero non cognoscitur.

PANACES CHIRONIVM. CAP. 57.

Inuenit olim Chiron Centaurus, & à se nominauit hoc, quod nunc ab omnibus ignoratur, Panaces.

* Quidam mentam Saracenicam uocant, sed falsò: Theophrastus quidem Panaces Chironium, Helenium uidetur. Nam aliud quam Nicander & Dioscorides Chironium habet.

LIGUSTICVM. CAP. 58.

Ligusticum à Liguria, ubi copiose nascitur, appellatum est. Galenus Libypticum uocat, pharmacopolæ Leuisticum, Germani Liebstöckel.

* Nostrum Ligusticum habet candidum semen, quia est satium: Dioscorides de syluestri loquitur.

PASTINACA ERRATICA. CAP. 59.

Erratica Pastinaca à Germanis Wilde mören/ & Vogelsnest/ propter umbellæ figuram, appellatur. Græcis Σταφυλιν & ἄγριον, pharmacopolis uero Daucum. Sed omnes authores Daucum diuersam herbam ab hac syluestri Pastinaca faciunt. Propterea hic scriptor Daucū seorsim etiam descripsit, cuius caput statim sequetur. Sunt igitur diuersæ herbæ, syluestris Pastinaca & Daucus.

* Pastinaca alia est satina, alia syluestris. Satina rursus duplex: Gallica, Pastenac uel Pasteneye. Germanis Carota, Mören/Rüble. & similiter syluestris, alia Gallica, Rossbibenelle/ Wilde Mören: alia Daucus dicitur, Germanis Vogels nest.

SESELE. CAP. 60. 61. 62.

Seseleos multæ sunt species, ut Massiliense, Aethiopicum & Peloponnesiacum: Est etiam Creticum, quod proximè sequitur. Aethiopicum autem & Peloponnesiacum, hodie à nobis non cognoscitur. Solius Massiliensis semen pharmacopolæ habent, Sileris montani appellatione, quod nomen à Sile deduxerunt. Nam Sefeli ueteres etiam Sili & Seli uocabant. Siler uero pumile falicis genus quoddam est, in a quosis proueniens.

* Sefeli Massiliensi, uulgo Rosskummel.

TORDYLVM, ID EST, CRETICVM SESELI. CAP. 63.

Τόρδυλον sunt qui τορδύλιον uocent. Nicander Hordylon, Aegineta τὸρδύλον, nisi uitium in exemplaribus sit. Herba hæc qualis ueteribus fuerit, nulli hæctenus cognitum est ex recentioribus, qui de simplicibus scripserunt. Ego tamen affirmare ausim, eam esse quæ à Germanis Berwurtz appellatur, à quibusdam etiam Meur, sed falsò. Parens noster in Botanologico suo herbam, quam Berwurtz uocamus, Daucum Creticum esse putauit. Semen uero manifestè historiæ reclamationem, quod ille nondum uiderat. Quapropter ab illius sententia libenter recedo, ne charum alioqui patrem pluris quàm ipsam rei ueritatem æstimare uidear. Non enim is sum, qui suos suiq; parentis errores defendat. Econtrà uero si iniuste ab aduersariis reprehendatur, me illum defendere uis naturæ iubet.

SISON. CAP. 64.

Sison siue Sison, exiguum semen est. Hoc tamen nomine à pharmacopolis non cognoscitur, qui duo semina Amomi appellatione ostendunt. Vnū rotundum & Paucere minus, neq; acre, neq; odoratū, quod Botryos semē est. Alterum uero Apiti siue Pe-

ANNOTAT. VALERII CORDI

ue Petroselini semen figura & quantitate æmulatur, colore nigrum, cum tunditur odoratum, & in gustu aromatica acrimonia linguam pungens (ut fere omnia in umbellulis genita semina.) Posterius hoc sine dubio est illud semen, quod Dioscorides aliiq; ueteres Sison siue Sinona appellarunt. Recentiores Medici, qui barbaro illo seculo uixerunt, & pharmacorum compositiones in luminaribus suis, ut uocant, conscripserunt, malè Petroselinum Olusatrum (quod illi corruptè Olixatrum uocant) & Sinon (quod Sinonum appellant) idem esse putant.

ANISVM. CAP. 65.

Anisum omnibus notum est semen, quod in pharmacopoliis nomen suum retinet. Quidam etiam Fœniculum Romanum illud appellant, cum tamen Romæ idem habeant Fœniculum, quod nos. Semine uero nostro dissimile Fœniculo est. Seritur in Germania multis locis ad uestigal, & à nobis Anis uel Enis appellatur.

CARVM. CAP. 66.

Κάρο siue Caron, Latini Carum uel Careon, pharmacopolæ Carui, Germani Wiesenfœmel siue Fœldfœmel, uocant. Nascitur in pratis & campestribus pinguibus (non tamen uliginosis) locis. Semine eius quotidie in cibis utimur.

ANETHVM. CAP. 67.

Anethum umbelliferum olus est, Fœniculo simile, latiore tantum semine. Pharmacopolæ herbam eodem nomine appellant, Germani uero Tilli.

CYMINVM SATIvvm. CAP. 68.

Cyminum sunt qui Cuminum appellant, pharmacopolæ Cyminum, siue Cyminum Romanum, Germani Kramfœmel, Römischer fœmel.

CYMINVM SYLVESTRE. CAP. 69.

Alterum
Nigella species.
Nigella cornuta.

Duplex sylvestris Cymini genus hoc capite describitur. Vnū satiuo simile semen, sed glutinosum ferens, quod Haberfœmel à Germanis uocatur, quoniam auenæ modo glutinosum sit. Apportatur hoc aliunde cum satiuo in Germaniam. Alterum Nigellæ potius quam Cymino simile est. Cum uero Nigella quoq; à quibusdam Cyminum nigrum uocetur, potuit etiam ad hanc herbam Cymini appellatio transferri. Vidimus eam saepe in agris, & hic quoq; in Vuittenbergenfi agro Medicinæ studiosis ostendimus. Est autem uerè Nigellæ omnino similis foliorum incisuris, florum figura & colore, seminum colore & odore: fruticosior tantum, & semen non uasculo continuo ut Nigella, sed in corniculis pluribus ex uno principio sine flore sursum crescentibus. Hoc Germani Kornfœmel, id est, cornutū Cyminū uocant. Ruellius libro iiij. cap. xliiij. ait, ad alterius sylvestris Cymini descriptionem satis accedere uideri herbam, quam sua rura Cornutam (à Corniculis) uocant. Qua in re bene iudicat Ruellius, propterea nequeo non illius iudicium probare. Atq; utinam ubiq; similiter iudicaret.

AMM. CAP. 70.

Ammi Latini Ammum, pharmacopolæ Ameos nominant. Peregrinum nobis semen est, & interdum eius loco Petroselini semen Materialistæ pharmacopolis uenerunt. Seui aliquoties mihi missum recens Ameos semen, & nostrum coelum minime respuit, habetq; mediam inter Apium & satiuum Petroselinum figuram.

* Circa Geslariam sponte nascitur.

CORIANDRVM. CAP. 71.

Κόριον ἢ Κοριανδρον, Latini Coriandrum, Germani Wandfœntill (à cimicibus & anetho composito nomine) & Coriander uocant. Nomen inuenit à foedo odore, quo, cum uirida adhuc est, Cimices imitatur. Pluribus Germaniæ locis ad uestigal ab holitoribus seritur.

HIERA

HIERACIUM MAIUS. CAP. 72.

Non reor Dioscoridem hoc loco inter umbelliferas plantas Hieracium descripsisse. Cum enim sint Intybaceæ & oleraceæ herbae, eas in secundo libro, ubi de Lactuca & Intybo agitur, describi oportuit. Est autem Hieracium maius Intybi agrestis species, quæ à Germanis Wilde Sewdistel uocatur.

HIERACIUM PARVUM. CAP. 73.

Hieracium paruum à Germanis Pippaw/ Pfaffenblatten / & Sommerdohr uocatur. Coliculus breuem, tenerum, concavum, & glabrum sine ramulis & foliis à terra ex circumstratis foliis erigit, in summo luteum orbiculatum & latum florem sursum, qui postquam in pappos resolutus fuerit, uestigium relinquit sacrificulorum raris simile. Porro utrunq; Hieracium nomen ab accipitribus accepit, qui eius lacteo liquore oculorum suorum aciem acuerè existimantur. Idem etiam de Aquila quidam tradunt. Pharmacopolæ rarò has herbas colligunt.

* Fuchsius Hedyphnoida uocat.

APIVM SATIIVM. CAP. 74.

Omnibus cognitum est satium Apium, quod Germanis Eppe/ deducto ab Apio nomine, & Wercf/ uocatur. Apium etiam sponte in nigro & pingui solo circa pagorum fossas ac riuulos nascitur, satiuo per omnia simile, & idem, præterquam quod non colatur. Copiose autem hoc inter Lipsiam & Merseburgum urbes circa pagos crescit.

* Apium satiuum aliud est latifolium, Wercf. aliud crispum, nostrum Petroselinum.

PALVSTRE APIVM. CAP. 75.

Ἐλεοσέλινον apud Theophrastum Paludapium non indoctè uertit Theodorus Gaza. Qui quamuis Græcus natione esset, primus tamen fuit, qui in Latina lingua Græcarum dictionum compositiones imitari auderet, nec infelicitè Latinam linguam in rerum appellationibus auxilium uideret. Est autem palustre, siue rusticum Apium, grædis herba, Apio satiuo similis, in palustribus proueniens, quæ à Germanis Wassermerc appellatur. Nullus eius apud nos est in Medicina usus. Cum tamen eadem omnia quæ satium possit.

* Eleoselinum maius, Wassermerc: minus, Wilde Wercf.

MONTANVM APIVM. CAP. 76.

Montanum Apium quid sit, hodie omnino ignoratur. Nolo tamen præterire, uehementer errasse interpretem Virg. Marc. quod capitula huius Apii Papaueris capitibus comparauerit. Ruellius autem Cicutæ capitibus illa similia uertit, & hoc quidam optime, ut nunc ostendimus. Magna enim est ineptia, umbellifere plantæ capitula, id est, ipsas umbellas papauerinis capitibus comparare, cum nulla sit inter utraq; illas partes proportio uel similitudo. Græci tamè exemplaris culpa est, quod Verg. Marcellus in uertenda hac nota peccauerit. Nam in illo legitur: κεφαλὰ μικρὰ παρὰ μὲν παρὰ, ubi ille μικρὰ Papauer uertit, cum tamen μικρὰ Papauer, μικρὰν uero ex papauerè expressum succum significet. Quis igitur herbarum partes succo alicui conferret? Verum abundat in ea dictione μν, syllaba, & simpliciter κωνία legendum, quod est Cicutæ. Et sic etiam uertit Barbarus. Omnes enim Apii species in umbellis flores & semina ferunt, & minime in papauerinis uasculis. Propterea sine dubio ipse Dioscorides huius montani Apii capitula siue umbellas Cicutæ capitulis comparauit, quæ etiam umbellas & minime papauerina uascula fert. Venia dignum Marcellum pronunciarem, si non ipse etiam omnia argumenta, quæ pro nobis sunt, probè sciuisset, & pro sua uersione contra Barbarum Apologiam scripsisset, in huius capituli Commensario.

PETROSELINVM. CAP. 77.

Quamuis Petroselinon quoq; similiter in montibus ut Oreoselinum nascatur. tas
K

men diuersa sunt herbae. Petroselinum enim non tantum in montibus gignitur, sed praeceptis illorum petris, unde nomen inuenit. In Macedonia optimum nascitur, unde de Macedonicum etiam appellatur. Ostendunt eodem nomine grande & nigrum quoddam semen pharmacopoeae, quod Ruellius etiam uerum Macedonicum Petro selinum esse credit, lib. iiii. cap. xlvii. Cum uero Petroselini semen Ammio candido & minimo semini comparetur, nequaquam uulgo uocati Petroselini Macedonici se- hoc semen Petroselinum Macedonicum non recte uocetur, eorum culpa est, qui in suis luminaribus docent, Petroselinum Macedonicum & Olusatrum, siue Olixatrum, (ut illi pronunciant) idem esse: sed magno errore. Habet enim Olusatrum proprium tur Petroselinum, ut sequenti capite indicabimus. Porro uero Macedonico caremus: Quod uero eodem nomine apud nos in hortis seritur, illius speciem cultura mansue- factam esse minime inficias eo. Hoc a nobis *Petersilien* appellatur.

OLUSATRV. CAP. 78.

Hipposelinum Theodorus Gaza apud Theophrastum Equapium uertit, pro- pter magnitudinem sic a Graecis uocatum. Est autem Olusatrum sine dubio ea Apii species cuius semen hodie in pharmacopoliis Petroselinum Macedonicum appellant. Omnes enim notae descriptioni conueniunt. Idem etiam Musa sentit. Ruellius Olu- satrum non cognouit, cum huius semen antea Petroselinum esse dixerit.

SMYRNIV. CAP. 79.

Smyrnion a Myrrha nomen habet, quoniam radicis lachryma & semen Myrrhae aliquem odorem & saporem habeant. Hanc herbam pater Angelicam esse dixit, non uulgarem tamen, sed quae in Pomerania & Brisgoia nascitur, nigra foris radice: & hac in re dubium non est. Ruellius non scuit, Smyrnum hodie Angelicam uocari, alio- qui non affirmaret, Angelicam Laserpitium Gallicum esse. Inuenit enim in quibusda- artis ueterinariae compositionibus Laserpitium Gallicum requiri. Postquam igitur fatiur Angelicam in Gallia uidisset, statim, (sed temere) iudicauit, eam Laserpitii Gallicum esse. Cum uero a nullo unquam probato authore aliqua Laserpitii species in Gallia nasci scribatur, nec eius historia a quoquam ponatur, uana haec est coniectu- ra, qua patriam suam celebrare conatur, ut similiter Laserpitiferae appellentur Gallie, quemadmodum Cyrenae, quas Catullus Laserpitiferas carmine suo appellat. Sed e- sto (quod non est) Angelica Laserpitium Gallicum uocetur, tamen etiam Smyrni- um esse potest. Quapropter ipse Ruellius Smyrnum quoque non cognouit, quamuis herbam uiderit. Ille Smyrnum eam esse herbam dicit, quae Gallis Leuechia, siue Le- ueche, appellatur. Cum uero ego compertum habeam, Leueche a Leuistico deductum & corruptum uocabulum esse, & sic Gallos fatiur Ligusticum appellare, † minime uerum est quod scribit, Leueche Smyrnum Gallis uocari. Porro uerum Smyrnum, id est, Angelica, a Germanis *Heilig geyst wurz* / *Brustwurz* & Angelick uoca- tur: quibus nominibus ea est intelligenda, quae ex Pomerania & Brisgoia affertur ra- dice nigra. Nam aliud etiam genus ubique in uliginosis circa paludes & profluentes, & in humidis petris prouenit, quod multis notis a priore discerni potest.

† Bene diceret Cordus, si nostrum Ligusticum seu Leuisticum uulgo dictum, cum ueterum Ligustico conueniret.

ELAPHOBOSCVM. CAP. 80.

Ad Elaphobosci descriptionem satis accedere uidetur herba, quae Germanis *Gir- schel* appellatur, alias *Gerpe* uel *Stranzel*.

FOENICVLVM. CAP. 81.

Marathrum Germani *Fenchel* appellant. Notum omnibus est, ferulaceam & um- belliferam herbam esse Foeniculum.

HIPPOMARATHRV. CAP. 82.

Hippomarathrum grande & syluestre est Foeniculum. Describitur & alia sylue- stris Foeniculi species, sed utraq; hodie ignoratur, quamuis Ruellius sibi Hippoma- rathrum cognouisse uideatur.

* Foeniculum syluestre crassius est satiuo, & grauioris odoris, Wilder Fenchel. Pleriq; cum Peucedano confun- dunt hodie: sed Peucedano odor est grauior, radix foris nigra, Hippomarathro candida.

DAUCVM. CAP. 83.

Hic Daucus à syluestri Pastinaca plurimum differt, habetq; multas species. Omni um uero maxima Pastinaca Gallica à Plinio uocatur, cui alia similes sunt, sed multo minores. Omnes hæ in Germania Pimpinellæ uocantur, uulgo Bibenelle/ quarum radices & semina ualde acrem habent saporem. Itali, inter quos etiam Musa est, aliam herbam Pimpinellam uocant: eam scilicet quam nos Bistrotrop, sicut appellamus: cuius duæ sunt species: Vna purpureo, altera pallido, cum floret, capitulo. Hæc in æditis & asperis nascitur, illa in pinguib; & lutosiis pratis: utraq; Italici ad cibos expetitur, habetq; Dauco, id est, Pimpinellæ nostræ similia folia, minime tamè umbellâs. Temperamento uero contrario constat, uulnera capitis mira efficacia sanat, quas uires uulgares herbarii magno errore nostræ Pimpinellæ tribuunt. Porro minime est negandum, quod etiam Pastinaca syluestris à ueteribus, & ab hoc ipso authore interdum Daucus uocetur. Propterea non merito aliquis Pharmacopolas reprehendet, quod Pastinacam syluestrem Daucum nominent.

DELPHINVM. CAP. 84.

Suspicio Dioscoridem nullum Delphinium, præsertim hoc loco, descripsisse. Neq; enim Galenus, neq; Aegineta huius mentionem in simplicium censu faciunt, cum tamen alias de omnibus quæ in Dioscoride describuntur simplicibus, ipsi quoq; agunt. Neq; hoc caput in antiquis codicibus legitur, neq; hoc loco inter umbelliferas herbas siliquis ferens describi debuit. Est enim hoc contra authoris huius institutum & ordinem. Non tamen nego fuisse Delphini appellatione ueteribus herbam, sed à Dioscoride non depictam.

* Aliqui Delphinium interpretantur Weydenkraut: cui folia salicis tribuunt, sed incisa.

DELPHINVM ALTERVM

PYRETHRVM. CAP. 85.

Pyrethrum Latini etiam Saluarem appellant. Radices eius in pharmacopoliis habentur eodem nomine. Seritur in Germaniæ multis locis ad uestigal, & à nobis Græco uocabulo corrupto Perthiam/ propriis uero nominibus Gemeurwurcz/ sine Gemeurwurcz, id est, gustu feruida, & saluaria uocatur. Ruellius malè folia eius Gallicæ Pastinacæ comparauit, cum tamen Dioscorides simpliciter ea syluestri Dauco comparauerit. Hoc autè loco per syluestre Daucum, Pastinacæ syluestrem intelligit. Nam huic similia folia Pyrethrum habere ipse inspexi. Gallica uero Pastinaca ualde lata habet, & Pyrethro dissimilia folia. Atqui Ruellius malè Gallicam Pastinacam idem cum syluestri Pastinaca, siue Carota esse putat. Quamuis autè Gallus fuerit Ruellius, minime tamen Gallicam Pastinacam cognouit, neq; ipsum Pyrethrum nasci uidit: quod ex Plinio & illius uerbis facile demonstrare possem.

* Pyrethrum minus, Wilder Bertram. Draco non est Pyrethrum.

LIBANOTIS. CAP. 86.

Libanotidis species, quæ hoc loco describuntur, nobis hodie omnino incognitæ sunt, & plurimè differunt à nostro uulgari Rosmarino, qui frutex potius quam herba est. Quidam tamen putant nostratam Rosmarinum hanc ueram Libanotida esse, sed apud nos degenerare. Verum hi toto cælo aberrant. Sunt enim diuersissimæ plantæ. Illæ enim, de quibus hic agitur, umbelliferae & Foeniculo similes sunt: quæ similitudo nullam habet cum nostrate Rosmarino proportionem. Nam quoties degenerant plantæ, minores aut maiores, aut debiliores euadunt, seruata semper eadem proportionem. Hanc autem Libanotida in Theriacis suis intelligit Nicander, & minime nostratam, quæ proprium ab illo genus habet, ut proximo capite sequetur.

* Libanotidem primam aliqui putant esse Angelicam syluestrem uulgo dictam, Wilde Angelica, secundam uero Schwarz Buschwurcz/ quam alij Sefeli Aethiopicum faciunt.

CANCHRYS, SEMEN LIBANOTIDIS. CAP. 88.

Quæ hoc loco describitur coronaria Libanotis, à Romanis & Germanis Rosmarinus uocatur: & hæc est quæ ubiq; ad coronas plantatur, habetq; diuersum genus à priore. In Italia & quibusdam Galliarum tractibus copiose nascitur sponte, apud nos uero satius est tantum.

SPONDYLIVM. CAP. 90.

Spondylium Latini Verticillarem uocant. Hodie nobis incognita est planta. Ruellius eam cognouisse uidetur, ait enim à Gallis Panacum syluestrem uocari. Videndum igitur est, quamnam ille herbam intelligat.

* Ruellius proculdubio sentit de ea, herbam, quam multi imperiti apud Germanos brancham ursinam falso uocant. Ea quidem ad Spondylii descriptionem melius accedere uidetur quam Astrantia uulgò dicta, Meisierwurzel, quæ nonnullis Spondylii nomine appellatur.

FERULA. CAP. 91.

Nigella Latini Ferula appellatur. Grandis hæc est & Foeniculo similis planta, pharmacopolis hodie incognita. In Italia sponte quibusdam locis prouenit. Germania uero à paucissimis feritur ostentationis gratia. Omnes umbelliferae plantæ ab hac ferulae dicuntur, ceu Foeniculum, Peucedanum, Anethum, &c.

PEUCEDANVM. CAP. 92.

Peucedanum Latini Peucedanum, Germanis Hasstrangt uocatur. Notum est Medicis & pharmacopolis Peucedanum.

* Herba Sulphurata.

NIGELLA. CAP. 93.

Nigella Latini Nigellam, Germani Schwarzen Kimmel appellant. Errant uehementer, qui in segetibus longis hirsutisq; foliis, & rubente flore nascentem herbam Nigellam uocant, quæ à nobis Rader appellatur.

LASERPITIVM. CAP. 94.

Silphium Latini Laserpitium, pharmacopolæ Asam foetidam, Arabes Aniudæ, Germani Teufelsdröck appellant. Multi opinantur (inter quos etiam pater meus fuit) Asam foetidam minimè esse Silphii liquorem, solo odore rem æstimantes. Verum ij falluntur. Differt enim secundum regionis diuersitatem Silphium. Optimum est Cyrenaicum, quo hodie caremus. Quod uero nos habemus, ex Media & Syria afferitur, cui Dioscorides uirosi odorem tribuit, quem in Asa foetida aperte sentimus. Certum igitur est, nos eam saltem Silphii speciem habere. Illi autem uehementer errant, qui Asam dulcem siue Benzoi, uerum Laserpitium esse putant, in quorum numero etiam est Ruellius, qui Beniuinum pro Benzoinum scripsit, & interpretatur prolem Iudeæ parentis, cum tamen Benzoi non in Iudæa nascatur, sed ex India afferatur. Porro non erit inutile, differentiam ostendere inter Laserpitium & Benzoi, ne aliquis ad falsam illorum opinionem inclinaret. Certum est Silphii liquorem ex ferulacea & Apio simili planta manare. Qui uero Benzoi ex India afferunt, uidisse se dicunt proceram arborem, ex qua resina modo destillet, quod incolæ Benzoi nomen, ex hoc pinguisimum florem exprimunt, quem sibi reseruent, ac potentissimis regibus pro magno dono mittant, oleum Beniuinum uocantes, & quo Diis suis supplicent. Sedimentum uero quod superfuerit, sicca resine simile aduenis mercatoribus uendi, & demum ad nos etiam afferri. Lignum etiam huius arboris in sacrificiis iucundissimo odore accendi, habetq; in maximo precio & honore.

SAGAPENVM. CAP. 95.

Sagapenum pharmacopolæ corrupto uocabulo Serapinum dicunt. Herba ferulacea in Media nascentis liquor est.

EUPHORBIVM. CAP. 96.

Euphorbium acerrimus est liquor, qui eodem nomine in pharmacopoliis uocatur. Nomen uero ab Euphorbo, lubæ regis Libyæ medico & fratre Musæ, Augusti Cæsaris medico, inuenit.

* Non est propriè arbor, liquor eius adulteratur lachryma Esule & Tithymalli.

GALBANVM. CAP. 97.

Galbanum uerum eodem nomine à pharmacopolis cognoscitur. Et hoc ferulaceæ cuiusdam plantæ, Metopium appellatæ, liquor est.

GVTTA AMMONIACA. CAP. 98.

In Libya circa Hammonis Iouis delubrum, ex ferulacea planta colligitur Hammoniacus liquor, qui & Hammoniacum Thymíama à Græcis Medicis appellatur. Qui dam autē Interpretes cum apud Galenum legunt: *Αμμωνιακὸν θυμιάμα*, duas dictiones uirgula distinguunt, diuersas res intelligentes, sed falsò.

SARCOCOLLA. CAP. 99.

Sarcocolla notum est in pharmacopoliis gummi, quod in Perside ex arbore quædam destillat, & in minimos grumulos concreuit.

GLVTINVM. CAP. 100.

Glutinum siue Gluten, *κόλλα* Græcis, Germanis *Leim* uocatur. Ligna eo conglutinantur, propterea etiam à Græcis *Ευλόκολλα*: & quod ex taurino corio excoquitur, *Ταυρόκολλα*, uocatur.

GLAUCIUM. CAP. 101.

Malè quidam credunt, Glaucium (Arabes Momithe uocant) cornuti Papaueris succum esse. Nam ex sui generis herba colligitur. Hodie uerò ad nos non amplius affertur.

* Quidam *Ratzenzägel* interpretantur.

ICHTHYOCOLLA. CAP. 102.

Ichthyocolla à pharmacopolis colla, siue gluten piscium, à Germanis *Hausenblasen* uocatur, quod scilicet piscis illius ex aluo sumpta membrana sit. Vtimur ea in gelandis croceis piscium iusculis. Excoquitur etiam ex membranis illis, quemadmodum ex boum coriis pulchrum, flauum & translucidum gluten, Germanis *Wunderlein* uocatum, quod eius madefactis in ore frustis chartæ glutinari soleant.

VISCVM. CAP. 103.

Germanis *Dogelleim* appellatur. Ex multis arboribus Viscum fit, quales sunt Myxæ fructus, Aquifolia, & ea quam nos *Madich* appellamus. Hoc uero loco Dioscorides Viscum intelligit, quod ex frutice illo fit, quia Germanis *Wissel* appellatur, nunquam per se à terra crescente, sed aliis arboribus ceu accidens adnascente. Inuenitur hic fructus in quercu, syluestri mælo & pyro, salice, betula, corylo, abiete, & nonnunquam etiam in uite.

* Melius Viscum fit à ramulis, quam à baccis, fit etiam ex Aquifolia.

APARINE. CAP. 104.

Aparine à quibusdam Lappa etiam uocatur, quod tota herba cum semine propter asperitatem suam prætereuntium uestibus adhæreat, Germani eam *Klebefraut* nominant.

ALYSSVM. CAP. 105.

Alysson hic author, & alii, rotundis foliis descripserunt, Plinius uero Rubiæ similis, sed malè. Qualis uerò sit hodie, ignoratur.

scilicet

ASCLEPIAS. CAP. 106.

Asclepias ea est herba, quæ à quibusdam Vincetoxicum, à Germanis *Schwalbennur* uocatur, quoniam cum maturuit semen in Siliquis, Siliquæ ipsæ dehiscunt, & hirundinibus uolantibus similes fiunt. Eandem ob causam ab aliquibus recentioribus Hirundinaria dicitur. Sed alia est Hirundinaria, quæ 2. libro Chelidonium uocatur.

COLVS RVSTICA. CAP. 107.

Asperula, Cnici, quem hodie Cartamum uocant, agrestior quædam species est, quæ hodie non temerè à quouis cognoscitur.

POLYCNEVM. CAP. 108.

Polycnemon qualis sit, hodie omnino ignoratur. Nomen à multis suris siue inter-nodiis inuenit.

CLINOPODIUM. CAP. 109.

Clinopodium Germanis *Werbeld* appellatur, multos habet, ut Marrubium, ni nomen illi indidere.

* *Origanum longum* nimirum.

LEONTOPETALVM. CAP. 110.

Leontopetalum omnino est incognita hoc tempore planta.

TEUCRION. CAP. 111.

Teucrium à Germanis *Rummertrost* uocatur. Huius etiam species est, quæ hodie dicitur (nomen Germanicum uidetur deesse) & nobis pro *Chamædry* in usu Germaniæ pharmacopolis habetur.

* *Herba Kleiner Rummertrost* nascitur saxosis locis, & alia species in montibus.

TRIXAGO. CAP. 112.

Chaerophyllum Germanicè *Erdeiche* uocatur. Non cognoscitur hæc à Germaniæ pharmacopolis. Eius tamen loco Teucris speciem habent, quam omnes etiam uulgares Herbarii *Chamædryos* appellatione indicant. Differunt autem plurimum inter se. Hæc enim ubiq; in campestribus nascitur, cœruleo flore, & minimo semine in compressis pericarpis clauso: Sed uera *Chamædryas* asperis & caluis exit montibus, flore purpureo, & semine nigro & rotundo in denticulatis caliculis, *Hyoisycami* uasculis similibus, multò tamen minoribus. Affertur iam ex Italia & Creta ad nos. Ego autem maximam eius copiam in Germania Ihenæ inueni. Brunfelsius eam in tertio Tomo sub *Chamæpyteos* nomine depinxit.

LEVCA. CAP. 113.

Leucadis Nicander etiam meminit. Quo uero nomine nunc appelletur, nulli cognitum est.

LYCHNIS CORONARIA ET AGRESTIS. CAP. 114. 115.

Vtraq; *Lychnis* hodie incognita est. Ruellius tamen eam cognouisse uidetur.

* *Lychnis latius*, *Daufent schôn*, *syluestris*, *Donner nägele*. Nostri *Caryophylli* nihil sunt quam *Lychnis* dis species. Plinius *Rosam* Græcam uocat. *Lychnites* Marienröslin.

LILIVM. CAP. 116.

Multæ sunt Liliorum differentiæ. Hoc tamē loco candida Lilia intelligenda sunt, quæ nobis *Lilien* uocantur.

BALLOTE. CAP. 117.

Ballote Latinis nigrum, siue cantherinum Marrubium, & *Ulcera*, Germanis *Schwarzer Andorn* uocatur.

APIASTRVM. CAP. 118.

Duplex est *Apiastrum*. Vnum sic appellatur, quod *Apio* simile sit. Hoc alio nomine *Ranunculus* uocatur, & in Sardinia uenenatum est. Alterum ab *Apibus* *Apiastrum* uocatur, quæ hæc herba delectantur. *Melissophyllon* hoc à Græcis uocatur. Plinius hanc distinctionem non cognouit, ut lib. xx. capite xi. uidere est. Vbi dicit: *Apiastrum* Higinus quidem *Melissophyllon* appellat, sed in confessa damnatione est uenenatum in Sardinia. *Apiastrum* uero, id est, *Melissophyllon*, quod Higinus intelligit, nequaquam est uenenatum. Pharmacopolæ hanc herbam *Melissam*, Germani *Binenkraut* dicunt.

* *Nascitur in Hesia* montibus quibusdam.

MARRUBIVM. CAP. 119.
Prasion, Latini Marrubium, Germani Andorn & Gorts vergis uocāt. Nota est omnibus herba.

STACHYS. CAP. 120.
Stachys spicata herba est, & Marrubio similis, candidior tamen, & ob eam causam Germanis Weisser Andorn, & Grotz Andorn uocatur.

PHYLLITIS. CAP. 121.
Omnibus persuasum, & Pharmacopolarum animis altius infixum est, Scolopendrium esse Linguam ceruinam, quæ Germanis Dirschung uocatur. Cum uero Scolopendrium Polypodii modo incisus foliis describatur ab omnibus, Lingua ceruina uero nullas omnino incisuras habeat, necesse est differre plurimum Scolopendrium & Linguam ceruinam. Quid autem reuera lingua ceruina sit, hoc loco indicabimus. Posthac etiam quid uerum Scolopendrium sit, indicaturi. Lingua ceruina igitur sine dubio est, quæ hic describitur, Phyllitis, tam graphicè omnes notæ descriptioni conueniunt.

PHALANGIVM. CAP. 122.
Phalangium hoc nomine omnino hodie ignoratur.

TRIFOLIUM. CAP. 123.
Multæ sunt Trifolii species in campis & pratis nascentes. Hoc autem loco diuersum ab illis Trifolii genus intelligit Dioscorides, quod priuatim Oxytriphylon & Asphalion ab odore uocatur. Quale autem Trifolium hoc sit, nondum compertum est.

POLIVM. CAP. 124.
Duplex est montani Polii genus, sed neutrum Pharmacopolis in Germania cognitum. Quod enim hi Polium uocant, asperis locis exit, Serpyllo syluestri simile, deinceps per ramulos nascente semine, non iniscundè uiride hoc olet: siccatum uero nullum habet odorem, hyeme etiā perit. Sed uerum Polium altis & calidis exit montibus, in summis ramulis Corymbi figura capitula, & in his semina ferens. Viride & siccum suauiter olet, & hyeme tota uiret. Sic describitur Polium à ueteribus. Huius minor species ex Creta, Lugduno, & Massilia, Galliæ urbibus ad paucos nostrates Pharmacopolas affertur. Maius uero in Germania copiosè nascitur, præsertim Ihenig, & ab incolis Wilder Rosmarin uocatur, improprie tamen.

*Wilden Lavendel in Turingia appellant. Teucrium est proprie minus Polium.

SCORDIVM. CAP. 125.
Scordion hec herba appellatur, quod odore tantum Allium imitetur. Forma enim omnino Allii dissimilis est. Pharmacopolæ magno errore syluestre Allium Scordion appellant. Verum tamen Scordium in Germania multis locis nascitur, ut Rundenbergi, Peyne in Brunsvicensi Saxonia, ut in Cheruscorum agris, nec non Vuittenberge; Herba est Chamædri similis, odore Allii, nascitur palustribus locis, unde etiam Romanis palustris Trixago appellata est. Germanicum nomen nondum audire licuit. Scordium quod in Creta, Italia & Gallia nascitur, eandem habet cum nostrate figuram.

TVSSILAGO. CAP. 126.
Βίχλον καὶ χαμαίλεον, siue χαμαίλεον, Latinis Tusilago, Farfarella, Farfarago, & Ungula caballina, Germanis Düstlattich & Brandtlattich appellatur.

ARTEMISIA. CAP. 127.
Artemisiæ duo cognouimus genera. Alterum rubente, & alterum candicante caule. Pharmacopolæ eodem utrunque adhuc nomine appellant. Germani Wuggart & Beißfuß. *Artemisia latifolia, Weisser Beißfuß.

TENVIFOLIA ARTEMISIA. CAP. 128.
Huius Artemisiæ caput genuinum non uidetur, quoniam antea etiam tenuioris Artemisiæ mentionem fecit. Propterea in antiquis exemplaribus nusquam legitur.

AMBROSIA. CAP. 129.
Ambrosiam recentiores Tanacetum, id est, Xeinfar esse putant, quidam etiam

K III

Hirschwurz. Sed utrunq; falsum est. Nam Ambrosia Artemisiae speciebus annu-
meratur. Hodie uerò non cognoscitur.

BOTRYS HERBA. CAP. 130.

Et hac Botrys altera Ambrosiae species est, cuius semen ab aliquibus Pharmaco-
polis Amomum uocatur. Seritur à paucis in Germania. Herba est admodum odora-
ta, & ab holitoribus, qui eam ferunt, *Türkischer Beifuss* uocatur. Nomen à copio-
so semine illi Græci indiderunt, quod in racemulis paruis circa totos ramulos nasci-
tur.

GERANIVM. CAP. 131.

Geranium siue Gruina, Germanicè *Kranzschabel* & *Storckenschabel* uo-
catur, quoniam semina gruinae rostris similia ferat. Habet hæc herba aliquot differen-
tias, quæ à foliorum & florum diuersitate cognoscuntur.

*Vna species quæ habet Maluæ folia, dicitur *Pes columbinus*, quod nomen etiam Amomo tribuitur. Alia, *Aqua mo-*
schata uel herba *Roberti*.

TOMENTVM, SIVE CENTVNCVLVS. CAP. 132.

τραπεζιον, Latini Centunculum & Albinū, Germani *Rhütrant* appellant, mol-
lis est & lanuginosa herba, qua pauperes olim culcitrae farciebant. Vnde à Græcis &
Latinis nomen inuenit. **Cotonaria* *Rhütrant*.

TYPHA. CAP. 133.

Typha palustris siue lacustris est planta, quæ à Germanis *Bolben* / siue *Narren-*
Folben uocatur, florem in summo densum, copiosum & clauæ similem habens.

**Wasser Folben*.

CIRCAEA. CAP. 134.

Circaea quo nomine iam appelletur, omnino incognitum est.

OENANTHE. CAP. 135.

Oenanthen Theodorus Gaza uitis florem apud Theophrastū interpretatus est:
Satis huic descriptioni respondet herba, quæ Filipendula iam uocatur, quod glan-
dibus similes radices à longis & tenuibus fibris ceu filis pendeant. Germani proprio
uocabulo *Erdeycheln* / quasi terrestrem glandem, à radicum similitudine, appellat.
Videndum tamen est, ne cum hac Chamædrin confundamus, quæ nobis *Erdeyche-*
id est, terrestris Quercus uocatur.

*Filipendula proximè accedit qualitatibus ad Pæoniam.

CONYZA. CAP. 136.

Confundit Plinius cum Origano & Cumila Conyzam, diuersas natura plantas,
quas hîc Dioscorides & alii ueteres seorsim diuersis etiam capitibus descripserunt.
Nihil enim commune inter se habent. Sunt autem plures Conyzæ species, quæ ma-
gnitudine, natali solo, & odoris grauitate dignosci possunt. Germani generali uoca-
bulo omnes eius species *Hundsauge* uocant.

*Aliqui *Duerwurz*. Species sunt tres. Montana, campestris, palustris. Prima ab odore thuris, etiam Libanotis
dicitur: & recentioribus, *Incensaria*. nam Itali *Thus*, *Incensum* uocant.

HEMEROCALLIS. CAP. 137.

Hemerocallis syluestre Lilium est, quod Germani *Goldpoln* / siue *Goldewurz*
appellant. Pharmacopolæ uerò *Asphodelum*, sed falsò, ut antea dictum est, cum de
Asphodelo sermonem haberemus.

**Wild lilgen*. Species una *Porphyrantes* dicitur. Altera Germanis *Gold lilgen*: quæ in montibus Sue-
uic sponte nascitur: alibi seritur.

VIOLAE. CAP. 138.

λευκοίον, Romani Violam albam, Arabes Cheiri, Germani *Gelbe violen* uocant.
Inueniuntur albo, luteo, cœruleo & purpureo colore. Ad medicinam tamen utilis-
simæ sunt luteæ.

**Fuchsius* pro *Damaschen blümen* esse *Leucoia* putat.

CRATAEOGONVM. CAP. 139.

Non cognoscitur hoc nomine aliqua herba. Est etiam arbor apud ueteres eiusdē
nominis.

no minis. Porro si quis ea probe intellexerit, quæ proximo capite de Phyllo dicturus sum, manifestum erit Ruellium errare, quod Thelygonon & Arrhenogonon Persicaria species esse scribit.

PHYLLVM, HERBA. CAP. 140.

Phyllon superuacua habet in hoc authore historiam. Nulla enim per se est herba, quæ propriè Phyllon appelletur. Neque Dioscorides eius historiam quasi suam posuit, sed ex Crateua Herbario, ut ipse fateatur, descripsit. Non tamen inutile futurum existimo, si quid sit Phyllon indicauero. Theophrastus lib. 9. cap. 19. de historia plantarum, herbam ponit, quæ duas habet species. Vnam appellat Arrhenogonon, quod masculinum sexum concipi faciat: alteram *ῥυλγόνον*, quod fœmininus sexus ea pota concipiatur. Ex quibus constat, hanc Theophrasti herbam cum Dioscoridis Arrhenogono & Thelygono, (quas etiam Phyllon uocat) eandem esse. Descriptio enim, nomen, & attributæ uires conueniunt. Quoniam uerò antè dixi, Phyllon non habere proprium genus, & tamen est herba quæ Arrhenogonon uocetur, necesse eam sub alio nomine latere: quod manifestum fiet, si quis Mercurialis historiam & uires ab hoc authore descriptas, cum Theophrasti Arrhenogono & Thelygono cõferat. Sunt enim sine dubio Arrhenogonon & Thelygonon, Phyllon & Mercurialis, una eademque herba, quæ duas habet species, ut suo loco indicabimus. Propterea nemo existimet, folium, herbam, hoc loco descriptum, diuersum à Mercuriali esse. Deprehensum à nullo hætenus est hoc in Dioscoride uitium. Nemo tamen hanc ob causam minus fidei Dioscoridi habere debet. Non enim ipse proprium Phyllo genus à Mercuriali diuersum constituit, sed hæc ex herbario Crateua descripsit, ad quem etiam ea reuocit.

TESTICVLVS. CAP. 141.

ὄρχις, Latinis Testiculus, siue Canis testiculus, Germanis *Knabenkraut*, *Ag-wurz*, *Scandehart*, *Scandehwurz*, *Geylwurz*, & *Erdgeyl* uocatur. Pharmacopolæ omnes eius species Satyriones nominant, cum tamen Satyrion diuersum ab Orchi genus habeat.

ALTER TESTICVLVS. CAP. 142.

Orchis Serapias priori similis est, maiora tamen folia, & minores testiculos habet: Germani iisdem hanc quibus illam nominibus appellant. Porro plures hodie Testiculorum species, quam à ueteribus descriptæ sunt, cognoscimus.

SATYRIVM, HERBA. CAP. 143.

Qualis hæc prima Satyrii species sit, non facile quis dixerit.

* Hoc etiam aliqui *Knabenkraut* interpretantur.

ALTERVM SATYRIVM. CAP. 144.

Alterum siue *Erythron* Satyrion, Germani *Rot Knabenkraut* uocant.

ORMINVM SATIvvm. CAP. 145.

Ormini duo sunt genera, Satium unum & syluestre unum. Vtrunque hodie *Centrum galli*, & male etiam *Gallitricum* uocant. Quidam etiam *Scarleam*, unde Germanicum nomen *Scarlet* deductum est.

* *Orminum syluestre*, *Wilde Scharley*, *wilde Salbei*.

HEDYSARVM, uel PELECINVS Latine *Securidaca*. CAP. 146.

ONOSMA. CAP. 147.

Onosma ex *Anchusarum* genere est. Hodie uerò quo nomine appelletur, non constat.

NYMPHAEA. CAP. 148.

Nymphaea est herba, quam Arabes *Nenuphar*, Germani *Seckenmetzen*, *See-blumen*, & *Keulenhurz* uocant. Prior hæc species grandem & candidum florem habet, multis oblongis foliis constantem.

ALTERA NYMPHAEA. CAP. 149.

Altera Nymphaea priori omnino foliis & fructu similis est. Flore differt, quem suum & *Rosa* similem habet.

ANDROSA.

ANDROSACES. CAP. 150.

Androsaces parens meus suspicabatur Cuscutam esse; nihil tamen certi pronunciauit, quoniam descriptioni Androsaces non per omnia responderet Cuscuta.

* Verum Androsaces Matthiolus pingit.

ASPLENVM. CAP. 151.

Asplenion, siue Asplenon, eadem est cum Scolopendrio. Scolopendrium uero, ut in Phyllitide dictum fuit, non est Lingua ceruina. Propterea errant omnes, qui adhuc Linguam ceruinam Scolopendrium uocant. Verum autem Scolopendrium Arabes, & quidam Pharmacopole Ceterach uocant, Germani *Wisselsahen* / id est, Scolopendre similem Filicem. Est enim Scolopendrium siue Asplenum, herba ex Filicis genere, Polypodii, & Scolopendre uermis modo utrinque incisa, habens folia ex una parte glabra & uiridia, ex altera flaua & aspera. Quidam Germani Scolopendrium etiam *Elein* & *Epitant* uocant. Dictum itaque iam est quid sit uerum Scolopendrium, siue Asplenum, & quid etiam sit Lingua ceruina, quae hactenus falso Scolopendrium est nominata. Sufficere igitur haec puto iis, qui praeteriti & barbari seculi erroribus adhaeserunt.

HEMIONITIS. CAP. 152.

Hemionitida Theodorus Mula in Theophrasto uertit, propterea quod in Theophrasto non Hemionitis, sed *ημιον* legitur. Quo autem nomine iam appelleretur, nondum constat. Ruellius tamen putat Linguam ceruinam, quae hodie falso Scolopendria uocatur, Hemionitida esse, sed antea ostensum a patre meo & me fuit, Ceruinam linguam sine dubio esse Phyllitida, quae seorsim ab Hemionitide describitur. Illud tamen fateor, me saepe suspicatum esse, & adhuc suspicari, quod Hemionitis & Phyllitis una eademque sit herba. Descriptio enim & uires conueniunt. Quod si fuerit, nemo Ruellium accusare poterit, quod Hemionitida Linguam ceruinam esse dixerit. Porro Verg. Marcellus maxime errat, quod Asplenon & Hemionitida eandem esse herbam suspicatur; in quam suspicionem ideo incidit, quod Asplenon etiam secundum mionion, diuersas naturae plantas, confundere, sciant Pliniani lectores.

* Hemionitum uerum Matthiolus exhibet.

ANTHYLLIS. CAP. 153.

Duae sunt Anthyllidis species. Vna lenti, altera Chamepity similis: utraque falso est gustu. Propterea ab Italis Salsola appellantur, & stercus passerum. Priorem nondum uidi, Altera uero quae Chamepity similis est (licet male in quibusdam Dioscoridis exemplaribus Chamadryi, scriptum reperatur) in Apricis Hercyniae syluae locis nascitur, & a Germanis *Salztraut* appellatur, tam manifesti salis sapore, ut etiam ex utraque, uita & non uita, Sal excoqui possit, quem Salem Alkali uocant Arabes. Propterea neque Aristotelem, neque Plinium recte sensisse constat, quod scribant omnes sapores praeter salum plantis inesse. Nec enim sola Anthyllis excipitur, cum aliae etiam plures huiusmodi inueniantur.

ANTHEMIS. CAP. 154.

Ανθις, siue *χαμαίμηλον*, corrupto nomine Pharmacopolis Camomilla uocatur. Germanice Camillen / Hermelen / & *Weydblumen*. Prior species, quae foris candidum, intus luteum habet florem, hodie in omnibus Pharmacopoliis ad usum Medicinae seruatur.

* Leucanthomus cognominata, ceteris melior. Tertia species, cuius folia in ambitu floris aurea sunt, nascitur in montibus. Est & alia species, Anthemum Theophrasti.

PARTHENIVM. CAP. 155.

Parthenium hoc a Pharmacopolis Matricaria uocatur, quod Arabum quoque interpretes minimè latuit. Galenus hanc herbam Amaracum uocat, ut in Sampsucho dictum est. Propterea magno errore in sexto libro Gal. de Simplicib. Amaracum Maioranà uertit Theodoricus Gerhardus Gaudanus. Nam Maiorana Galenus postea in 8. meminit, sub nomine Sampsychi, & diuersum ei ab Amaraco temperamentum tribuit. Quinetiam ab hoc auctore Parthenium Amaracus dicitur.

* *Cotula foetida* non est Parthenium.

BYPHTHAL

BUPHTHALMVM. CAP. 156.

Sunt aliqui qui Buphtalmum & Chrysanthemum eandem herbam esse credant, quibus non uehementer repugnabo. Illud tamen nouisse oportet, plures esse Buphtalmi species: Sunt enim quibusdam candidi simulq; lutei flores, quarū maiorem nos Rūdille / minorem uerō Hundsaule & Hundesblumen appellamus, Pharmacopolæ Cotulam foetidam. Quædam etiam species omnino luteos flores habet, & his Chrysanthemum nomen Græci indiderunt, Germani uerō, idem significantē uocabulo Goldtblumen.

*Cotula alia foetida est & dicitur: alia non foetida, quæ potius fuerit Buphtalmus.

PÆONIA, SIVE GLYCYSIDE. CAP. 157.

Insignis est herba Pæonia, & omnibus cognita: habet tamen duas species sexu distinctas. Fœminam nos habemus, cui radices numerosæ ceu gracilibus Isthmis coherent. Masculam uerō in Germania haberi nondum comperi, cuius semen aliunde mihi missum terræ mandauit, sed nulla cura mulceri potuit ut exiret. † Quamuis enim † Nobis quidem è semine non una planta prouenit: sed tardè plures periculum fecerint, atque ipse etiam sæpius. Oportere igitur adesse certum semini, rendi tempus & modum, quidam uolunt, & illud etiam curari, ne unquam semina, cum è corniculis eximuntur, digitis attrectentur. Quibus an assentiri debeam, nescio. Quoniam etsi quotannis semen sponte è corniculis in terram excidat, & seipsum ferat (ubi magnam Pæoniæ copiam holitores habent) minimè tamen enascitur: quod diligenter ipse animaduerti, & hortulanos huius rei causa interrogauit, qui simile se deprehendisse responderunt. Pæoniam Germani Deonten / & Freijam rosen uocant. Pharmacopolæ Latino siue Græco nomine utuntur.

LITHOSPERMVM. CAP. 158.

Lithospermon, Germani Steinsamē / Weerhirsē / & Steinhirs. Pharmacopolæ Milium solis uocant. Nullam herbā usq; adeo admiratus est Plinius, atq; hanc.

PHALARIS. CAP. 159.

Phalaris Pharmacopolis incognita est herba, nec cuiquam adhuc constat, quo nomine iam appelleretur. Mihi uerō ante paucos annos semē è Norimberga missum est, à Gallis Milium syluestre uocatur: quod cum seuissem, Phalaris ipsa, quā Dioscorides hoc loco describit, erupit. Optime descriptioni respondent notæ omnes. Germanicū eius nomen ignoro, quoniam apud nos adhuc neq; satiuam, neq; sponte nascentē uidi.

*Quidam Buthursen interpretantur.

RVBIA. CAP. 160.

Ῥυβία, Theophrastus Ῥυβία appellat, qui eam longè aliter quàm hic author describit: quàm bene autem, non uideo. Siquidem nos cum omnibus antiquis & recentioribus Medicis optime Rubiam cognoscimus, ea qua Dioscorides eam describit figura. Seritur hæc in multis Germaniæ locis ad uestigal. Pharmacopolæ Rubiam tinctorum uocant, Germani Ruten. Ii autē uehementer errant, qui Anchusæ, id est, Buglossæ asperæ siue rubetis radices pro Rubia accipiunt, quales noui multos.

LONCHITIS. CAP. 161.

Lonchitis hæc mihi adhuc incognita est. Hodie in Pharmacopoliis habetur nuscquam. Ruellius tamen nouisse uidetur. Cum uerō nesciam qualem ille herbā nigros Capetos Gallicè uocet, eidem assentiri non possum.

ALTERA LONCHITIS. CAP. 162.

Altera Lonchitis sine dubio ea mihi uidetur esse, quæ Germanis groß Spicant appellatur. Mediam figuram inter Scolopendrium & Polipodiū habet. Scabræ sunt foliorum incisuræ. Vnde eam asperam Lonchitida cognominauerunt.

ALTHAEA. CAP. 163.

Althæa, syluestris Maluæ genus est, in uliginosis & palustribus locis nascens.

Planta

ANNOTAT VALERII CORDI

Plantatur à quibusdam etiam in hortis. Pharmacopolæ eam eodem & Bismalæ nomine nouerunt. Latinis Hibiscum olim dicebatur. Germani *Eibisch* / *Sammet* / *bappeln* / *Stoekwurz* appellant.

ALCEA. CAP. 164.

Et hæc sylvestris Malæ species est. Folia profundius Verbenæ modo incisa habet, florem uerò & sem̃ Althææ. Germani eam *Nochlenchten* & *Sigmarwurz* uocant, aliqui *Feltriz* / quia rumpat pannos oculorum. Nascitur plerumq; in pratis, quæ fluuii tumescentes attingere possunt, & non procul ab horum ripis. Pharmacopolæ hanc herbam non habent.

CANNABIS SYLVESTRIS. CAP. 165.

Sylvestris Cannabis omnibus nota est. Nullū habet apud nos in Medicina usum: **Wilde Eybisch. est similis Althææ.*

CANNABIS SATIVA. CAP. 166.

Satiua Cannabis à nullo nō cognoscitur. Rarus & huius est in Medicina usus. Male huius folia Malo similia Verg. Marcellus interpretatus est. In Græco enim textu *Μελίς* id est, Fraxino, legitur.

ANAGYRIS. CAP. 167.

Anagyris, quæ ob foetorem suum in prouerbiorum censu habetur, hodie non temere à quouis cognoscitur.

**Fruetex est, qui post annum primum è semine prouenit: habet enim hoc osseæ duritiei.*

CEPHAEA HERBA. simpliciter Portulaca agrestis ei uidetur. CAP. 168.

Κεφαλαία quamuis ab hortis nomen habeat, tamen in arenosis littoribus, & minime in hortis nascitur. Est autem eadem herba cum Portulaca, præterquam quod Cepæa sponte in asperis littoribus nascatur, cum Portulaca in hortis seratur. Apparet igitur permutasse inuicem nomina sua has herbas. Germani Cepæam *wilde Borzel* uocant.

ALISMA. CAP. 169.

Alisma siue Damafonium, hodie Herbarii corrupto uocabulo Almeam uocant, Germani *wilden Wegerich* / uel *Wirtenpfeiff*. Hic author unum tantum Damafonii genus ponit. Plinius uerò duo. Nos autem plures eius differentias nouimus. Nullus est hodie in Pharmacopoliis Domafonii usus.

ONOBRYCHIS. CAP. 170.

Qualis Onobrychis sit herba, hodie omnino ignotum est.

**Italorum hanc Rutam caprariam esse putant.*

HYPERICVM. CAP. 171.

Tres sunt reuera Hyperici species. Prima propriè & simpliciter Hypericum uocatur. Altera priuatim suo nomine Ascyron & Ascyroides nominatur. Tertia etiam peculiari nomine Androsæmon appellatur: quamuis etiam omnes tres species Androsæmi appellatione ueniant, propterea quod digitis confricata earum comæ & flores, sanguineo colore succum remittant. Prima igitur species, quæ priuatim Hypericum dicitur, nondum mihi cognita est. In nostris autem Pharmacopoliis loco eius Ascyro utimur, quod altera est, ut antea indicauimus, Hyperici species. Demonstrauimus etiam male ab aliquo Hyperici caput, sylvestris Rutæ capiti commixtum esse, & quod Ruta sylvestris differat à Perforata. Ruellius in tertio de natura stirpium libro, cap. 74. scribit, Dioscoridem in Hyperico mentione floris digitorum attritu cruentatini non meminisse. Concederem ego hoc (quoniam sunt quædam Dioscoridis exemplaria, quibus ea nota deest, quale etiam Verg. Marcellus habuit) nisi in probatis codicibus, ubi de Hyperico agitur, manifestè hæc uerba legerentur: *Ἀνδρῶν ἐκ τῆς μήλωνος ὁ διαρίθην τοῖς δακτύλοις αἵματι ὡδὴ γόμην χυλὸν ἐκκρίνει, ὅθεν καὶ τὸ ὀνόμαί αὐτοῦ κλήνβη*. Quæ sic uerti possunt: Florem habet luteum, qui digitis attritus sanguineum succū excernit, unde & Androsæmon, id est, Humanus sanguis appellatur.

**Aliqui*

*Aliqui hodie Hypericum uocant, cui folia sunt minora, perforata: Ascyrum, latioribus folijs: Androsæmum, non perforatis. Vide mox in Ascyro & Androsæmo.

ASCYRON. CAP. 172.

Ἀσχυρόν, quod aliqui Ascyroides uocant, secunda est Hyperici species, quam Pharmacopolæ etiā simpliciter Hypericon & Perforatā, Germani Warthaw & Sancti Johannis erant appellāt. Folia eius inter lucem & oculos nostros posita crebris punctis ceu Perforata uidentur. Vnde etiam Perforatæ nomen inuenit. Hanc herbam Antonius Musa in suo simplicium examine Rutam syluestrem esse contendit, cuius sententiam antea confutauimus.

*Lege proximè retro caput de Hyperico.

ANDROSÆMVM. CAP. 173.

Ἀνδρόσαμον, quod Ἀνδροσαδία etiam uocāt Græci, in nullo usu hodie habetur. Herba est rubente caule, cuius cortex ita striatur, ut quadrangulum reddat caulem. Ramulos & alas Ascyro similes, folia tantum maiora & minores flores quàm Ascyron habet. Nasctur circa profuentes riuulos, & à Germanis tot Warthaw appellatur.

*Vide superius caput de Hyperico.

CORIS. CAP. 174.

Coris à graui & cimicibus simili odore nomen inuenit. Fruticulus dodrantalis est, folijs Ericæ similibus, profert etiam baccas Iuniperi baccis similes, sed minores, quæ cum folijs attritæ medium inter Iuniperum, Pinum, & Cimices odorem remittunt. Estq; hic minimè ingratus. Germani Corin Erdtuer / quasi paruam & terrestrem Thedam appellant, quoniam odore etiam Thedam arborem imitatur. Dioscorides fructus siue baccas eius non descripsit, quas tamen urinam & menses trahere dixit.

CHAMÆPITYS. CAP. 175. 176.

Chamæpityn Græci uocant herbam, Pini odorem aliquem habentem, cuius tres ponunt species, quæ olim omnes à Latinis Aiuga & Ibiga dicebantur. Hodie uerò quid reuera Chamæpitys sit, non omnibus est notū: quamuis à parente meo, & quibusdam alijs scriptis sit proditum. Quidam Pharmacopolæ Chamepeucen, à Germanis Zeitheyde appellatā, Chamæpityn uocant. Quidam eius loco primam Syderitis speciem, quam Germani Zeis erant appellant, ostendunt. Et hæc herba etiam à Venetis nobis huc transmittitur, cum tamen ubiq; apud nos in montibus nascatur. Sunt etiam qui ueram Chamædryn Chamæpityn uocent. Alii quoq; alias herbas eo nomine indicant, sed omnes illi errant. Nam uera Chamæpitys est herba illa, quæ à Pharmacopolis luæ dicitur.

VALERII CORDI SEMESUSIJ, in Pedacij Dioscoridis

ANAZARBEI QVARTVM DE MEDICA

materia Librum, Annotationes.

VETONICA. CAP. 1.



VETONICA, PHARMACOPOLIS BETONICA, GERMANIS Bethonten uocatur. Nota est omnibus herba. Sequitur in quibusdam exemplaribus aliud Betonica caput, uerum illud non est Dioscoridis, quod superstitiosa uerba indicāt, quibus totum caput constat. Neq; etiam in antiquis scriptoribus legitur. Negandum tamen minimè est, aliud quoq; Vetonicae genus esse, quod Aegineta Pulegii similitudine describit. Cuius Galenus etiam lib. 4. de sanitate tuenda meminit, aitq; eam Sarxifagon uocari: de qua in proprio loco dicturi sumus.

L

BRITANNICA. CAP. 2.

Certum est copiose nasci in Germania Britannicam, cum olim vires eius Frisii etiam cognite fuerint, qui eam Romanis contra Stomachacem demonstrarunt: Quo uero nomine iam appelletur, non constat, nisi quis Bistortam, seu herbam paralyticos esse dixerit: quorum neutrum adhuc neque affirmo, neque nego.

*Bistorta potius Limonium fuerit.

LYSIMACHIA. CAP. 3.

Lyfimachiam Leoniceus Corneolam esse putat, quatinus uires uiridem colorem inficiunt. Huic subscribit Ruellius lib. 3. cap. 78. Quamuis post aliam herbam Lyfimachion esse putet, quam Galli Pellibossam uocant. Ego autem nullo modo illis assentiri possum, qui Corneolam Lyfimachion esse putant. Quoniam Corneola est fruticosa herba, quae a Germanis Gubettraut appellatur, in aetis nec aquosis nascens, neque gustu magnopere astringens. Hanc Corneolam Georgius Agricola, Medicinæ doctor, secum ex Italia attulit, sibi a Leoniceo pro Lyfimachia demonstratam, sed plures notae non conueniunt. Vera tamen Lyfimachia in aquosis nascitur, & a Germanis Weiderich appellatur. Ruellius eodem quo antea de Lyfimachia eum scribere loco dixi, putat Lytri uocabulum corruptum esse a Luteo. Nam ut Victorius est author, qui non possunt Chrysocolla propter raritatem uti, herba Lutea appellata, caeruleum inficiunt. Verum nequaquam ibi Victorius per Luteum Lyfimachiam intelligit (quod Lytron etiam appellatur) sed sui generis herbam, quae Graecis Ictis, Germanis Weyde / Latinis Lutea, siue Glastrum appellatur.

SANGVINALIS MASCULA. CAP. 4.

Polygonon mas, Latinis Sanguinalis mascula, & Proserpinaca, Pharmacopolis Lingua pallerina, Corrigiola, & Cetonodia: Germanis Wegedrit & Deningras uocatur.

SANGVINALIS, FOEMINA. CAP. 5.

Πολύγονον θήλυ, quae Romanis Sanguinalis foemina, Germanis Schaffenhew appellatur, masculo omnino dissimilis est. Habet enim idem cum Hippuris genus, specie tantum differt. Nascitur in stagnantibus & lacustribus pratis, caulibus geniculatis, in se factis, & foliis Hippuridis (id est, Rosagel) similis, qui mirum in modum eius pabulo delectantur. Huic etiam similis alia est, sed asperior, quam Germani Schab rauß appellant, quod ea sculptores in poliendis ligneis operibus uti soleant.

*Polygonos haec nascitur tantum in aquosis locis: Hippuris etiam extra aquas.

POLYGONATVM. CAP. 6.

Polygonatum sine dubio est ea herba, quam Pharmacopoea Sigillu Salomonis, Germani Weiswurz & Gelendwurz appellant. Vtraque gens ab articulata radice illi nomen indidit. Vulgares Germanici herbarii hanc herbam cum Dictamno & Helleboro albo confundunt, detestabili, & digno ut confutetur errore.

CLEMATIS. CAP. 7.

Clematis haec Peruinca species est, quae astringendi vires habet. Est enim alia quodaeque Peruinca, quae aluum ducit: de qua hoc loco non agitur. Germani hanc Clematida wilden Singrün uocant: aliqui Ingrün / Beruinct.

ALTERA CLEMATIS. [Quidam codices, ut à Gonpylo editus, Clematidem alteram hoc loco non habent.]

Alteram hanc Clematida, ut Galenus refert, Dioscorides in fine quarti libri descripsit. Nunc uero in principio libri quarti utraque describitur, sed male. Priorem enim in principio huius libri astringentibus herbis, seu Britannicæ, Lyfimachiae, & utriusque Sanguinali, propter uirium similitudinem, coniunxit. Hanc uero quoniam aluum semper duceret, in quarti libri fine, ubi de purgantibus agitur, descripsit. Est autem Clematis haec duplicis differentiae. Vna enim grandis frutex est, proceras arborescens, & singulis annis incrementum sumens, quoniam caudex & uiticulae illi aliarum arborum modo durant. Altera uero per omnia huic similis est, breuior tamen (quamuis & haec interdum 15. pedum longitudine adolecat) & autumnis caules siue uiticulae

uticulas amittit. Nascitur hæc in pratis circa arbuta, quò fluuiorum inundationes peruenire queunt. Illa uerò in montibus arbores & uinearum sepes ascendit. Vtraque Germanis & Ebling uocatur. Arborefcens tamen maioris, & herbacea minoris cognomen habet. Saxones etiam *wilde weinranden* nominant, quòd sarmentis uitem æmulentur.

POLEMONIA. CAP. 8.

Polemonia quo nomine iam uocetur, nulli cognitum est. Ruellius tamen Polemoniam eam esse credit, quam Gallica rura Boscaluriam uocant, quod nomen cum Germanis commune habent Galli. Nos enim sic eam herbam uocamus, quod Salviae similitudinem aliquam habeat, & in dumosis locis nascatur, quæ nos *Busch* appellamus. Vulgo apud nos *Buschsalbei* herba hæc uocatur. Sed Ruellius eam uel ad historiam torquet. Neque folia enim, neque radix conueniunt, quas ille conuenire dicit, contra oculis perspectam experientiam & testimonium:

PETRAEVN SYMPHYTVM. CAP. 9.

Σκῦντρον πετρεῖον, Latini Petram Consolidam uocant, Germani *Steingunsel*. Nascitur petrosis & in petris. In pharmacopoliis autem hoc tempore non habetur, præsertim in Germania: quamuis in petrosis locis nascatur, quales sunt *Aschburgi*, duobus à Brunsvico miliaribus.

ALTERVN SYMPHYTVM. CAP. 10.

Alterum Symphytum sine dubio est aspera illa in uliginosis locis nascens herba, quam Pharmacopolæ maiorem Consolidam, Germani uerò *Beynweile* / *Schmerwurz* / *Schwarzwurz* / *Waiwurz* & *Loewwurz* uocant.

HOLOSTEVM. CAP. 11.

Holosticum mollissima dicitur esse herba, quapropter ex aduerso sic appellata est. Quo nomine iam dicatur, ignotum est. Ruellius eam à Gallis Denticulum canis appellari scribit. Cum uerò idem author alibi gramen, alibi Coronopum dentem canis esse dicat, parum sibi ipsi constat. Propterea illius opinioni astipulari non possum.

STOEBE. CAP. 12.

Stoebe quo nomine iam appelletur, nondum comperi. Sunt tamen aliqui qui eam Scabiosam esse credant. Cum uerò ab hoc authore nulla eius descriptio ponatur, nihil affirmo.

✧ *Alia uidetur Stoebe Dioscoridis & Galeni, neutra uidetur esse Scabiosa.*

CLYMENVN. CAP. 13.

Qualis Clymenon herba sit, nondum scio, Ruellius eam cognouisse uidetur.

PERICLYMENVN. CAP. 14.

Periclymenon omnium doctorum consensu frutex est arbuta scandens, quem Itali & Pharmacopolæ Matris syluam, Germani *Geißblat* / id est, Caprifolium appellant. Porro cauendum est ne diuersas res confundamus. Nam quidam Itali & nostrates etiam Pharmacopolæ pedali altitudine herbam quandam foliis oblongis per interualla quouis plerumque in uno geniculo stellæ modo dispositis, similiter Matris syluam uocant. Ea Germanis *Waldmeister* dicitur, & est Aparina syluestris quædam species.

✧ *Dioscoridis Periclymenum idem uidetur cum Cyclamino eius altero, & cum Vite syluestri, una planta tribus locis descripta.*

TRIBVLVS. CAP. 15.

Tribuli duplex est genus. Terrestre unum, & aquaticum alterum. Terrestrum in Germania nasci nondum uidi. Aridum tamen à Georgio Agricola ex Italia allatum consexi, habetque eam figuram, quam Dioscorides illi tribuit. Vehementer errant qui Tribulos in Georg. Vergiliu uulgares Carduos, id est, Disteln interpretantur. Nihil enim commune cum his habent. Aquaticus uerò Tribulus, quem aliqui non rectè Marium cognominant, sine controversia est, quam nos *Wassernuß* / *Stachelnuß* / & *Spitznuß* appellamus, cuius miram in germinando proprietatem obseruauimus: Nascitur in limosis & stagnantibus fluuiis, ut apud nos est inferior *Mildæ* pars circa *Dieben* / *Elster* in *Misnia*, *Albis*, & alii quidam.

SARXIPHAGON, SIVE SAXIFRAGA.

Credunt nonnulli non esse hoc caput Dioscoridis, eo solo argumento persuasi, quod Latina uox, Saxifraga, in principio capitis loco Græci nominis legatur, quam Græci in Sarxiphagon corruerunt, ut fit in alterius linguae uocabulis non intellectis. Nullius autem est id argumentum ualoris. Nam ipsi Græci Latina quædam uocabula in suam linguam receperunt, quales sunt *ἀξὺνγία*, id est, Axungia, & hæc Saxifraga, & alia quædam. Porro hoc Sarxiphagon est quod Galenus Cestron etiam dici testatur, quodque Aegineta Pulegio simile esse dicit, sed minus. In Cestri, id est, Betonica capite, Dioscorides cum Epithymo comparat. Ego uero suspicor non legendum esse Epithymum, quoniam nulla est inter Pulegium & Epithymum similitudo. Præterea in quibusdam Græcis exemplaribus non habetur hoc uocabulum. Quare Thymum inter paruum Pulegium & Thymum. Nascitur apud nos herba quædam in asperis locis, mediam figuram inter Serpyllum, Thymum & Pulegium habens, quæ apud nos Pharmacopola pro Polio utitur, Germanice *wilder Rânel/wilder Poley*. Hæc an Saxifraga sit animaduertendum Errat Ruellius, quod hanc Saxifragiam esse putat Saluiam uitam. Nam Salua uita idem est cum Adianto & Capillo Veneris, de quo seorsim, ferè in fine huius libri ager Dioscorides. Porro mira est hodie in appellandis herbis inconstantia. Quicquid enim sanguinem sistit, Sanguinariam uocant, & quicquid calculosis medetur, Saxifragiam, nimis latè patente significatione & uocabulo.

LIMONIUM. CAP. 16.

Limonium nomen inuenit, quod in palustribus pratis nascatur: pediculos ex una radice emittit tres uel quatuor, dodrantali longitudine, & in singulis terna sunt Betæ similia folia, quo fit, ut decem aut pluribus foliis à Dioscoride describatur. Flores habet candidos, quorum nullam mentionem Dioscorides facit, Germani hanc herbam *Wienmangel* & *Biberlee* appellant, † Nullus est eius in Pharmacopolis usus. Sunt & alia duo syluestris Betæ genera, quæ ab Italis & Pharmacopolis Pirole, à Germanis *Walbmangel*, id est, syluestres Betæ, & *Wintergrün* appellantur, quorum Dioscorides non meminit.

Gesnerus
hanc sententiam non
probat: &
Bisfortam
potius Limonium
facit.

LEPORINVS PES, HERBA. CAP. 17.

Λαγώπες qualis sit, uel quo nomine iam uocetur, uulgo incognitum est, quamuis, ubique in agris nascatur, estque Trifolii species, quam Germani *Râgentlee* uocant, & *Hâjenpfoten*.

MEDIVM. CAP. 18.

Medion ut minus cognoscamus, diuersæ eius apud authores descriptiones faciunt. Plinius enim Iridi satiare folia eius comparat, Dioscorides uero Seridi. Sunt etiam Græca Dioscoridis exemplaria, in quibus Iridi, manifestè pro Seride, legitur. Quare uidendum est, & rationibus & coniecturis artificiosis scrutandū, utrum Iridi, uel Seridi, legendum sit.

*Seridi potius quam Iridi legendum conijcimus.

EPIMEDIUM. CAP. 19.

Epimedium suo nomine similiter ut Medion hodie incognitū est. Sed nunc aliud habet nomen, nempe Trinitas, à tribus foliorum partibus. Vnde etiam Græcis Trias uocatur.

*Trinitas dicitur apud Chirurgos Italiae Germanice *Edel leberfraut*.

GLADIOLVS. CAP. 20.

Non temerè cognoscitur hodie uerus Gladiolus. Veteres omnes herbas, quæ Gladio similia haberent folia, Gladiolos cognominabant, quales sunt Acorus, Sparganium, Xyris, Iris, &c. Quos hodiernos quoque imitatur, sed maiori quam par erat licentia. Est enim sui generis herba, quæ Gladiolus Latinis, & Græcis *Σίφιον, σάφισον*, dum ensem, interdum etiam Gladiolum interpretatus est. Quinetiam Ciperū sui generis luncū, Gladiolū uertit, sed malè. Verus autem Gladiolus in pinguibus & humetibus locis

bus locis nascitur, quæ fluviorum inundationes obtegere possunt. Caulem habet in-
gnileuore, ut Theophrastus ait. Propterea Ruellius contra Theophrastum & ipsam
experientiam, scabrum caulem illi tribuit. In summo caule ceu umbellam habet, pur-
pureis & ab inuicem distantibus floribus plenam. Hoc enim sibi uult in Græco Dio-
scoridis textus *xydop.* Germani hunc Gladiolum *Schwertel* appellant. Videndum
tamen est, ne aliam herbam pro hac aliquis intelligat. Nam Germani quoque, ut Græ-
ci & Latini, Gladioli nomen ad Iridis & Acori species transferunt.

*Gladiolum sunt qui Victorialem rotundam, aut sceminam hodie nominant, Runde Sigwurz / Vietintrafft.
Longa quidem uel mascula cognominata Victoralis, non est huius generis, sed allium alpinum. Gladiolus uagum
est nomen, ad herbam hic descriptam, & Gladiolum aquaticum, & Cyperum.

SPARGANIVM. CAP. 21.

Sparganium semen suum in pilulis fert: Nascitur humentibus locis, & Germanis
Degentraut uocatur. Nullus est huius, quemadmodum & ueri Gladioli, in nostris
regionibus usus.

XYRIS. CAP. 22.

Xyris sine dubio est illa Iridis species, quæ ab Italis Spatula foetida nominatur, ea
habet quidem florem, sed qui post multos annos primum erumpat: unde aliqui sine
flore esse crediderunt, iuxta uulgares hos uersus.

Iris purpureum florem gerit, lreos album:

Gladiolus luteum, sed Spatula foetida nullum, &c.

ANCHUSA. CAP. 23.

Anchusæ prima species, quæ Onoclea dicitur, non temere apud nos provenit. Her-
ba est ex sylvestris Buglossæ genere, cuius radix usque ad interiorum medullam siue
neruum rubenti turget succo. Affertur radix eius ex aliis regionibus ad maritimæ
Germaniæ urbes, ubi eam Alkannam, Orcanettam Galli, improprie uocant Phar-
macopolæ. Nam Arabes Ligustrum Alkannam appellant, ut in primo libro diximus.
*Anchusa alia maior est, alia minor: & tertia species minima, quæ Schinckwurz uulgo nominatur.

ALTERA ANCHUSA. CAP. 24. 25.

Nullus adhuc ex recentioribus scriptis certi aliquid de Anchusa prodidit, præter
patrem meum, qui suo studio inuenit, Anchusam alteram hanc esse in fabulosis na-
scentem, rubente radice, Buglossam. Nihil enim est quod descriptioni repugnet. Ger-
manicam wilde Schsenzungen uocant. Radicis superficies per mellesem sanguineo
succo manat. Male hæc à quibusdam Cynoglossa dicitur.

*Aliqui hanc Echion faciunt.

LYCOPSIS. CAP. 26.

Lycopsis à florum figura dicta est, qui (scilicet flores) hiantes suo rictu, patulas lu-
porum fauces imitantur. Altera Anchusæ similis est, & species eius, longiorem tan-
tum & asperiorum caulem habens, Germani similiter wilde Schsenzungen / uel
scharpf Schsenzungen appellant. Nascitur in fabulosis campis, nonnunquam etiã
in muris & circa arces in montibus sitas, Male & hæc ab aliquibus Cynoglossa ap-
pellatur.

ECHIVM. CAP. 27.

Echion absque controversia est illa sylvestris Buglossa, quam hodie Pharmacopolæ
simpliciter Buglossam uocant, Germani Schsenzungen. Leonicensis, uir alioqui do-
ctissimus, & qui primus commissos in plantis errores corrigere conatus est, non satis
certis & sufficientibus rationibus, hanc Buglossam Cirsion esse putat: quæ secutus etiã
est Ruellius. Equidem diligentius illos hanc herbam considerasse optarem. Porro
cùm iam dixerim, nostram uulgo uocatam Buglossam, non esse ueram Buglossam, sed
Echion, necesse est in eius locum ueram Buglossam substituere, ne in calumniatorum
cauillationes incidam. Hoc autem in suum locum differemus. Est & alterum Echion
prædicto minus, nigrioribus in purpura floribus. Nascitur hoc in pinguibus aruis:
Nicander quoque duas Echii species cognouisse uidetur.

OCIMASTRUM. CAP. 28.

Onosmodis Ruellius laceam albam esse putat, ubique in agris nascentem herbam:

ANNOTAT. VALERII CORDI

quàm uerè autem, nondum uideo: Quando quidem notæ, quas tamen Ruellius conuenire dicit, descriptioni non respondeant. *Gefnerus cum Ruellio sentit.

ERINVS. CAP. 29.

Erinos hæc herba appellata est, quòd Caprifici modo lacteum liquorem remittat. Hodie autem incognita est: quamuis Ruellius eam cognouisse uideatur.
*Aliqui Rapunculum syluestre Erinum esse putant: quam rectè ipsi uiderint, wilde Rapunzel.

GRAMEN. CAP. 30.

Ayosia, siue Gramen, quod Germani Gras appellat, hoc loco non quoduis fornum significat, sed eam herbam, quæ ubique in cultis nascitur, geniculatis & dulcibus per terram serpens radicibus ceu uiticulis: foliis arundini similibus, sed multò minoribus. Hanc Germani singulari etiam uocabulo, Quecken, Queckgras, & Gras à iumentis appellant, quæ ea herba delectantur. Queck enim Saxonica lingua utentibus populis iumenta significat. Quapropter hoc uocabulo Germani à uergetis interpretantur. Nam sic etiam Gramen à Græcis dicitur.

CAP. 31.

CAP. 32.

Gramen arundinaceum, Germanicè Xhorgras, Saurhaw.

Parnasinum uerò Gramen nobis incognitum est, quoniam in Parnaso monte gignitur.

SIDERITIS. CAP. 33.

Prima Sideritis à Germanis Seyßtrant appellatur. Omnes enim notæ conueniunt descriptioni. Hanc herbam quidam Chamaepityn appellant, sed falsò, ut in fine tertii libri demonstrauimus. Ruellius herbam Iudaicam, siue Tetrahit Sideritida priam esse putat: quam uerò ipse Iudaicam herbam intelligat, non scio. Nam illi qui autem huius nominis sunt, sibi ipsis non constant, quam herbam Tetrahit, siue Iudaicam appellant.

CAP. 34.

35.

Alteram Sideritida & tertiam, quæ Heraclea uocatur, ignorare me ingenuè fateor. Ruellius tamen utranq; cognouisse sibi uidetur.

ACHILLEIA. CAP. 36.

Achilleia qualis sit, hodie omnino ignorant. Ruellius tamen hoc ἀχίλλειον Millefolium esse dicit. Intelligit autem Millefolium uulgare siue terrestre: sed magno errore. Nam nostrum Millefolium est Stratiotes Millefolia, siue terrestres, apud ueteres autores. Hic autem error in grauiorem illum errorem coniecit, ubi Stratioten terrestrem indicare conatur: de qua re suo loco dicemus. Reuera autem Achilleia est Xeinarn. Copiosissime nascitur in pinguibus & quiescentibus aruis.

RVBVS. CAP. 37.

Rubus, sunt etiam qui ρυβόχαρος appellant: quamuis ρυβόχαρος in primo inter arbores describatur, sitq; diuersus ab hoc Rubo. Hæc igitur nominum permutatio in causa est, quod diuersas ρυβόχαρος descriptiones apud autores legamus. Rubus uerò, de quo hic agitur, triplicem differentiam habet. Quidam enim frutices & arbuta bitum excedente longitudine, fructum post Solstitium maturum ostendens, spinis horret caulibus eius, quem singularem plerumq; erigit. Tertius humi in aruis & alibi repit in terra, aculeatos ramos siue uiticulas spargens, hanc ρευαίχαρος Theophrastus à nobis Brahme & Kragen appellantur. Fructus uerò eius, qui Mora Rubi sunt, Brahmebeer & Kragenbeer appellantur. Malè quidam mora bacci pro bati, id est, Rubi, pronunciant. *Chamebatus, Saubenbeer.

RVBVS IDAEVS. CAP. 38.

Rubus hic in Ida, Troadis monte, non tantum gignitur, unde nomen illi Greci indiderunt: Nascitur apud nos etiam in montibus & syluis, sine adnuculis per se uirgis recta ascendentibus subsistens, tenuibus & exilibus spinis, quamuis frequentissimus etiam sine spinis, omnino glabris inueniatur uirgis. Folia à tergo candidiora habens, quàm

quam supradictus. Fructus quoque solstitio maturefcere incipit, qui rufus & leniter hirtulus est. Germani hunc Rubum priuatim *Dunpeter* / *Dindbeiz*, & Mora eius *Dimperen* uocant, quæ gustu iucundiora quam prioris Rubi fructus percipiuntur: Ruellius sine dubio cognouit hunc Idem Rubum, aitque à Gallis Frambosciam appellari. Idem Ruellius fraga Idæi rubi speciem quandam esse putat, nec malè, si non Idæus rubus frutex, & fragaria exilis herbula esset, quæ tota foliis, floribus & fructibus constat: neque enim [†] dignos caules, neque ramos aliarum herbarum modo habet. [†] Hoc nomen ne dignos.

HELXINE. CAP. 39.

Dux sunt herbæ Helxine appellatæ. Vna Cissampelos Græcis, Latinis Conuolulus uocatur: altera uero Parietaria Latinis dicitur. Vergilius autem Marcellus malè Cissampeli Helxines caput è Dioscoride, quasi adulterinum reiecit, nihilominus tamen nomina eius in Helxines (quæ Parietaria est) capite relinquens, ut sunt Cittampelon, Cissampelon, Melampelon, & Cissanthemon. Helxine igitur, quæ Cissampelos uocatur, à Germanis *Dinden* / *Wederwiden* / & *Saunwinden* appellatur, cuius flores hæcenus Ligustrum interpretati sunt apud Verg. magno errore, ut in primo libro indicauimus. Nascitur etiam in segetibus Helxine, gracilibus & oblongis foliis, flore prædicti floribus simili, sed secundum proportionem minore. Vtraque lacteum liquorem confrica remittit, hæc *Kornwinden* Germanis appellatur: Huic Helxine Elatine similis est, propterea Serapio statim post Conuolululum Elatinen (Dioscoridem citans) describit. Idem tamen Serapio Cissampelon Asci, Elatinen uero Athin, corruptis ab Helxine & Elatine nominibus, appellat. Altera uero Helxine, quæ parietaria, Perditium & Muralium dicitur, in parietibus & muris sub stillicidiis nascitur, unde à Germanis *Traufftraut* uocatur: ab aliis *S. Peters traut* / *Tag vnd nacht*. Huic similis est Alline, cuius caput in secundum librum ante Auriculam muris ab aliquo transpositum est. Nam hoc loco omnes quatuor illæ herbæ describi debent, scilicet Helxine duplex, id est, Cissampelos & Parietaria, stillicides Elatine & Alline. Hunc enim ordinem ipse Dioscorides in describendis his herbis seruauit. In multis hodie pharmacopoliis Allinè (id est, *Tag vnd nacht*) Parietariam uocant, sed magno errore. Nam Parietaria tantum in stillicidiis circa muros & parietes nascitur, Alline uero in syluis, plurimum à parietibus distante natali, à quo utraq; nomen suum inuenit. Cum autem hoc loco de Alline mihi sermo sit, nequaquam omittere possum, magno errore apud Plinium Helxines appellatione Cardui quendam describi. Verba Plinii ex lib. xxi. cap. xvi. hæc sunt: Helxine rara uisus est, neque in omnibus terris: est radice foliosa, ex qua media ueluti malum extuberat, coniectum sua fronde. Huius uertex summus lachrymā continet iucundi saporis, Acanthiden Mastichen appellatam. Hæc autem de uerbo ad uerbum ex Theophrasti libro vi. cap. iiii. de plantarum historia desumpsit Plinius. Theophrastus uero hoc loco non Helxine habet, sed *ifira*, quæ carduus pinea à Theodoro interpretatur. Plinius secutus est Hermolaus Barbarus, qui eadem in Corollario huius cap. scribit. Hunc autem errorem facile in librariorum et scriptores reiceret aliquis Collutius, nisi ipse Plin. lib. xxii. cap. xvii. (ubi Dioscoridis Helxinè, id est, Parietariæ, siue Perditium describit) scriberet, se, qualis uera esset Helxine, in priori libro dixisse, hoc est, ubi Helxinen pro Ixine apud Theophrastum legit, ut supra demonstraui. Graue hunc errorem nullus adhuc in Plinio animaduertit, quamuis toties emendatus, & reprehensus sit. Sed satis esset, si quis eos errores corrigeret, qui post uitam Plinii librariorum incuria irrepserunt. Nam omnes ipsius authoris errores corrigere, onus esset ualde impar unius uiri humeris:

ELATINE. CAP. 40.

Elatine, ut iam diximus, Helxine Cissampelo similis est, florē habet ualde exilem, & triquetrum semen. lacteum liquorem non remittit, qua sola nota à Cissampelo distinguī potest. Nascitur in aruis & cultis locis, Germanis *Erwinden* appellatur. Hodie nullus illius est in Medicina usus.

* Quidam hanc Orbanthen faciunt.

EUPATORIVM. CAP. 41.

Eupatorii nomine non omnes pharmacopolæ eandem herbam ostendunt. Vt autem

L iij

ANNOTAT. VALERII CORDI

breuiter dicam: Nullus uerum Eupatorium cognouit, præter eos qui hodie Agrimoniam uocatam herbam Eupatorium uocant. Nam reuera Eupatorium est ea quæ nunc falsò appellatur Agrimonia: qui error Dioscoridis etiam ætate fuit. Propterea illius authores à Dioscoride in hoc capite iure reprehenduntur. Sed tanta fuit haec stenus barbaries, ut nullus eam reprehensionem animaduertit. Dudum de hac rescripserunt Leoniceus, parens meus, & alii plures, quibus etiam ipse Ruellius subscribit. Germani *Odermenig*, Eupatorium uocant, & *Leber Ecten* / quia lappas habet.

QUINQUEFOLIUM. CAP. 42.

Quinquefolium Græci *πεντάφυλλον*, Germani *Fünffblat* / & *Fünfffinger* trant appellant. Serpit per terram multis & longis uiticulis, ex geniculis singulis radices in terram demittentibus. Est etiam sine dubio Pentaphylli species, quæ Tormentilla appellatur: quod ex foliorum & florum figura, & totius herbæ sapore, temperamento & uiribus iudicare qui uis potest. Quapropter illi minimè sunt accusandi, qui Tormentillam *πεντάφυλλον* esse scripserunt. Hi autem qui omnino nos uero Pentaphyllo carere scriptis prodiderunt, nullo modo probandi sunt. Vbiq; enim in phar-macopoliis uerum habetur *πεντάφυλλον*.

* Quinquefolium simpliciter dictum, humi serpit: eiusdem species minor, id est, Tormentilla uulgò dicta, rectè sit-git.

PHOENIX. CAP. 43.

Phoenix hæc herba à punice coloris semine dicta fuit. Est autem frumentacea & spicata planta, in aruis & recenter illitis luto maceratis nascens, & Germanis *Wenje Eorn* / siue *Wenje gersten* appellatur, aliis *Fünff* habet / frumentum tectorum.

IDAEA RADIX. CAP. 44.

Idæa radix qualis sit, hodie omnino ignoratur. Nomen inuenit ab Ida monte, in quo fortè copiose nascitur. Quapropter non credo ubiq; eam apud nos prouenire.

* Sunt qui aliud faciant Idæam herbam apud Plinium: aliud radicem Idæam, quarum parum à Rhodia distare pui-tant, & fortè Ben rubrum uulgò dictum esse. Folia autem rusci non huic, sed herbarum Idææ attribuenda: confunde utriusq; historiam.

RHODIA RADIX. CAP. 45.

Ex Macedonia olim Rhodia radix in Græciam ferebatur, propterea radicem tantum descripsit Dioscorides: folia uerò, caules, & alias eius partes quales sint, nullus unquam scriptor prodidit. Radicis tamen tam certæ à Dioscoride afferuntur notæ, ut facillimè deprehendi possit, si modò aliquis in eam incidat. Ego cum præterito anno apud circumforaneum herbarium radicem quandam uiderem omnes notas habere, quas Dioscorides Rhodiæ tribuit, statim iudicaui eam Rhodiam siue Rhodia da radicem esse: simulq; nomen ab eo quærens, quod Rosaria erat, cum audirem ipsum quoq; nomen conuenire, nihil dubitabam. Emptam itaq; radicem terræ mandauit, quæ proxima æstate caules, folia, flores, & semina maiori Crassulæ similia protulit. Eandem radicem cum in Italia uidisset Georgius Agricola Medicus, harum rerum studiosissimus sectator, statim ipse quoq; iudicauerat eam Rhodiam esse, cuius partem apud illum uidimus, estq; omnino cum nostra hac eadem. Idem Agricola Portu-lacæ siue Crassulæ folia Rhodiam radicem habere in Italia obseruauit, qualia etiam in nostra domum ab illo reuersi inuenimus. Cum igitur diuersorum hominum iudicia in eadem re conueniant, respondentibus etiam omnibus descriptioni notis, nihil est, quod aliquis dubitet, Rosariam esse Rhodiam radicem, quam Germani *Rosenbus* circa Saltzburgum. Porro illud constanter dicere ausim, Galenum hanc radicem non cognouisse, quoniam eam calidam in secundo, siue in principio tertii esse scribit. Quod temperamentum ex uiribus, quas Dioscorides illi tribuit, collegit. Verum cum ipsæ quoq; Rosæ similiter ut Rhodia radix, capitis doloribus medeantur, nec tam in calida sint, falsa est hæc ratiocinatio. Galenus autem Rhodiam radicem tantum digerendo capitis dolores pellere credidit, cum tamen id partim propter reper-cutiendi uim, partim etiam propter aliquam partium tenuitatem faciat. Constat enim ex

nim ex contrariis qualitatibus, humida ac calida, scilicet terrea & frigida, quemadmodum ipsæ etiam Rosæ, quod ii qui plantarum odoribus nares, & saporibus linguam exercuerunt, facile percipere possunt. Nam odore, sapore, & colore omnino rosas imitatur Rhodia radix.

EQUISETVM. CAP. 46.

Hippuris, Cauda equina, siue Equisetum, à Germanis *Rannentraut* / *Roszagel* / *Schaffthorn* / & *Taubenrocken*, id est, Columbina colus, appellatur quoniam prælidium quoddam ante germinationem color in torulos tornata simile, ceu penso inuolutum, primo uere emittit. Longiora folia & teneriorem habet caulem, quam Polygonos fœmina, nec in aquis, ut illud, prouenit. Facile igitur ab inuicem discerni possunt.

EQUISETVM ALTERVM. CAP. 47.

Alterum Equisetum priori simile est, breuioribus tantum foliis. Quapropter non existimo hoc genere ab illa differre, quoniam primam etiam Hippurum multum mutari secundum diuersos natales obseruauimus.

* Nascitur in syluis, *Wilder Roszagel*.

COCCVS INFECTORIVS. CAP. 48.

Frutex est sui generis, foliis Aquifoliæ. Kermes Arabibus. Est & alius Coccus uermiculus dictus, *Zerbs* Polonis.

TRAGIVM. CAP. 49.

Si (ut Dioscorides scribit) sola Creta Tragium gignit, nulla nobis spes est, quod in nostris regionibus inueniatur.

* Non eodem modo ab authoribus describitur.

ALIVD TRAGIVM. CAP. 50.

Aliud Tragium quo iam nomine appelletur, uel an apud nos proueniat, nondum compertum est.

* Non est propriè frutex.

TRAGVS, HERBA. CAP. 51.

De Trago hac parens meus in Botanologico suo disseruit, qui primus eam in lucem rursus restituit, Germani *Dünerbeer*, siue *Dünertrauben* uocant, quidam etiam *Razentrübitt* / uel *Blatloß*. Sed hoc nomen latius patet. Itali *Pegnolla* iam dicunt quod oblongi eius acini, quos pro foliis habet, Pincis nucleis similes sint. Nascitur maritimis litoribus, fluminibus imminutibus apricis petris, & in muris, aliquando etiam in tegulis. Antonius Musa errat longè, quod Italorum *Pegnolla* *Aizoon* minus dicat esse. sunt enim tam similes inuicem herbe, ut non facile à quouis discerni possunt, minus *Aizoon* & *Tragus*. Propterea utriusque differentias ponere non erit inutile. Dioscorides *Aizoon* minori *αὐθι χαρά* tribuit. Significat autè hoc loco *χαρά* non simpliciter uiridem, sed luteū & modicè ad uiridem inclinatū colorē. Theophrastus etiam per *χαρά* simpliciter luteū intelligit lib. vii. de hist. plantarum in fine capitis xiii. Vbi *Anthemī*, id est, *Chamemeli* florē foris candidum, intus uero *χαρά* esse scribit. Eo loco *Gaza* malè uiridem, interpretatus est. Nam omnes uideamus, *Chamemeli* florem in medio nō uiridem, sed luteū colorem habere. Et ipse Dioscorides mediū florē *Anthemidis* ad aureum colorem inclinare scribit, qui plurimū à uiridi differt. Quapropter cū *Aizoon* minus *αὐθι χαρά*, id est, luteos flores habeat, quos sepissimè etiam nos in ea herba uidimus, nullo modo *Pegnolla* minus *Aizoon* esse poterit. Habet enim *Pegnolla*, id est, *Tragus*, nō luteos, sed candidissimos flores, quos in omnibus locis producit. Hinc est quod nullos flores in Trago describit Dioscorides. * Huius herbe folia Dioscorides fructus nominat.

IVNCVS. CAP. 52.

Ἰύνκω. Græcis in genere omnis luncus dicitur. Germanis *Binzgen* / *Xit* & *Semipeten*. Habet autem multas species luncus. Est enim molli acumine quidam, qui ubique apud nos in aquosis nascitur, & priuatim à Græcis *Ἰύνκω λέα*, id est, levis siue lenis luncus appellatur. Qui uero maritimis nascitur locis, acuto & ad uulnus infesto est acumine, *Ἰύνκω* uocatus; eo nos caremus. Grandis uero luncus in lacu-
bus

ANNOTAT. VALERII CORDI

bus & stagnis nascens, quæ Græcis ὀλέγιον, Germanis *Rosbintzen* siue *Pferdes-
bintzen*/Latinis *Mariscus* nominatur. Est & quartus luncus Euripici nomine, quam
uis quædam exemplaria Dioscoridis Aethiopicum eum appellant. Sed ut meam opi-
nionem dicam, nullus est hoc nomine apud omnes alios authores luncus. Quapro-
pter necesse est huic loco subesse mendam, & neq; Aethiopicus, neq; Euripicus legen-
dum. Nam Galenus, qui luncorum species & uires ex Dioscoride collegit, nullam fa-
cit Euripici siue Aethiopici lunci mentionem. Et quod hic de Euripico legitur, ille
de Holoschoeno scribit. Serapio etiam qui de uerbo ad uerbum Dioscoridis caput de
lunco interpretatur, nullum Aethiopicum siue Euripicum luncum habet, sed simili-
ter ut Galenus de tertio lunco, id est, Holoschoeno eadē scribit, quæ nūc in exemplari
Dioscoride hæc duæ dictiones reijciendæ sunt, Aethiopicus siue Euripicus, & in lo-
cum ὀλέγιον substituenda.

LICHEN, HERBA. CAP. 53.

Lichenem Græci hanc herbam appellarunt, quod more lichenis, id est, impetigie
nis in humidis & umbrosis petris serperet. Serapio eam *Hazez Alscher* appellat, in
terpres uero *Epatiam* reddidit. Vulgo enim *Epatica* herba uocatur, quam *Lichena*
ueteres dixerunt. Sed præter hanc innumeras alias habent *Epaticas*, qui uulgaribus
& a nullis authoribus traditis nominibus delectantur. Lichen autem (ut ad rem no-
stram redeamus) herba est in humidis & umbrosis petris, nonnunquam etiam in ge-
lidorum puteorum lapidibus serpens, quam quidam *Epatiam*, Germani *Stettin*
fledten & *Wöpsfledten* & *Läbertrout* appellant, neq; caulem, neq; flores, neq;
femen habet, quamuis interdum breuissimos quosdam pediculos, parua ceu acetabu-
la ferentia protrudat. Sed hæc neque flores, neq; caules, neq; semina propriè dici pos-
sunt.

PARONYCHIA. CAP. 54.

Paronychia quo nomine iam appelletur, non quiuis dixerit.

CHRYSOCOME. CAP. 55.

Similiter etiam ignoramus, quid *Chrysocome* sit, cui nomen aurei coloris corym-
bi indiderunt. *Saracenicam* tamen *Mentha*, quam recentiores Græci *Costum* herbam,
Germani uero *Warien münze* appellant, sine dubio est *Chrysocome* cognata. Ha-
bet enim in summis caulibus aurei splendoris corymbos, & *Veratro nigro* similes ra-
dices. Estq; herba tota cum radicibus admodum odorata.

CHRYSOGONVM. CAP. 56.

Chrysogonon ab aurei coloris semine nomen suum inuenit. Quo uero nomine
hodie uocetur, & a quod nos proueniat, omnibus adhuc ignotum est.

HELIOCHRYSUM. CAP. 57.

Heliochryson apud *Theophrastum* *Aureliam* interpretatur *Theodorus Gaza*.
Est autem herba quæ in pharmacopoliis *Stichados citrinum*, & Germanis *Rein-
blum* & *Winterblum* & *Jingling* uocatur. Male in hoc capite aquo
sis conuallibus interpretatus est *Verg. Marcel*. Nam in Græcis codicibus *χαράδρον*
δεν τὸ τοῖς legitur: quibus uocabulis significantur torrentibus & imbris abrupta
loca, quæ alias sicca sunt, præterquam cum per ea imbrium torrentes delabuntur. Hu-
iusmodi enim locis in aspero sabulo *Heliochrysum* nascitur, & nunquam in aquosis
uallibus. Nam aspero, arenoso & sicco solo gaudet. Apud *Gal.* & *Aeginetam*
per *Amaranthum* *Heliochryson* est intelligendum. Nam huius etiam flores, quemad-
modum purpurei *Amaranthi*, non marcescunt, ut nomen indicat. Si quis autem illorum
authorum capita de *Amarantho* *Dioscoridis* *Heliochryso* conferat, omnino eandem
herbam esse pronunciare cogetur. *Purpurea* uero *Amaranthus*, *Plinii* nimirum, qui uul-
go *flos amoris* dicitur, nullam facit Medicinam, propterea ab hoc authore non de-
scripta est. *Ruellius* minimè uerum *Heliochryson* indicat, qui lib. iij. cap. xxiii. *Sticha-
dos ci-*

dos citrinā uerā Stichada esse dixit, magno & ipsum errore. Nam Stichas uera longē alia est herba, quam quæ Stichados citrinum uocatur.

CHRYSANTHEMVM. CAP. 58.

De Chrysanthemo seu Caltha in Bupthialmo differuimus, ubi eam à Germanis **Goldblumen** appellari indicauimus.

* Videtur hoc caput cum Bupthialmo confusum.

AGERATVM. CAP. 59.

Ageraton quo nomine iam appelletur, & an in nostris etiam regionibus nascatur, nulli cognitum est.

VERBENACA RECTA. CAP. 60.

Verbenaca hæc recta dicitur, quod rectis surgat caulibus. Germani hanc **Nanen** **Temp** appellant. Nascitur aquosis locis.

VERBENACA SVPINA. CAP. 61.

Hæc autem Verbenaca resupinatos erigit caules, & ubiq; adhuc in pharmacopolis Verbenæ, & à Germanis **Eisenkraut** / siue **Eisenhart** (ab effectu, quia incuruos habet circa radicem ramulos) appellatur. Columbæ utraq; Verbenæ delectantur, unde illi **περσεπορ** nomen Græci indiderunt, qui eam **εργα βοτάνης** etiam, id est, **Sade** **de illi περσεπορ** nomen Græci indiderunt, qui eam **εργα βοτάνης** etiam, id est, **Sade** **cram** herbam uocant. Sunt hodie aliqui qui luteis & paruis floribus herbam quandam Verbenacam fœminam uocant, sed eam Irionem esse secundo libro docuimus: nihil enim cum Verbenaca commune habet.

ASTRAGALVS. CAP. 62.

Astragalus herba à radicum, cum talis, similitudine appellata est, hodie autē quid sit, ignorant omnes. Ruellius tamē cognoscere uisus est sibi, cui cum ratione est adhuc bēda fides. Nascitur ubiq; æditis fruticosisq; locis. Germanis **Anollenkraut** uocatur, quibusdam **Christianwurbs**.

HYACINTHVS. CAP. 63.

Quantum ex poetis & aliis Rei rusticæ scriptoribus intelligere possumus, non minus tantum herbae nomen Hyacinthus fuit. Nam Irin quoq; Hyacinthum aliqui nominarunt, & poetæ Lilio similem Hyacinthum esse dicunt, colore tamen differre, quoniam Lilio insit argenteus candor, Hyacintho uerò purpureus color. Porro Hyacinthus quem Medici intelligunt, parua herba describitur, multis & purpureis in comagibbosa constitutis floribus. Hunc licet hodie omnino ignoremus, spero tamen me, quid reuera sit, non ita post longum tempus nos assecuturos. Nascitur in Comitatu Mansfeldensi iuxta montem Petri copiose, & Germanis **Breünling** uocatur.

* Heluctijs, ut quidam aiunt, nescio quibus, **Kolrosen**.

PAPAVER ERRATICVM. CAP. 64.

μικρὸν ποῖος, Latinis Papaueralis, & Papauer erraticum, pharmacopolis Papauer rubrum, Germanis **Witloer mahn** / **Seldemahn** / **Kornrosen** / **Klapperrosen** & **Klitsche** dicitur. Notum omnibus erraticum Papauer est, nascitur in aruis & segetibus. Sciendum est in hoc cap. improvidē comparari huius Rhœadis Papaueris folia Origani & Thymi foliis. Non posset dissimilior esse horū proportio. Habet enim Rhœas Erucae siue Cichorii modo incisa folia, à qua similitudine longissimē recedunt Thymi & Origani folia. Abundant igitur & ab aliquo malè adiecta sunt uocabula ista. Vehemēter errant, qui hoc Papauer cornutū Papauer et Memithen, id est, Glauco esse putāt. Est enim quilibet illarū ab aliis diuersa, et proprii generis herba.

SATIVVM PAPAVER. CAP. 65.

μικρὸν ἡμερῶν, id est, satium Papauer, quod Germani **Mahn** / siue **Wagen** uocant, duo prima diuisione genera habet. Thylacite ab oblongo et utriculis simile capite nominatur, habet hoc candidum semen, quod hodie Papauer album dicitur. Alterum uerò nigrum semen, in lato sessili & doliole simili capite, unde etiam à Græcis Pithite nominatum est, uulgo hoc nigrum Papauer à pharmacopolis nuncupatur. Ex nigro hoc Papauere lacteus liquor leniter incisis uasculis colligitur, quē Opium in omnibus adhuc pharmacopoliis nominant. Exprimitur etiam ex tulsis foliis & uasculis succus, & exsiccat. Eum priuatim Græci **μικρὸν ἡμερῶν** uocant, sed uiribus multo est liquore imbecillior, propter inconcoctam & aqueam substantiam, eandem ob causā

ob causam facillimè putrescit & teredines sentit. Quidam interpretes cum apud Græcos authores Opon, siue Opium legunt, succum Papaueris interpretantur : sed magno errore. Nam *μυκάνιον* luccus est Papaueris, Opos uerò siue Opium, est liquor eiusdem.

PAPAVER CORNUTVM. CAP. 66.

μυκάνιον κεράτιον, Latinis Corniculare, siue Cornutum Papauer, Germanis *Hornmahn* appellatur. Non habetur hoc in nostris pharmacopoliis. A quibusdam tamē in hortis feritur. Siliquam habet longam Fœnugræci siliquæ æqualem. In Dioscoridis exemplaribus malè legitur *καρπὸν δὲ μικρόν*, id est, fructum breuem, ut Vergilius Marcellus interpretatus est. Cum uero eundem fructum cornu modo inflexum, & Fœnugræci siliquæ similem esse dicat, nequaquam *μικρόν* sed *μακρόν* legendum est, quod ipsius fructus oculis subiecta forma manifestè indicat. Serapio quoq; ubi hoc Papauer de uerbo ad uerbum ex Dioscoride descripsit, dicit, illud habere semen minutum in subtilibus & longis uaginis. Errant qui cornutum Papauer esse putant in fegete nascens Papauer, quod antea Rhœada nominauimus. Differt etiam ab hoc Papauere cornuto Memythe, id est Glaucium, ut prius aliquoties indicauius.

PAPAVER SPUMEVM. CAP. 67.

μῆκον ἀφρόδης, quod quidam etiam Herculeum, siue Heraclion uocant, ignota omnibus nunc est herba, neq; ipse Plinius eam cognouit. Nam libro xx. capite xix. de hoc Papauere sic scribit: Alterum è syluestribus genus Heraclion uocatur, ab aliis Amphron, foliis (si procul intuearis) speciem passerum representantibus, radice in summa terræ cute, semine spumeo, ex hoc lina splendorem trahunt æstate. Hæc autem de uerbo ad uerbum ex Theophrasti de hist. plant. libro ix. cap. xiii. desumpsit Plinius. Sed nequaquam Theophrasti mentem intellexit. Nam hic Papaueris huius folia Struthi siue Struthii herbae foliis comparauit, quæ lanaria radícula etiam appellatur, quod scilicet radice eius lanæ & linteæ candorem acquirant. De Struthio hoc in secundo libro differuimus. Commisit itaq; hoc loco Plinius duplicem errorem, utrunq; falsis magnum. Primus est, quod pro herba Struthio passerem animal interpretatus sit. Alter uerò, quod dixerit, Papauere lina candorem trahere. Cum igitur Struthos passerem etiam significet, facilis esset prior error, nisi ipse Theophrastus apertè indicaret, Papauer folio constare Struthi, quo splendore in linteis tribuant. Candorem autē linteis non passere, sed herba lanaria, quæ Struthos siue Struthion Græcè dicitur, tribuunt. Potuisset etiam ex hoc colligere Plinius, Theophrastum herbam & non auem in his apertè indicatur, Struthion folia habere, quod plantis & non animalibus propriū esse omnes nouerūt. Ne autem alicui incredibile uideretur, herbae huius folia passeris speciem habere, Theophrasti uerbis hanc parenthesin adiecit Plinius : Si procul intuearis.

Error Plinij.

* Hoc fortè est Ben album syluestre.

HYPECOVVM. CAP. 68.

ὑπὸ κοῦον quo iam nomine appelletur, nullus adhuc scriptis prodidit, neq; aliquis ex doctis nouit. Propterea mihi quoq; ueniam dari non est iniquum, quod ipsum non nouerim.

APOLLINARIS. CAP. 69.

ποσσύανον, Latinis Altercum, Apollinaris, Symphoniaca, & Hyoscyamus, Germanis *Bilentrant* uocatur. Tres habet differentias. Est enim purpureo flore & nigro semine quædam. Altera florem luteum & semen subflauum habet: utraque apud nos non nascitur, & quoniam uenenatæ sint, nihil refert quod his careamus. Tertia omnium est innocentissima, quæ flore constat albo, sed in medio purpureo, & semine candido. Nascitur hæc apud nos ubique in ruderibus, fossis, & circa oppida pagosq;.

PSYLLIVM, SIVE PVLICARIS. CAP. 70.

Ψύλλον & Pulicaris dicta hæc herba est, quod semen eius colore & quantitate pulicibus simile sit. Notum hoc est eodem nomine omnibus pharmacopolis. Herba ipsa sponte apud nos etiam & copiosissimè nascitur, præsertim Interboci, & uicinis locis.

SOLANVM QVOD EDENDO EST. CAP. 71.

Στρυχὸν κηπίος, Latinis Solanum & Cacubalum, pharmacopolis Solatrum, Germanis Lachtschatte uocatur. Multa sunt solani genera, quæ deinceps enarrabimus.

Hoc loco Dioscorides uulgare solanum intelligit, quod nos simpliciter Lachtschatten & pharmacopolæ Solatrum appellant. Serebatur olim cibi gratia. Nos uero illud in cibo uitamus. Theodorus Gaza omnes Solani species Vesicarias apud Theophrastum interpretatur, sed malè. Nam Vesicaria speciale nomen est, & uni tantum Solani speciei proprium, quæ fructus uescicis similes fert, unde & nomen inuenit.

VESICARIA. CAP. 72.

Αλικάκαβο, quod φασαλίνα etiam hic author & Aëtius uocat, Arabibus & pharmacopolis corrupto ab Halicacabo nomine Alkekengi dicitur, Germanis uero Juckenkirchen / Blasenbeer / Blasenkräuter & Solatren. Nascitur circa uineas sponte, in quibusdam etiam locis in hortis seritur: fructum habet in rubenti & leniter turbinato folliculo ceu uescica, croceum, & Ceraso magnitudine æqualem.

SOMNIFICVM SOLANVM. CAP. 73.

Στρυχὸν ὑπνωτικόν hodie ignoramus. Id tamen certum est, Amarum dulcem, id est, Jelenger ie lieber, huic ualde cognatam esse. Folius enim, florum forma, fructu & uiribus (quas in me ipso expertus sum) Solanum refert.

SOLANVM FVRIOSVM. CAP. 74.

Στρυχὸν μανικόν in Aegypto copiose nascitur, unde ad nos fructus eius afferuntur, quos pharmacopolæ Cuculos de Levante, id est, Solanum orientale uocant. Nam Cuculus idem est quod Cacubalus siue Solanum, Levante uero Itali orientem a leuando uocant. Antequam autem ad nos perferantur hi Cuculi, omnino exsiccantur interiores nuclei, & succosa caro quæ corticem ambit. Semel satis recentes uidimus. Pisces quamprimum eos deglutierint, uertigine corripiuntur, & supini aquis innatant, ita ut facillimè manibus apprehendi possint.

† Mihi Coccali orientis uulgo dicti cum Solani huius historia conuenire non uidentur.

DORYCNIVM. CAP. 75.

Nullus ex ueteribus tum Græcis tum Latinis, hanc herbam descripsit, præter Dioscoridem, qui historiam eius ex Crateua desumpsit. Plinius & alii quidam crediderunt, Dorycnium idem esse cum Solano furioso, quod falsum esse Nicander, Dioscorides, & plures alii testantur. Reuera autem sui generis herba est Dorycnium, de quo meam opinionem paucis proferam: Seritur à Venetis monachis, & à paucis in Germania Medicis herba, quam Granacordis & Halicaccabum alteri uocant, ab Halicacabi fructus similitudine. Habet hæc herba omnes notas & uires, quas Nicander & Dioscorides Dorycnio tribuunt, † sola tamen folia non conueniunt, quæ Dioscorides olei foliis similia esse dixit. Sed hoc me nihil mouet: Desumpta ex Crateua est historia, potuitque corrupti locus iste, ubi de foliis agitur. Respondet candidi flores, folli-
culi, unde etiā Halicaccabus à ueteribus & nostris appellatur. Conueniunt etiā ad am-
mullum in folliculis contenta, rotunda, dura, leuia & colore uaria semina. Conuenit etiam eorum numerus, & eō manducata lacteum habent colorem & saporem, quas notas Dorycnio Nicander tribuit. Quinetiam somnifica sunt eius semina, nec sine periculo uitæ intra corpus sumuntur. Quapropter cum omnes alię notę conueniant, uerissimile est in foliorum comparatione mendam esse. Seuius hanc herbam, uidimus & gu-
M

† Reprehēdit hanc opinionem Matthiolum.

stauimus. Propterea non ex aliorum relatione ista de Dorycnio scripsimus: Grana eius comesta suauiore somnum quam Opium afferunt: Sed cauendus est magnus illorum numerus.

MANDRAGORAS. CAP. 76.

Non sine causa turbabitur, qui Theophrasti & Dioscoridis de Mandragora uerba considerabit. Dioscorides enim Mandragoræ primi fructus sorbi magnitudine, & luteo colore esse dixit, quamuis Marcellus male uitellis ouorum interpretatus sit, ratus *ovis* legi oportere, quæ uox oua, non ouorum uitellos significat. Probari codices *ovæ*, id est, forbis, habent, ubi Serapio Mespilum interpretatus est, sed malè. Hoc autem peccatum potius interpreti, quam Serapioni adscriberem. Alterius uerò mala, siue fructus, duplo maiora, & croceo colore depinxit, utriusque etiam caulem negat. Sed *ij*. Vbi fructus eiusdem niger & acino uuæ similis describitur. Sed malè *ῥα γὰρ ὁ δὲ ρα* *δὲ ρα*, quo uocabulo acino uuæ simile quiddam Græci intelligunt. Ruellius non racea enim corruptus est iste apud Theophrastum censer, sed magno errore. Non Mandragoræ historia apud Theophrastum & Dioscoridem, cum uerò contraria omnino sit dam alterutrum authorem mentitū esse pronunciaret: quod ne aliquis faciat, moneo & suadeo. Nam uterque satis exquisitè & optimè Mandragoræ historiam executus est, (quod fortasse Paradoxon alicui uidebitur.) Sed illud nunc demonstrare incipiam: Dioscorides tres Mandragoræ species enumerat, Theophrastus autem unam tantum. Dioscorides autem marem & foeminam Mandragoram, id est, priores duas species, quas solas uiderat, descripsit ea forma, qua adhuc in Italia cognoscuntur. Quin & ego fructus & semina uidi, plantam & enata folia historię conuenire animaduertī nem facit. Tertiam uerò Mandragoræ speciem, quæ Morion priuatim dicitur, Theophrastus describit Mandragoras: grandem habet radicem, caulem procerum, folia Solani & Mandragoræ prioris foliorum mediā habent figuram, flores proferunt nigros, & post hos nigros fructus grandi uuæ acino æquales (id est, *wie ein große Weinbeere*) qui uinosum succum gustatus emittit. Vidimus eam plantam in Helliæ mine Græcorum Morion interpretantur. Alii etiam *Schlaffbeer* eam uocant, quoniam soporem fructus eius faciunt. Porro nullum tam stupidum esse existimo, dragoram esse. Fingunt enim radicem aliqui ex radice bryoniæ & althææ, alii aliter. Veri Mandragoræ radicis cortex in pharmacopoliis suo genuino nomine habetur.

ACONITVM PARDALIANCHES. CAP. 77.

Pardalianches Aconitum, quo pantheras uenatores necant, hodie nulli cognoscitur. Si tamen huius historię conferamus herbam, quam nos ab uno fructu, quem solum fert, *Einbeer* uocamus, uiresque cōsideremus, manifestè uidebimus eam hoc Aconitum esse, quod Theophrastus alibi Telyphonon, alibi *Μυόφωρον*, alibi etiam Scorpionem uocat, quoniam radicem habet graminis modo geniculatam, & scorpionis caudæ similem.

* Fallitur Cordus: est enim *Einbeer* Solanum syluaticum quoddam, frigide facultatis, non septicæ.

ALTERVM ACONITVM, ID EST, LYCOCTONON, SIVE CYNCTONON. CAP. 78.

Aconitum quod Lycotconon & Cynctonon dicitur, quoniam lupos & canes interimat, tres habet differentias: quarum una, quæ est efficacissima, a pharmacopoliis habetur, & ab his radix Aconiti dicitur. Germani uerò Græcum nomē Lycotconon interpretantur, Nam *Wolfswurzel* a nobis appellatur, quod uenatores Lupos & Vulpes eius radice necent.

* Id quod purpureos flores habet, dicitur *Münchschappen*.

CICVTA:

CICUTA. CAP. 79.

Κόρυς Latini Cicutam, Germani Witterich & Witscherling uocāt. Non cognoscitur ab omnibus Cicuta. Nam aliam herbam minimē uenenatam hoc nomine habent pharmacopole, cuius semen longum & gracile existit, ideoq; creditur apud nos non esse uenenata Cicuta. In causa est, quod ueram Cicutam non nouerunt, quā in nostris etiam terris præsens est uenenum: quod manifestissimis exemplis probari potest. Non enim rarō contingit pueros radice & semine eius, quod Aniso equale est, uesci & intermori. Habet Cicuta foetidissimum odorem, quo solo statim abominabile eius uirus percipitur. Sunt autem plures eius species.

* De temperamento eius controuersia est, sicut de Coriandro. Species Cicute etiam in areis hortorum nascitur, semine aniso simili, Gleysen.

TAXUS, ARBOR. CAP. 80.

Taxus arbor, quæ à Græcis Σκιάξ appellatur, uenenum est. Ideoq; oportet, ut diligenter animaduertamus, quam rem intelligant scriptores, cum Smilacem apud eos legimus. Nam præter hanc arborem duæ sunt adhuc plantæ, quæ Smilaces appellantur. Vna lenis siue satiuā dicitur Smilax, id est, Dolichus. Altera aspera est Smilax, siue Hedera Cylissā. Est autem Taxus arbor sine dubio ea, quam nos etiam Eben uocamus, è cuius ligno adhuc arcus & scorpiones fiunt, quos optimos ex Taxo fieri auresiores tradunt. Hi autem maximē errant, qui Eben Ebenum esse credunt, sola nominis similitudine decepti. Noluī in primo libro inter arbores describere Taxum Dioscorides, ne cognata facultate præditæ res distraherentur. Cum igitur Taxus uenenum sit, non immeritō hoc loco inter uenenatas plantas recensetur.

APOCYNVM. CAP. 81.

Apocynon qualis sit herba, hodie omnino ignoramus. Cognominatur hæc etiam Cynocrambe, quoniam canes interimat. Porro alia est etiam quæ proprio nomine Cynocrambe uocatur, ut suo loco ostendemus. Quapropter uidendum est, ne diuersæ naturæ res confundamus.

* Apocynum uerum pingit Matthiolum.

NERIUM. CAP. 82.

Nerion quod aliqui Rhododaphnen & Rhododendron, à rosa simili flore uocant, arbor est quibusdam temporibus uenenata, è cuius & Aconiti floribus in Ponto uenenata mel apes colligunt. Arbuscula hæc in nostris regionibus non nascitur, in Italia à quibusdam in hortis ostentationis causa plantatur, & nos ipsius semina seruimus: fructum habet longum, intus ceu carduorum pappis refertum, qui in quibusdam Dioscoridis exemplaribus malè Hyacinthi pappis similes esse leguntur. Cum autem Hyacinthus nullo omnino pappo habeat, legendum est Acanthi, id est, Spine siue Cardui alicuius, ut probatio dices & ipsa experientia testantur. Monendi etiam Medicinæ studiosi sunt, apud Aëtium in compositione Esdræ malè seorsim legi Flores Nerii & Rosarū Rhododaphnes, Nam eadem arbor Nerion et Rhododaphne est. Rosæ itaq; Rhododaphnes nihil aliud sunt, quàm flores Nerii. Videtur itaq; flos Nerii interpretatio esse Rosarum Rhododaphnes ad marginem signata, quæ postea ab aliquo indocto in ipsum uerborum contextum posita est. Porro ipse Galenus & Dioscorides diuersas Nerio uires adscribunt. Ille enim Nerion homini quoq; uenenum esse dicit: Hic uerò homini contra uenena remedium facere. Possent autem hi auresiores conciliari hoc modo, si intra corpus sumatur Nerion uenenum esse, Si uero foris imponatur, contra uenenatorum morsum Medicinam facere. Sed sic fere ueritas habet. Nam probata exemplaria addunt σὺν οἶνῳ πινόμενα, id est, cum uino pota, uide licet flores & folia. Sic etiam in Plinio manifestè legitur, qui proculdubio hoc ex Dioscoride transcripsit. Quin etiam in Esdræ Antidotum, cuius præcipuus usus est contra uenenata animalia, Nerii flores recipiuntur, ceu medicamentum contra uenena efficax. Id tamen uerum est, florenti eius insaniam facere, sed non semper. Accidit enim hoc quibusdam locis, & quibusdam temporibus.

Fungorum multiplex est differentia. Quidam enim edendo sunt, quidam vero intra corpus sumpti strangulant. Germani omnes generali uocabulo *Schwemine* uocant. Qui autem edendo sunt, suis etiam distinguuntur generibus. Sunt enim quidam Piperis sapore, & lacteo liquore manant, hos Germani *Pfifferlinge* uocant. Sunt & Boleti, quos *Bölze* eadem nostra gens appellat, uenenati Fungi. Multa habent genera, sed omnia *Poggentil*, id est, Bufonum cathedræ siue sellæ Saxonibus dictæ *Suegen*, *Schwemine*, id est, Muscarios fungos uocamus, quoniam muscas lacte intrinsecus occidunt. Pharmacopolæ etiam in suis Officinis Fungos habent, quos Boletos & Fungos ceruinos uocant. Ferunt eos in syluis ex semine ceruorum nasci, & propter ruptissimis montium syluis, quod ne Damæ & Rupicapre quidem peruenire possent, nedum cerui. Nec uerisimile est eos Venerem stimulare, cum frigidum, pituitosum, crudum, & malignum succum in humano corpore gignant, Quæ enim Venerem accendere debent, contrarias facultates & qualitates habere necesse est.

*Fungorum edulium optimi sunt Pfifferlinge & Reiffen dicti.

Colchicon copiose in Colchide nascitur, unde etiam nomen inuenit. Estque in illis regionibus uenenata herba. Quod uero apud nos provenit, amarius est, quo sapore ueneni aliqua pars diluitur, nec tamen omnino innoxium redditur. Homines enim quos eo purgauerimus, seuisima incurrunt accidentia. Pharmacopolæ hanc herbam *Hermodactylum*, Germani *Herbitblumen* / *Wissenjaffra* / & *Settiosen* appellant. Quidam huius florem *Narcissum* esse crediderunt, sed reuera *Narcissus* plurimam ab hac herba differt. Colchicum aliqui etiam *Ephemerum* appellarunt, quod eadem die qua sumatur, hominem occidat.

*Huius radix tot habet annos, quot cortices. Theophrastus *Narcissum* uocat, ut quidam putant, mihi non uidetur.

Ephemerum hoc solo nomine Colchico simile est: uiribus enim & forma multum ab illo differt. Alio nomine etiam *Iris agrestis* uocatur. Hodie autem ignotum est.

*Non est *Lilium conuallium*, ut quidam rentur.

ἡ ἐν τοῖς ὕδασι γινώσκουσα, id est, *Lens* in lacustribus locis genita. Differt hæc a lente legumine. Nam aquis stagnantibus innatat ceu muscus, minimis & compressis foliis constat. Figuram Lentis semina repræsentant. Vnde & nomen inuenit. Germanis eadem significatione *Wasserlinsen* uocatur.

ἡ ἀσπρὸν κίον Latini *Semperuiuum*, siue Vitalem maiorem, pharmacopolæ *Barbæ louis*, Germani *groß Dauswur* / *groß Donnerkraut* / *groß Immergrün* / & *Dansiauch* appellant. Plinius Gramen & Aizoon diuersas naturas plantas confudit, lib. xxiii. cap. ult. errore manifesto. Plinium secuti sunt Hermolaus Barbarus & Ruellius, qui ferè de uerbo ad uerbum illius errorem exscripserunt. Miror autem uehementer, hos doctissimos alioquin uiros, istum insignem Plinii errorem non obseruasse.

Semperuiua minor non est Italica uocata *Pegnolla*, ut antea in Trago demonstrauimus. Habet

Aizoon
murus.

†
CAP. 91.
Ижебра.

92.

* Recentiores aliqui Scatuncellum uocant, Itali Rondelam.

934

* Gesnerus Crassulam hanc ueteri Græco uocabulo Anacampserotem uocat.

94.

*Foemina passim uulgaris est, exili semine: mas, Yrtica Romana uocatur.

95.

*Plinius aliquando Mesolencum & Dialencum nominat. Non est Scrophularia.

ANNOTAT. VALERII CORDI

GALION. CAP. 96.

Galion hoc à coagulando lacte nomē inuenit. Duplicis est differentiae. Vna enim candidum, altera luteum florem habet: utriq; Aparines sunt folia. Flores quamuis parui sunt, multitudine tamen herbam ex longinquo conspicuam reddunt. Germani Kaynritzen & Labtraut[†] appellant. Recentiores quidam Aspergulam. Sed late patet hoc nomen, neq; in aliquo probato authore legitur.

[†] Nam Lab, coagulum uocant.

SENECIO. CAP. 97.

Εργήριον & Senecio hæc herba dicitur, quod flores eius cito in ipsa iuuentute canescant. Magnus hodie in hac herba error committitur, ne dicam maximus. Senecion enim refrigerandi uim habet. Hodie uero Senecionem alii Carduum benedictum, alii Nasturtium aquaticum uocant, herbas in tertio gradu calidas. Verum autē Eri geron siue Senecion, ubiq; cultis & incultis circa oppida, & in muris nascitur. Itali res Petrellam, Germani Baldgreise & Creutztraut appellant. Sunt & huius plura species.

THALICTRUM. CAP. 98.

Thalictron non est Argentina siue Argentilla, ut Ruellius opinatur, neq; hoc ille certò affirmat. Verum autem Thalictrum est ea herba, quam Germani Deyleblat appellant, qua rustici in Saxonia maxima curant uulnera, sine aliquo adiutore Medico. Nascitur in campestribus & in pratis, non ita humentibus. Sunt autem tres ipsius species, quæ suis differentiis distingui possunt.

* Aliqui Wicrthyon appellant: sed hoc uocabulum late patet.

MUSCVS MARINVS. CAP. 99.

Βούον θαλάσσιον, Muscus marinus, Plinio Lactucæ similis constat foliis, is seprur gosis & contractis, sine caule ab ima radice exeuntibus. Sed male ista de Marino musco scribit. Intelligit enim eam herbam, quam antea Lichena esse ostendi. Muscus uero marinus multis capillamentis tenuior est, quam ut Lactucæ foliis constare possit. Mihi sine dubio Marinus muscus esse uidetur Muscus ille salus, quem pharmacopo lae hodie Corallum herbam, siue Corallinam appellant. Idem etiam Antonius Musa iudicat. Affertur ex maritimis locis, una cum adhærentibus marinis testis. Est alia etiam herba nomine Carolina siue Carlina, cuius in Chamæleone mentionem fecimus.

MARINVS PHYCVS, SIVE ALGA. CAP. 100.

Nobis in mediterraneis locis habitantibus, omnino incognita est marina Alga.

POTAMOGETON. CAP. 101.

Potamogetona bellè nouisse se credit Vergilius Marcellus. Interim tamen ait, non inuenisse à uicinitate fluminum, prope quæ nascatur. Quæ uerba indicant, eum nullo modo herbam hanc cognouisse. Nam Potamogeton in ipsis aquis nascitur, & tantum folia paulum extra aquas eminentia ostendit. Quæ uero reuera sit Potamogeton, nondum constat. Noui ego herbam Betæ folio, sed longiore, quæ spicatum florem extra aquam erigit. Ipsa uero longis uiticulis in aqua spargitur, & gustu uehemēter astringit. Nascitur stagnantibus & limosis fluuiorum partibus, & in aqua repletis urbium fossis. Est & alia huic omnino similis, sed rotundiore folio. Quamuis autem omnes huius herbæ notæ Potamogetoni conueniant, nullam certam tamen sententiam de ea ferre ausim.

* Aliqui Wasser mangolt uocant: quod nomen etiam Limonio Cordi attribuant.

AQUATICVS STRATIOTES. CAP. 102.

Si in Aegypto & Nili inundatione tantum hic Stratiotes nascitur, ut Plinius scribit, eum in nostris regionibus querere superuacuum esset labor. Cum uero Dioscorides illum indefinitè aquis innatare & sine radice uiuere scribat, soli Plinio non credo. Quis enim omnium regionum fluuios & paludes uidit, ut certò affirmare ausit, nusquam

MILLEFOLIA STRATIOTES. CAP. 103.
 Χυλίσφυλλο ♂ δισπρατίωτης, id est, Millefolius Stratiotes sine dubio est illa herba, quæ
 hodie ubiq; Millefolium uocatur, à Germanis Garben & Aelcken. Hanc herbam
 Ruellius antea Achilleam esse credidit, sed magno errore. Propterea nunc etiam non
 minus in indicando Stratiote terrestri siue Millefolio errat. Nam ferulaceam quandā
 herbam & Dauci speciem Millefolium Stratioten esse dicit, quæ Daucus asininus,
 Anethum, sylvestre, & Cuminum syluaticum à quibusdam appellatur. Quamuis au-
 tem Stratiotes hic Millefolium umbellæ similes corymbos habeat, minimè tamen ex
 ferulacearum siue umbelliferarum genere est. Porro hæc herba, quam Ruellius Stra-
 tioten Millefolium esse falsò dicit, à Theophrasto Pastinaca Patrensis uocatur, nigrā
 habet radicem, sapore & odore Pastinacæ.

* Est & alia Stratiotæ terrestris species, non descripta Dioscoridi, quam uulgo uocant wito Wulm. wito.

VERBASCVM. CAP. 104.

Porro Coronarium Verbalcum Græcis *Lychnitis* & *ὀρνυλιν* nominatur: quoniam ramulis illius & convolutis foliis pro funiculis siue convolutis linteolis in lucernis quidam utuntur. Seritur hoc in hortis, foliis cōstat oblongis & hirsutis, floribus purpureis rose simplicibus: quamvis etiam cādido colore inveniuntur, hos Germani *Campelosen*, *Warten rosen*, *Sammel rosen*, & *Damastē rosen* appellant.

*Herbam paralyfin uulgo dictam Schlüsselblumen/aliqui Verbasculum uocant, nescio quam rectè.

ÆTHIOPIA. CAP. 105.

*Aethicpidis picturam apud Matthiolum reperies. Aliqui Symphyto maiori cognatam putant esse herbam.

ARCTION. CAP. 106.

ARCION. CAP. 107.

ARCION. CAP. 107.

PETASITES. CAP. 108:
Petasites à petalo, id est, galero nomen habet. Grande enim illi est folium, quod ca-
 put humanū à solis æstu, uice galeri defendere potest impositum. Mediam habet hæc
 M inq

PETASITES. CAP. 108.

PETASITES. CAP. 108.
 PETASITES à petaso, id est, galero nomen habet. Grande enim illi est folium, quod ca-
 puthumanū à solis aestu, uice galeri defendere potest impositum. Mediam habet hæc
 M iij

herba inter Personatiam & Bechion figuram, folia tamen huic rotundiora quam Personatiae sunt. Primo uere spicam longam purpurascens floribus plenam protrudit, qui lappularum aliquam habent similitudinem, sed reuera lappae non sunt. Germani Petasiten Neubien uocant, alii Weintraut: uel Pestilenzkraut, quod rardix bubones pestilenciales maturet. Nascitur uliginosis & pinguibus locis.

EPIPACTIS. CAP. 109.

Epipactis quae sit herba, hodie omnino ignoratur, nec facile erit eam inuenire, quoniam nullus ex ueteribus, ut in re nota sit, totam eius historiam posuit.

CAPNOS, ID EST FVMARIA. CAP. 110.

Κάπνος, Latinis Fumaria & Fumus terrae, Germanis Erdtrauch / Nimmerekraut & Daubentropff dicitur. Sunt etiam qui Wilderauten appellant, sed male. Capnos haec, quam Dioscorides describit, ubique in Pharmacopoliis Fumi terrae appellatione habetur. Nascitur in agris. Est & alia Capni species, cuius Plinius & Aesculapius sepius nascatur, & Capnos Chelidonia, quod Hirundinis aduentu erumpat. Cauliculo eius, ubi terra erumpit, gallinaceorum calcaribus simile quiddam adiacet, a quo etiam Romanis pedes gallinacei dicta fuit haec herba, ut apud Plinium legitur. Haec Capni species proculdubio est ea herba, quam Germani Holwur & Hanten spore appellant, quam ubique per Germaniam Aristolochiam rotunda uocant, cuius species duae sunt, maior & minor, sed magno errore, ut in tertio libro diximus. Habet enim huius herbae folia Rutae & Fumi terrae foliorum mediam similitudinem. Aristolochiae uero omnes hederaceo constant folio.

SATIVA LOTVS. CAP. 111.

Graeci Loti appellatione eas herbas indicant, quas ipsi alio nomine τριφύλλον & Latini Trifolium uocant, Germani Alee. Has omnes Arabes Andacochae appellatio hortis feritur. Propterea quamuis haec nullam habeat apud authores descriptionem, cum sola in hortis feratur, ex omnibus aliis Loti generibus, facile erit eam cognoscere. Est itaque haec sine dubio Trifolium illud satium, quod Germani Gartenflee / asrem siccata. Flores habet in capitulis fere coeruleos, quibus in iisdem capitulis semina succrescunt Foenugraeci seminibus similia, sed multo minora, in leniter aculeatis utriculis inclusa. Quoties igitur apud Arabes simpliciter Andacocham scriptum inuenerimus, haec herba accipienda est. Nam hodie ex Trifolii uulgaris genere sine odore herbulam hirsutam, nullas vires praeter astringendi habentem, & ubique in agris nascentem, Andacocham uocant, sed magno errore.

*Lotus satium Gallis & Italis Foenugraecula dicitur. Germanis Nart / Gartenflee / Heluetijs Zigerkraut.

SYLVESTRIS LOTVS. CAP. 112.

Sylvestris Lotus hoc nomine nulli hodie cognita est, propterea nihil adhuc certi de ea pronunciare aui.

*Aliqui Melilotum uulgare esse putant. Streinflee.

CYTISVS. CAP. 113.

Satius cultu differt a sylvestri: qui frutex in Germania sponte provenit, Geisflee / Bergflee.

LOTVS AEGYPTIA. CAP. 114.

MILLEFOLIUM. CAP. 115.

Μυριόφυλλον, quod Latini Millefolium uocant, plurimum differt ab ubique uocato Millefolio, quod antea Stratioten Millefolium esse indicaui. Nam Stratiotes asperis & siccis locis nascitur, hoc uero Millefolium palustribus. Porro Germani hanc herbam Wasserflee / hel / & Wasserfannen appellant, quoniam folia eius Foeniculo similia sunt, & tota herba nuper natam abierem figura imitatur.

MYRRHIS.

MYRRHIS. CAP. 116.

Myrrhis umbellifera est herba, Cicutę ualde similis. Nascitur iuxta arbusa, & Germanis *Burckindren* uocatur. Sunt etiam qui *Welberfernen* appellant. Sed hoc nomine eam indicare non satis tutum est. Nam & Cicutā palustris etiā Germanis *Welber* uocatur. Et non raro accidit, pueros nominum uicinitate deceptos, hanc pro illa cibi gratia tempore famis eruere, & comesta mori. Cuius rei aliquot exempla uidi.

MYAGRVM. CAP. 117.

Myagros hoc nomine ignota hodie est. Ruellius tamen eam cognouisse uidetur, sed sibi ipsi non constat. Nam lib. 3. cap. 25. semen eius Fœnugræco comparat, & bene. In quibusdā tamen Dioscoridis exemplaribus non *καλιδι*, id est, Fœnugræco, sed *πραχύλω*, id est, ceruici, magno errore comparat. Quam enim figuram Fœnugræci semen cum collo siue ceruice habet. Ruellius uerò in lib. 2. cap. 30. ubi quid sit *μύαχρον* indicat, & deinceps notas eius descriptioni confert etiā, dicit semen eius in colli speciem exporrigi. Quo loco manifestè uidemus, quomodo cogat etiam falsam notā de descriptioni respondere.

OENAGRA. CAP. 118.

οἰνάχρον, siue *οἰνόδινος*, uel *ὀνάχρον*, ut quædam exemplaria habent, hodie ignota est planta.

CIRSIVM. CAP. 119.

Cirsion, quod aliqui transpositis literis Crission uocant, nequaquam est uulgo uocata Buglossa, ut Leoniceus & Ruellius scribunt, salua tamen doctissimorum uiro- rum autoritate. Certum enim est uerum Buglossen esse Boraginem. Cirsion uerò quoniam Buglossa siue Boragine grandius est, grande etiam Buglossum appellabatur. Vulgaris autē Buglossa, siue Hircina barba uel lingua, Boragine multo minor existit. Ergo nequaquam Cirsion esse potest. Antea etiā uulgarē Buglossam Echion esse indicauimus. Sed uerum Cirsium grandis est herba, latis & multo longioribus quā Borago foliis, proceriore etiā caule. Scribitur a quibusdam apud nos in hortis, siue Italicum uel Romanum Buglossum uocatur.

ASTER ATTICVS. CAP. 120.

Astera Atticum Arabum interpretes, & Pandectarum author Mattheus Syluaticus, cum Eryngio confundunt, sed fœdo errore. Sunt enim diuersissimi generis herbe. Ruellius quoque Astera Atticum non rectè indicat, quamuis non suam, sed aliorum de hac herba opinionem ponit. Ego autem scio me uerum Astera Atticū in montibus circa Ierusalem inuenisse. Non enim melius historiæ conuenire posset, tam exquisitè respondent descriptioni omnes eius herbe partes. Nascitur in petrosis montibus, ut quædam etiam Dioscoridis exemplaria indicant. In quibusdam etiam exemplaribus de floribus eius leguntur, *αἰθρὸς πορφύρεον ἢ μίλιον*, id est, florem purpureum aut luteum, sed falsò. Non enim in quibusdam locis purpureos, & in quibusdam luteos habet. Sed utrumque colorem simul iidem flores ostendunt. Quapropter *πορφύρεον ἢ μίλιον*, id est, purpureum & luteum legendum est. Hoc enim alia exemplaria & ipsa floris figura testantur. Media namque floris pars luteum habet colorē, circa quam parua & purpurea foliola, ut in Chamæmeli floribus uidemus, disposita sunt, quo fit ut purpureo & luteo simul colore Asteris flos describatur. *† Sternfraut.*

ISOPYRVM, HERBA. CAP. 121.

Quę sit Isopyron herba, hodie nulli non incognitum est, nec aliquis adhuc ex recentioribus eam inuenit.

† Sunt qui Nigellam Damascenam esse coniectent.

VIOLA NIGRA. CAP. 122.

ἰοῦ ἀχρὸν, Romani Violam purpureā uocant, Germani *Violen*, siue *Veieln*. Nota omnibus hæc herba est, quę primo Vere ubique in hortis & uepribus emicat, coliculo gracili, & ualde odorato flore. Herba eius in Pharmacopoliis Violaria uocatur.

CACALIA

CACALIA. CAP. 123.

Cacalia non est agreste Carui, ut quidam apud Ruellium opinantur, Hodie enim omnino incognita est.

*Sunt qui Liliū conuallium aut cognatam herbam esse suspicentur.

BVNIVM. CAP. 124.

BUNION nulli hodie hoc nomine notū est. In secundo libro sermo de Buniade etiā habebatur, quæ plurimum ab hoc Bunio differt.

PSEVDONIVM. CAP. 125.

Pseudobunium in Creta nasci Dioscorides scriptum reliquit. Quapropter nescio an apud nos etiam nascatur. Hodie uero quid sit, omnes ignorant.

HEDERA TERRESTRIS. CAP. 126.

Terrestris Hedera, quam Græci χαμαίαιοςον uocant, non est herba illa, quæ Germanis Bundehebe dicitur: de qua re parens meus in Botanologico suo differuit.
*Smirgel herba aliquo modo huic descriptioni conuenit, sed nulla est in floribus amaritudo.

CHAMAEPHYCE. CAP. 127.

Quædam exemplaria pro χαμαιπύτυν, χαμαιλέυκον habēt, sed malè. Nam Chamæ-
leuce diuersa est ab hac herba, & eadem cum Bechio, id est, Tusilagine. Correctiores
uero codices & Plinius Chamæpeuce habent, id est, pilula picea. Est enim paruis
frutex Chamæpeuce, foliis uirentibus, & piceæ similibus, odore admodum graui, &
Germanis Seewannen/Sechannen / & Seytheyde appellatur. Quidam hunc
fruticem etiam Chamæpityn uocant, sed malè: ut suo loco indicauimus.

BVGLOSSVM. CAP. 128.

Verum Buglossum, quod ueteres medici intelligunt, sine dubio est omnibus nota Borrago. Nam Apuleius dicit Corraginē à Lucanis appellari Buglossion, B, litera in C, mutata. Folia Buglossi ueteres dixerunt animi uoluptates & letitia facere, si uino iniiciantur. Idem nos Boraginis floribus tribuimus.

*Menses facit duplicem Borraginem.

*Mesius facit duplicem Borraginem, unam sylvestrem quæ est nostra Buglossa: et alteram sativam quæ est Bor-

CYNOGLOSSA. CAP. 129.

CYNOGLOSSA. CAP. 129.

In hisce regionibus male asperam Anchusam illam quam Lycopsin esse diximus, Cynoglosson uocant. Veram autem Cynoglossam omnes aliæ Germaniæ gentes, *Funosunge*, id est, Caninam linguam uocant: quam etiam Pharmacopolia habent. Dioscorides ei caulem negat: & nos etiam sine caule eam nasci ubique uidemus, quibusdam tamen temporibus eadem caulem, purpureos flores, & post hoc minutus lappas producit, quas Plinius etiam illi tribuit. Ergo imprudenter Ruellius scribit, non esse Cynoglosson quod in Officinis habeatur, quoniam caules & lappas ferat, fortè & secundo sine caule nasci, ut Dioscorides eam depingit, reuera tamen caulem fert. Duplex inuenitur Cynoglossa, maior & minor. Hæc Dioscoridin non fuit cognita, & foliis, caulibus, floribus & lappulis maiori similis est, sed minora hæc omnia habet. Quinetiam natales & odoris uires cum illa communia habet.

PHYTEVMA. CAP. 130.

PHYTEUMA. CAP. 130.
Phyteuma hodie omnino incognita est herba, nec opus ea magnopere habemus,
si amatoris tantum ueneficiis est utilis.

LEONTOPODIVM. CAP. 131.

LEONTOPODIUM. CAP. 131.
Leontopodium similiter ut Phyteuma incognita nobis est, nec alias habet in medicina uires, quam quod amatoriis ueneficiis utilis sit. Quædam tamen exemplaria cæcorpori foris impositam abscessus discutere addunt.

HIPPOGLOTTON. CAP. 232.

Quædam exemplaria Hippoglosson habent, sed malè. Nam nomen suum ab Hippoglotide

poglotide inuenit. Habet enim, ut Plinius etiam ait, parua foliola linguularū forma ex foliis exeuntia. Propterea Vergilius Marcellus malè Hippoglosson legi cenſet, qui nequaquam etiam uerum Hippoglosson in ſuo Commentario indicat. Neſcio enim quam ſpicatam lanuginem introducere conatur, cum tamen nullus unquam au thor alicuius lanuginis uel ſpicæ in hac herba mentionem faciat. Mihi profeſſo hoc Hippoglosson, ſiue Hippogloſſidion, ſiue Hippoglotton eadē eſſe uidetur cum Lau ro Alexandrina. Virunq; enim Hippogloſſum ab hoc authore & aliis omnibus uo- catur, utrumque Ruſci folio deſcribitur. In Lauro Alexandrina tamen paruorum fo- liorum ex foliis naſcentium non meminit: e contra etiam in huius Hippogloſſi hiſto- ria, foliis adnati fructus mentionem non facit. Sed hoc meam opinionem magis con- firmat. Quod enim utriuſq; deſcriptioni deſt, id etiam ex utriuſq; deſcriptione ſar- ſiri poteſt. Quo fiet, ut unam tantum herbam Hippogloſſon & Alexandrinam Lau- rum eſſe cognoscamus. Nam habemus in Pharmacopoliis herbā Vuulariæ nomine, cuius foliis alia minora naſcuntur folia, quæ omnia Ruſci modo aculeata ſunt, ſed molliora. In medijs uerò foliis iuxta parua foliola rubentem fert fructum, Ciceris ma- gnitudine. Hac itaq; Vuularia Hippogloſſi & Alexandrinæ Lauri deſcriptioni opti- mē conuenit. Ruellius hoc loco laudandus eſt, quod Hippogloſſon Bonifaciam, ſiue me conuenit. Ruellius hoc loco laudandus eſt, quod Hippogloſſon Bonifaciam, ſiue Paganam linguam ab Italis uocari ſcribit. Eſt enim Bonifacia eadē herba quæ Phar- macopolis Vuularia, & Germanis *Seppflintraut/Zungenblat/ & Berblat* ap- pellatur. Nec memouet, quod Galenus & Aegineta diuerſis locis de Hippogloſſo & Alexandrina Lauro agāt. Aegineta enim ex Galeno, Galenus ex Dioſcoride earū uires tranſcripſit. At certo ſcio, Galenum Hippogloſſi nomine ab Alexandrina Lau- ro diuerſam herbā nō cognouiſſe. Poruit itaq; hæc una herba ab alio Hippogloſſum, ab alio uerò authore daphne Alexandrina appellari. Nam Theophrastus Alexandri- næ lauri tantum meminit, procul dubio ſub hac etiā Hippogloſſon intelligens, cuius alibi nuſquam mentionem facit. Vnde Dioſcorides etiam, & qui Dioſcoridē ſecuti ſunt ſcriptores, occaſionem naſti ſunt credendi Hippogloſſum ab Alexandrina Lau- ro diſſerre. Talis quoq; error ipſi Dioſcoridi in Phyllo & Mercuriali accidit. Similes etiā innumeros in Plinio inuenias. Alexandrina Laurus etiā Idæa dicitur, quod ſi a- liquis ignorauerit, & nomē illud ſolum apud authorem aliquē inuenerit, ſtatim opi- nabitur, eam ſui generis eſſe herbā, ſed falſo. Conſtat etiā certiffimis uulgi experimen- tis, Vuulariæ radicem etiam ſiccā bubones in peſte maturare. Hinc eſt quod mala- cticā uim Hippogloſſi radici authores tribuant. Quinetiam Vuularia diſſiciliter pa- rientes epota adiuuat, menſes cit, & calculos pellit, quæ licet omnia uulgi experimen- ta ſint, tamen eaſdē etiā facultates Lauro Alexandrinæ authores adſcribunt. Cum igitur Vuularia utriuſq; deſcriptioni reſpondeat, & utriq; etiam attributis uiribus pol- leat, ac Alexandrina Laurus & Hippogloſſon etiam eandē hiſtoriam & idem nomē habeant, ſine dubio Vuularia eadē eſt cum Alexandrina Lauro, & Alexandrina Lau- rus eadem cum Hippogloſſo. Poſſemus hoc loco plura argumenta afferre, ſi non bre- uitatis cauſa illud omitteremus.

ANTIRRHINVM. CAP. 133.

Antirrhinon, ſiue Anarrhinum, quod alio nomine Cynocephalea & Bucranion appellatur, fructum fert canino ſiue uitulino capiti ſimilem, tam exquiſita ſimilitu- dine, ut etiam os & nares appareant, quæ in maturitate in eo aperiuntur, ut per eas maturum ſemen excidere poſſit. Naſcitur ubiq; in agris & hortis. Germanicum eius maturum ſemen excidere poſſit. Naſcitur ubiq; in agris & hortis. Germanicum eius nomen eſt *Brackenbaupt/Hellis* etiam *Orant* uocatur. Quod uocabulū pluribus herbis tribuitur, quæ à ueneficiis hominem tueri ſuperſtitioſe creduntur. Idem etiam de Antirrhino ueteres tradiderunt.

*Orant den alten weibern wol beſant. Aliud eſt Orant Tragi: quod tamen & ipſe Antirrhinum facit.

CATANANCE. CAP. 134.

Catanances duæ ſunt ſpecies. Cum uerò utriuſq; ad amatoria tantum uſus ſit, nihil reſert eam non cognosci. Mirum in modum autē errat Ruellius, quod Biſtortam al- teram Catanancem eſſe credit. Atque in hac ſola herba uidere poſſumus, quomodo ad deſcriptiones torqueat plantarum partes. Catanance enim folia, figura & colore oleæ foliis ſimilia deſcribuntur. At oleæ folia minimi hominis digiti longitudinem & latitudinem non habent. Biſtortæ uerò folia dimidii ſerè pedis latitudinē habent, & ſeſquial-

& sesquipedale etiam longiora sunt, quæ nullam cum oleagineis foliis proportionem habent. Cætera taceo.

TRIPOLIUM. CAP. 135.

Tripolium (si Arabibus, & ex his in simplicibus exercitatissimo Serapioni credimus,) nihil aliud est quam Turbith Arabice dicta herba, cuius radices in Pharmacopolis habentur. Serapio in sui Turbith descriptione, totum Dioscoridis caput de Tripolio recenset. Dioscorides certe Tripolii radicem per alium aquam & urinam pelere scribit, quas vires omnes Medici Turbith habere nouerunt. Illi uero uehementer tyusam describunt.

*Plinius uidetur Polium cum Tripolio confundere.

ADIANTV. CAP. 136.

Duplex est Adianti genus, candidum & nigrum. Vtrumque tamen Polytrichon, Calitrichon & Capillus Veneris uocatur. Recetiores inexcusabili errore Scarleam Calitrichon uocant, quæ diuersissima est herba ab Adianto. Hunc errorem Ruellius quodam animaduertit, qui Scarleam saluiam transmarinam appellat. Est autem Adiantum ex Filici genere ferè minima. Dioscorides nigrum tantummodo describit, quod diu caruimus, nunc uero copiose affertur, & à Pharmacopolis Capillus Veneris uocatur. Habet hoc nigros, splendentes & extremæ gracilitatis coliculos. Male autem in eius historia legitur: *φύλλα θύσια πηλιδίου*, quæ uerba ab aliquo adiecta sunt. Nam antea eius folia diligenter descripsit, cum ait: *φύλλα ἔχοντες ὡς θύσια*. Imposititia & adulterina igitur sunt ista uocabula: Folia Filici similia. Nam ipse etiam Serapio eadem non habet, quamuis totam Adianti historiam ex Dioscoride transcripserit. Candidum aliud Adiantum dicitur, quod respectu nigri candidiores habeat coliculos, qui alia reuera in uiridi pallent. Hoc à Germanis *Waurauten* / & *Welschlin* dicitur, quoniam onisci animalia in humidis muris, iuxta illius cespites agunt.

TRICHOMANES. CAP. 137.

Et Trichomanes quoque à capillo similibus coliculis nomen inuenit. In Pharmacopolis Polytrichon uocatur, quamuis hoc omnium Adianti specierum cognomen potius sit. Germanicum eius nomen est *Steinsarlin* / *Fäderhar* / *Widerthron* / & *Steinfeder*. Sunt etiam qui Saxifragiam illud uocant, sed nimis latè pater hoc uocabulum.

XANTHIV. CAP. 138.

Xanthion inde nomen habet, quod flauos faciat capillos. Nascitur ubique in insidiat. In quibus Dioscorides ait locis, & Germanis *Betlers leuse* / & *Jgelfletten* appellatur.

ÆGILOPS. CAP. 139.

Facile quidem est dictum, Ægilopem sterilem esse Auenam, & Hordeum necare, sed eam indicare non est cuiusuis.

BROMVS. CAP. 140.

Bromos quoque sterilis Auenæ species est. Cum autem eius generis plures in aruis reperiuntur herbae, non facile indicari potest. *Sauber haber.

GLAVX. CAP. 141.

Glaux non tantum in maritimis locis nascitur. Nam apud nos etiam in siccis apricis montibus & abruptis uis inuenitur.

POLYGALA. CAP. 142.

Ab effectu nomen suum hæc herba inuenit. Lactis enim generandi facultatem possidet. Germanis *wilde Süßwurz* appellatur, uel *wilde Lacteriz*.

OSYRIS. CAP. 143.

Osyris sine dubio est ea herba, quam nunc Linariam recentiores uocant, Germani uero *Arrotensflachs*, & *Wartkraut*. De qua re etiam parens meus in suo Botanologico scripsit.

SMILAX ASPERA. CAP. 144.

Asperam Smilacem, quam Theophrastus etiam Cilissam hederam uocat, in Germania non nasci puto. Quoniam ex Cilicia in Græciam translata sit. Et nunc in Italiæ quibusdam locis in hortis ostentationis causa colitur. Florem habet odoratum, cuius Ouidius meminit, cum ait: Et Crocon in paruos uersum cum Smilace flores. Ramulos & folia eius uidi, quæ Georgius Agricola (cuius antea memini) secum ex Italia attulit.

LENIS SMILAX. CAP. 145.

Lenis Smilax eadē est cum fatiua, quæ Dolychus etiam appellatur: quod palam fiet, si quis alios auctores de Smilace legat, qui eandem herbam lenem & fatiuam esse indicant, & duo tantum Smilacis genera esse dicunt, scilicet asperum, & lene, quod in hortis nascitur. Ad hæc si utriusque descriptio & uires in hoc auctore considerentur, quilibet iudicabit eandē esse herbam, lenem & hortensem Smilacem. Propterea ipse Dioscorides errauit, quod crediderit lenem Smilacē propriū genus à fatiuo habere. Dioscoridē in hac re secutus est Galenus, qui ait, lenē Smilacē asperę similes uires obtinere, quod falsum est: Nam lenis Smilax terrestri constat substantia, ut omnia ferē legumina: propterea etiā grauiā & tumultuosa facit insomnia. Asper uerō Smilax longe alio constat temperamēto, quod ex gustu percipi potest. Sapore enim nihil commune cum leni Smilace habet. Cum autem plantarum temperamenta & facultates (ipso Galeno teste) ex sapore iudicentur, necesse etiam est, asperam Smilacem nihil in uiribus cum leni Smilace commune habere, ut Dioscorides etiam indicat, qui Smilacem lenem tumultuosa insomnia facere dicit. Asperam uerō contra letalia uenena antidotum esse. Cum igitur tam breuiter Galenus lenis Smilacis uires perstringat, & minime uerum temperamentum illi assignet, facile colligitur, ipsum nesciuisse, quid lenis Smilax esset. * Τύρξις ἴσχε bonen.

RUSCVS. CAP. 146.

Μυρσίνη ἄγρια, siue ὀξυμυρσίνη, Latinis Ruscus appellatur. In Germania eam nasci nondum uidi, uel ab aliis nasci audiui. Propterea nullum eius Germanicum nomen expiscari potui. Quidam cum mihi locum in Germania describeret, ubi copiose Ruscus nasceretur, eo ut uiderem uiuam plantam profectus sum. Ruscum minime inueni, sed aliam herbam graminis foliis, iisq; mollissimis, quorum figura nō posset magis à Rusci foliis differre, radices tamen Rusco simillimas, quod ad figuram attinet, habentem, quarum in plurimis Pharmacopoliis pro Rusco usus est, & Rusci radices appellantur, sed magno errore. Hanc aliqui pro Phalangiti ostendunt. Nam uerum Ruscum uidi aridum ex Italia allatum, dura & aculeata folia habentem: quam ob causam Vergilius quoque horridum eum appellat.

Huius Oxymyrsinę fructus plurimum differunt à Cubebis aromaticis granis, quos duos fructus, Serapio eosdem esse credidit: quem errorem iamdudum deprehendit & scriptis mandauit, doctissimus uir Nicolaus Leoniceus, cuius inuentum alii etiam sibi adscriperunt.

LAURVS ALEXANDRINA. CAP. 147.

De Lauro Alexandrina, siue Idæa, in Hippoglossō satis dictum est. Melius scribitur Hippoglossus, quod in summo sub foliis ceu ligulas exerat, auctore Galeno & Dioscoride. Eadem uidetur Idæa Laurus. Serapio huius quoque in Lauri capite meminit, Hippoglossi uerō nusquam, proculdubio intelligēs Hippoglossōn à Lauro Alexandrina nihil differre. Porro quod ad capitis huius emendationē faciat, etiam prosequamur. Omnia exemplaria folia Lauri Alexandrinę, Rusci foliis cōparant, quædam tamen minora esse indicant, Rusci autem folia multo minora sunt, quam Vuulariæ. Ergo dicet aliquis, Vuulariam Laurum Alexandrinam non esse: cuius uenia dico, locum in Dioscoride corruptum esse, nec minora sed maiora legi debere, quod Plinius & Serapio clari uerbis ostendunt. Hic enim de uerbo ad uerbum eius historiā ex Dioscoride transcripsit. Testantur idem correctiora exemplaria, in quibus manifestē λέγεται, id est, maiora legitur. Huius autem erroris causa & origo est, uocabulorū

contrariam significationē habentium similitudo. *μείζων* enim minus, *μείζον* uerò maius significat. Facilis itaq; & lubricus est ex alterutro in alterutrum lapsus. Fallitur Ruellius in indicanda hac uerba. Non enim cognouit eam cum Hippoglossio eandem esse.

DAPHNOIDES. CAP. 148.

Δαφνοειδής recentiores Laureolam uocant, quæ in nostris Pharmacopoliis nō habetur, nec ego quæ sit compertum habeo.

*Semen oblongum habere quidam aiunt, & Germanicè interpretantur *groß Kellershalß*. *Daphnoides* pium Matthioli exhibuit.

CHAMAEDAPHNE. CAP. 149.

Chama daphne, ut à Dioscoride describitur, non multum ab Alexandrina Lauro differt. Hodie non cognoscitur, si alia & diuersa est ab Alexandrina Lauro.

VERATRUM ALBUM. CAP. 150.

Εμβόλον λευκόν, id est, albū Veratrū, siue albus Helleborus, Germanis *weiß Nieswurz* uocatur, ubiq; in Pharmacopoliis habetur. Vulgares herbarii confundunt Dictamnū, Helleborū album, & Sigillū Salomonis, id est, Polygonatū, ut antea etiam dictū fuit. Albus Helleborus copiosè in Germaniæ alpihus iuxta Heluetios nasci dicitur.

VERATRUM NIGRUM. CAP. 151.

Εμβόλον μέλας, id est, nigrum Veratrū, apud nos in hortis plantatur: quamuis quibusdam in locis sponte proueniat. Nascitur ad Hercyniam syluam Sesamoidis genus, cuius radices Radicarii Agyrtae Pharmacopolis pro Helleboro hocuendunt. Sunt enim illi simillimæ, sed multo inefficaciores, quoniam non tam uelementer ut illæ purgant. Hinc est quod aliqui temerè pronunciant, nos uero Helleboro carere. Porro Hellebori huius flores à Dioscoride in candido purpurascetes, & figuraracemosi describuntur, quod ex minori Sesamoide huic adscriptū est. Aliqui enim hunc Helleborū cum Sesamoide confundunt. Sed uerus niger Helleborus uiridem in pallido florem habet, & minimè racemosum, Germanicè *schwarz Nieswurz* & *Christwurz* appellatur. Folia habet Platano, siue Aceri similia, profundius tamen serræ modo asperis incisuris horrent. Quæ uerò ab Agyrta pro Helleboro iam uenditur, Nigellæ constat foliis: & Sesamoides minus esse uidetur.

†
Atqui talis iam agnoscitur uerus Helleborus niger in Italia circa Comum: cuius tamen uulgaris noster, species una est.

SESAMOIDES MAIUS. CAP. 152.

Sesamoides dicitur, quod Sesamo simile semen habeat. Hoc in Anticyra nasci dicitur. Vires quas Dioscorides huic adscripsit, Plinius Sesamo assignauit, malè Sesamū pro Sesamoide, in hoc authore legens. Pliniū secutus est Ruellius. Sed miror hunc tam crassum errorem adeo non animaduertisse, ut etiam ipse in eum inciderit.

*Sucus Leusefrant/ ut quidam interpretantur: sed ea puto Consilio fuerit, à Sesamoide longè diuersa.

SESAMOIDES MINUS. CAP. 153.

Minus Sesamoides foliis priori dissimile existit. Ab huius historia non multum ab Iudæa herba, quam Agyrtae Pharmacopolis pro Helleboro nigro uendunt. Vires enim easdem habet, nec radicū descriptio dissidet, quæ tenues, graciles & nigri Helde supra in Helleboro nigro.

CUCUMER AGRESTIS, ET ELATERIVM. CAP. 154.

Είρος & *εγριον*, Latinis Cucumis agrestis, siue anguinus, & à recentioribus Asfinus appellatur. In Germaniæ quibusdam locis ad Medicinæ usum seritur, & ab holoribus Pompen uocatur, propterea quod semen & humorem ei aculetur, quemadmodum dum machinæ quædam aquam, quam nos Pompen appellamus. Elaterion uerò est exiccatus & in pastillos cōformatus fructuū succus. Dissidet autē in eius electione grauissimū

grauissimi auctores, Aegineta, Dioscorides, & alii. Ego autem Aeginetae sententiam magis laudauerim, qui illud probat, quod ad uiridem colorem inclinat, Dioscorides uero candidum. Sed impossibile est uiridem per se succum, cum exiccatur, candidum fieri. Quod uero ex radicibus fit Elaterion, candidum colorem acquirit. Nam ipse succus etiam lacteus est. Sunt & alia quaedam in hoc capite absurda, ubi Elaterii conficiendi modus traditur. Sed huius instituti non est, omnes errores discutere.

Germanice dici potest Igelsfürbes.

PEDICULARIS, HERBA. CAP. 156.

Staphis agria, siue Phithiroctonon, Latinis Pedicularis herba, & Pharmacopolis adhuc Staphis agria uocatur. In Germania eam nondum nasci uidi.

THAPSIA. CAP. 157.

Thapsia a Thapso Insula, in qua primum inuenta est, appellatur: raro afferuntur ad nos radices, interdum tamen pro Turbith aduehuntur, sed Turbith est durius. Est autem ferulacea & Foeniculo similis planta. Nicander Trinacriam Thapsiam probat. In Sicilia enim efficacissima nasci creditur.

*Duplex est, una, minor: altera, maior: quae pro Costo interdum affertur: & foris quidem Costi loco uti licuerit, intus non item.

GENISTA. CAP. 158.

Sparton, Latini Genistam, Germani Günsfer uocant. Copiosissime nascitur in Hesiæ montibus, ubi etiam arborefcit. Semina eius in Pharmacopolis habentur. Est autem duplicis differentiae. Quaedam in funes torquetur, ex qua etiam corbes uiris passis & sicubus seruandis texuntur in Hispania. Spartum id ueteres uocarunt. Altera non tam lentas habet uirgulas, ut simile quiddam ex iis fieri possit.

SILYBUS. CAP. 159.

Silybus quid sit, nemo adhuc compertum habet. Serapio illud Hacub Alkandee uocat.

GLANS VNGVENTARIA. CAP. 160.

Βάλανος ὁ μυρεψικὴ, ab Arabibus granum Ben appellatur. Sunt etiam radices Been uocatae, sed ab Vnguentaria glande diuersae. Videndum igitur est, ne res eas confundamus, ut quidam faciunt. Afferitur rursus ad nos ex Aegypto fructus hic. Theophrastus eum simpliciter etiam Βάλανος uocat, nulla adiecta differentiae nota, Martialis quoque in Apoph. Myrobalanum, cum ait:

Quod neq. Vergilius, neq. Carmine dixit Homerus,
Hoc ex unguento constat, & ex Balano.

NARCISSVS. CAP. 161.

Narcissi plura sunt genera. Ex his purpurei sero florere feruntur. Candidi uero Narcissi (de quibus Dioscorides scribit) genus est, flos ille quem Germani Merzenblumen & Josephsblume appellant. Nascitur Lipsiae in syluis. Et sponte in hortis & sepius in Hesiæ. Hodie nullus est huius in Medicina usus.

*Narcissos aliqui interpretantur Hornungeblumen / Merzenblumen / Aprillenblumen / & Narcissum autumnalem pro Colchico accipiunt.

HIPPOPHAES, HERBA. CAP. 162.

Hippophaes quid sit, hodie omnino ignoramus. Herba autem est ex aculeatarum genere.

HIPPOPHAESTVM. CAP. 163.

Hippophaeston quoque nulli hodie hoc nomine cognitum est.

RICINVS. CAP. 164.

Croton siue Cici, Latinis Ricinus dicitur, quoniam semen habeat Ricino insecto simile. Est autem Ricinus animal paruum, quod ouium, canum & bouum feminibus ac cuti adheret, exitu carens, propterea eo usque sugendo se implet, donec rumpatur. Germanis etiam Secke appellatur. Porro ipsam plantam Pharmacopola Cataputiam

maiores, Arabes Kerua, & Germani *Wundelbaum* / & *Römischen Hanf* appellat, aliqui *Xeniffische* bonet. Seritur à quibusdā ostentationis causa in hortis. Plantano & Aceri similibus foliis, sed maioribus. Agyrtæ cum *Türkischen hanf* uocant; quod nomen uulgius etiam retinet.

TITHYMALI. CAP. 165.

Tithymalum Latini Lactariam herbam appellant. Est autem omnibus illius speciebus lacteus liquor, qui ex abrupta herba emanat. Cum uerò plures sint herbae præter Tithymalos, quæ lacteum habent liquorē, necesse est earū differentias ponere, ne aliquis error committatur, qui in his herbis committi possunt maximi. Sunt enim quedam lacteum liquorem habentes frigida, quædam etiam in summa caliditatis gradu constituta. Constituamus igitur tres illarū differentias. Prima Tithymalorum esto, Altera Intybaceorum, Tertiæ uerò describamus eas plantas, quæ neq; ex Tithymali neq; ex Intybaceorum genere sunt. Quomodo autem illæ ab inuicem dignosci possint, nunc ostendemus. Tithymalus quamuis in multas species diuidatur, omnes tamen oblongo & nullis incisuris diuiso folio constant. Intybacea uerò herbae omnes bellas habet. Quibus uerò hæ non sunt, illæ loco earum in medio duorum foliorum singulos flores & fructus ferunt. Intybacea uerò in singulis pediculis singulos habet flores, ex minimis foliolis compactos, colore luteos, sola Condrilla minore & Cichorio excepto, quæ interdum cœruleos, interdum candidos flores producant. Intybaceorum omnium flores in lanugine uocata pappos resoluuntur. Tithymalorum uerò minime, qui omnes fructus habent tribus loculamentis distinctos, & in his singulis singulos nucleos. Intybaceorum femina cum pappis leniter per auram auolant. Tithymali cum impetu & crepitu suum semen ei aculantur. Intybaceorum lacteus liquor amaro gustu statim in lingua percipitur, Tithymalorum liquor à bubuli lactis sapore non multum recedit, dum primo gustatur, deinde paulatim totum os & fauces accendit, & Coccognidii modo urit, & foris cuti impositus exulcerat, quod Intybaceorum liquor minime facit, propter temperamentum frigiditatem. Hæ igitur herbae quas iam ab Intybaceis suis notis distinximus, omnes Tithymali appellatione ueniunt, estq; hoc generale eorū nomen. Intybacea uerò herbae sunt omnes Lactuce species, utraq; Chondrylla, utrunq; Hieracium, Intybum satium & agreste, quod Cichorium uocant, & quæcunque his similes sunt, & lacteo liquore manant. Tertia uero lactariae plantarum differentia ad neutrum genus illorum referri potest, neq; simul unum proprium reuera genus habet, ut Tithymali & Intybacea. Non enim sibi ipsis, ut illa, similes sunt. At huiusmodi pauca inueniuntur, ut Ficus, Erinos herba, Scammonia, Cissampelus utraq; & tenella minoris Clematidis germina, quæ singulae proprium habent genus, nec omnes sub eodē genere contineri possunt, ut Tithymali & Intybacea.

*Rapunculi, etiam ut uulgo uocant, & herbe ei cognate, lactis nonnihil habent: & Opuli folia, & ferulaceæ herbae, calide & acris naturæ liquorem lacteum non pauca continent.

Tithymalorum autem, quas Latini priuatim lactarias herbas uocant, plures sunt species, sed nobis non perinde cognita: quamuis nos non pauciores etiam cognitas habeamus. Sed ea quas nos habemus, partim à ueteribus non descriptæ sunt; & contra nos non habemus aliquot, quæ apud illos descriptæ sunt.

Prima itaq; Lactaria herba, quæ Characias, id est, Vallaris appellatur, & mas existimatur, nulli hodie hoc uocabulo cognita est, aliqui *Teufelsmilch* interpretantur. Secunda, femina est, & Caryites Myrsinitesq; appellatur, fructus ferens ceu nuces, & hæc uulgo non cognoscitur. Quidā tamen Nucē uomicā Pharmacopolis dictum fructum, cornea soliditate, in hac lactaria nasci credunt. Tertia paralius est, in maritimis nascens, quam nemo adhuc ex recētoribus indicauit. Quarta Helioscopius dicitur, quod comam suā cum sole circumagat. Hæc proculdubio mihi esse uidetur, quæ à Germanis *Wundsmilch* uocatur. Cyparissias quinta in ordine recensetur, ad quam refertur etiā Pityusa, quæ specie tantum ab hac differt. Miror autē cur Cyparissias appellatur, cum tamen Dioicorides eā nuper natæ Pinu similē esse, & inde nomē accepisse dicat. Vnde necessario sequitur, eā Pityusē nomē habere. Nam Pitys Pinus est cui nuper semine enatæ similis esse Cyparissias dicitur. Cyparissus uero Cupressus est. Eadē igitur

igitur genere est Cyparissias & Pityusa. Porro duæ sunt Pityusæ, minor & maior, propterea etiam post septem hos Tithymalos priuatim describuntur. Sine dubio autem Cyparissias & minor Pityusa, eadē herba mihi uidetur, quam Arabes Scobram, Pharmacopolæ uerò & recentiores Medici Esulam minorem, & Germani Wolffsmilch appellat. Sextum locum Dendroides habet, arboris modo ramosa & fruticosa hæc mihi esse uidetur sine controversia, quam Germani Steynmilch uocant. Nascitur in petris. Septima est Platyphyllos, à latitudine foliorum dicta, quam non facile hodie aliquis demonstrauerit.

*Matthiolus Tithymalorum aliquot species pulchrè pinxit. Cyparissiam aliqui Esulam minorem uocant, Wolffsmilch.

PITYVSA. CAP. 166.

Pityusa, ut antea dictum fuit, duplicem habet differentiam. Minor genere à Cyparissia nihil differt. Maior uerò in pinguibus & uliginosis nascitur locis, recentioribus Esula maior, & Germanis Teufelsmilch appellatur, uel wilde Wolffsmilch.

LATHYRIS. CAP. 167.

Ad uel quocq; ex Tithymalorum genere est, forma & fruticosis ramulis insignis. Recentiores & Pharmacopolæ eam priuatim etiam Tithymalum uocant, & Caraputiam minorem, quoniam fructus & semina maiori Caraputia, id est, Ricino similia habeat. Germanicè Springtöner/Sprungsamē, & Fuchsmilch uocatur.

PEPLVS, HERBA. CAP. 168.

Peplus parua est herba, ex Tithymali genere, ubiq; in hortis & uineis nascēs, Germanicè Steyn Dundsamilch dicitur.

PEPLIS. CAP. 169.

Peplis genere Peplo cognata est, sed quo nomine iam appelletur, nulli cognitum esse puto.

*Kleine Wolffsmilch.

CHAMÆSYCE. CAP. 170.

Chamæsyce dicitur hæc herba, quod Ficus modo lacteo liquore abundet. Hodie uerò incognita est.

SCAMMONIA. CAP. 171.

Scammonia herba est nostro Cyssampelo, id est, Conuoluulo similis, lacteo liquore etiam similiter plena, maiore tamen radice. Hinc est quod Cyssampelus tenuis Scammonia uocatur, quoniam multo tenuiorem radicem quam Scammonia habeat. Comparantur apud Dioscoridē Scammonia folia Helxines foliis, quo loco Helxine non Parietariam, sed Cyssampelum, id est, Conuoluulum significat. Colligitur ex Scammonia radice liquor, qui exicatus ad nos perfertur, & similiter ut planta, ex qua fit, Scammonea uel Scammonium uocatur.

CHAMELAEÆ. CAP. 172.

Chamelæa est planta olei foliis, unde & nomen inuenit, quæ ab Arabibus & Pharmacopolis Mezereon appellatur. Huic similis est Thymelæa, id est, frutex in quo Coccognidium nascitur. Cōfundunt hodie diuersas has plantas. Nam Thymelæam quocq; Mezereon, & Coccognidium grana Mezereon uocant, quantumuis admonuerit Dioscorides Coccognidium nō esse Chamelæa, id est, Mezerii, sed Thymelæa semen.

THYMELAEÆ. CAP. 173.

Thymelæa frutex est, quem Germani Zebast & Kellershals appellat, ex quo colligitur granum gnidium, quod composito nomine etiam Coccognidium appellatur. Nascitur pinguibus, montanis & opacis locis.

SAMBVCVS. CAP. 174.

Acta, Latinis Sambucus, Germanis Holunder & Albern appellatur. Nota omnibus Sambucus est, flores candidos, & nigras baccas in latis umbellis ferens. Inuenitur etiam aliud Sambuci genus prædicto minus, floribus & baccis non in un-

N ij

ANNOTAT. VALERII CORDI

bella, sed racemo constitutis. Baccæ rubentem habent colorem. Hoc à veteribus non est descriptum. Nascitur pinguibus montanis locis: *wilder Holder*.

EBVLVS. CAP. 175.

ἔβυλος, id est, parua Sambucus, herba est. Autumno enim caules illi omnino pereunt, uirgas habet quadrangulas, Sambuci modo inanes, folia, flores, umbellas & baccas Sambuco similes & æquales, quamuis baccæ non nigrum habeant, sed rufum colorem. Germanicam *Artich* appellant.

PYCNOCOMVM. CAP. 176.

Pycnocomon quid sit omnino ignoramus. Brunfelsius in tertio Tomo nequaquam ueram huius imaginem pingi curauit. Male Vergilius Marcellus semen eius Porro simile interpretatus est. Correctiores enim codices *μαρρύβιον*, id est, Marrubii, habent, non *μαρρύβιον*. Necesse enim est hanc herbam Marrubii semen habere, si Ocimo similes prius rationibus & argumentis.

APIOS. CAP. 177.

ἄπιος, quam *ἰσχιάδα* etiam uocant, herba hæc dicitur, quod Pyro similem radicem habeat. Quidam etiam Raphanum syluestrem appellant. Videndum tamen est ne cum agresti Raphano, id est, Armoracia confundatur. Quædam exemplaria radicem eius Asphodeli radici similem faciunt, quædam Spondylii, sed facilis est ex altero in alterum lapsus. Ea uero exemplaria quæ radicem huius herbæ Asphodeli radici comparant, deprauata sunt, siue ea Theophrasti, siue Dioscoridis fuerint. Asphodelus enim multas oblongis glandibus similes radices habet, ut Pæonia scemina, quibus nulla est cum Pyro similitudo. Spondylium uero rotundam habet, & Pyro conformem uersis facultatibus colligere possumus. Nam Ischiadis siue Apii huius una tantum radix intra corpus sumpta, utrinque, id est, per aluum & uomitum purgat, eiusque liquor (quam Ruellius Ischiada esse putat) famis tempore pauperes in Gallia uescuntur, quod uidisse se Ruellius testatur. Cum uero Apii radix una tantum tam uehementer purget, & corpus inaniet, minime cibis & alimentum esse potest, neque aliquis ea sine nime Ischias appellanda erit. Fateri autem omnes cogimur, nos hanc herbam ignorare.

*Hodie nota est, pingitur à Matthiolo.

COLOCYNTHIS. CAP. 178.

Colocynthis diminutiuum est à Colocyntha, id est, Cucurbita. Est autem Colocynthis Cucurbitæ syluestris genus, quam Pharmacopolæ Cucurbitam deserti, & Colocynthidam uocant.

*Huius species una fructu oblongiore, propriè est Colocynthis: hac olim pro uentosa utebantur. Altera Somphos est, qua in Pharmacopolijs utimur.

EPITHYMVM. CAP. 179.

Epithymum, quo nos hodie utimur, uerum Epithymum esse negat Antonius Musa, infirmis admodum argumentis nitens, nos uero in utraque partem prolixè disputatis sit eos nouisse, uerum Epithymum in Pharmacopolijs haberi, & reuera nihil aliud esse quam Cuscutam in Thymo nascentem. Adnascitur etiam Thymbræ Cuscuta, quæ Epithymbrum appellatur. Cuscuta enim aliarum herbarum accidens est, è qua seruauimus. Propterea bene legitur apud Plinium, Epithymum sine radicibus nasci. Nam proprias radices minime in terram agit, sed herbarum abundantî succo uiuit & nutritur.

ALYPVM. CAP. 180.

Alypum herbam qui cognosceret, nullum adhuc uidere uel audire mihi licuit.

EMPE=

EMPETRVM. CAP. 181.

Empetron hoc an idem sit cum Sarxiphago superius descripto, uel diuersum, non facile aliquis indicabit. Vtuncq; fuerit, nulla iam hoc nomine extat herba.

* Querendum an Millegrana uulgò dicta sit.

CLEMATIS. CAP. 182.

VITIS SYLVESTRIS. CAP. 183.

Aliquam planta hæccum Vite similitudinem habet. Ideoq; hoc nomen inuenit, improprie tamen. Non enim idem genus cum Vite satiuæ habet, ut satiuæ cultura tantum ab hac distinguatur, sed suum genus à Vite diuersum habet. Germanis hæc syluestris Vitis Spectreben appellatur, & flores eius Spectulien/Periclymeno ualde similis est. Videndum ergo erit, ne cum eo confundatur.

VITIS ALBA. CAP. 184.

Αμπελ & λευκή, uiticulas, folia, & capreolos satiuæ Viti similia habet, & candida radice, propterea albæ Vitis nomen inuenit. Herba est sepes ascendens, quam pharmacopolæ Bryoniam, Germani Saunreben/Gichtreben/Gichtwurz/Dundesreben/ & Strickwurz appellant, Baccas fertrubentes.

VITIS NIGRA. CAP. 185.

Αμπελ & μέλαινα in quibusdam similis est Albæ uiti, Radicem tamen nigram habet. Hæc eodem nomine iam appellatur. Habet autem nigras baccas.

FILIX. CAP. 186.

Filix siue ῥέας hæc, mascula appellatur, folia ab una radice multa emittit, magnarum auium alis similia, unde etiam nomen acquisiuit. Caulem nunquā producit, Germanicè Faren/ siue Farentraut uocatur, propterea quod latos uentris lumbricos expellat, quos Faren Germani nominant.

THELYPTERIS. CAP. 187.

Θυλό ῥέας foemina est Filix, proceris constat caulibus, & foliis pluribus, mascula Filice latioribus & breuioribus, Germani hanc Roffaren (an quod equis medeatur, ut Tragus de hac aut illa scribit) appellant; aliqui Hdsfaren/Creutzfaren.

POLYPODIUM. CAP. 188.

Ex Filicum etiam genere est Polypodium, quod Latini Filiculam, siue Filicularem, & Germani Engelstiß/ & Süßfaren appellant. Pharmacopolis Polypodii nomen cognitum est. Sunt etiam Germani qui Polypodium Steinfaren appellant, quoniam plerumq; in muscolis petris nascitur. Hoc tamen nomen differt à Steinfarlin/ id est, Trichomane.

* Filicula modo pro Polypodio, modo pro Trichomane accipitur.

DRYOPTERIS. CAP. 189.

Δρυό ῥέας thelypteridi similis est, multo tamen minor. Nascitur in uetustarum quercuum muscolis partibus. Germanis, quoniā parua sit Filix, Erdsfaren/Windfaren/Baumfaren/ & Eydsfaren appellatur. Vulnerarias habet uires, rusticis non incognitas. Querenda est in antiquis & umbrosis syluis, in quibus annosè Quercus fuerint. In piceis & abiegnis syluis minimè prouenit.

* In maxem & foeminam diuiditur.

CNICVS. CAP. 190.

Cnicon pharmacopolæ & recentiores Medici Carthamum appellant. Germani Distelsaffran/ siue Feldtsaffran. Theophrastus de historia plant. lib. vi. cap. iiii. tria genera Cnici siue Cneci describit. Vnum satiuum, quod Carthamum appellari iam diximus. Et duo syluestria. Ex his primum est quod à Dioscoride Atractylis li bro tertio uocatur. Alterum uero syluestre Cnicum, Dioscorides & alii Græci Acanthi nomine indicant. Propterea minimè errat Ruellius, quod alterum syluestre Cni

N iij

ANNOTAT. VALERII CORDI

cum, *Cardium benedictum* appellari scribit, quem nos *Acanthium* esse in tertio libro diximus. Porro *Cnici flores* à *Dioscoride Croco* comparantur, quo loco non ipsius *Croci flores*, sed in medio flore nascentia rubro colore stamina, quæ *Crocus* appellantur, intelligenda sunt. Nam *Dioscorides* non dicit, quod *Cnici flores Croci flores* similes sint, sed simpliciter *Croco*. Quilibet autem nouit *Crocum* non ipsum florem sed floris stamina, ut iam diximus significare. Igitur nullum turbare uel in dubitationem rapere potest florum *Cnici cum Croco* comparatio.

MERCVRIALIS. CAP. 191.

Λινοζωσ Latinis *Mercurialis*, Germani *Bingelfraut* appellatur. Duplex illius genus sexu distinguitur. Mascula appellatur, quæ bina semper, & testiculorum figura iuncta semina habet. Fœmina racemosos flores & semina producit. Reperantur hoc loco quæ superius de *Phyllo* herba dicta sunt, ubi indicauimus *Phyllon* proprium genus, & à *Mercuriali* hac diuersum non habere, sed idem esse *Phyllon* & *Mercurialem Dioscoridis cum Theophrasti Arrhenogono*, & *Thelygono*. *Pharmacopolis* hæc herba Latino nomine cognita est.

CANINA BRASSICA. CAP. 192.

Κυνική, siue *Cynocrambe*, sine dubio est *Mercurialis mascula sylvestris*: quod ipse *Dioscorides* etiam indicat. Herba est *Mercuriali masculæ* similis, semina uerò quam *Mercurialis* maiora habet. Fœmina in hoc genere non inuenitur. Nascitur in syluis, & Germanicè *Wild Bingelfraut* appellatur. *Ruellius* in hac herba indicanda errauit.

HELIOTROPIVM MAIUS. CAP. 193.

Ἡλιοτρόπιον τὸ μέγα, id est, *Heliotropion maius*, qualis sit herba, & quomodo iam uocetur, ignoro cum omnibus. Solus *Ruellius* eam sibi cognouisse uidetur, qui herbam *Cancris* appellari scribit: ubi diligenter animaduertendum est, *Ruellium* longè aliam herbam intelligere quam *Millegranum*, quæ apud nos herba *Cancris* uocatur. Nam hæc tam exigua habet foliola, ut uix conspici possint, & in arenosis areis nascitur. Quam uerò *Ruellius* sic uocat, pingui solo provenit, & *Ozimi* folia habet, ut ille scribit. Vulgo creditur *Heliotropium* esse ea herba, quæ à Germanis *Wegwart* appellatur, sed falsò. Nam *Wegwart* *Cichorium* est, id est, *Intybum agreste*, cuius *Dioscorides* ij. libro meminit. Hoc autem loco *Heliotropium* seorsum ab illo describitur. Erroris causam protulit *Plinius*, qui cœruleum florem *Heliotropio* tribuit, qualem *Cichorium* habet, quem etiam cum sole circumagit. Quamuis igitur multæ sint herbae, quæ solis cursum sequantur, una tamen est, quæ propriè *Heliotropium* dicitur, estq; duplex, maior & minor. De illa iam egimus. Hæc uerò iam sequetur.

HELIOTROPIVM MINVS. CAP. 194.

Ἡλιοτρόπιον τὸ μικρόν quæ sit, hodie omnino ignoramus. Neq; aliquis adhuc eam scriptis ex recentioribus indicauit.

SCORPIOIDES. CAP. 195.

Scorpioides hoc plurimum differt ab herba, quam *Theophrastus Scorpionem* appellat. Nam *Scorpioides* hoc semina habet, *Scorpionum* caudis similia. *Scorpio* uero apud *Theophrastum* radice *Scorpionis* caudæ simili describitur. *Theophrastus* autem *Scorpionis* appellatione primum *Aconiti* genus intelligit, quod alias *Tetastaphonon* & *Pardalianches* appellatur. Porro *Scorpioides* quæ sit herba, hodie ignoramus.

VALERII

77
VALERII CORDI SIMESUSII, in **Pedacij Dioscoridis**
ANAZARBEI QUINTVM DE ME

dica materia *Librum, Annotationes:*

Qui est de Vitis, Vino, & Metallicis.

VINIFERA VITIS. CAP. 1.



NOTA OMNIBVS EST QVAE IN VINEIS COLITVR Vitis, Germanice *Weinstock* appellatur. Plurimas habet hae diuersis regionibus differentias.

* *Capreoli, Eläbern/Gäbele. Vinacea, Trebern/Träff.*

LABRUSCA. CAP. 2.

Αμυγδαλέα, Latine *Labrusca*, Germanice *Wilder Weinstock* appellatur, eadem est cum praedicta Vite, praeterquam quod non colatur. Sola igitur hac nota ab illa differt. Nascitur apud nos circa vineas, & in vinearum sepibus.

VVA. CAP. 3.

Σταφυλή, Latine *Vua*, Germanice *Weintraub* uocatur. Intelligitur autem hac appellatione totus in Vite racemus multis acinis constans: det *Traub*. Ipse acinus *Vue* a Graecis *πάσι*, a Germanis *ein Weinbeer* appellatur. Passa uero *Vua sapis* Graecis, & *Rosen* Germanis appellatur. Cuius in pharmacopoliis tres sunt differentiae: omnium maximae sunt, quas hodie *Cibebas* appellant, anteriori pollicis articulo magnitudine fere equales. Arabibus *Vua Cibib* dictae. Secunda differentia continentur uulgares, quas simpliciter *Vuas passas* uocamus. Tertia uero omnium minima, nullo intus nucleo. Afferuntur hae non in racemis, sed ab his decerpitae, & in grandes massas compactae. Pharmacopole eas *Corinthiacas* siue *minores Passulas* uocant. Germanice *klein Rosen*.

VVA PASSA ALBA. CAP. 4.

LABRUSCAE, FLOS. CAP. 5.

οινάβη sylvestris Vitis, quam *Labruscam* uocant, flos est. Habetur eodem nomine herba etiam, quae in iii. lib. descripta est. Verg. Marc. Interpres in huius capituli Commentario scribit, se non meminisse, quod in aliquo loco apud Dioscoridem eo nomine herbam legerit, cum tamen illius caput interpretatus sit, & adiectis etiam Scholiis illustrauerit.

OMPHACIVM. CAP. 6.

ομφάκιον immaturae *Vuae*, quae *δμψα* Graece dicitur, succus est: ab Italis nunc *Agresta* appellatus.

VINVM. CAP. 7.

Notum est omnibus Vinum, Cuius natura uuarum diuersis locis genitarum temperamentum sequitur.

VINVM ALBUM. CAP. 8.

VINVM SAPORE DIFFERENS ET MIXTIONE. CAP. 9.

VINVM LOCO DIFFERENS. CAP. 10.

VINI FACULTAS. CAP. 11.

OMPHACITES. CAP. 12.

LORA. CAP. 13.

Λευρεπιάς, siue *πύτυον*, Latinis *Lora*, Germanis *Laur* uocatur. Fit expressis *Vuis*, affusa aqua, & iterum calcatis.

VINVM E SYLVESTRI VVA. CAP. 14.

VINVM

ANNOTAT. VALERII CORDI

VINVM MELITITES. CAP. 15.

οἶνον μελιτίτης ex austero musto & melle conficitur. Hodie uerò an conficiatur, nescio.

MVLSVM. CAP. 16.

οἶνόμελι, id est, Mulsum, ex ueteri austero uino & melle conficitur, apud nos non preparatur.

AQVA MVLSA. CAP. 17.

μελίκρατον Latini Aquam mulsam, Germani *Donigstrauff* uocant. Differt Melicraton ab Hydromele, quod Melicraton ex melle & aqua simpliciter fiat, estq; subiectanea & temporanea confectio. Hydromeli uero similiter ex aqua & melle conficitur, sed preparatur ut seruari & uetustatem ferre possit. Cuiusmodi est quod in Germania *Medt* appellatur, quo præter Germanos etiam alii Septentrionales populi pro uino & ceruisia utuntur.

* *Medt* quod ex sauis paratur, Apomeli est potius quam Hydromeli.

AQVA. CAP. 18.

Nota est omnibus Aqua. Cuius qualitas secundum loca in quibus scaturit, uel per qua fluit, uariatur.

MARINA AQVA. CAP. 19.

Nota omnibus ad mare habitantibus Marina aqua existit, pro qua nos in mediterraneis habitantes salinarum muriam, uel ex aqua & sale confectam aquam, accipere oportet.

THALASSOMELI. CAP. 20.

Purgationum causa conficiebatur olim θαλασσόμελι, nunc nusquam, quod ego sciam, conficitur.

ACETVM. CAP. 21.

οξος Latine Acetum, Germanice *Essig* appellatur. Quoties Acetum apud Medicos scriptum inuenerimus, semper uini Acetum intelligere oportet, & nequaquam ceruisiae. Est autem Acetum uinum uel ceruisia uetustate corruptum, & in acidiliis quoris saporem conuersum. Saxones qui Brunsvicensium Saxoniam incolunt, ex industria etiam Acetum, quemadmodum ceruisiam coquunt, quod non fit ceruisia, sed statim mustum illud decoctum, refrigeratum in Acetum transit, quo illis finitimæ gentes ferè omnes pro Aceto in cibis utuntur.

ACETVM MVLSVM. CAP. 22.

οξύμελι pharmacopolæ adhuc conficiunt, Oximel simplex uocantes?

OXHALME. CAP. 23.

οξύαλμυ ex aceto & muria conficiebatur: iam uero nullus restat eius usus.

THYMOXALME. CAP. 24.

θυμοξάλμυ etiam Dioscoridis ætate non amplius conficiebatur, eius tamen præparandi rationem Dioscorides tradit.

ACETVM SCILLITICVM. CAP. 25.

Acetum Scilliticum adhuc in pharmacopoliis conficitur, & Acetum Squilliticum uocatur. Quid autem Scilla sit, in secundo libro dictum est.

* *E* cruda scilla fieri: nam è cocta facile putrescit.

VINVM SCILLITICVM. CAP. 26.

Scilliticum uinum nusquam in Germania confici uidi.

MARINA AQVA CONCINNATA VINA. CAP. 27.

Non conficiuntur apud nos eiusmodi uina:

VINVM EX COTONEIS MALIS CONFECTVM. CAP. 28.

Duplex

Duplex est apud Dioscoridem huius confectio, sed altera tantum apud nos fit.

MELOMELI. CAP. 29.

Μελόμελι ex malo Cotoneo & melle conficitur. Rarus hodie est illius usus.

HYDROMALVM. CAP. 30.

Υδρομέλι nusquam in Germania præparatur, neq; alibi confici existimo.

OMPHACOMELITES. CAP. 31.

Ομφακόμελι ex acerbæ uue succo & melle conficitur. Sed huius non ita frequens est in Germania confectio.

VINVM EX PYRIS CONFECTVM. CAP. 32.

Conficitur hoc quemadmodum Cydonite, Sed rarus est eius usus in Medicina. Helli rustici ex Pyris syluestribus succum exprimunt, qui uini saporem habet, sed ob frigidius temperamentum, & humiditatis inconcoctæ abundantiam statim acescit, ideoq; musteum ebibitur.

VINVM E LABRVSCAE FLORIBVS CONFECTVM. CAP. 33.

Huius conficiendi rationem Dioscorides docet, sed nusquam apud nos conficitur.

VINVM EX PVNICIS. CAP. 34.

Ex Punicis malis exprimitur hoc uinum. Seruatur in pharmacopoliis & uinum Granatorum appellatur.

ROSACEVM VINVM. CAP. 35.

Rosaceum uinum in Germania nusquam uidi præparari, Acetum uerò Rosaceum ubiq; fit.

VINVM EX MYRTI BACCIS CONFECTVM. CAP. 36.

Ex contusis & expressis Myrti baccis conficitur Myrtite uinum, In nostris uerò regionibus nusquam præparatur.

VINVM MYRTEVM. CAP. 37.

Vinum cui contusæ Myrti baccæ & ramulicū foliis inijciuntur, Græcis Μυρτίαινη, Latinis Myrteum appellatur.

LENTISCINVM ET TEREBINTHINVM VINVM. CAP. 38. 39.

Lentiscum & Terebinthum arborem, nusquam in Germania habemus. Ideoq; hoc uinum apud nos non confici potest.

PALMEVM VINVM. CAP. 40.

Ex uulgaribus palmulis conficiebatur hoc uinum. Nos illud nunc non præparamus. Arabibus Nabith uocatur.

FICATVM VINVM. CAP. 41.

In Cypro olim ex Ficubus conficiebatur, eo quo Dioscorides docet modo, hoc uinū.

VINVM E SYCOMORIS. CAP. 42.

VINVM RESINATVM. CAP. 43.

Resina in frigidis regionibus uino adiicitur, ne acescat.

PINEIS NVCLEIS CONDITVM VINVM. CAP. 44.

Non præparatur hoc apud nos, nisi quis ex industria & Medicinæ causa conficiat.

CEDRINVM VINVM. CAP. 45.

Cedrus arbor apud nos non prouenit. Quapropter illius baccis uinum condire non possumus.

E BACCIS IVNIPERL. CAP. 46.

CEDRITES. CAP. 47.

VINVM PICATVM. CAP. 48.

Picatum uinum nusquam adhuc confici uidi.

VINVM ABSINTHITE. CAP. 49.

Ex Absinthio ubiq; conficitur Vinum & Ceruisia, quod nulli incognitum esse existimo.

VINVM HYSSOPITE. CAP. 50.

Hyssopo etiam uinum, quemadmodum Absinthio, conditur, & in multis Germaniæ locis conficitur.

MVL

ANNOTAT. VALERII CORDI

MVLTI ALIIS PLANTIS CONDITA VINA. CAP. 51.

et deinceps, usque ad 63. inclusive.

Plantæ quibus sequentia uina condiuntur, omnes antea descriptæ sunt. Ipsa uero uina nondum confici uidi.

VINVM AROMATITE. CAP. 64.

Conficitur hodie multiplex Aromatite uinum, præsertim in maritima Germania & Saxonia, quæ Claretum, & Lautertrand appellanti; hoc candidum; illud, crocatum est. Sed secundum Dioscoridis descriptionem non conficiuntur.

PLVRIBVS DIVERSISQVE ODORAMENTIS CONDITA VINA.

CAP. 65. Vsq; ad CAP. 70. inclusive.

Sequentia uina apud nos non præparantur, solo Nectarite excepto, quod ex Inula etiam, Nectarion appellata, radicibus conficitur. Vbiq; uulgo *Alaunwein* uocatur.

PLVRIBVS HERBIS CONDITA VINA. CAP. 71. Vsq; ad CAP. 83.

Herbæ quibus sequentia uina condiuntur, antea explicatæ sunt. Satis igitur sit no- uisse, nullam ex illis apud nos confici præter Saluiacum. Conficitur tamen in quibus- dam locis etiam ex Dauco, quem syluestrem Pastinacam in iij. lib. nominauimus. Ihenæ in Thuringia ex Polio etiam uinum præparant, cuius Dioscorides nullam fa- cit mentionem. Sequitur etiam uinum ex salis flore confectum. Quid uero sit salis flos, ipse Dioscorides hoc eodem lib. scribit in Metallicis medicamentis, quæ nunc se- quuntur.

DE METALLICIS MEDICAMENTIS.

CADMIA. CAP. 84.

Multæ sunt Cadmiæ species, nos tantum duas in pharmacopoliis habemus: Vnâ ex fossilium genere, Alteram factitiâ. Illam Germani *Galmey* & pharmacopolæ Lapidem calaminarem. Hanc uero Thutiam appellant, quæ omnium efficacissima est. Thutia autem Arabica est dictio, qua metallicum Spodium & Pompholyga indicat Serapio. Posteriores uero Botryiten Cadmiam minorem sic appellant, sed male. Est autem Botryites Cadmia minor, ex accenso & liquefacto aëroso lapide fuligo quædam sursum in caminos euolans, & ferreis hastis undique eminentibus tuberculis ceu racemus adhærens. Cadmiæ uocabulum recentiores in Cmaiam & Chniam (as- lias Climiam, Catimiam) corruerunt. Reliquum autem Cadmiæ genus in multas diuiditur species, à Galeno & Dioscoride descriptas, quarum maximus olim erat in Chirurgia usus. Verum hæc omnes hodie ubiq; incognitæ sunt, quamuis in nostris metallicis fornacibus, maxime Goslaris, omnes species gignantur. Diuiditur autem omnis Cadmia in Natiuam & factitiâ. Natiua duplex est. Vna cuius Galenus me- à quibusdam Medicis prælata, cuius magna copia in Vuestphaliæ montibus & tor- rentibus reperitur. Aspectu racemosa, & mixtis ueluti cubis constans, foris spadiceo, intus autem aëreo aut argenteo colore. Altera lapis est ponderosus, scaber & uersico- lor, quem antea lapidem Calaminarem appellauimus.

Factitia autem Cadmia in plures species conciditur. Prima Botryitis dicitur, quod grandis racemi instar, à fornaculateribus pèdeat. Hæc rursum duplex est. Vna qualẽ ferreis hastis ex industria fornacibus insertis, undique tuberosa, & racemosa facie ad- hærens. Secunda Cadmiæ species Placo des appellatur, quod ueluti latis crustis com- pacta sit, quæ & ipsa duplicem habet differentiam. Vna crassioribus constat crustis, commissuras candicantes aut pallidæ lineæ cingulorum modo interfecant, quam ob causam Zonitis nominatur. Tertia uero Ostracitis dicitur, quæ testaceâ & terrestrẽ habet substantiam, concretionem tenuis, & colore plerumq; nigricans, in ima fornace nascens,

* *Cadmia* capitis est fumus pyritæ lapidis, Pompholyx est fauilla (cum erit cinis color inducitur, & aqua calida cum sit) ad tectum ascendens: Spodium uerò cinis relabens. Tutia est *Cadmia* fistularis hodie in pharmacopolijs uia dicta, sed falso: nam Tutia Arabicum nomen Spodio debetur. Pyrites est materia eris & plumbi, & ubi non est Pyrites, ibi non gignitur *Cadmia*.

932

CAP: 86.

* Lege etiam supra in capite de Cadmia. Spodium uulgare est antispodium, quo extrinsecus tantum uti conuenit: efficacius, quod preparatur cum camphora.

1907

ANNOTAT. VALERII CORDI

squamam, æris squamam uocat. Nam ipse Dioscorides aliter scribit:

AERUGO. CAP. 91.

107. Græci æruginem uocant, quoniam florida sit æris rubigo, quæ priuatim in ære ærugo, ut in ferro ferrugo, uocatur: utraque ceu putrefactio sui metalli est. Pharmaco polis uiride æris, Germanis *Rupffergrün* / *Spangrün* / & *Grünspan* appellatur. Qui barbaris & impropriis uoculis delectantur, Aeruginē Prasion uiride uocant, ut simpliciter Prasion appellatam herbam ab ea distinguant. Sed ridicula hæc est distinctio. Sunt autem duo potiora æruginis genera. Vnum *ἰδρυσόν*, à Græco uerbo *ἰδρῶ*, quod rado significat, dicunt. Hoc ex industria & arte præparatur, & laminis æris deraditur, unde nomen inuenit. Derafum in massas formatur, & hæc est quæ ubiq; CAP. 92. habetur ærugo. Alterum eius genus sponte in ærariis metallis siue fodinis generatur, & interdum in uermiculorum formam concrefcit, quapropter *ἰός σκώληξ* nominatum est. Hoc autem hodie in nullo usu Medicis est. Inuenitur tamen non raro in nostris ærariis fodinis.

FERRUGO. CAP. 93.

ἰός σιδῆρος, Latinis Rubigo ferri, siue ferrugo, Germanis *Eisenrost* appellatur. Nota omnibus res est.

RECREMENTVM FERRI. CAP. 94.

Omniū metallorū recrementum Græci *σκαρίαν*, Germani *Schlacken* appellant. Hoc uero capite de ferri tantum recremento agit Dioscorides, quod nos *Eisenschlacken* / appellamus. Quidam ex recentioribus ferri squamam improprie etiam *σκαρίαν* uocant, ex qua pilulas præparant, à calore resoluta uentriculo salutares.

PLUMBVM ELOTVM. CAP. 95.

Plumbum Græcis *μόλυβδος*, Germanis *Blei* uocatur. Duo habet genera Plumbum. Vnum nigrum, Alterum candidum dicitur. Illud est quod hodie simpliciter Plumbum, et à nobis *Blei* appellatur. Hoc uero iam Stannum tantum Latini, et Sini Germani nominant. Porro elotum plumbum ex nigro fit, estq; nihil aliud quam impurum Plumbum, cum liquore aliquo in crassiusculam substantiam detritum, quod siccatum in puluerem transit. Malignis & calidis ulceribus curandis utilissimum.

CREMATVM, SIVE VSTVM PLUMBVM. CAP. 96.

Plumbum usq; in cinerem crematum hoc loco intelligit Dioscorides. Rarus hodie eius est usus, nisi quod figuli eo utuntur.

RECREMENTVM PLUMBI. CAP. 97.

Plumbi *σκαρίαν*, siue recrementum, Germani *Bleischlacken* appellant.

PLUMBARIVS LAPIS. CAP. 98.

Λίθος μολυβδαῖος lapis est metallicus, colore plumbi, ex quo etiam Plumbum excoquitur. Germani Metallici illum *Glantz* appellant, Plinius etiam Galenam. Estq; pariter argenti & plumbi ferax uena.

STIBIUM. CAP. 99.

Stibium Græci *σίμμι* & *σίβη*, pharmacopolæ Antimonium, Germani *Spießglas* appellant, quod Plinius etiam lib. xxxij. cap. vi. Alabastrum & Larbasum uocari scribit. Est autem scissile metallum, colore plumbi, cum prunis inticitur, sulphuris modo liquefit, & sædum odorem remittit. Si diutius cremetur, tandem in plumbum

* Vix est metallum, cum in laminas duci non possit, sed res metallica. Purgato hoc ad characteres fundendos typographi utuntur.

PLUMBAGO. CAP. 100.

Plumbaginem Græci *μολυβδαῖαν* uocant, Cuius duplex est genus. Fit enim quædam cum plumbo aurum, siue argentum purgatur. Estq; horum metallorum fax, quæ ablata massa in fundo catini reperitur. Hæc Germanicè *Tef* appellatur. Altera fossilis est, colore prædictæ non dissimilis, quæ plumbiferax uena est: non unquæ etiam argenti. Eâ Germani *Bleischweyß* uocant. Plinius utraq; hæc plumbaginem, galenâ etiam uocant. Vtebantur

Vtebantur ueteres in emplastris Molybdæna, iam uero à Metallicis tantum cognoscitur.

* Que colorem lithargyri habet, aut fossilis aut factitia est: quæ plumbi, est lapis plumbarius, Galena fossilis Plinio.

ARGENTI RECREMENTVM. CAP. 101.

Argenti recrementum priuatim Græci ἐλκυσμα, Germani Silber-schlacken uocant.

SPUMA ARGENTI. CAP. 102.

Argenti spuma Græcis ἀδάργυρος, pharmacopolis Lithargyrium, Germanis Silber-schum, & Gledr uocatur. Duplex eius genus colore distinguitur. Quoddam enim aureo est colore, ideoq; Græcis χρυσίτις, pharmacopolis Lithargyrium auri, Germanis Goldgledr dicitur. Alterum colore argenteum candorem imitatur, quod Græcis ἀργυρίτις, pharmacopolis Lithargyrium argenti, Germanis Silbergledr nominatur. Est autem Lithargyrium plumbum nigrum, quod purgationis causa argento additur, cum argenti fordibus in spumam concretum.

CERVSSA. CAP. 103.

Κερύσις Græci, Cerussam Latini, Bleiweiß Germani uocant. Et hæc plumbum est aceti acerrimi halitu in candidum pollinem resolutum. Hæc si uratur, donec rufum contrahat colorem, colorem facit, qui Sandix appellatur. Quem Vergilius intelligit, cum ait:

Sponte sua Sandix pascens uesit agnos.

Quo loco aliqui Sandicem herbam esse interpretati sunt, quæ lanas inficiat: sed male, quamuis ipse Plinius etiam crediderit Vergilium herbam intellexisse: quod tamen ex uerbis illius nullo modo colligi potest.

* Sandix est uulgarè minium.

CHRYSOCOLLA. CAP. 104.

Chrysocolle Germanis Schiefergrün appellatur, qua olim pictores & aurifabri utebantur. Illi, quoniam iucundum haberet colorem: hi uero ut aurum ferruminarent, unde etiam nomen inuenit. Hodie nullum habet in Medicina usum.

* Humor est qui defluit per uenas auri & æris, & putrescit.

ARMENIUS LAPIS. CAP. 105.

Armenium, siue Armenius lapis, æruginosam habet substantiam, ideo ærugini quoq; secundum proportionem in uiribus responder. Paucissimi pharmacopolæ hunc lapidem habent, quidam tamen eundem Smaragdî nomine ostendunt, sed magno errore.

* Smaragdus pellucidus est, & sapore caret. Armenius Chrysocolle et Cœruleo cognatus est.

COERVLEVS. CAP. 106.

Κόρυλος, siue Cœruleum, Arabibus Lapis lazuli, Germanis Lasurstein uocatur. Duplex illius genus est. Vnum in aurifodinis inuenitur, uenis eius per lapidum commixtas in diuersas partes tendentibus. Alterum in maritimis quibusdam litoribus gignitur, crasso sabulo simile. Est etiam factitium, quo pictores tantum utuntur. In pharmacopoliis ex cœruleo pilulæ fiunt, quas de Lapide lazuli cognominant.

INDICVM. CAP. 107.

Malè lapidis appellatio Indico præponitur, neque enim lapis est, neq; terra, sed color in purpura cœruleus, propterea Dioscorides eum cœruleo coniungit. Est autem duplicis differentiae. Vna in India arundinibus adnascitur, ut scribit Dioscorides. Altera in Æthiopia, siue βακκίον appellatur, quæ apud nos à tinctoribus ex latide herba præparatur, cuius florida spuma est, unde à Germanis Weydeblum & Indich appellatur.

OCHRA. CAP. 108.

Ochra lutei coloris terra est, quam Germani Ochergeel uocant, cuius tres sunt differentiae. Quoties Ochra colore plantarum flores à Dioscoride describuntur, non

pallidus color tantum, sed luteus etiam intelligendus est.

* Probatissima Goslarie effoditur.

CINNABARIS. CAP. 109.

Cinnabaris sine dubio est Gummi, siue exiccatus ille rubeus succus, qui in pharmacopoliis sanguis Draconis appellatur. Plinius ex Elephanto & Dracone pugna elisum & commixtum sanguinem esse credidit, uerum falsò, & mercatorum fabulis deceptus. Nostra ætate inuentum est, proceræ cuiusdam arboris in Aphrica genitæ Gummi, siue lachrymam esse. Fallitur Anto. Musa, dum putat nostrum Draconis sanguinem diuersum esse ab eo, quæ Serapione describitur, quoniam Serapio Sideritidis esse succum scribat. Quæ in re errauit Serapio. Propterea non sequitur, quod

* Natiua ex arboribus fluit, & sanguis Draconis Arabice uocatur. Metallica propriè Minium uocatur. est autem uena argenti uiui. fit etiam factitia ex argento uiuo & sulphure.

MINIVM.

Minium, cuius hoc capite meminit Dioscorides, uena est, ex qua Argentum uiuum conficitur, & alio uocabulo etiam *zindzaf*, à colore uocatur, Germanis *Bergzinobers* & *Quet Silber* etiam nominatur. Quod hodie ubiq; Minium à pharmacopoliis, & Germanis *Wenge* dicitur, minimè uerum est Minium, sed sandicis species, neq; unquam ex eo Argentum uiuum fieri potest, quod Minio proprium est.

ARGENTVM VIVVM. CAP. 110.

Argentum uiuum, siue Vena eius in marmore, siue per se inueniatur, idem est. Plinius Hydrargyron ab Argento uiuo distinguit, sed malè. Germanis *Quet Silber* pharmacopoliis Chimistis Mercurius appellatur.

RUBRICA SINOPICA. CAP. 111.

Μίλτος Σινωπικόν in Cappadocia olim effodiebatur, nunc uero in nullis pharmacopoliis habetur.

* Aliqui hodie pro uero bolo Armeno adferri putant.

FABRILIS RUBRICA. CAP. 112.

Fabrilis rubrica est rufa gleba, quam hodie Bolum appellamus. Huic etiam cognata est lapidosa ista terra, quam nos *Åðtel*, siue *Åðtelsteyn* uocamus.

* Vna est natiua: alia factitia, Braunrot ex Ochra cremata.

LEMNIA TERRA. CAP. 113.

Rarissimè hodie Lemnia terra affertur. Mirum enim in modum adulteratur. Olim hæc Lemnia sphragis, id est, Sigillum appellabatur. Nunc uero Terræ sigillatæ appellatione in pharmacopoliis habetur, sed quæ minimè uera sit.

ATRAMENTVM SVTORIVM. CAP. 114.

Atramentum sutorium Græci *χαλκανθον*, pharmacopolæ Vitriolum, Germani *Kupferwasser* appellant, multas habet differentias. Quoddam in stirias destillando concrescit, unde *σαλακτίς*, *σαλακτικόν*, & *λογχωτόν* appellatur. Quoddam in glebas concrescit, quod *πηκτόν*, id est, gelatum uocatur. Tertium coquitur donec refrigeratum geletur, hoc *εσθρόν* nominatur, & ubique habetur. Colore etiam distinguitur non meminit. Errat Antonius Musa, quum scribit Vitriolum Romanum nunc appellatum, ueterum Mysi esse. Olim coria sutores Chalcantho tingebant, unde apud Latinos nomen inuenit.

* Est aqua aluminosa, quæ destillauit per uenas cretas, Stalactidem interpretantur Gogfel. Vide etiam in Additione ad Chalcitin.

CHALCITIS. CAP. 115.

Quantum

Quantum ex Galeno conicere possumus, duplex est Chalcitis. Vna quæ in fodinis concreta inuenitur. Altera quæ ex Chalcantho fit. Vtraque hodie ignota est, quam uis in nostris ærariis fodinis reperiatur. Galenus cum scribit Chalcanthum etiam in Chalcitida paulatim mutari, incepta foris à superficie mutatione, non intelligit in superficie cuiusuis Chalcanthi colore in candidam seu pallidam substantiam resolutam materiam, ut Musa falsò putat. Quapropter idem Musa immeritò reprehendit Galenum, qui ipse metallicas fodinas inspexit, & diligenter Chalcanthi in Chalcitida mutationem obseruauit.

* Chalcites Græcis aliàs pyritem significat, sed additur lapis. aliàs Chalcanthum ruffum, Ror Ruppferwasser, uel Solet inuenitur & candidum Chalcanthum.

PSORICVM. CAP. 116.

Ψωριον compositio est, ex metallicis quibusdam medicamentis, contra scabiem facta, unde & nomen inuenit.

MISY. CAP. 117.

Misy non minus quam Chalcanthum, congelatus est humor, qui per commissuras Pyritidis, id est, ærarii lapidis, fluxit: Ibidem aliquandiu contentus in duram, sed interim friabilem substantiam concreuit. Est autem Misy gleba, substantia, sapore & uiribus Chalcantho similis aspectu, atque in friando arenosa natura, colore aureo, stellarum & scintillarum ignis modo splens. Fuit hoc medicamentum olim Galeni ætate in frequenti usu, à quo tempore usque ad nostram ætatem omnino incognitum fuit, nec adhuc à quoquam cognoscitur, uno atque altero excepto. Antonius Musa in suo de simplicibus examine scribit, Vitriolum uulgo appellatum in pharmacopoliis Romanum, uerum esse Misy, magno errore. Siquidem Vitriolum Romanum uiridissimum habet colorem, Misy aureum: nec est ulla in aspectu nota, quæ conueniat. Non animaduertit ille, Vitriolum Romanum illam esse Chalcanthi speciem, quæ Pecton uocatur, uiridè aut cœruleo colore, & sponte in fodinis concrefcens, unde nomen inuenit. Verum autem Misy in maxima copia inueni Goslarie, cum in metallicas fodinas ibidem descendissem, omnino ea facie, colore, substantia & facultate, quibus à Dioscoride, Galeno & Plinio describitur. Cuius magnam quantitatem mecum Vuitenbergam attuli, sperans posse fieri, ut rursus in usum recipiatur.

* Gelben Ruppferauch.

ATRAMENTVM METALLICVM. CAP. 118.

μελαντηλαι pharmacopolæ adhuc Atramentum nigrum, siue griseum, Germani Atrament appellat.

* Vena est Chalcanthi, pura, non cocta: schwarze Ruppferauch.

SORY. CAP. 119.

Σορυ Melanteriæ cognata res esset, nisi ruffum magis colorem haberet. Pharmacopolæ Sory ostendunt sub Atramenti rubei nomine, Germani Ror Atrament uocant. Sciendum est Chalcanthum, Chalcitida, Misy, Melanteriam, & Sory, omnia ex una materia constare, nempe gelato humore, qui per lapides æs in se habentes, fluxit & destillauit, sed differre, secundum admixtam illi terræ diuersitatē, quo fit ut omnia illa in aqua cocta Chalcanthum remittant.

* Hoc etiam uocant Schwarzen Ruppferauch.

DIPHRYGES. CAP. 120.

Triplex est Diphrygis genus. Primum luto simile quiddam est, & in cuniculis è terra eructatur, quod Dioscorides in sola Cypro gigni testatur. Sed hoc certò affirmare difficillimum est, cum tam spaciosum terrarum orbis, multa habeat loca omnium metallicorum medicamentorum feracia, quibus olim Cyprus nobilitata fuit. Inter quæ Germania iam diu principatum obtinet. Ipsum natium Diphryges non minus quam Cyprus gignens. Eructatur namque Goslarie è terra in cuniculis colore lu-

ANNOTAT. VALERII CORDI.

teum, substantia lentum glutinosumq, figulinae cretae modo, tanto impetu, sed paulatim expuitur, ut lapillos etiam prodiens sursum attollat: natura & facultatibus Misy respondet. Secundum fax aeris est, quemadmodum Molybdæna auri & Argenti. Tertium ex Pyrite lapide usto preparatur. Omnium tamē optimum est secundum, quod Germani *Offenbrun* uocant, hodie nullum habet in Medicina usum. Pandetarius uehementer errat, quod Diphryga & lapidem Phrygium eandem rem esse scribit. Confundit enim hæc duo.

AVRIPIGMENTVM. CAP. 121.

Auripigmentum Græci *Αρρευινδυ* uocant, Germani *Auripigment* / siue *Opment* / *Goldgeel* / Chimistæ & pharmacopolæ Arsenicon ab Auripigmento hodie distinguunt. Nam Arsenici appellatione facta quædam ex metallicis quibusdam uena indicant. Est autem apud Græcos & Latinos duplex Auripigmenti genus. Vt optimum est.

* Arsenicum uulgare factitium est & chymicum.

SANDARACHA. CAP. 122.

Sandaracha eandem habet cum Auripigmento materiam, & in iisdem fodinis, & in iisdem glebis inueniuntur. Differentia est quod flammeo colore, ut Cinnabaris metallica, fulgeat, propterea ab Arabibus Auripigmentum rubeum uocatur. Hodie in pharmacopoliis Gummi Iuniperi Sandaracha uocatur, maximo errore, & qui ab Arabum interpretibus originem duxerit, melius autem diceretur Sandarax. Antonius Musa, Georgium Agricolam in Sandaracha reprehendit immerito, quoniam ipsius Agricola uerba de Sandaracha nullo modo intellexit.

* Roter *Schwefel*, *Schürschwefel*.

ALVMEN. CAP. 123.

Alumen Græcis *Ερυθρίη*, Germanis *Alum* uocatur. Multæ olim eius erant differentia. Nos uero illud habemus, quod Græci *Βολιτιδα*, id est, glebosum, atq, hoc factitium. Nam ex nativo glebofo scissile Alumen gignitur, quod flos ueluti illius est, uiribus efficacissimū omnium. Antonius Musa errat, quod scribit Alumen scissile esse illud, quod hodie Alumē plumosum, siue de pluma uocatur. Nam omne Alumen in aqua resoluitur, & in igne exurit. Plumosum uero in aqua nunquam dissoluitur, neq, in igne mutatur, etiam si pluribus diebus cremaretur. Alumen scissile omnium efficacissimè totum os astringit, Alumen uero plumosum nihil omnino præter uentum erit.

* Alumen zucharinum sit è factitio subtilissimè trito & albumine oui. Bolitis, id est, glebosum, Arabes tamen nominant. Pro omnibus speciebus uti licebit nostro factitio.

SVLPHVR. CAP. 124.

Θειον Græci Sulphur, Germani *Schwefel* appellant. Viuum Sulphur appellatur Græcis *απυρον*, quoniam ignem nondum expertum est. Tale existit omne fossile Sulphur, quod nondum liquefactum & in frustula fusum est.

* Sulphur est adeps terræ, ideoq, in oleo resoluitur.

PVMEX. CAP. 125.

Pumex lapis omnibus est notus, quem Græci *Κίονειον*, Germani *Bimbe* appellant. Est autem lapis in ardentibus montibus natus, qualis in Melo, Lipara, Sicilia, & aliis quibusdā locis sunt, & quibus insulis & montibus mari expositis, nonnunquam in mare præcipitantur, cui postea innatant propter substantiæ raritatem, quod uidentes nautæ & mercatores, spumam maris esse pumicem credunt: sed falsò.

* Alius est candidus, alius niger.

SAL. CAP. 126.

Salis genera plurima sunt. Prima tamen diuisione in duo genera diuiditur. Quidā enim

fossilis est, & quidā factitiū. Ex fossili olim maximē probabatur ad Medicinā Hamōmoniacus, pro quo alius factitiū eiusdē nominis irrepsit, aurifabris & ærariis fabris quā Medicis utilior. Nunc uero ex fossili primam bonitatis notam habet, qui lucē transmittit, & in cubos dum frangitur se diuidit, quem gemmæ salem Pharmacopolæ uocant.

* Marinus sal sit, cum marina aqua in lacubus concreuit, Grob salz / Meer salz.

SALIS SPUMA, AVT LANUGO. CAP. 127.

Αλὸς ἄλγυ, id est, Salis spuma, qua hodie omnino in nostris Pharmacopoliis caremus, quamuis etiam in nostris maris cautibus gignatur, ut in Suecia, Dania, & Noruegia.

* Est marina spuma densata, Meerblumen.

MURIA. CAP. 128.

Halme, id est, Muria, duplex est, Natiua & factitia. Natiua ex salinarum fontibus hauritur. Factitia eo modo præparatur, quo Columella docet. Germani Muriam factitiā Salzlaſſen. Natiuam uero Sahl appellant.

* Non est Laſſen piscium aut carniū, quod Garum uocari debet.

SALIS FLOS. CAP. 129.

Αλὸς ἄνδρ in Aegypto Nili gignitur, & in aliis quibusdam locis. Quapropter nobis ignotus est.

* Non salis, sed maris florem interpretari oportebat: est autem nihil aliud quam Sperma ceti uulgo dictum. Dioscorides describit crudum, nos præparatum habemus.

NITRVM. CAP. 130.

Nitri multæ sunt differentiæ. Ex quibus etiam est quod hodie Salpetræ appellatur. Hoc substantiæ tenuitate omne aliud Nitru antecellit, differtq; a ueterum, id est, uero nitro, quod salis modo candentibus testis prunisq; impositum, primum paucas bullas emittit, quibus cessantibus ipsum nitrum remanet, nec ab ipso igne accendi aut consumi potest, sed salis modo tostum igni resistit. Nostru uero nitrum, quod ex nitrosæ terræ diluto coquitur, contactu igne ocysimè flammā concipit, totumq; in aërem resoluitur. Hinc colligimus ualde esse tenuium partium. Nam gustatum quodque cum maxima tenuitate pungit, atq; copiosam ex alto saliuā prouocat. Errant igitur, qui nitrum frigidum esse pronunciant.

* Fel Nitri est nitrum arboreum, quo uti licet pro ueterum nitro.

SPUMA NITRI. CAP. 131.

Dupliciter huius medicamenti nomen profertur. Aut enim duobus separatim uocabulis Αφρὸς νίτρος nominatur, aut ex utroq; composito nomine ἀφρονίτρον. Hinc Martialis in Apophoretis utrunq; illi nomen hoc disticho tribuit:

Rusticus es, nescis quid Græco nomine dicas,

Spuma uocor Nitri, dicor & Aphronitrum.

Gignitur autem duobus modis. Primum per se in cautibus cauernosis, nullo iuxta nascente nitro. Secundo autē, in ueri Nitri, quale in Aegypto habetur, acerbis, superficietenus, in spumofam substantiā resolutis eius glebis, quod ad nos omnino non adfertur, neq; apud nos hactenus inuentū est. Primum uero in petris & antiquis muris ex nitroso tenuiq; humore in illis concepto gignitur, habetq; hoc duas ab inuicem diuersas species. Quod enim in petris nascitur, substantiā habet magis terrestre, ideoq; in testa prunis impositū, donec ipsa testa excanduerit, primum bullas agit, quibus attolli desinentibus, id quod aqueū in eo erat, consumptū esse cognoscimus, quo consumpto quod terrestre est, salis & ueri nitri modo remanet. Hinc dicit Dioscorides, paulo post principiu, quod utrunq; tam nitru quā spuma nitri, salis modo torreatur, uel cumentur. Porro Aphronitru in antiquis muris nascens, iā dicto aspectu simile est, colore candidissimū, substantia uero multo tenuiore, quā in petris natū constat. Ideoq; factitiū nostratis nitri instar prunis inspersum, facilmè flammam concipit, totumq; in flammā, fumū & aërē resoluitur: capellę uehemēter huius linctu delectatur.

O iij

Nouisse autem oportet, omne nitrum quod accendi potest, nō esse illud nitrum quod ueteres describunt. Color uerō tam nitro quam Aphronitro non ubique terrarum idem est. Alibi enim rubent, alibi ad purpuram inclinant. At Aphronitrū quod hēnā cauernosis cautibus adnascitur, partim cinereo, partim candidissimo conficitur colore, atq; hoc triticeae farinę aspectu simile est, ut etiam Galenus scribit. Quod autem antiquis muris efflorescit, nunquam alio quam candido conspexi colore.

FAEX. CAP. 132.

Fæcis appellatione hoc loco Vini & Aceti facem intelligit Dioscorides. Est autē Fæx horum liquorum sedimentum, quod Germani Hefen appellant.

CALX. CAP. 133.

Αλκας Græcē inextincta Calx appellatur, Germanicē vngeshter Ralc. Crematur & Calx ex marinis buccinis, ut in maritima Germanię ora, ubi omnia ædificia, tam publica quam priuata, huiusmodi calce extruuntur. In mediterraneis locis ex alio lapide & marmoris genere quodam uiliore paratur.

* Calcarius lapis est de specie Marmoris.

GYPSVM. CAP. 134.

Gypsum in multa genera diuiditur. Quoddam in longos & rectos pectines finditur: quoddam uerō in laminas, quod idem est cum Aphroselino, siue speculari lapide. Quoddam etiā in glebas magnas concreuit. Omnia hæc genera Germani Gips uocant.

* Gypsum aliud est Sciscile, aliud alabaistro simile, ex lapide speculari etiam, quem Erdglaß uocant, fit optimum Gypsum.

SARMENTORVM VITIVM CINIS. CAP. 135.

Sarmenta uitis omnibus nota sunt, ex quibus Cinis lixiuie causa uritur: quamuis ipse etiam Cinis per se Medicinam faciat.

ALCYONIVM. CAP. 136.

Αλκυονίον marine spumę species est, propterea in Pharmacopoliis spuma maris uocatur, cuius quinque habentur differentię. * Meerschaum.

ADARCES. CAP. 137.

Αδάρκες quoque, uel Pericalamitis, spumofum quiddam est, quod Itali Passam marinam uocant.

SPONGIAE. CAP. 138.

Spongię omnibus notę sunt, quibus mensę & alia quędam exterguntur, Germanicę Schwämme uocantur: quo nomine etiam Fungi conueniuntur.

CORALLIVM. CAP. 139.

Corallium lapideus frutex est in mari natus, cuius tres species triplici colore distinguuntur. Est enim nigrum, candidum & rufum, Omnes Germanicę Corallen appellantur. CAP. 140. Vulgatius est rufum, & preciosius candidum. Nigrum raro inuenitur, & priuatim ἀντιπαδής uocatur, Theophrasto memoratum.

PHRYGIVS LAPIS. CAP. 141.

Qualis sit lapis Phrygius, hodie omnino incognitum est, quamuis in omnibus ferre Pharmacopoliis habeatur sub lapide Lyncis nomine. At cum duo sint lapides Lyncis appellatione uenientes, necesse est ut indicem, uter horum Phrygius sit. Primus itaque instar digiti oblongus atque teres est, & in mucronem desinit. Alter uerō aspectu terrę glebam pumicofam & laxam imitatur, mediamq; inter lapidem & terram substantiam habet: colore est pallidus aut subfuscus, candidisq; maculis & lineis uelut lutum contraxisset, distinguitur. Posteriolem hunc Phrygium lapidem esse censemus.

mus, Author Pandectarum atq; Serapio Diphryges & Phrygium lapidem confuderunt, eandem rem esse falso existimantes.

LAPIS ASSIVS. CAP. 142.

Assius lapis in Asio Troadis promontorio inuenitur, unde nomen inuenit. Hodie uerò ignotus est.

* Idem Sarcophagus appellatur. Germanicè Walsstein / lapis laxus & rarus. sed aliqui etiam Arabicum lapidē qui candidi coloris sit, Walsstein interpretantur.

PYRITES LAPIS. CAP. 143.

Pyrites lapis, Arabibus Marchasita, Germanis Reiß uocatur, cuius multæ sunt species, metallicæ rei peritis cognitæ.

* Vinus est aurei coloris, Golt oder Kupffer Fieß; alius argentei.

HÆMATITES. CAP. 144.

Hæmatites lapis nomen suū in Pharmacopoliis retinet, & Germanicè Blutstein appellatur, cuius multæ species à Plinio enumerantur, quæ omnes in Hercyniæ Saxoniæ montibus gignuntur, una tantum excepta.

* Nomen ei uel à colore, uel ab effectu, idem cum ferro temperamentum habet, cum aliqua tamen caliditate. Bonus non statim debet resolui. Ambergi ex nigro fit ferrum.

SCHISTVS. CAP. 145.

Schistus scissilis est lapis, substantia & uiribus Hæmatiti similis, colore tamen magis pallido, & uiribus secundum proportionem debilioribus ab illo dignoscitur.

GAGATES. CAP. 146.

Gagates & Thracius lapis substantia & uiribus ualde similes sunt. Vterq; enim ex bituminosa materia constat. Distinguntur inuicem formæ diuersitate. Gagates enim crustaceus est. Thracius uerò sibi ipsi undiq; æqualis. Porro lapidis Gagatæ species est, qui copiose in Germaniæ montibus inuenitur, & quo fabri æarii & ferrarii pro carbonibus utuntur, quod ex substantia, odore, uiribus & forma demonstrari potest. Germanicè hi lapides Steinfölen appellantur. Hoc Gagatæ genus Theophrastus ἄργεος λίθου uocat. Vide mox in Thracio.

THRACIVS LAPIS. CAP. 147.

Thracius lapis idem est cum succino nigro, quod nos Schwarz Augstein appellamus.

* Aliqui Chalcanthum uocant Augstein / id est, Ophthalmicum lapidem. Succinum uero Igstein / nescio quæ etymologia. Thracium aliqui putant Anthracum quoq; dici. Vide proximè retro in Gagatæ.

MAGNES LAPIS. CAP. 148.

Magnes lapis in multis Germaniæ locis inuenitur, propterea omnibus notus est; Germanicè Magneth / & Eisenbraut uocatur. Nascitur in Misnie montibus, & in Hercynia Saxoniæ, prope Harzburgum, milliare Germanicum à Goslaria distantem arcem, & ab eius loci incolis Segelsteyn appellatur, quod nautæ eo utantur.

ARABICVS, GALACTITES, MELITITES, MOROCHTHVS, ALABA-

STRITES, & Thyites, lapides. CAP. 149. 150. 151. 152. 153. 154.

Arabicus, Galactites, Melitites, Morochthus, Alabastrites, & Thyites, hodie omnino incogniti sunt lapides; quamuis ad Thyiten etiam referri possit lapis, qui Stolpæ nascitur, duritie sua etiam ferrum durissimum respuens. Ex hoc olim mortaria fiebant, unde & nomen inuenit. Porro Galactites Hildenshemii gignitur, iisdem forma, substantia & uiribus, quas illi Dioscorides tribuit. aliqui uiridi colore describunt, sed malè. Arabicus quoque, quamuis non cognoscatur, Hildenshemii in montibus inuenitur, partim candidissimo, partim maculoso ebori similis. Vltus exasperatur, ideoq; optimum dentifricium existit.

* Arabicus

ANNOTAT VALERII CORDI

*Arabicus alius est cinerei coloris: alius candidi, quem Germanice Walfstein uocant: quanquam & Aflum lapidem aliqui Walfstein interpretantur. Alabastrites uel Onyx (quanquam & gemma Onyx est) hodie Alabastrum uulgo dicitur, & marmor candidum: est enim marmoris species. Alabaster, weisser Marmelstein. Thyites est uiridis, & remittit lacteum liquorem: Auicenna uocat lapidem Nigrorum & Aethiopum.

IVDAICVS LAPIS. CAP. 155.

Iudaicus, qui etiam Balanites, Phoenicites, Tecolithus & Eurius appellatur, adhuc in Pharmacopoliis Iudaici nomine habetur. Plinius ex eo lapide quatuor fecit lapides, nominum diuersitate deceptus. Est autem insigni & mirabili forma lapis, in quo solo naturae artificium cognosci potest.

*Species una est figura glandis, unde & Balanites dicitur: altera similis uertebra piscium.

AMIANTVS LAPIS. CAP. 156.

Amiantus lapis sine dubio est scissilis ille & friabilis lapis, quem Pharmacopolae Alumen plumosum uocant, qui eam habet naturam, ut igne nunquam consumatur, etiam si aliquot diebus cremetur. Multae eius differentiae sunt. Inuenitur interdum flexilis, ut fila & tela ex eo fieri possint. Agyrtae pilos Salamandrae esse dicunt, sed falso. Est enim lapis qui ex montibus effoditur. Plinius Indici cuiusdam lini meminit, quod igne consumi non possit: sed mercatorum fabulis deceptus. Nam idem est cum Amianto linum illud. Germanice hic lapis Federweiß, Sternflachs, Stern-dache, vnd das Ewig liecht appellatur. Est & alius Amiantus, qui in laminas finditur, ut lapis specularis, sed huius nullam facit mentionem Dioscorides.

*Videtur descriptio Amianti lapidi speculari potius conuenire, nam in igne non consumitur, & purior redditur. Aliqui uocant Reussisch glasz. Veteres Amiantum, etiam Thernitum uocant.

SAPPHIRVS. CAP. 157.

Sapphirus gemma est omnibus nota, cuius plures sunt species, uulgo Saphir uocatur.

MEMPHITES. CAP. 158.

Memphites circa Memphim urbem Aegypti inuenitur. Hodie uero omnino incognitus est.

SELENITES. CAP. 159.

Selenites qui alio nomine Aphroselenus uocatur, idem est cum speculari lapide, quem Germani vnter Frauen Eis, & Erdeglass appellant. Finditur in laminas, ex quibus olim fenestrae fiebant, quales adhuc in uetustis templis & edificiis uidemus.

*Vide supra in Amianto.

IASPIS. CAP. 160.

Iaspis multas habet species, quae colore distinguuntur, hodie tantum notus est qui ad rufum colorem inclinat, lenae pluribusque aliis locis in Germania nascens.

AETITES. CAP. 161.

Aetites non in Aquilarum nidis gignitur, sed in montibus & saxorum commissuris inuenitur. Germanice Adlers stein uocatur.

OPHITES. CAP. 162.

Ophites multas habet differentias. Qui uero cinereo est colore, & maculis distinctus, in Germania etiam inuenitur, & uulgo Schlangenstein appellatur, e quo cochlearia & pocula fiunt, quae contra uenena uim habere creduntur. Diui Bennonis monumentum quatuor columnis ex Ophite factis sustentabatur Misnae in arcis templo, quod hoc anno destructum est.

Porro Ophites, cui grauitatem Dioscorides tribuit, hodie omnino non cognoscitur, dubiumque est utrum ea uox βαρύς, id est, grauis, ad pondus an ad odoris grauitatem referenda sit. Porro Hildenshemii marmor planum ceditur, maculis atque etiam squamis serpentinis similibus constans, odore cum teritur graui uisum cornu, simulque putrida

putrida oua referenti, qui etiam eo odore alioquin saluberrimum fontem sub huius marmoris petra largis undis scaturientem inficit. Nam ieiuno stomacho haustus, rursus cit, odorem & saporem ipsius lapidis referentes. Porro hoc marmor sine dubio est Ophitis species. Hinc colligitur, grauitatem non ad pondus, sed ad odorem referendam esse, cum alias terere omnes lapides ponderosi sint.

SPONGIARVM LAPIDES. CAP. 163.

In Spongiis testacei inueniuntur lapides, qui in Pharmacopoliis adhuc habentur.

LITHOCOLLA. CAP. 164.

Lithocollla gluten est, quo Lapidæ lapides fractos conglutinant. Germanice *Steinleim* uocatur, cuius plures sunt confectiones.

OSTRACITES. CAP. 165.

Ostracites Hildenshemii nascitur substantia et asperitate testas lateresque imitatur, atque percussus eorum modo resonat, concretionem planus est, sibi ipsi crebris ceu lateribus interpositus, *(forte impositus)*.

SMYRIS LAPIS. CAP. 166.

Smyris duritia Adamanti proxima est, ideoque Gemmarum utroque gemmas possunt. Vitrum etiam eo finditur. Germanice *Schmirgel* / siue *Schmirril* uocatur.

*Aliqui Smyrillum uocant.

ARENA LITTORALIS. CAP. 167.

Hoc loco intelligenda est Harena, quæ in marinis littoribus inuenitur.

COS NAXIA. CAP. 168.

Naxia cotes in Cypro olim inueniebantur, nobis pro eis alias accipere licet, quæ simile habeant temperamentum.

GEODES LAPIS. CAP. 169.

Geodes lapis Aëtite cognatus est. Quemadmodum enim Aëtites lapidem, ita Geodes terram in se complectitur, propterea à Græcis *Γεωδης*, & à Germanis *Erdschloß* uocatur. Gignitur in Misnia non procul à Dresda, & in Saxonia prope Hildenshemiam urbem.

TERRA. CAP. 170. *etc. usque ad 178.*

Eretria, Samia, lapis in Samia terra repertus, Chia & Selenusia terræ hodie omnino non afferuntur. Cimolia uero Creta etiam appellatur, cuius duplex genus colore distinguitur. Est enim purpurascens altera, & candida altera, hanc Cretam Latini, & Germani *Kreiden* / siue *Creit* appellant. Affertur ex Anglia.

*Pro terris illis ueterum, quæ ad nos non adferuntur, aliæ apud nos nascentes substitui possunt.

MARINAE TESTAE. CAP. 178.

In maritimis locis & littoribus ex salis aspersione, terra & calculis testacea corpora concresecunt, quæ Dioscorides hoc loco intelligit.

TERRA EX FORNACIBVS. CAP. 179.

Fornacum terra omnibus nota est, quam Germani *Ofen leymen* / siue *Back ofen leymen* uocant. Non tamen intelligenda est terra, siue lutum ex quo fornaces fiunt, sed ea quæ iam in fornacibus longo tempore exusta est.

MELIA TERRA. CAP. 180.

Ex Melo insula olim terra hæc in alias terras ferebatur. Nunc illi cognata quædam alia ex Tripoli Aphricæ affertur, temperamento, uiribus & substantia Meliam referens, qua Barbitonsores in extergendis peluibus utuntur. Ipsa tamen Hildeshemii inuenitur, ea substantia, colore, strepitu, & abstergendi ui, quibus hic describitur. Plinius candidæ etiam meminit, quæ Melini nomine & ipsa ibidem reperitur.

AMPEL

AMPELITIS TERRA. CAP. 181.

Ampelitis, siue Pharmacitis terra, Bituminosam habet substantiam, & gagatis modo crustacea est, & in assulas finditur. Scissilis talis apud nos etiam cum follilibus car bonibus (quos gagatis speciem esse dixi) ex montibus eruitur Zuicauig in Misnia finibus, & Aquisgrani in inferiori Germania à fabris lignariis Schwarze Freid/ id est, Nigracreta appellatur.

FVLIGO CAP. 182.

Ασβόλη Græcis, Fuligo dicitur, Schmitze & Kienrauch Germanis. In primo li bro de Fuligine dictum est, quæ ex pinguibus rebus conficitur. Hoc uero loco eam Fuliginem intelligit Dioscorides, quæ in Vitrariis officinis ex siccis lignis flamma re solutis gignitur. Inuenitur etiam pinguis, lenta, & in nigras massas pici similes concre ta Fuligo, maximè in rusticis ædibus, trabibus supra focum adhaerens, quæ ex humi dis lignis fit, & Germanis Ruß appellatur, acrimonia prædictam superans.

ATRAMENTVM LIBRARIVM. CAP. 183.

Omnibus notum est quo scribimus Atramentum. Hodie tamen alia ratione fit, quam qua Dioscorides docet:

Finis Annotationum Valerii Cordi in
Dioscoridem.

Hieronymo Heroldo Lipsensi, rei- PVB. NORIMBERGENSIS MEDICO DO- ctissimo, experientissimoq; CONRADVS GESNERVS medicus S. D.

De libris quatuor Valerij Cordi, quibus stirpes uarias, earumq; partes describit. De
adnotatiunculis adiectis, nominibus ab authore confectis, & eiconibus.



EMITTO humanitati tuæ nunc tandem clarissime
HEROLDE, diligentissimi desideratissimiq; VALERII
CORDI tui, quatuor illos sanè egregios, quibus uarii
plantarū generis descriptiones accuratissime persequi-
tur, libros, quos cum tu superiori anno liberaliter mihi
communicasses, utq; publicæ utilitatis ergò typis excu-
di efficerem, hortatus esses; ego mox reliquos etiam e-
iusdem authoris libros inquirere cœpi, ut pleraque eius
scripta uno uolumine concluderentur. In ea cogitatio-

ne dum uersor, commodum & insperatò mihi à præstantissimo medico Ioanne Pla-
cotomo, libri aliquot Cordi offeruntur: inter quos iidem quoq; De stirpibus libri e-
rant, iūq; ipsius authoris manu, sed prima festinataq; perscripti: ita ut quædam, nisi
apographo tuo adhibito, legi non facile à quouis potuissent. Videtur autem circa
annum à nato Domino quadringentesimum supra mille quingentos hæc condidisse.
Opus quidem cum aliàs imperfectum apparet, tum lacunis alicubi relictis (pro
quibus nos asteriscos inseruimus) dissitum & hiulcum: quarum tamen pleraq; ab
harum rerū studiosis obseruatoribus poterunt aliquando suppleri. Ipse, si uixisset,
emendaturus pleraq; ac suppleturus, si licuisset, erat. Ego quaecumq; est, publica lu-
ce dignum iudicauī, non minus (in suo quidem genere) quàm olim Aeneidem Au-
gustus. Parcent igitur operi posthūmo ambitiosi homines, & cornicum oculos con-
figere soliti, qui ut aliquid esse uideantur, nodum uel in scirpo quærunt: et reprehē-
dendis hisce libris, quibus extremam manum imponere authori non permisere fa-
ta, abstinebunt. Sed mihi quoq; uitio non uertent, si quædam emendanda fortè præ-
teritui, non meum enim hunc fœtum, sed alienū edo: in quo ingenium meum osten-
tare non libebat, neque vacabat, sed ne decuisset quidem opinor. Adnotatiuncu-
las illas breuissimas, quæ ad margines paginarum, uel ad principia aut fines capi-
tuli leguntur, pleraq; ut reperi, partim in autographo Cordi, non ab ipso, sed do-
cto quodam uiro eiusq; nominis studioso (pro suo in singulis iudicio, præsertim
circa Germanica nomina: partim in alio exemplari, similiter ab erudito quodam
adscriptas, reliqui. De meo pauca quædam sparsim addidi, nec ulla separaui nota.
Quod ad stirpiū aliquot nomina à Cordo confecta attinet, ubi uetera Græca La-
tinæ non reperiēbat, monui ubique Lectorem, ne quis imperitior quam ut anti-
quæ à nouis discernere ualeat, intricaretur. Finxit autem pleraq; omnia aptè, & ita
ut rerum quæ nominantur naturis perpulchrè congruant. eiusmodi quidem nomi-
na rebus indere, ubi antiqua defunt aut ignorantur, hominem philosophum & qui
rerum naturas calleat, maximè decet. Horum pauca quædam, in quibus Græcæ lin-
guæ proprietas & analogia non satis obseruatur, suis locis notauimus, ita ut quò-
modo aptius formari possint, indicaremus. Eicones stirpiū, ut nouit præstan-
tia tua, nullè ab eo expressæ fuerūt: quas ego passim addendas curauī, ut hoc etiam
ornamentum libris eius accederet, idque eò libentius feci, quoniam Iosias Riheli-
us (Argentinenſis typographus, de bonis literis præclarè meritis, & inter alias
optimi parentis Vuendelini uirtutes huius etiam laudis heres, quòd multos subin-
de egregios diuersis in linguis codices suis prælis excudat) qui typis suis impri-

Adnotati-
uncule.

Nomina
stirpiū.

Eicones.

mendum hoc uolumen suscepit, per multas iam prius imagines sculptas in prom-
ptu habebat, quibus in publicandis De natura stirpium eruditus et copiosis illis Hiero-
nymus Tragi commentariis, Germanica Latinaque lingua, Vuendelinus pater usus
est. Subiit igitur non inuitus hunc laborem, ut quæ nam in Tragi libris propolite
eicones, quibus à Cordo descriptis plantis congruerent, inquirerem & notarem:
quod in nonnullis præstare fatis difficile erat, ubi scilicet res una nominibus longe
diuersis ab utroque describitur. His autem, quæ ex Tragi opere desumptæ sunt
imaginibus, Tragi nomen, unâ cum libri, capituli, pagineque numero adscribere uolui:
quo uidelicet ita non solum appareat, unda petita sit pictura: uerum etiam si quis
plura de eadem stirpe cognoscere cupiat, mox inueniat locum. Porro præter has ei-
cones, adieci nonnullas ex aliorum, qui hodie imaginibus stirpium insignes extant,
libris, denique de meo stirpium pictarum thesauro, de quibus, quarum Io. Kentmannus
illustris medicus Torgæ apud Misenos candidissime me participem fecit, multis sa-
ne et raris, plerasque reliquas addidi: idque adeo non minus libenter et iucundè per-
feci, quam si uiuenti ipsi Cordo (cuius etiam memoriam colo) impartiri eas mihi li-
cuisset. Sacchari arundinis effigiem è Cosmographia Munsteri mutuatus sum.
Quod si ex his picturis aliqua non admodum accuratæ aut elegantes uidebantur,
Lectorem tamen plerumque omnes, ut ad rerum ignotarum cognitionem facilius per-
ueniat, promouebunt. Quod uero nonnullis Cordi descriptionibus eicones nullæ
adiectæ sint, causa est, quoniam stirpes aliqua (quamuis notæ mihi) hoc tempore
haberi non potuerunt, uel quia aliqua, ut nihil dissimulem, adhuc mihi incognitæ
sunt, aut esse uidentur. Forte enim aliquas earum noui, non tamen ex istis tum no-
minibus tum descriptionibus statim agnoscere potui. alicubi etiam picturæ quæ
dam minime necessariæ mihi uisæ sunt, ut ubi proximè alia eiusdem generis & per
omnia ferè similis proponitur pictura. Quare cum Nigellæ effigiem posuerim, illi-
us quam Damascenam cognominant, omisi. Hoc certè quantum in me fuit per-
ficere studui, ut Cordi lucubrationes hactenus suppressæ, quibus medicamentorum
simplicium natura illustratur, in publicum usum ac lucem tanquam è tenebris
productæ simul alijs prodesse, simul sui conditoris nomen celebrarent: & inter
cipuè Otho Brûfelsius, Leonhartus Fuchsius, Hieronymus Tragus, Adamus Lo-
nicerus: et nuper uno alteroque libello etiam Antonius Schneebergerus ciuis meus,
qui nunc Vilnæ in Polonia medendi artè egregie exercet, Valerius Cordus quoque me-
rito neque postremo loco nominaretur. Et quoniam tibi in primis doctissime Herolde,
Cordi existimationem ac famam curæ esse sciebam, tum hanc ob causam: tum quia
æquum erat, & gratitudinis officium postulabat, ut à te primo communicati mihi
huius authoris libri, ad te quoque primum redirent, in tuo tanquam optimi patroni
nomine eos apparere uolui. Remitto igitur tibi sortem tuam cum usura ferè pari,
nempe alijs Cordi libris, & in eos quos tu miseras eiconibus scholijsque adiunctis.
Spero autem te diligentiam meam, non quidem summam aut exquisitam, sed quan-
tam hoc tempore præstare mihi licebat, boni consulturum: & si quid inciderit tibi
per otium ad hæc legenda diuertenti, quod emendandum existimes; aut si addenda
aliqua eicon communicari abs te queat, id omnino facturum, quod ego de humani-
tate tua mihi polliceor: & quod præcipuum est Cordi nostri famam honestare, &
Gesnerum tuum amare perpetuo dignaturum. Vale, Tiguri, VII. Cal. Decem-
bris, Anno M. D. LIX.

VALERII

VALERII CORDI SIMESIJ, Historiæ plantarum, liber I. qui est de herbis diuersis.

*Provida quas hominum causa natura creavit,
Pulchrius est rerum cognitione nihil.*

DE ROSELLA SIVE SALSIRORA, [que ab alijs Ros
Solis dicitur.] CAP. I.



ROSELLA habet minima, septem uel octo numero, plura interdum, & interdum pauciora, longis et rubentibus pediculis in orbem per terram sparsa, leniter plerumque, quæ coelum spectant, concava & hirsuta, ceu rubenti capillo uestita, eoq; in medio breviori, in ambitu uero longiori: siccissimas etiam temporibus ceu roris minutissimas guttas et aspergines habentia: sapore acri, nitent & glabra omnino sunt ex inferiore parte foliola, habentq; tota minimi cochlearis figuram: è medio uero foliorum coliculus exit dodrante breuior, gracilis, rubescens, & sine ramulis, in summo paruos & pallidos flosculos sustinens, radículas habet paucas, breues, & capilli modo tenuissimas. Nascitur uliginosis & palustribus arenis. Habent folia, caules, & flosculi, acerbum, leniter acetosum & modicè acrem saporem.



DE LIMNESIO SIVE CENTAVRIDE,
[que uulgo Gratiola dicitur.] CAP. II.

CENTAVRIDE ab uno radice cespite multos erigit, teretes & dodrantem altos, interdum uero altiores: in quibus folia centaurio minori, hyperico, uel ascyro similia, longiora tamen, & ad hyssopi foliorum longitudinem accedentia, leniter per ambitum incisa, quatuor uersibus usq; ad summum cacumen nascuntur, in quorum alis flores singulos oblongos, inferius ubi pediculo iunguntur, subflavos, cætera candidos, & quatuor foliolis constantes producit: quorum inferiora tria clausa & contracta plerumq; sunt, superius uero expansum ac sursum reflexum, quibus singulis singuli succedunt fructus, anagallidis fructui magnitudine æquales, sed oblongiores, & in turbinem desinentes, semina minima intra se claudentes. Radices candidas transversas & multas in terra spargit, graminis similes, crassiores tamen & crebrius geniculatas: à quibus plurimè hellebori modo descendunt fibræ, saporem habet tota herba ualdè amarum, ac omnino nihil (quod sensu percipi possit) adstringit.

P ii



gentem. purgat egregiè bilem & pituitam, nihil interanea lædens: quoniam horribili isto ac ingrato odore, quo cætera purgantia medicamenta prædita sunt, caret.

DE SAGITTA SIVE SAGITTALI, [Sagittam inter ulnas
appellamus, quam Mago dicit Pistanam à Græcis appellari, &c.
Plinius lib. 21. cap. 17.] CAP. III.


SAGITTA pediculos habet triquetros, intus raros & spongiosos, bicubitæ
les, interdum longiores, brevioresq; secundum lacuum in quibus nascitur alti-
tudinem. iis in summo triplici acumine folia alata sagittæ modo præfixa sunt: inter
quæ caulis erumpit foliorum pediculis altitudine ferè æqualis, & ipse rarus, spon-
gius, rectus, & læuore insignis, in quo per interualla terni plerumq; candidi et tri-
bus foliolis constantes contrariis pediculis nascuntur flores: quibus punicea intus
sunt stamina, floribus subnascuntur hirsutæ et castaneæ magnitudine pilulæ: quartus
exterior pars tota copioso, plano, & tenui semine constat: in medio uerò globulus
rotundus est, cui annectitur semen. radices habet multas, hellebori fibris similes, co-
lore pallidas. Nascitur in lacubus & stagnantibus undis.

* Telum Iouis in Albi.

De

Sagitta.

Bistorta. Trag. 1. 105. pag. 321.



DE BISTORTA. CAP. IIII.

BISTORTA in triquetris pediculis folia circa radicem profert, rumici equa lia, acutiora tantum, superius uiridi, inferius candido ad cinericeum inclinante colore: e basi in utroq; pediculi latere deorsum fastigiata, & sinuosa: inter quæ cau- les assurgunt solidi, geniculati, & bicubitali ferè longitudine: quem singula ex geni- culis prodeuntia ac sursum nascentia folia amplectuntur, inferioribus multo mino- ra: ii in summo minutos, candidos, & modicè purpurascens flores in spica disposi- tos ferunt: quibus triquetra, similia lapathi seminibus, sed maiora semina succedūt. radicem habet pollice crassiorem ceu geniculis distinctam, bis in sinum detortam ac inflexam: cui foris est nigricans, intus uerò in candido rubescens color. Adstringū- gustata, radix, et semen, folia præterquam quòd paululum etiam adstringunt, lubri- ca & glutinosa gustu percipiuntur. Nascitur pinguibus & lutosis pratis, nonnun- quam etiam in syluis antiquis.

DE CARDVO SPHAEROCEPHALO, [Spinam albam in Italia quidam
hodie uocant, quærendū an Echinopus ueterum sit.] CAP. V.

SPHAEROCEphalus Carduus multa ab una radice folia mittit, pedali & ali-
quando maiore longitudine, latitudine pedis dimidiū utrinq; aliquoties profun-

P III



dis & spinam fe-
re cōtingentibus
incisuris diuisa,
per ambitum bre-
uibus nec adeo
infectis aculeis ar-
mata, superius ui-
ridia, inferius can-
dicante lanugine
obducta. Caules
posthac ab una
radice duos aut
tres, interdum et
ampliores erigit,
altitudine duoru
triūmue cubito-
rum, solidos ro-
bustosque intus
ceu sambuci me-
dullam habētes,
rubente & tactu
glutinosa lanugi-
ne uestitos, quae
digitis ad caules
confricata odorē
aliquem remittit.
Caulibus folia
(prius descriptis,
similia) per inter-
ualla adnascun-
tur, minora quo-

summitati propiora: ē quorum alis circa superiorem caulium partem ramuli oriun-
tur. pilae magnitudine, rotunda, hirsuta & aculeata capitula ferentes. Flores undiq;
ex singulis capitulorum aculeis singuli nascuntur, colore candidi (aut ferruginei)
quinq; oblongis & ualde exiguis foliolis constantes. Habent etiam singuli (cum a-
periuntur) flores singula cœrulea stamina: quorum deinde summitates in duos par-
uos et reflexos apices finduntur. Flores ex superiore capitulorum parte prius erum-
punt. Vltimo autem inferius ubi ramulis iunguntur, quapropter particulatim & in-
equaliter enascuntur flores, qui ubi defluerint in aculeis foramina relinquunt, qui-
bus semina oblonga, candida, hirsuta & aspera lana ceu amianto obducta, includun-
tur. Radicem habet longam, crassam, & intus omnino lignosam. Folia & semina sa-
pore leniter amara sunt. Nascitur saxosis & fluuiis imminētibus collibus.

* Crocodilium uidetur.

DE SENA. CAP. VI.

SENA caulem erigit cubitali altitudine paucis ramis fruticosum, foliis in singu-
lis pediculis utrinq; tribus uel quatuor binis semper per intervalla ex contrario
& rubente annexu erumpentibus, Portulacae foliis figura similibus. In supremo pe-
diculo nullo inter utrumq; ordinem intercedente, quod (ut in reliquis siliquis seren-
tibus herbis fit) parem numerum turbet. Ex pediculorum alis (in quibus folia na-
scuntur) alii indiuidui & singulares prodeunt ramuli, circa quos ex intervallo dispo-
siti sunt lutei & pallidiores flores, quinque foliis in concavitatem aliquam reflexis,
constan-

constantes eiusdem coloris stamina habentes, & quorum medio sursum incurvatum corniculum prominet, quod paulatim in latam, planam & compactam excrefcit fili quam, sex uel septem cordis figura, & nigrescente colore semina intra se cludente. radice nititur oblonga, tenui, lignosa et inutili, odore ingrato tota herba sentitur, ut Cynoglossa & punice folia. flori stamina prius, deinde folia decidunt. Radice nititur tenui flauesciente & inutili. Aestiu est herba.

Sena. T. 3. 9. p. 964.

Piperitis. Trag. 2. 148 p. 928.



DE PIPERITIDE SIVE SILIQVASTRO. Peruniano, [Capsico fortè
aut Cardamomo Arabico, cognata planta.] CAP. VII.

PIPERITIS caulem erigit cubitalem, minimi digiti crassitudine, in angulos striatum & circa foliorum ramorumq; eruptiones in purpureo colore nigricantem, intus seu sambuci medulla farctum, in summo in duos seu tres ramos similiter striatos diuisum, qui rursus in minores diuiduntur. oblongis foliis constat, in posteriori parte trium plerumq; & quatuor digitorum latitudine, in mucronem fastigiatas, quo fit ut mediam habeant lauri & solani foliorum similitudinem. flores ex alis ramulorum erumpunt candidi, quinque aut sex foliis stellæ modo dispositis. constantes paucis in medio staminibus, quibus amissis ex caliculis teretia & sine commissuris succrescunt ceu siliquæ, uascula longitudine digitali, latitudine uero pollicari (& interdum latiore) sensim in turbinem seu mucronem desinentia, principio uiridia.

P. iiii

cum autem maturuerint ruffa aut punicea, nitentia & deorsum, ut flores ipsi pendencia. quæ cultello in longitudinem aperta plurima in flauo candida, compressa & Lenti similia semina sed tenuiora ostendunt membranæ crassæ ceu callo per media uascula transeunti adnata constant intus uascula & calli pingui & succosa substantia quæ uetustate in puluerem resoluitur. Radicibus nititur numerosis, tenuibus, & in minimas fibras diuilibus: seritur fictilibus uasculis, radices, caulis, folia & flores nullam fatu dignam saporis qualitatem habent. uascula uero cū seminibus & quod carnosum in medio est acerrimo sapore linguam uellicant, & odorata sentiuntur. Aestiuæ est herba.

DE BALSAMELLA, [Balsamine peregrina, quam Euchsus alteram facit, Dodoneus sceminam. Itali (inquit) Balsaminum genere neutro uocant, & Balsamina seu Charantia distinguunt.] CAP. VIII.



BALSAMELLA. la caulem cubito altiore a radice mittit, rubentem inferius circa terram, qua manum implere possit crassitudine, superius minimo digito multo graciliorem, cui ab inferiori parte usque ad summitatem undique cubitum longi, crassi & recti adnascuntur rami: ex his duo circa terram contrario sibi opponuntur exortu. caulis & ramis leuorē habent, & pingui, carnosæ, succosæq; constant substantia ut portulacæ caules, sed multo robustiores sunt. pinguia et mollia totam herbam uestiunt folia tenui foliæ lauri foliis similia leniter per ambitum serrata, in utroq; pediculo rum latere paruas & rufas excrecentias habentia, è quorū alis in ruffo purpurei flores erumpunt purpureis uiolis non dissimiles, sed multo maiores.

res (nullis in medio staminibus præter unum capitulum seminum ferendi causa enascens) a tergo breuem apicem & incuruam caudam ferentes, quamuis in anteriore etiam parte longiorem apicem gerant. ex singulis floribus singula hirsuta prodeunt capitula, magnitudine cynosbatī, in quibus milio equalia sunt semina, colore nigra et aliquantulum aspera. Radicibus nititur numerosis, tenuibus, pinguibus & succosis ab eraso caulis trunco descendētibz. Aestiuæ est herba.

* Balsamina Amygdaloides.

De

DE DORYCNIO, [Ego neq; Dorycnium puto, neq; Solanis cognatum, esse
quidam Halicaccabum peregrinum nominant.] CAP. IX.

T. 1. 119. p. 897.



DORYCNIVM ex breui caulis
trunco plures singulares & striatas
emittit iunceæ gracilitatis uiticulas, duorū
plerumq; cubitorum altitudine, tenuia affi-
xa uirgulta ascendētes. ē quibus per inter-
ualla striati pediculi, tria folia apio simila
ferentes prodeunt, & quodlibet eorum in
tres partes per ambitū profundius incisas
diuiditur. hæc quo summitati propinqui-
ora fuerint eo minora etiā sunt. ex foliorū
alis singuli exeunt pediculi, longitudine di-
gitali, gracilitate sua mediocri filo equales,
in extremitate duobus breuibus & retro-
flexis capreolis contrario annexu sibi ipsis
oppositis. uirgultorum alas ac furculas ap-
prehendētes, quo melius uiticula ea ascen-
dere et imbecillitati suæ cōsulere possint. in
fine pediculorū ante capreolos fert flores
candidos, paruos, exiguis intus luteo colo-
re staminibus, quorum magna pars caduca
apud nos est: qui uero abortiui non cecide-
rint, sed remanserint, ē medio triquetros dē-
sos et aëre inflatos emittunt folliculos, ma-
gnitudine halicaccabi uescis equales, tenui
admodum membrana constantes princi-
pio. Viride mox in ruffo pallecente intus
tribus mēbranulis à medio ad angulorum
interualla usq; transcuntibus in tres came-
rulas interseptos. qui interdum non tribus
tantum, sed quatuor constant angulis, uerū
hæc non est propria eorum, sed monstrosa
forma ex super abundanti in ea parte nutri-


mentali humore causam et originē habens. singulis camerulis ubi in medio follicu-
lo coniunguntur, singula semina innascuntur magnitudine parui pisi, figura rotun-
da, colore nigra ab una parte, nempe in annexu cādidam & satis magnam maculam
habentia, figura quadam tenus azari folium uel latiusculum cor imitātem, unde eti-
am ipsa semina grana cordis appellantur, ea foris dura sunt, intus uero candidum &
inflexo septo distinctum nucleum complectuntur, sapore dulcem, radicem habet di-
gitali crassitudine, multis fibratam cirris. Aestiuæ est herba.

DE ANBLATO, [Germanicè dicto: id est, Aphyllo, quod folijs careat.
Orobanchen aliqui putant, non tamen ea, sed ei similis superficie herba
est. nos aliquando Plinij Aegoletyron esse putauimus.] CAP. X.

ANBLATVM primo uere colicolum profert longitudine dodrantalem,
a minimo digito graciliorem, tenerum & succosum. à cuius medio quatuor flo-
rum ordines usq; ad summam enascuntur. & omnes antrorsum spectantes, flo-
res in ruffo candicant, foris hirsuti & à tergo foliolis ceusquamis eiusdem coloris
operti sunt: ē quibus parua & acuminata prodeunt uascula plena seminibus paruis,

hyoscyami seminibus similibus, uascula maturo semine in duas partes se aperunt, radicibus nititur multis crassis, succosisq̃, squamarū modo sibi ipsis superiacētibus & hyeme non pereuntibus. caret herba hac foliis. nascitur putri et umbroso solo in syluis aut secus eas. saporem habet in acerbo leniter amarum, adiuncta pauca partium tenuitate.

Anblatum.



Helianthemum. T. 1. 73. p. 121.



DE HELIANTHEMO, id est, Sonnenblume. Est hec, ni fallor, immerito
Hyssopus sylvestris dicta à Trago, cuius eiconem etiam posuimus, Scyden
hyssop. CAP. XI.

HELIANTHEMUM coliculos producit graciles, lignosos & subhirsutos, in quibus folia sunt polygonii foliis similia, carnosa & leniter hirsuta, per quorum longitudinem singularis transit linea intus ceu cannale foliis impressa, foris uero eminens siue elata. coliculis flores lutei deinceps adnascuntur pentaphylli floribus similes forma & magnitudine, quibus singula succedunt oblongi erui magnitudine uascula, et in his papaueris quātitate semina, colore. Radicibus nititur tenuibus & lignosis nullius usus. habent folia & flores dulcem lubricumque saporem. folia item confracta mox apte coniuncta ob succi lentorem rursus coalescunt. Nascitur asperis, siccis & apricis, tam campestribus quā montanis locis.

* Consolida aurea Chirurgis quibusdam.

De

DE HYOSCYAMO PERVNIANO, [*Stramonia*, uel
Nuce Meihel.] CAP. XII.

T. 2, 128. p. 896.



lorum partibus relictis, ē quibus singula nascuntur rotunda & aculeata capitula, magnitudine iuglandis, & singulis eorum aculeis in flauo candidum durumq; subest semen magnitudine & figura senae semini aequale. Radice nititur candida, digitali crassitudine in fibras distracta, eaq; inutili, seritur in hortis magno studio, sed raro maturefcit. Aestiuā est herba.

DE GINGIDIO Syriaco olerē. Icon hac Gingidij à Dodoneo exhibetur. Bisacutum (inquit) Romani uocant, ut Dioscorides ait: cuius nominis uestigium hac ætate Itali et Hispani seruantes, hanc herbam uulgò Bisniago appellant. Nascitur in Italia, in aruis frequens. utuntur coliculis eius ad dentium expurgationem, Brabantis raro usum. CAP. XIII.

UMBELLIFERA & aestiuā herba Gingidium est, hisce proximis annis ad nos primum in Germaniam allata. Prima æstate qua seritur geniculatum emittit caulem, minimi digiti crassitudine, cubito proceriorem, nigricantibus striatum lineis, multosq; ramulos ferentem. folia sub geniculis exeunt, pastinacae satiuac foliis similia, tenuiora tamen, pluribusq; incisa eruptionibus, singulae ramulorum diuisiones, umbellas, & in his candidos exiguosq; flosculos sustinent.

Q ii

PERVNIANVS Hyoscyamus, prima qua seritur æstate caulem emittit uiridem, candicantibus punctis distinctū, crassitudine fere digitali, longitudine cubitali, in paucos ramos diuisum. folia fert iuxta alas solani foliis similia: multo tamē maiora, longitudine spītamæ. latitudine paulo angustiora, mollicie, odore et sapore hyoscyamum uulgarem referentia, * quamuis etiam coctorum pisorum aliquo modo odorem referant. iuxta quē uirides, dragoræ sō concaui & oblongi calices sunt, ē quibus singuli prodeūt flores, colore candidi, inferius angusti et striati, superius uerō cōplicati: postea se in calathi figuram explicantes, resupinato undiq; labro: ē cuius circumferentia quinq; plerumq; aut sex erumpunt mollia acumina, paribus interuallis ab inuicem distantia, a quibus singulis terne descendunt usq; in imam florum partem, lineæ, colore in uiridi, candicantes intus & extra conspicuæ, sed intus concauæ, foris uero eminentes, flores triente sunt longiores & superius quatuor digitos lati: inferius uerō, qua ex caliculis prodeunt, unum tantum in mediis ipsis quina plerumq; sunt aut sena colore candido stamina, forma lilii staminibus similia, inter quē etiam claua ut in lilio apparet, in summa conuolui, id est, cyssampeli florum imaginem referunt, hii toti decidunt. ima tantum calicu

imò Math
dragoræ sō
lia & radia
cem olent:
eisi fortius

hirsi-
ta, per
sta, for
phylli
i erui
nititur
sapor
escunt.

De



dam acrimoniam præ se fert. semina item Ammii saporem habent, quamvis acriorē addi possunt.

DE MELONGENA, [Malum insanum aut Melanzanum uocant aliqui recentiores, Simeon Sethi fortē Mazinzanion.] CAP. XIII.

MELONGENA, quam Itali corrupto nomine Melanzanam uocant, Prima quæ seritur æ state caulem erigit longitudine cubitali, crassitudine minimi digiti, solidum lignosumq; in ramos inæquali ordine diuisum, ex quibus alia prodeunt ambitum parum et inæqualiter sinuosa, in mucronem desinentia aspera & in confri cado strepentina, secus ea longos rubentesq; pediculos & in his singulos aculeatos calices, ex quibus singuli item nascuntur flores in quinque acuminata & rugosa foliola, stellæ modo diuisi, colore purpurascens, estq; tota florum latitudo duorum ferè digitorum, in quorum medio quinque sunt erecta, lutei coloris stamina in medio eorum uno eminente apice, florum foliola postquam defluerint ex calicibus singuli subnascitur fructus anatis & interdum anseris oui magnitudine, nonnunquam oblongi & ouati, nonnunquam etiam rotundi, & interdum sursum recurui, colore plerumq; rubente, quamvis etiam flauī & candicantes inueniantur, intus rara, lenta

lenta erungosa carne constantes, apud nos serò maturescentes, in medijs fructibus sinuosa quædam cavitates sunt, & in his semina copiosa figura lentis colore flavescente, minora tamen tenuiora. Radicibus nititur numerosis in minimas fibras ceu capillamenta diuisis. feritur à nobis ad spectaculum in hortis aut fictilibus. Arabes etiam in alimentis fructu utuntur, sed uitiosum gignit succum, saporem habet in dulci fatuum, pauca admixta amaritudine.

Melongenâ. T. 2. 127. p. 894.

Scorodonia. T. 1. 4. p. 12.



DE SCORODONIA (id est, Wildesalbey.) *fluestris*. [Tragus
saluiam *fluestris* uocat lib. 2. cap. 4.] CAP. XV.

SCORODONIA caulem habet scordij modo quadrangulum, longitudine cubiti, & hirsutum, per intervalla singula folia ex oppositis lateribus alternis uicibus proferentem, Betonicæ foliis similia: minora tamen, tenuiora, candidiora. quorum alis supra medium caulem singuli nascuntur ramuli, & minora inferioribus folia. flores ex adnatorum & medii caulis uno latere erumpunt, hiantes & in cædido pallidi, deinceps usq; ad summitatem dispositi, semina fert nigricantia quaterna, plerumq; in singulis florum caliculis chamædryos seminum quantitate. Radix nititur tenui, lignosa & paucis fibrata cirris, ideoq; inutili, & singulis annis intereunt, quotannis autem semine se propagat: est enim æstiva herba. Folia gustu

Q iii

amara sunt, odore scordium & lupuli fructus imitantur. Nascitur editis incultis locis, inter arbuta, & sylvis lucidioribus, solū amat aliquatenus arenosum uel aliō-
quā asperum, non tamen omnino siccum.

* *Sindricube.* Est scordium Montanum Odi.

DE POLYACANTHA cardui specie, fruticosus carduus est [Itali quidam Carduū stellatum uocant, à spinis stellatis: & aliqui, ni fallor, Calcatrippam: quod nomen Cordus lib. 2. cap. 14. o. Consolide regali uulgò quibusdam dicto adscribit. Polyacanthus Theophrasto alicubi inter acanacea numeratur, Gaza Aeuleosam interpretatur, sed acanacea dicuntur, quorum & folia & conceptaculum florum spinosa sunt: id quod Polyacanthæ Cordi non conuenit.] CAP. XVI.



POLYACantha caulē habet gracilem in multas alas et adnata diuisum, calque nonnunquā humi undiq; prostratas, circa quē ab inferiore parte folia sunt dodrante breuiora utrinque, profundius usque ad spinam incisa, suntq; eorū diuisiones seu partes ferē minimi digiti longitudine, latitudine eiusdē, maioribus intervallis dispositę et molliter hirsutę. capitula fert numerosa quinque aut sex gracilibus lōgis, acutissimis & flauescētib; aculeis septa, ex quibus purpurei prodeunt & capillacei flores: iis sub sunt parua, oblonga & candicantia

semina cum floribus in pappos resolutis auolantia, sub ipsis capitulis parua quę dā foliola sunt, quę singula inferiorum foliorum partes figura imitantur, leniter & ipsa hirsuta. Radicem habet digitali crassitudine, longitudine dodrantali candidaq; per cuius medium lignosus à caule descendit nervus: ea gustu & odore uulgarium carduorum radices refert: folia uerò sapore amara sunt. Nascitur circa urbes, oppida & pagos, planis & campestribus locis, præsertim in Rhenana regione.

* Iconem ē Dodonei libris mutuati sumus, pictorū fortē incuria, non optimam: capitulum ex arida depictum, seorsim apposuimus.

De Tana-

DE TANACETO PERVNIANO. CAP. XVII.

PERVNIANVM Tanacetum cuius flores alii Indianos charyophyllos, alii Indianas rosas uocant, paucos ante annos ad nos allatum est, sed uix summo studio & cultura ad maturitatem peruenit. Prima qua seritur æstate caulem emittit trium cubitorum altitudine, in ruffo nigricantem, & angulis striatum, à quo iuxta terrā bini alterno ordine seu positu resupinati & contrario exortu enascuntur rami, medio caule paulo breuiores, folia habet in singulis pediculis multa tanacetī foliis similia, undiq; per ambitum serrata, flores foliaceos in summis ramorum surculis ex oblongis uiridibus et angulosis caliculis profert pulcherrimos aspectu, media inter caryophylli calendule et rosarum flores forma et magnitudine, quorum foliola inferius lutea sunt, intus uero in fuluo rubentia, et leniter holoserici modo hirsuta, in mediis floribus stamina sunt similiter lutea, semina in caliculis fert oblonga, nigra et tenuia, florum foliolis annexa. Radices sub sunt tenuibus cirris fibrata, quotannis intereunt, folia trita ualde odorata sunt, flores uero imbecilem spirant odorem, gaudet assiduo sole & crebra rigatione.

* Petilium aliqui suspiciantur.

DE ALTERO NIGRO HELLEBORO, uel Helleborine
maiore. CAP. XVIII.

CAULEM habet singularem minimi digiti crassitudine, dodrantali altitudine, propter foliorum quæ defluerunt uestigia asperum, circa quem folia sunt nigri hellebori foliis similia, molliora tamen, candidioraq; : caulis superius in ramulos diuiditur, quos folia sine pediculo prioribus dissimilia uestiunt, duorum ferè digitorum latitudine in extremitate in quinque, sex uel septem partes ceu digitos diuisa, quorum medio flores prodeunt lati & concaui, foris uirides, intus uero in uiridi candicantes, quibus singula succedunt nigellæ capitibus similia uascula, maiora tamen, & in his nigricantia semina tritico similia, sed multo minora. Radice nititur tenui, lignosa, foris nigra, paucis fibrata cirris, eaq; inutiles. Olet folia grauiter quem admodum sambucus, & amara gustu percipiuntur, quemadmodum ipsa etiam semina. Nascitur asperis, apricis calculosisq; montibus, plurimumq; in Sueuia Vuirtembergensi, iuxta Reutlingam & Messingam in Taurino monte.

* Consiligo Columelle.

DE AIZOO serrato, [quod folijs albicantibus & serratis in saxis montium
prouenit, Fischjung aliqui uocant.] CAP. XIX.

AIZOVM serratum circa radicem numerosa & crassa habet folia, maiori aizo similia, multo tamen minora & undiq; minimis sursumq; uergentibus incisuris instar serræ incisa, aizo maioris modo globum ueluti oculum constituentia, caulem erigit unum atq; alterum, gracilem, longitudine pedis, pauca & deinceps disposita foliola ferentem: in cuius cacumine flores sunt candicantes, minoris aizo floribus similes: quibus succedunt minima semina, radicibus adhæret paucis, nigris, & tenuissimis. Adstringit tota herba, folia uerò efficacius. Nascitur altissimis calcariis petris, iisq; humido musco obductis: ut supra Reutlingam, auff der Almen, non longè à Nebulosa spelunca in Sueuia.

* Aizoi serrati species duas appinximus: quarum ea, cui rariores sunt flores, eosdem punctis sanguineis distinctos habet.

Q iiii

Aizoum serratum.

Aizoum serratum alterum.



DE HELLEBORINE tenui folia, [Matthiolus hanc Consiliginem esse suspicatur,
sed uera Consiligo descripta est superius, secundo ante hoc capite.] CAP. XX.

COLICVLOS ab uno radice capite plures erigit teneros, teretes, longitudi-
ne dodrantali: circa quos folia sunt abrotono aut Chamemelo similia, in sum-
mis coliculis colicorumque indiuiduis: adnatis ueris principio singuli sunt stellati
flores: quorum hæc est forma, in medio paruum eminet capitulum flauum aspe-
rumque, per ambitum numerosis & luteis staminibus circumuallatum, è quorum ana-
nexu floris foliola enascuntur undique in orbem radiorum modo disposita, uncie
longitudine, latitudine uero quarta uncie non excedentia, colore lutea & ut purissi-
mum aurum splendentia, à tergo alia & minora sunt foliola, colore nigricante, quia
bus nondum apertus flos continebatur. Radices habet numerosas, nigras, graci-
les, hellebori nigro similes sapore amaro. Nascitur montanis asperisque locis.

* Est Sesamoides nostrum minus.

Helle-

Helleborinum. T. 1. 135. p. 406.

Epimedium. T. 1. 177. p. 518.



DE TRINITATE, id est, Epimedio. [Germani aliqui Hepaticam nobilem,
vel auream nominant.] CAP. XXI.

FOLIA asaro æqualia similiaq; habet, sed in tres partes diuisa, unde nomen inuenit, superius uiridia, inferius rubentia, asari instar, contra hyemem contumacia. è quorum medio primo uere do drante breuiores prodeunt graciles teretesq; coliculi, & in singulis singuli flores, magnitudine & colore purpureis uiolis similes, sex paruis foliolis constantes, in medio paruum est capitulum, paucis & exiguis staminibus circumdatum. Radices subsunt graciles, numerosæ nigraeq; in diuersa tendentes. Nascitur umbrosis syluis.

* Anthera.

DE BECHIO, [id est, Tusilagine.] CAP. XXII.

BECHION primo uere singulares, molles, hirsutos, do drantalesq; emittit coliculos, oblongis squamis ceu foliolis deinceps uestitos, in quorum summitate singuli sunt flores in orbem circumacti, luteis et capillatis foliolis constantes in medio eiusdem coloris stamina sunt, minimis liliis similia partimq; reflexa.

R



DE ANCHUSA minima. [Eadem autem cognatissima videtur, quam Tragus
sylvestris Buglossæ nomine describit lib. 1. cap. 77.] CAP. XXIII.

MINIMA anchusa primo vere caule affurgit gracili, anguloso, solido & hirsuto, foliis oblongis hirsutisq; uestito, inferius minimi digiti ferè longitudine, in summitate uerò multò minora. diuiditur caulis in pedales ramulos, in quibus per intervalla exigui & singuli flores minimis foliolis obsidentur, quibus quaternæ plerumq; succedunt semina, colore nigro, forma & quantitate echii seminibus æqualia. floret particulatim, ita ut in summis ramulis tantum flores conspiciantur. Radicem habet longam & gracilem, foris sanguineo colore tinctam, & tingentem, maximè sole taurum occupante. deinde æstate arecente herba, ipsa quoq; nigrescit & moritur, qualitatibus echii & aliis anhusis respondet. nascitur in aggeribus & aruis.

DE LITHOSPERMO.

CAP. XXIII.

LITHOSpermon ab una radice plurimis affurgit cubitalibus aut maioribus caulibus, iuncis, teretibus, asperis & solidis, digiti minimi longitudine et latitudine, foliis utrinq; acuminatis et asperis uestitis, superius in copiosos ramulos diffusis, in quibus breui intervallo utrinque folia sunt inferioribus breviora, in exortu non coniuncta, se alternatim oppositorum spaciis contraria. secus quæ

quæ singuli sunt, breuesq; pediculi in quinque minima foliola diuisi, & in horum medio terna plerumque aut bina & singula semina milii quantitate, modicè superius turbinata, colore in candido cæsa, splendida & dura, intus minimum nucleolum habentia. floret particulatim in summitate tantum conspicuis floribus, paruis candidisq; similibus et equalibus minime anchusæ, sed diutius floret usq; in autumnum. Radice nititur digitali crassitudine, longitudine pedali, in partes distracta foris, initio ueris usque ad solstitium, ferè anchusæ modo, cruento et roseo succo tincta, intus autem cæcidam quæ singulis annis nouos emittit caules, eoque plures quo annosior fiat. donec deinde nimia radicum copia & senio suffocetur, qualitatibus & temperamento Anchusis & Echio æquipollet, ad illorum itaq; genus referendum est, quod ueteres non animaduenerunt.

Lithospermon. T. 1. 183. p. 536.

Filipendula. T. 2. 122. p. 883.



DE FILIPENDULA, [aliqui Oenanthem Dioscoridis faciunt.] CAP. XXV.

FILIPENDULA multos dodrantes à radice capite coliculos emittit, admodum graciles, utrinque ex intervallo breui semuncia longioribus & serratis foliis alatos, sine peciolo, pediculo adnatis, in summis pediculis unum folium ueluti in tria diuiditur, ita ut duo ad utrumque latus inclinet, medium uero rectè promineat omnibus autem foliorum interuallis ueluti paruula foliorum rudimenta immixta sunt.

R ii

Caulē emittit singularem, cubitalem aut interdum maiorem iunce & gracilitatis: teretem, solidum, modicè rubentem & minimè profundè striatum geniculis, longo intervallo præcinctum. e geniculis singula prodeunt folia prædictis similia, sed iuxta exortum latiusculis duabus laciniis utrinque caulem amplectentia. flores medio uere in summis profert caulibus corymbi figura acervatos antequam aperiantur in ruffo candicantes, totus deinde corymbus in plures graciles & inæquali longitudine surculos diuiditur, floribus paruis, cædidis et septē plerumque foliolis compolitis plenos, multis in medio capillatis staminibus, dilabētibus florum foliolis semen remanet paruum, oblongū, gracile, copiosum et capitulum constituens ueluti * Medesufsi semen, non tamē inuolutum. in omnibus surculorum maioribus sinibus et euidentioribus furcis singularis est flos, & postea seminibus constans capitulum sine pediculo fatu digno alarum cauis annexum. Radicem habet superius in superficie terræ minimi digiti crassitudine, oblongam, à qua undique exeunt graciles teretesque fibræ, in extremitate singulis plerumque ueluti caudatis glandibus, substantia carnosus capitate omnibus in uniuersum radicibus, foris niger est color, intus uerò in candido modicè ruffus, tota herba diuersis constat qualitatibus, partim enim adstringit, partim tenuem quandam saporem & ueluti uinosum palato imprimit, caput & olfactum odore etiam cum gustatur tentantem, flores inter optimum mel & uinum & pœoniam medium habent odorem, estque hic non iniucundus, omninoque similis Medesufsi floribus, cui tota etiam equalis est temperamento. Nascitur in pratis, campis & herbosis locis, nonnunquam etiam frutetosus.

Id est, argentea
maioris quæ et
frampff-
wurzel
dicitur.

Tormentilla. T. 1. 171. p. 502.



DE TORMENTILLA, id est
Pentaphyllo recto. CAP. XXXVI.

TORMENTILLA, graciles dracunculæ à radice emittit coliculos, breui intervallo, quinis, senis aut septenis foliis uestitos pentaphyllo similibus, multo tamen minoribus. in summis coliculis luteis flores sunt, & semina pentaphyllo similia, minores tantum. Radice nititur crassa, oblonga, tuberosa, intorta capillamentis, et fibris uillosa, foris nigricante, intus ruffa et carnosissima, quæ efficacissimè cum quadam tenuium uirium participatione adstringit. Nascitur aliquo modo uliginosis, macris, & herbosis locis, tam editis quam planis, nonnunquam etiā in altissimis sed humentibus montibus.

DE FRAXINELLA, [cuius radice uulgo hætenus pharmacopole nostri pro Distamno abusi sunt.] CAP. XXXVII.


FRAXINELLA caules erigit longiores cubito, teretes, uirides, inferius glabros, superius leniter asperos & rubentes, in nullos ramulos diuisos, à quibus folia exeunt posito & figura fraxino similia. (unde nomen inuenit) nam bina, ex intervallo contrario exortu, longo intusque canaliculato pediculo enascuntur, uno inter utrumque ordi-

A detailed botanical line drawing of a plant. The plant has a central, upright stem that branches out at the base into several smaller stems. The leaves are pinnate, consisting of multiple small, oval leaflets arranged along a central rachis. The leaves are distributed along the main stem and the lower branches. At the top of the main stem is a long, slender raceme bearing several flowers. Each flower appears to have five petals and a prominent central stamen or pistil. The base of the plant shows a thick, gnarled root system with several smaller roots extending downwards. The entire illustration is rendered in a simple, clean line-art style, typical of 18th or 19th-century botanical plates.

fiore, candidas, carnosasq; per longitudinem lignoso, lento & exemptu facili transiente neruo, qui quoniam inutilis abiicitur. habent folia ruthæ saporem & odorem, superior uerò caulis pars cum floribus multum grauisimumq; nec tamen iniucūdu odorem spirat. Radicibus acris, & amarus est fapor ad iuncta euidenti paritū tenuitate, qua diu palatum detinet. odorem uerò spirat, ueluti si quis dauci radicem, syluestris pastinacæ semen & piper commisceat. Nascitur editis montanis, & frutetosis locis, solum amat lutosum saxosumq; . minimeq; arenosum.

CAP. XXVIII.

DRACVNCVLVS Palustris coliculos spargit pedales minimi digiti
crassitudine, uirides & glabros geniculatos, ex geniculis fibratas candidasq;
radices fundentes inter raros, fungosos lationibusq; & contiguis foraminibus in
longitudinem porosos: in articulis rotunda, lataq; folia proferentes, acuatim in te-
nuem mucronem desinentia, iuxta pediculum sinuata, quæ& inferius nitida. te-
rum pediculi longis foliolis ueluti tunicis inuoluti sunt, quæ primum ipsos pedicu-
los uestiunt & amplectuntur, in uniuersum autem hædæraceorum figuram expri-
munt, nisi multo maiora & speciosiora essent. à medio cespitis capite alius erigitur
pediculus singularis, plerumq; longitudine dodrantalis, digito paulo gracilior, te-
R. iiii



adnascentium Alnorum umbram amat. solo macro & putrido maxime gignitur, pingui uero & lutofo nondum mihi uisa est nasci, diuturna est herba.

DE PENTAPHYLLO palustri.

CAP. XXIX.

PENT Aphyllon palustre uticulas per terram spargit longas, graciles & angulis striatas, in quibus ramuli & folia pentaphyllo similia et aequalia sunt, quinque aut septem numero, inferius in cinereo candicante, superius uero uiridia. flores in medio uere & postea profert foliatis, in quinque aut sex folia diuisos, colore fere pureos eiusdem coloris staminibus in medio paruum capitulum cingentibus, quod paulatim in fructum rubentem excrescit: quantitate, figura et colore nondum rubentis fragi, nullo intus succo, radicibus nititur longis, tenuibus, nigricantibus et in geniculis fibratis, adstringit tota herba, praesertim fructus. Nascitur uliginosis, putridis & macris pratis. herba est diuturna.

* Heptaphyllum Plinij fragiferum.

De

Pentaphyllon palustre.



DE TRIFOLIO palustri.

CAP. XXX.

TRIFOLIUM palustre coliculos emittit breues, minimo digito graciliores, teretes, geniculatos, uirides, & intus porosos. è singulis geniculi pediculi exeunt digito longiores, terna folia iuglandi similia: ferentes, caules erigit cubitales, teretes glabros & æquales, in quibus sole ex tauro in geminos eunte, deinceps dispositi flores sunt foliati, candidi. floribus succedunt rotundi & parui folliculi papaueri simili semine pleni. Radicibus nititur plurimis, teretibus crebro geniculatis, intus porosis, undique in transuersum tendentibus & seipsas quotannis propagantibus: hinc fit ut tanta huius herbæ copia eodem loco gignatur, coherentibus in terra propaginibus. è radicum articulis, aliæ erumpunt radiculæ, longitudine dodrantes, iunci lenis crassitudine, teretes & tam foris quàm intus candidæ. saporem tota herba amarum habet, sine alia euidenti qualitate, nascitur uliginosis, palustribus & maris pratis, plerumq; iuxta palustre pentaphyllon, iisdem enim proueniunt natalibus.

* Limonium Odi. Euberflæ.

R iiii




DE BRASSICA sylvestri, uirgata.

CAP. XXXI.

BRASSICÆ sylvestris, quædam est species, quæ caulem erigit bicubitalem, & ferè teretem, glabrum, intus medullaceum. cui statim à terra usq; ad summum tatem iuncæ gracilitatis deinceps adnascuntur rectę uirgæ, longitudine cubitali, sub his iuxta exortum singula sunt folia longitudine digitalia, inferius uncia, aut interdum duum digitorum latitudine, in mucronem desinentia, pinguiâ & glabra, sine pediculo caulem & uirgas, ueluti sinu quodam circum amplectentia. totis uirgis siliquas erectas producit, digiti longitudine, uehementè graciles, intus sinapi similia semina continentes, quæ per longitudinem in duas partes tenuissima quadam membrana diuiduntur, flores uere & æstatis initio in summis tantum uirgis apparent candidi, minimis quatuor foliolis & paucis staminibus constantes. floret particulatim: itaq; simul maturas & maturescētes siliculas, simulq; flores habet. Radix subest do drantalís digiti mediocris crassitudine. Tota herba fatiuam Brassicam sapore æmulatur.

De

DE VICTORIALI foemina, id est, sylvestri Gladiolo. [Longa uictoralis
uulgò dicta, non Gladioli, sed Allij genus est in Alpibus.] CAP. XXXII.



VICTORIALIS foemina post ueris
initium rectum et mucronatum emit
tit folium : è quo alia duo aut tria erum-
punt, Iridi similia, multò tamen angustio-
ra, utrinque striata et Iridis modo sibi in-
serta : iuncum, teretem, cubito longi-
orem, & glabrum caulem amplectentia :
in cuius summitate quinquè, sex aut sep-
tem egregiæ figuræ & coloris flores, sole
cancrum ingrediente, se proferunt, à se in-
uicem distantes, in unam partem caulis se
inclinantes, & deorsum nutantes. constât
hi sex folijs, uncia parum longioribus, si-
mul ab uno exortu prodeuntibus: ex qui-
bus quatuor semuncia paulò latiora sunt,
colore roseo, sed multò letiore & pulchri-
ore: interdiu, cum sole tanguntur, ignis &
scintillarum modo exteriori superficie co-
ruscantia, & ueluti flagrantia, reflexis la-
bris profundioris calathi figuram referen-
tia. reliqua duo foliola prædictis multò te-
nuiora sunt, ac intra florem cõstituta, infe-
rius aliquantulum prominent, & candi-
dam, longam, & in medio latiore macu-
lam habent: quam undiq; purpurea linea
circumscribit, & terminat. superiori floris
folio stamen subest trifidum, & inter hoc
et folium singularis apex. floret paucis
diebus, ab inferiori parte incipiendo. ape-
riente enim se qui in summitate est flore,
inferior flaccescit & clauditur. floribus sin-
guli folliculi succedunt, in rotundo modi-

cè oblongi, tenuibus uenulis distincti, nucis auellanae quantitate: qui cū immaturue-
runt in tres partes diuiduntur, & tenuia paleacea, flauaq; semina ostendunt: in qui-
bus rubens, cartilagineus, & paruus est nucleus, radicem habet non profundam,
paruam, rotundam, bulbosam, ab ima basi uersus germen turbinatam, aliquot crini-
tis & reticulatis tunicis, ueluti lorice uestitam: quibus detractis duo exigui candi-
di, carnosiq; apparent bulbi, uno alteri insidente, superiori quidem ueris initio mi-
nore, sed uegetiore: inferiore autem maiore & latiore, uerū flaccido et fungoso. perit
enim & flaccescere incipit, prioris anni bulbus ueris initio supernascente alio, itaq;
simul decrecentem & increcentem radicem habet, nonnunquam etiam inferiori
subest tertius bulbus, sed adeò flaccidus & inanis, ut inter effodiendum, (quia non
est spectabilis) negligatur, dum floret superior & minor bulbus increcit, uincitq;
soliditate & quantitate inferiorem: nam cum flaccescere flos incipit, digiti crassitudi-
nem, & globuli figuram acquirit. fibras ab inferioris bulbi base emittit tenues,
candidasq;. saporem radix habet præ cæteris herbæ partibus excellentem, nem-
pe dulcem & modicè acrem. relinquit enim in palato aliquandiu linguam & fauces
aliquantulum urentem & saliuam elicientem (flores & folia idem faciunt sine dul-
cedine) acrimoniam. Nascitur editis, frutetosis & herbosis locis, magis tamen pla-

nīs, nec adeo altis ut hyacinthus, solum amat lutosum, provenit copiosissime in syl-
uulis frutetosīs circa pedem Lauterbergi, hoc est sereni montis, quem hodie mon-
tem diui Petri uocant, uno atq; altero ab Hala Saxoniae miliaribus.

Eiconem hanc à Io. Kentmanno accepimus.

* Est victorialis rotunda quam inueni prope Gaerstedt. Longa uocatur Siegwurz, & in Austria, Al-
pibusq; nascitur. Figuram habet oblonge barbe bifide, sed rotundam, Germanicè. Aller mann harnisch,
& runde Siegwurz, appellant aliqui etiam Oberharnisch. De longa uide Ioannem Ammonium
Agricolam.

DE THALICTRO nigro. [Hanc Galli Saxifragam nominant: aliqui luteam
cognominant.] CAP. XXXIII.



nuem præ se fert saporem, saliuam elicientem. flores subacri, & ericæ, rapisq; simili
odore sentiuntur. Nascitur in campis & pratis quibusdam.

DE THALICTRO tenuifolio.

CAP. XXXIIII.

THALICTRUM tenuifolium, nigri altitudine, caulem emittit, & interdum proceri-
orem; paulo graciliorem, profundius striatum, colore in uiridi pallidum, lon-
gioribus interuallis geniculatum. folia è geniculis pro fert utrinq; pediculis adnata,
inuicè circa exortum nigri Thalictri modo respondentia: in tenues, angustas, unci-
ales,



ales, indiuiduas, & non ferratas partes, dissecta, glabra, & undiq̃ uiridia. Toti autem cum foliis pediculi, syluestris pastinacæ foliorum figuram fere exprimunt. in summo caule sex aut septem digito longiora adnata sunt: æstatis initio plures, exiguoq̃ corymbos ferentia, capillatis, breuibꝯ & flauis flosculis ueluti staminibus compositos: quibus succedunt nigro Thalicthro, æqualia fere & similia semina. Radicibus nititur nigri similibus et equalibus, non tamen adeo lignosis, sed carnosioribus, nec adeo croceis. Gustu & qualitatibus tota herba nigro Thalicthro, remissioribus constat. flores uerò odore Canopum, id est, sambuci flores æmulantur. Nascitur iisdem quibus nigrum natalibus: nonnunquam etiam humidioribus pratis, præsertim uliginosis & macris.

* Eacuius hic effigiem damus herba, si non Thalictrum leptophyllum Cordi est, genere tamen proximo continetur.

DE AIZOO minimo, [quod acre non est, sed acri persimile.] CAP. XXXV.

AIZOON minimum coliculis & foliis minori simile existit, multò tamen exilioribus, minoribusq̃ his partibus constat. flores habet foliolis quinque stellæ modo radiatis constantes, quinque exiguis acuminatis in medio apicibus se-

mini ferendo natis, iisdemq̃ decem staminibus circumuallatis, aizo acris floribus, forma, quantitate & luteo colore similes, positu tamen differentes, non enim minoris aut acris aizo modo umbellam siue capitulum constituunt, sed deinceps ab uncialibus aut longioribus coliculorum adnatis utrinq̃ alterno situ exeunt. ex his qui ab uno latere enascuntur, oppositorum spaciis iunguntur. Radicibus nititur tenuibus et capillatis. Adstringunt uehementer coliculi, foliola & flores, quemadmodum minus aizo, sed uehementius. siccior enim est. Nascitur iisdem, quibus acre & minus aizo natalibus. Cauendum ne harum similitudine fallamur, acrem pro hac accipientes: uiret semper, unde nomen inuenit.

DE MILLEGRANA, [Galli Herniariam uocant, Tragus Empetron, nescio quam rectè.] CAP. XXXVI.

MILLEgrana dodrantes, numerososq̃ per terram undique spargit coliculos, admodum graciles, colore in uiridi flauos & teretes, breui interuallo rutæ similibus foliis, minoribus tamen uestitos: secus que, ramuli exeunt duarum aut trium unciarum longitudine, omnibus ramulis copiosi & minimi in lateribus ramuli adnascuntur, colore flauis, principio circa ueris exitum tenuissimis & lereis flosculis, deinde minimis seminibus pleni. Radice nititur singulari, tenui, candida et in serius fibrata, et inutile. Herba, odore nullo commèdatur, saporem uerò primum in-

lipidum, mox subamarum, & modicè acrem habet. Nascitur apricis, arenosis, sabulisq; campis, littoribus & ripis.

* Est herba canceriminor.

Millegrana. T. 1. 181. p. 527.



DE ASTRAGALO herba. [Turnerus Apion
Fuchsij Astragalum facit. Sed alium Astraga-
lum pingit Matthiolus, qui cum Dioscoridis
descriptione melius quadrat.] CAP.
XXXVII.

ASTRAGALUS uticulis similes cau-
les spargit, tenues, angulosos etcice-
ri non dissimiles, longitudine pedales aut
do drantales, in quibus ex intervallo qua-
terna aut sena sunt folia, longitudine unci-
ali: latitudine autem semunciae, utrinq; acu-
minata: forma & magnitudine ciceris foliis
similia, non tamen per ambitum serrata, ne-
que hirta sed glabra. flores habet circa ve-
ris exitum purpureos, ciceris floribus quan-
titate & figura similes; quibus succedunt sel-
qui unciales angustae siliquae, aliquantulum
teretes, & in his quaterna aut quina plerum
que semina estatis initio, uiciae similia, pau-
lo tamen minora, colore caesia. Radicibus
nititur ab uno eodemq; interdum tuberoso
so principio, in plures graciles, nigrae uti-
culas, per transversum in terrae superficie
distractas, quae in geniculis tuberosae, cras-
sae, uillosae, fibratae & superficie tenus nigrae
sunt: intus autem candidae, sapore ut glycyrr-
hiza dulci, adstringere & acerbis, quarum
usus est. semine quoq; adstringit, sed crassa et
terrestri constat substantia, ueluti uicia. Na-
scitur montanis, frutetosis, incultis & uento

perflatis locis: plurimaq; Gosslariae in uicinis Rammo montibus.

* Germanis Christianwurzel & Knollen wurzel: aliqui Cicer montanum uocant.

DE NYMPHAEA Alba.

CAP. XXXVIII.

NYMPHAEA aqua à candido florum colore alba dicitur, à radicis capite pe-
diculos, secundum stagnorum profunditatem, bicubitales aut tricubitales
emittit, crassitudine minimi digiti, teretes, uirides, indiuiduos, molles et flexiles, gla-
bros, intusq; satis amplis in longitudinem tendentibus foraminibus porosos, qui
singula ferunt folia do drantis aut pedis, quoquo uersus latitudine superius omni-
no lae uia, glabra, aequalia & nitida, inferius autem ramosis uenis distincta, aquae in-
natantia, & forma rotunda, nisi iuxta pediculi annexum in digito plerumq; profun-
diorem sinum recederent. Caules ab eodem radicis capite plures profert eiusdem
longitudinis, crassitudinis, formae & substantiae, in ruffo aliquantulum nigrican-
tes, & similiter latis & contiguis foraminibus peruios, in superficie aquae desinen-
tes, nullis penitus foliis ornatos, singulos flores in summitate ueris exitu ac aestate
feren-

T. 2. 48. p. 696.



habent dulcedinem & aperti aliquantulum grauiter olent. semen autem glutinosū habet saporem. Radices amaræ sunt & adstringunt. Nascitur in stagnis & lacubus, quorum fundus lutosus & limosus est.

ferentes, anteq̃ aperiantur, pollicari longitudine & crassitudine, & in mucronem desinentes, colore foris uiridi, cum uero aperiantur, in quatuor folia exterior pars expanditur, inferius ut dictum est, uiridia, superius candida. quæ autem quadripartita ista tunica claudiebantur folia similiter undique expanduntur. ex his exteriora pollicarem habent longitudinem & latitudinem, interiora uerò minora sunt, omnibus ab utraq̃ parte niueus est color. Stamina in medio sunt longitudine uncialia, acuminata, plana & lutea. Dilabentibus florum partibus, in medio capitulum remanet, paulatim in quãtatem doliaris papaueris utriculi adulescens, concaua et aculeatam in summitate coronam habens, intus in loculamentis in medio coeuntia, distinctum. in quibus semen est milio simile, paulò tamẽ maius, nigrum & splendidum. Radicem habet diuturnam cubito plerumq̃ longiorem, crassitudine brachiali, propter contigua amissorum pediculorum uestigia, fasciæ clauæ modo nodosam transuersæ limo inhaerentem, foris omnino nigram, intus autem candidam, fungosam et porosam. à cuius ima parte pede longiores in limum descendunt fibræ, minimo digito graciliores, teretes, foris in candido liuentes, intus uerò candidæ, & substantia porosæ. flores gustu aqueam

DE NYMPHAEA Citrina.

CAP. XXXIX.

NYmphæa altera quæ à luteo floris colore citrina aut lutea cognominatur, albæ similis est, suis tamen notis (ut ostendemus) dignoscitur. pediculos enim in quibus singula sunt folia, non teretes, sed angulosi sunt, duobus utrinq̃ evidentibus angulis, unoq̃ obtuso, tertium latus ueluti teretis pediculi pars est. folia habet non adeò rotunda ut alba sed oblongiora, caules item similes et æquales, paulò tamen crassiores, & colore in flauo uirides, multò angustioribus poris peruios. flores uero omnino dissimiles, non enim oblongum antequam aperiantur, capitulum constituunt, sed rotundū & modicè latum, in quinq̃ folia rotunda et uncialia se expandentes foris uiridia, maximè quæ è caule exeunt, intus uerò lutea et splendentia. stamina intus in orbem disponuntur numerosa, lutea, forasq̃ reflexa, inter quæ et exteriora quinq̃ folia minora sunt, & multa foliola, eiusdem coloris in medio staminū, uigente adhuc flore, capitulum erumpit rotundum, uiride tam recens quàm maturum, & piri modo turbinatum in summitate lata & modicè concaua, ueluti stella, non tamen incisa, aliquam uentrosi canthari similitudinem referens. hoc pereunte

S iii

flore maximi, papaueris utriculi magnitudinem acquirit, quod antequam penitus maturefcatur, incifum uifcofa, in diuellendo emittit fila, fermen in fungofis loculamentis multo maius quam alba habet, colore flauum. Radicem habet diuturnam multo longiorem et craffiorem, rarioribus pediculorum uestigiis tuberosam, foris et intus candidam, tranfuerfamque a qua omnino nigrae in limum descendunt fibrae, albae fibrae craffiores. totius radices substantia, porosa & fungosa est, gustu aqueo subamaro, & aliquantulum adstringente. flores autem & femina uehementer adstringunt. Odorem radix iniucundum spirat, flos uero iucunde cum grauitate alia qua, olet et gusta habitum oris suauem reddit. Nascitur iisdem quibus alba Nymphaea, locis simulque cum illa floret & fructificat.

Nymphaea Citrina. T. 2. 48. p. 697.



Cicer nigrum. T. 2. 10. p. 609.



DE CICERE nigro seu arietino.

CAP. XL.

CICER nigrum quod arietinum quidam appellant statim a terra in plures petas, inaequali ordine subdiuisos. e quorum geniculis folia prodeunt, uncia breuiora, oblonga & aliquantulum serrata, digitali fere pediculo utrinque ex intervallo breui adnata, in extremo pediculo unum recta inter utrumque ordinem extenditur flores secus folia ex alis exeunt, aetatis initio & aliquandiu post, singulares, parui papilionum figura in purpura rubenes, quibus singuli succedunt folliculi unciae longi.

Foenogracum. T. 2. 4. p. 597.



longitudine hirsuti & ueluti flatu distenti, in quibus bina, aut terna clauduntur semina, pisi mediocris quātitate, angulosa, turbinata, arietini capitis propemodum figura, unde nomen inuenit, foris nigra, intus autem flaua. Radice nititur gracili, candida & inutuli. Seritur in hortis aliorum leguminum modo. Totius herbæ superficiei minimæ & roscidæ insident guttæ etiā siccissimis diebus, præsertim folliculis & foliis gustu simul aceroso & falso, semina pisis suauiore habent saporem, herba uerò ipsa gustu reliquis leguminibus respōdet.

DE FOENOGRAECO. CAP. XLI.

FOE NO græcum singularem cubito plerumq; proceriorem rectumq; emit tit caulem, iuncq; gracilitatis, teretem, uiridem & concuum: e quo ex interuallo longiore, dodrantalia exeunt adnata, folia habet in uno pediculo terna, unciali longitudine, semunciae latitudine, iuxta annexum angusta, in summitate uerò latiora & in rotunditatem desinentia, superius uiridia, inferius cineracea. quorum natura est sereno cœlo & sole supra horizontem existente, se demittere, turbido autem ac pluuioso, & sole occidēte, sursum se erigere atq; inuertere, ut inferior eorū pars reddatur superior. flores circa exitum ueris in summis uirgis exiguos & oblongos

profert, colore pallidos, figura uero papilionibus similes, eosq; in singulis uirgis una uice singulares, quo decedente supra eum alius erumpit, quo fit ut paulatim & successiue etiam fructificet, siliquas post flores fert digito longiores, graciles, acuminatas, incuruas ac reflexas, caprinorum cornuum figura, (unde Græcis ægoceros uocatur) in quibus semina oblonga, angulosa & flaua sunt, umbilico ueluti cauda quadam sili culis adhaerentia, quibus exiccatis medicatus est sapor. Odor uerò cum grauitate aliqua iucundus, ueluti Loto satiūo. Radice nititur longa, tenui, candida & inutuli: seritur in hortis ad medicinae usum.

DE PASTINACA nigra syluestri, cui radix foris nigricat, intus candidat, perennis. CAP. XLII.

PAST Inaca nigra folia à radice capite emittit pastinacæ syluestri aut satiuae similia & æqualia: neq; tamen hirsuta, neq; aspera, sed glabra & aspectu pulchra: e quorum medio caulis plerumq; bicubitalis assurgit, minimo digito gracilior, uiridis, & glaber, non omnino teres, sed aliquantulum angulosus, & lineis striatus, geniculis dodrantali aut pedali interuallo ab inferiori parte præcinctus. e quibus folia exeunt prædictis similia, sed minora. Ramos à foliorum sinu singulos producit pedales, aliquando maiores, in summo caule ramorumq; adnatis umbellæ sunt, æstatis initio, luteis in pallido stolis plenæ: quibus succedit oblongum, angulosum &

S iiii

VALERII CORDI HISTORIAE

duplex semen, magnitudine, figura & colore inter fœniculi & cari semen medium. Radice nititur cubitali, nervosa, digitali ferè crassitudine, foris nigra, intus autem candida, eaq; perenni: quæ gustata simul Tordyli & Pastinacæ Gallicæ saporem æmulatur, semen subamarum, subacrem, & tenuem habet saporem: folia autem non admodum dissimilem sed amariorem. Nascitur in campis et pratis, quæ fluviorum inundationibus irrigantur.

DE CARO. CAP. XLIII.

CARON ea æstate qua seritur folia tantum à radice emittit pastinacæ sylvestris similia, paulo tamen minora, nec adeo in latitudinē explicata, neq; hirsuta: altero dehinc uere caulē singularem profert, longitudine bicubitalem, gracilem, teretem, uiridem, glabrum, concavum, & geniculis interseptū: in quibus ramuli sunt & folia, iis quæ iuxta terram erant minora. flores medio uere in umbellis exiguos, candidosq; fert, & post illos semina oblonga, parua, angulosa, in cinereo nigricantia, dupliaq;. Radice nititur ferè dodrantali, gracili & candida. ea antequam caulem proferat, mollis est & pastinacæ saporem imitatur, at postquam caulem emisit, gnosca fit & perit. Semen acrem, tenuemq; saporem habet, anetho non dissimilem. Nascitur in pinguibus campis ac pratis, quò fluminū inundationes peruenire queunt, nonnunquam etiam editis, sed tamen pinguibus campis ac pratis.

Caron. T. 1. 152. p. 455.

Phasiolus. T. 1. 12. 615.



De

DE PHASIOLO minore, satiuo: [uel Eruo anguloso, à uiticularum angulis dicto, satiuo. Tragus Pisum Græcorum uocat.] CAP. XLIIII.

PHAS Iolus minor, qui ab aliquibus angulosum eruum appellatur, statim à terra in plures bicubitales spargitur uiticulas, easque latas & angulosas, duobus angulis in molliciem & foliaceam substantiam desinentibus. folia ex interuallo è geniculis profert bina, digitalia, semuncie latitudine indiuiduis neruis à tergo uenosa, glabra & utrinque in mucronem desinentia, uni pediculo inhaerentia, ita circa annexum singulares adnascuntur & intorti capreoli, quibus aut adminicula apprehendit, aut eorum inopia seipsam comprehendit. foliorum præterea pediculi quatuor uiticulis iunguntur binis, paruis, acuminatisque foliolis excipiuntur, flores æstatis initio habet candidos papilionum figura. quibus siliquæ succedunt, minimi digiti longitudine & latitudine compressæ, lato & anguloso dorso, uentre autem in aciem attenuato, in quibus semina sunt pisus mediocribus æqualia, angulosa, & in aciem obtusam desinentia, colore candida, & gustu pisus similia. Radice nititur parua, candida, fibrata, tuberculis plerumque exiguis plena: seritur aliorum leguminum modo.

* Weyssé Bechern. Alius est phascolus sponte sua stans, quem Colonia uidi.

DE PHALARIDE. CAP. XLV.

T. 2. 35. p. 669.



PHALARIS culmos tres aut quatuor erigit cubitales, & nonnunquam proceriores, geniculatos, Zeæ aut olyræ culmis non dissimiles, folia è geniculis singula exeunt, dodratalia, semuncie latitudine in mucronem fastigiata, parua arundini aut tritico similia: ex iisdem geniculis singuli etiam culmi ramorum uice ascendunt, foliis amplexi, spicas desinente uere summis culmis & adnatis singulas rectasque è foliorum inuolucris protrudit, unciales aut sesquiunciales, digitalicrassitudine, teretes, in summitate turbinatas, breuib, latiusculis, candicantibus & uiridibus lineis distinctis aristis, ueluti squamis compactas: è quibus flores exigui, pallidi staminibus aut tritici floribus similes se proferunt, semen inter squamos fert, milio non dissimile candicans, splendidum, oblongum, & in mucronem acuminatum, gustu milio non dissimile. Radice nititur multifida & fibrata. Culmi & folia graminis aut arundinis, siue aliorum frumentaceorum modo aqueam dulcedinem gustu præ se ferunt. Seritur à quibusdam, ut aliæ fruges, estque estiuum frumentum.

DE ASPARAGO. CAP. XLVI.

ASPARAGUS caules emittit primo uere teneros, longos, teretes, uirides,

T

glabros & sine foliis ab uno cespite plures, qui paulatim in numerosos, tenues & lentos diuiduntur ramos & uirgas, & circa has foliola frequentia, uncia longitudine, indiuidua & capillorum aut setarum modo tenuia: tota itaq; herba cum foeniculo aliquam in foliis similitudinem habet, & duum cubitorum altitudinem petit. Flores sole in geminos transeunte circa ramulos copiosos, paruos, et pallidos producit, & post eos baccas pili quantitate, rotundas, rubentesq;, intus carne sua duo aut tria nigra & corneae soliditatis semina claudentes. Radicibus nititur perennibus, numerosis, ab uno transuerso, & propter caulium uestigia, aspero, uillosoq; dorso, utrinque in obliquum descendantibus, longis, teretibus, lentis, foris cineraceis, intus autem candidis, quibus dulcis & glutinosus est sapor: coliculi item adhuc teneri admodum suauem saporem habent, sic ipsa etiam semina. Nascitur campestribus tam editis quam planis locis, quamuis etiam seratur.

Asparagus. T. 1. 74. p. 222.

Althaea. T. 1. 121. p. 371.



DE ALTHAEA, seu Malua palustri.

CAP. XLVII.

ALTHAEA quæ palustris malua est, caules erigit plerumq; bicubitales minimi digiti crassitudine, teretes, lanuginosos & solidos, foliis oblongo pediculo insidentibus ex intervallo usq; ad summitatem uestitos, ex rotundo in angulos exeuntibus per ambitum serratis, quatuor unciarum aut digitorum latitudine, tactu mollibus, breui & densa, & ueluti detonsa lanugine, holoserico similibus. Ramulos

mulos ē singulis foliorum alis profert similiter foliatis, flores in summis uirgis & ramulis emittit candidos, sole in cancro existente, syluestrium rosarum figura, paulo minores tamen, quinque uncialibus foliolis constantes, in quorum medio paruum est nucamentum, iulo simile, colore rubescens, semen habet latum, paruum, in orbē centro cuidam circumpositum, quod cortice detracto nigricat. Radicibus nititur diuturnis, ab uno trunco descendantibus, cubitalibus, pollicis aut digiti crassitudine, foris subpallidis, intus autem candidis: substantia & gustu neruosis, lentis, glutinosi, dulcibus & mucilaginosi, aquam coagulantibus, tota herba easdem habet qualitates. Nascitur pinguibus, uliginosis, humentibus & palustribus pratis, & in fossis.

DE PHV maiore, [hortensi.]

CAP. XLVIII.

T. 1. 19. p. 60.



PHV maius caules emittit bicubitales, minimi digiti crassitudine, ternos, glabros, concauos, geniculatos, & ueluti candicante polline conspersos. habent adnata etiam caules, eaq; bina in singulis geniculis. flores astate in caulium & ramulorum summitate exiguos, in purpurea candicantes, corymbis latis & umbellis similibus, insidentes habet: & post eos semina exigua, quibus lanuginosum, & pappis simile quiddam adheret. folia a terra circa caulium pedes multa emittit mollia, glabraq; sex aut octo unciarum longitudine, latitudine autem trium digitorum, longis, teneris & canaliculatis pediculis insidentia: ea partim incisuris carent, partim uero in pinnas profundius secta sunt. Radicibus nititur longis, perennibus, in latitudinem se propagantibus, crebro propter foliorum

uestigia geniculatis, digiti crassitudine, colore caesiis, transuersis, & in superficie terrae inhaerentibus: a quibus longae, teretes & iuncinae fibrae in rectum & obliquum descendunt, gustu amaris & subacris, odore uero admodum medicato, & Nardii Indici aut Celticae similibus, aliquantulum tamen uirosioribus: nobis colitur in hortis.

T ij



HELLEBORUS niger qui apud nos gignitur, ab uno radicis cespite, numerosos emittit pediculos, longitudine dodrantales, aut pedales, iunco crassiores, glabros, in tereti alioquantulum canaliculatos et ab imo rubentes, & nigricantibus maculis uariatos, in quorum summitate ex uno principio in latitudinem se pandunt folia, quinque aut sex unciarum longitudine, latitudine uncie aut sesquialterius unciae utroque capite mucronata, per ambitum asperis et aculeatis incisuris, serrata, tactu rigida, inferius in uiridi nigricantia, superius autem nigra, ex his quaedam minora sunt, & tria aut quatuor sibi coniunguntur, iuxta utrumque canalis latus quo pediculi fulcantur. Profert etiam coliculos foliorum pediculis aequales: in quorum summitate flores sunt hyeme usque ad ueris initium quatuor aut quinque, pallidis

in uiridi foliis: & pollicis ungui aequalibus constantes, plerumque pronos: e quorum medio capitulum angulosum, cornutum, & ueluti siliculis congestum exeritur, alioquot oblongis & nigris seminibus onusta. Radicibus nititur perennibus, crassis & nigris, a quibus plurimae quoquo uersus emittuntur longae, teretes, iuncea & nigrae fibrae, odore dum eruuntur admodum graui, ac sambuco non dissimili, sapore uiae montibus, saxoso & tamen pingui solo: In Misnia uero & Turingia, Hetsia, Saxonia, & pluribus aliis Germaniae prouinciis, in hortis colitur.

DE ARO.

CAP. L.

ARON primo uere inuolucrum modo conuoluta in mucronem emittit folia: ea se paulatim expandunt, & hederaceorum formam asciscunt, hisce tamen multo maiora fiunt, nam in dodrantalem plerumque longitudinem excrescunt, & in acutiuscedunt, quibusdam etiam in locis purpureis maculis distinguuntur. Ab eo tempore aliud quoque emittit inuolucrum, breui coliculo insidens & erectum, quod sole ad gemi.

ad geminos properanti aperitur, in leporinæ aut asininæ auriculæ formam, intusq; pistillo culinario simile quiddam ostendit, minimi digiti longitudine, idq; erectum & colore in purpura liuidum aut cinereum, purpureo cuidam & aspero tuberculo innitens, sub quo aliud quoddam tuberculum est prædicto æquale, sed colore pallidum. hoc flaccescit superiori tuberculo atq; pistillo, in iuglandis magnitudinem increfcit, & uua rubentis figuram acquirit, singulisq; acinis unum atq; alterum semen continet, eruo paulo minus: hoc instante æstiuo solstitio perficitur, inueniturq; tum temporis sine foliis coliculo, nitens uua: quæ postq; defluerit, absconditur tota herba. Radice nititur bulbosa, diuturna, pollicis anteriori articulo æquali, candida, teneraq; quæ enascente herba flaccescit, post maturitatem uero arefcite increfcit & tumida fit: multosq; oculos seu tubercula emittit, quibus se propagat. Odorem omnes herbae partes grauem spirant: sapore uero adeo acri, linguam & palatum pungunt, ut carduorum & spinarum aculeos elitare se gustantes credant. Nasctur umbrosis, antiquis syluis & uetustis, umbrosisq; urbium & castrorum fossis, ac iuxta sepes: Seritur a quibusdam etiam in hortis.

Aron. T. 2. 80. p. 774.

Perfoliata. T. 1. 162. p. 482.



DE PERFOLIATA. CAP. LI.

PERFOLIATA hæc herba dicitur, quoniam caulis per ipsa folia crescit. Singularem emittit caulem cubito longiorem, gracilem, teretem, rubentem, concauū,

T iii

& tamen solidum ex intervallo foliis singulis eleganter uestitum, per quæ traiectus esse caulis uidetur, non omnino per medium, sed eo loco ubi omnes eorum uenæ ueluti in centro coeunt, habent folia duarum aut trium unciarum longitudinem, præsertim quæ caulem amplectuntur, nam quæ in ramulis sunt iis magnitudine cedunt, omnia tamen subrotunda, modicè turbinata & glabra existunt, inferius autem iuxta terram nulla cauli circumfunduntur, ex omnibus geniculis ramuli exeunt graciles, similiter foliati, eo positi semper seruato, ut ab ima parte foliorum unicus caulis aut ramulus sit, & quamprimum uero caulis aut ramulus folia transferit, in furcam diuidatur, hic ordo usque ad summam continuatur, in qua plures corymbi sunt, foliis exiguis & in exortu simul coniunctis pediculis insidentibus congesti: in quorum medio, semen paruum, oblongum, angulosum, cartilaginofum, liuidum, numerosum, nudumque continetur, id flores non habet, præter aliquantulum luteæ cuiusdam lanuginis, nascenti insidentis. Radice nititur candida, tenui, fibrata, lignosa & anua, ideoque inutili, semen gustu subamarum, acreque est, & tenuitate sua saluam elicit, folia autem remissiore habent saporem. Nascitur editis & pinguibus aruis, ut Eymbecci & in Hesiæ quibusdam aruis, ac alibi etiam, quinetiam à quibusdam in hortis feritur;

DE TITHYMALLO pentaclono, [communi puto, radicè
inutili.] CAP. LII.

TITHYMALLVS pentaclonus ab uno radice cespitè plures emittit caules, pede plerumque proceriores, iunci modo graciles, teretes & glabros. foliis glabris duarum & nonnunquam trium unciarum longitudine, digitique latitudine, ac incerto ordine dispositis, uestitos. hi ex summitatis capite ueluti ex centro quinos proferunt furculos, longitudine digitales, admodum graciles & teretes, sub quibus singula sunt folia inferioribus æqualia. Omnes furculi superius in binos, exiguos furculos, furcarum modo diuiduntur: singulisque furculis bina subsunt folia, prioribus multo minora, longitudine unciali, digiti latitudine, & in mucronem desinētia. furculi autem extremi furcarum semel atque iterum ex intervallo binis amplectuntur foliis, sibi in exortu contrariis, proxime descriptis similibus, minoribus tantum. Flores qui propriè sic appellantur non habet, quemadmodum ferè omnes Tithymalli: sed singulos fructus in singulis furculorum eruptionibus, & iuxta foliorum furculos amplectentium principia, magnitudine seminis uiciæ, figura triquetros, obtusis tamen angulis: aliquantulum hirsutos, in tria loculamenta diuisos: quæ singula continent semina milii aut panico æqualia, foris nigro cortice, intus autem candida, pingui nucleo, gustu dulci: ea in maturitate apertis repente loculamentis prosiunt: furculi alios caules etiam proferunt, è foliorum sinu, sub quinquepartito capite, simili fructu præghantes, uerum inæqualiter dispositos. Radicibus nititur perennibus, ab uno principio numerosis (maximè pingui, culto, necherbofo loco) transuersis, non in altum descendentibus, tortuosis, minimo digito aliquanto gracilioribus, carnosiss, in candido flauis, multos rubentēque asparagos emittentibus, ex quibus sequenti anno germina prodibunt. fibras demittunt radices numerosas, quibus herba nutritur, maiores enim radices caulium tantum ferendorum causa natae sunt, abundat tota herba lacteo liquore: & gustu ac reliquis qualitatibus, cæteris Tithymallis responder. Nascitur frutetosus locis.

DE DAVCO angulofolius. CAP. LIII.

DAVCVS angulosus dum è semine nascitur, primo anno caulem non fert, sed folia undique circa radice caput per terram strata, ea ratione, ut multa folia singula constituent, pedalibus enim et canaliculatis pediculis utrinque apposita sunt, duarum unciarum longitudine, folia ab utroque latere profundius usque ad suum quodque

que pediculum in partes per ambitum serratas dissecta: ex his maxima sunt, quæ posteriori pediculorum parte exeunt: minima uerò, quæ anteriore. Caulem altero & nonnunquam tertio anno erigit tripedalem, minimo digito graciliorem, angulosum, & iuxta terram ferè triquetrum, nisi plures intercederent minores anguli, foliis & geniculis præcinctum. folia è geniculis se proferunt inferioribus similia, breuiori tamen pediculo: & ex horum alis pedales, ac plerumq; indiuidui ramuli, angulis striati: in quorum cacumine æstate singulæ sunt umbellæ, forma conuexæ, densæ & candidis, minimisq; floribus farctæ, melleo liquore ueluti conspersæ, quibus odor est lixiuii aut saponis, siue mellis calce mixti. semen * Radice nititur diuturna pedali, pollicis aut digiti crassitudine, candida, circa caput propter amissorum foliorum uestigia & neruos pilosa & uillosa: in crassiores fibras distracta, per quam lignosus descendit neruus. ea gustu acris est, saliuam prouocat, diuq; feruorem in gustantis palato relinquit: folia acrimoniæ mixtam quoq; amaritudinem habent. Semen uerò * Nascitur asperis & editis locis: copiosissimaq; lenæ, in uincarum incultis calculosisq; partibus: & Vuitembergæ in tumulis quibusdam sabulosis, quæ ex urbæ uersus septentrionem itur.

* Querendum numquid cum Oroselino, hoc est, Apio montano, commune habeat hæc herba.

DE IXOPO. [Intybacea herba, cui nomen à liquore, quem Greci oponuocant, quem ixi, id est, uisci instar uiscosum habet, confinxit.] CAP. LIIII.

IXOPOS intybacea herba est. ea numerosa emittit à radicis capite folia, longitudine dodrantali, latitudine unciali, acuminata, & undiq; per terram strata, paratim etiam in obliquum erecta: è quorum medio unus atq; alter, aut nonnunquam plures exeunt dodrantales, & interdum pedales coliculi, teretes, teneriq; in quorum cacumine, circa ueris medium singuli sunt orbiculati flores, multis luteis capillamentis uni calici insidentibus constantes: qui deinde in pappos resoluti auolant, unâ cum oblongo & inferius annexo semine. Radice nititur perenni, pedali, duum digitorum crassitudine, foris nigra, intus candida, carnosa & fungosa: quæ præcisa, copiosum emittit liquorem, colore in lacteo modicè cinereum, qui digitis tractatus, aut gustatus, substantia uisco similis fit, & in longum ductilis, siccatu uerò ruffescit, paulatimq; nigrescit. Tota herba gustu dulcis est, chondrillæ prioris modo. lixquor non ignauiter etiam adstringit, odore uerò nullo commendatur. Nascitur editis, apricis, montanis locis. terram amat pinguem, calcario lapide mixtam plurimo, ideo prouenit circa lenam.

* Vidimus nos similem herbam in solo argilloso ad pedem montis. folijs ferè plantaginis minoris: radice ciliatâ arida suffitur, iuniperum ferè olente, etc.

DE THAMECNEMO. CAP. LV.

THAMECNEMUM caulem habet pedalem, teretem, glabrum, solidum, singularem, inferius tumidis geniculis binum digitorum interuallo interceptum, in summitate crebris surculis, usq; bifidis & trifidis, atq; è geniculis prodestitibus, ramosum. folia è singulis geniculis exeunt bina, pingua & glabra, in uiridi cœrulea, longitudine digitali, latitudine uerò unciali. flores æstatis initio fert in summis surculis paruos, quinquefolios, colore puniceos, nunq; omnino se aperientes, sed semiclauiis similes, tumido, molli & quinqueangulari calici insidentes, quo detracto, capitulum emicat nuce auellana minus. hoc cum maturuit, in quatuor plerumq; partes dehiscit, & rotunda nigraq; semina ostendit milio paulò maiora. Radice nititur parua, annua & inutili, folia gustu subamara sunt & brassicæ saporem referunt. Nascitur in aruis, solum amat pingue, album, & marga stercoreatum, quare Hamelanum est in Angrinariis.

* Videtur ad polemonij uel persiliatæ species pertinere. Græce lingue peritus fortè Thamoocnemum potius dixerit, siue à θάμνῃ, siue à θάμνῃ, quod est creber.

T iiii

Thamecneum.

Lavandula maior. T. 1. 18. p. 58.



DE LAVANDULA maiore, [quam spicam nardi vulgus nominat: Dodonæus
Lavandulam marem] CAP. LVI.

LAVANDula maior frutex est cubitalis plerumq; æ breui & scabro caudice in quâ cubitales, iunco graciliores, quadrangulares, aliquantulum hirtas & striatas: geniculis longo intervallo interceptos: è singulis geniculis folia prodeunt duarum unciarum longitudine, tenuia, angusta & hirta. flores summis uirgis fert paruos, hiantes & purpureos, in gracili & digitali longitudine spica dispositos, angustis, striatis: quæ caliculis insidentes, quibus exigua, nigra & splendentia semina succedunt, uirgines sunt, & tota hyeme folijs cinerei coloris uestiuntur. Radice nititur lignea & tum palatum penetrantem, odorem quoq; uehementem, acrem, tenuem & iucundum: eadem substantia constant, pingui, idèq; copiosum oleum, uulgo spicæ oleum appellatum, in sublimatione remittunt. Colitur apud nos in hortis, in Narbonensi autem Gallia sponte provenit tanta copia, ut non temerè alia materia accendendo igni adhibeatur.

De

DE LAVENDULA minore, [quam uulgò simpliciter Lauendulam nominant. Dodonæus
Lauendulam seeminam.] CAP. LVII.

LAUENDULA minor maiori in cunctis similis est, minoribus tamen furculis & foliis, breuioribusq; spicis constat, odore quoq; & sapore remissiori, olfactum recreat, non enim adeò gravem odorem spirat, minusq; pinguis existit. Colitur & hæc in hortis.

Lauendula minor. T. 1. 18. p. 37.

Stichas. T. 1. 76. p. 213.



DE STICHAE Arabica.

CAP. LVIII.

STICHAS quæ hodie Arabica stichas appellatur, mediam habet inter maiorem & minorem Lauendulam figuram, spica tantum crassiore & multò densiore constat. flores alioquin Lauendulae forma & colore similes fert maiores tamen; odore & sapore maiorem Lauendulam æmulatur, sed multum superat, uehementissimū enim & aromaticum odorem spirat, substantia quoq; non minus pingui constat ac illa, in Germania semine fata pullulat quidem, primāq; æstate foeliciter adolefcit, hyemem tamen nequaquam tolerat, quapropter eo tempore intra tectum ferenda est, & tepida nec obnoxia gelu camera fouenda. Cellariis humidioribus seruata, contrahit situm & perit, ideo tutissime prædicto loco seruatur. In Narbonensis autem Gallia

V

quibusdam locis sponte cum Lauendula nascitur, praesertim in Malsiliensi provincia.

* Nostra Spica & Lauandula sunt sylvestres species stechadis, maiores lignosiores, odore & gustu ignaviores.

T. 2. 106. p. 847.



DE DIPSACO sylvestri. CAP. LIX.

DIPSACUS aculeata est herba, ex car-
duaceo genere, primo anno cum e se-
mine aut sponte enata fuerit caulem non
fert, sed tantum folia, longitudine dodran-
talia, latitudinae trium digitorum, nonnun-
quam etiam maiora, aspera, rugosa & supe-
rius aculeis armata, undique in orbem a radi-
cis capite strata, & in terra iacentia, totaque
hyeme uirentia: e quorum medio sequenti
anno caulis assurgit rectus, bicubitalis, mi-
nimi digiti crassitudine, teres, glaber, inter-
imque angulis striatus, maxime in summitate
te tactu solidus, intus tamen aliquantum con-
cavus, colore cadicans, geniculatus et spi-
nis Raie piscis modo armatus, praesertim in
summis uirgis. folia e singulis geniculis bi-
na exeunt, praedictis plerumque longiora &
magis acuminata, nullis in superficie spinis
horrida, nam aculeos tantum in eminenti
dorso ferunt Luciorum dentibus similes. ex
his aliquot quae a duobus aut tribus inferis
oribus geniculis prodeunt, non ab inuicem
discreta sunt sed continua iuxta exortum, &
concauo sinu ueluti labro quodam cau-
lem amplectuntur, quo rores & pluuiales
aquae etiam siccis diebus aliquando conti-
nentur. supra haec foliorum labra ramuli ex-
eunt, e singulis geniculis bini, alterno & cru-
ciformi positi, caulis modo geniculati &

aculeati, in quorum summitate singula sunt oblonga & ovata capita, longitudine di-
gitali, et latitudine duarum unciarum aut trium digitorum, aculeis longis, angustis,
mollibus & obliquo ordine dispositis constantia: sub his ubi ramulis insident, in or-
bem se proferunt, ueluti longi quidam radii, resupinati & inferius aculeati, flores in
ter aculeos capita proferunt aestate paruos, in ruffo purpureos, lanuginosis & par-
tis intus oblongam habent concavitatem, lanuginosa quadam medulla plenam: in
caput. Radice nititur fere dodrantali, digiti crassitudine, candida & fibrata, primo
anno carnosa, altero uero lignosa, & postquam exaruerit caulis, intereunte. folia gu-
stu amara sunt, quemadmodum & radix. Nascitur campestribus, planis locis, circa
fossas & riuulos.

De

DE DIPSACO satiuo: [cuius capitum aculei deorsum inflexi sunt: aliud ferè nihil differt à superiore.] CAP. LX.

DIPSACUS satiuus sylvestri per omnia ferè similis est, maioribus tamen omnibus partibus constat, nec quicquam etiam differt partium positu aliisque proprietatibus, præterquam quod capitum aculei duriores, & deorsum inflexi sunt: floresque candidiores ferat. Capitibus in uellicando panno fullones utuntur, cuius rei causa, in hortis seritur, uiribus sylvestri responder, quamuis paulò debilioribus.

DE PEPLO, [quem aliqui Esulam rotundam uocant, folijs non serratis, etc. autumno locis cultis diu apparet, sub hyemis etiam initium.] CAP. LXI.



PEPLVS Tithymalli species est semestris, eadem enim æstate qua ex femine prodierit, interit, sparsoque semine se quotannis propagat. Caulem unum atque alterum statim à terra emittit iunco crassiorem, teretem, glabrum, subrubentem, & solidum, aliquot ab ima parte adnatis inequali et incerto ordine dispositis frondosum, in tres ramulos diuisum, quorum singuli deinde in binas, quinque, sexies, aut sæpius circa exortum coeuntibus, subdiuiduntur. folia sub singulis furcis & geniculis prodeunt bina, contrario positu Rutæ latifolia & hyperici folijs similia & æqualia. Sub trifidis autem ramulis terna sunt folia. ex his rotundiora sunt ac iuxta annexum angustiora, quæ ab inferioribus anomalis adnatis incerto ordine exeunt, in extremarum furcularum angulis exiguum & hirsutum quiddam floris loco conspicitur, secus quod exigui sunt & triquetri folliculi in terram annuentes, in singulis furcularum angulis singuli, quibus terra clauduntur semina papaueri æquale, foris nigrum, intus autem candidum, inferiores furculæ primò semen ferunt, deinde superiores ideoque successiue, fructificat tota æstate semineque maturum ei aculatur, & propter diffusos ramulos huius frequenter sternitur. Radice nititur gracili, breui, candida, multis capillamentis fibrata, lignosa & inutili. Abundantia

muli & folia lacteo liquore, primum subdulci, interimque modicè acri, deinde paulatim fauces exurente, semen dulcius est, sed similiter gustantis os accendit. Nascitur in hortis & uincis.

DE PARIETARIA, [uulgò dicta, Helxine ueterum.] CAP. LXII.

PARIETARIA caules ab uno cespite plures emittit cubito proceriores, teretes, uirides & solidos, ab inferiori parte ultra medium usque ramosos, ex quibus per

interualla exeunt singula folia, oblonga, duarum unciarum aut digitorum latitudi-
ne, in summis uirgis minora, in oblongum mucronem fastigiata, & iuxta pediculum
similiter ferè acuminata, tactu aspera, hirsuta & strepentina, secus quæ parua et aspe-
ra quædam sunt, & numerosa ueluti lappæ, uerticillorum Marrubii modo cauli-
bus circumposita, uestibus tenaciter adherentes, candicantibus flosculis plena,
adeò paruis ut uisum ferè subterfugiant, iisdemq; antequam aperiantur rubentibus.
femina lap- pis continentur, admodum parua, nigra & splendentia. Radicibus niti-
tis carnofo, molliq; cortice uestitis, intus autem lignosis & fibratis, facileq; dum ma-
& aqueum. Caules uerò aliquantulum cum aqueo sapore amarescunt. Radices po-
gant. Nascitur circa macerías, parietes & muros, in tectorum stillicidiis.

Parietaria. T. 1. 63. p. 193.

Botrys. T. 2. 124. p. 887.



DE BOTRY.

CAP. LXIII.

BOTRYS, quæ etiam Ambrosia appellatur, æstiuæ herba est. Caulem erigis-
simo teretè, multis alis & ramis fruticosum. folia habet inferius sub ramulis singula
digito longiora, duorum digitorum aut unciarum latitudine, per ambitum Cicho-
rii, quercus

rii, quercus & Erucae modo laciniata & sinuosa, aliquantulum hirsuta, à tergo, id est, subtus erassa, eminente, fragiliq; spina, & uenis ad lacinias prodeuntibus distincta, ac colore in pallidum uergentia, superius uerò uiridiora, & concavis canaliculis infra eminentibus contrariis, sulcata, quæ autem ramulis breui interuallo adnascuntur folia prædictis multo minora sunt, æstate totis ramulis secus folia adnascuntur, in latitudinem diffusi. racemi admodum parui, parietariæ lappulis non dissimiles, præterquam quod uirgas non amplectantur, sed ab iis ad latera extendantur. Flores qui propriè sic appellari possint non habet, paruum enim & quæ uix cognosci possit in racemis fert lanuginem colore candicantem, figura parietariæ flosculis respondentem, semen in racemulis fert papaueri minus. Radice nititur semestri, breui, fibrata, lignosa & inuili. Saporem racemi amarum habent, quibus maturescenibus, folia pallescunt & decidunt. Odorem tota herba admodum iucundum & uinosum spirat. Seritur apud nos in hortis.

DE ABROTONO nigro masculino. CAP. LXIII.

T. 1. m. p. 41.



ABROTONUM nigrum seu masculum frutex est odoratus, uirgas ab uno radice trunco, profert numerosas et lignosas; à quibus plures erigit cubitales & graciles turculos, capillatis, angustis, incis, & in latitudinem diffusis foliis plenos, flores & semina æstate circa surculos numerosos fert, colore ad aurum inclinantes, figura absynthii floribus & seminibus respondentes, quamuis in plurimis Germaniæ regionibus neque flores neq; semen producat, propter aliosam naturā, & nostratis cœli frigiditatem. Radice nititur lignosa & ramosa, folia & summas surculorum partes hyeme amittit. Odorem habent comæcius uehementer acrem, & aliquantulum grauem, saporem uerò amarum, tenui & palatum penetranti acrimoniæ mixtum. Colitur apud nos in hortis.

DE ABROTONO candido seu semina. [Aliqui pro Abrotono semina Chamecyparissum pingunt.] CAP. LXV.

ABROTONUM candidum surculos, nigro Abrotono similes producit, similibusq; foliis, floribus et seminibus uestitos, præterquam quod folia non ita tenuia sint, sed aliquam habeant cum Achilleæ foliis similitudinem eadem superius nigro Abrotono candidiora sunt, inferius autem multo candidiora & cinerea, surculos hyeme omnino amittit. Radicibus nititur perennibus, gracilibus & fibratis, plurimas quoque uersus sub terræ superficie uiticulas spargens, quibus se quotannis cum scenore propagat, ideoq; non unus atq; alter surculus solus inuenitur, sed integra sylua simul: saporem & odorem nigro Abrotono ferè similem habet, remissiorem tamen. Nascitur editis campis.

V iii

Abrotonum candidum.

Hyssopus sativa. T. 1. 14. p. 47.



DE HYSSOPO sativa.

CAP. LXXVI.

HYSSOPUS sativa caudicem habet in ramos diuisum, à quibus lignosae, geniculatae, quadrangulares & cubitales assurgunt uirgae. è quorum geniculis bini & circa exortum coniuncti prodeunt furculi alterno & cruciformi positi: folia sub iisdem furculis è geniculis exeunt quaterna, bina aut plura, longitudine uncia-
 lia, angusta & utrinque acuminata, glabra & ueluti acu puncta, non tamen perforata: in summis furculis parui & denticulati calices exiguos corymbos constituunt, in spi-
 ca dispositos, flores æstate à caliculis singuli prodeunt hiantes, qui plerumque stami-
 na exerentes, colore in purpura coeruleos & omnino saluiae floribus similes, mino-
 res tamen, semina flores singuli ut plurimum quaterna relinquunt, nigra & admo-
 dum parua, hyeme summas uirgas amittit saluis inferioribus. Radice nititur ligno-
 sa & perenni. Odores coma eius acrem, aromaticum & iucundum spirat, saporem
 habet amarum, feruidum & tenuitate sua totum palatum penetrantem. Colitur in
 hortis, prouenit etiam in murorum coronis.

De

DE CEPA ouata, Equam sic nominat à radicis figura. 1. CAP. LXVII.

CEPA ouata prima æstate qua seritur folia uulgaris simili profert. Altero uero anno cum rursus deponitur quatuor aut quinque emittit caules, uulgaris similes: in quorum summitate globosa sunt capitula, & in his flores & semina nostrati æqualia. ipsa uero Cepa à nostrati differt, quod longa & utrinque acuminata est: minus etiam inflat quam uulgaris Cepa.

* Alia est quam Ascaloniam nonnulli cognominant, utpote sterilis.

DE THLASPI Cardamoide. CAP. LXVIII.

T. 1. 27. p. 87.



THLASPICardamoides siue nasturtium, folia habet modicè pinguia, digitali longitudine & latitudine aliquantulum serrata, ex his aliquot profundius sunt incisa, omnia per terram undiq; sternuntur. Caulem è medio foliorum singularem erigit, pede proceriorem, teretem et leniter hirsutum, brevioribus foliis uestitum, in summitate in ramulos furculaceos diuisum: quibus enascentibus folia quæ circa terram sunt exarescunt: flores habet exiguos, candidos & numerosos, undiq; ramulis circumpositos, eosq; non simul, sed particulatim & tantum in summitate producit, semen habet copiosum, totis ramulis adnascens in singulis pericarpis, iisq; inferioribus conuexis, superius aliquantulum concauis & compressis, geminum, figura & quantitate nasturtii, colore rufum, totum pericarpium conuexi alicuius clypeoli formam refert, & utrinq; eminenti semine aliquam cordis speciem ostendit. Radice nititur semestri, oblonga, gracili, candida, lignosa & inutili, folia gustu uehementer acrisunt, & nasturtium æmulantur, semina autem glutinosum lentorem acrimoniæ commixtum habent. Nascitur lutosis & pinguibus aruis, secus uias inter segetes, copiosissimumq; inter Goslarium & Hildesheimium in Saxonia.

DE ISOPHYLLO. CAP. LXIX.

ISOPHYLLON quamuis umbellifera sit herba suum habet proprium genus neq; enim incisis constat foliis, sed indiuiduis & æqualibus. Caules ab una radice emittit duos tres aut quatuor bicubitales ferè ut plurimum crebro geniculatos, graciles, teretes, glabros & uirides, folia è geniculis singula profert quatuor aut quinque unciarum longitudine, unius uncie aut digiti latitudine, uiridia, glabra & uenosa, minimè incisa, ac sine pediculo geniculis adnascencia, quæ tamen iuxta ter-

V iiii

Isophyllon. T. 1. 143. p. 431.



ram sunt, folia antequam caules adoleſcant latiora ſunt, quæ uerò in ſummitate prodeunt, multò minora prædictis exiſtunt. Ramulos à geniculis producit longos, in quorum ſummitate exiguæ ſunt umbellæ, paruis & luteis floſculis plenæ, quibus ſemina ſuccedunt, perfoliatæ ſimilia. Radice nititur perenni, candicante, gracili & in partes diſtracta, lignoſo intus neruo. Saporem habet tota herba ſubacrem, aliquantulum amarum, & ſaliuam prouocantem, perfoliatæ non diſſimilem. Naſcitur montanis locis, ſolum amat argillaceum, calcario lapidi mixtum.

* Geyl aller welt. Pontanus Elaphuſcum uocat ex Gallia.

DE GERANIO ſupino maiore, [folijs frè cicuta, locis cultis naſcitur, etc. Videtur autem cognatum Geranio primo Dioſcoridis.] CAP. LXX.

GERANium ſupinum maius, uiticulas ab una radice emittit plures, plerumque cubitales aut maiores, (niſi ſolis ſiccitas impediat,) geniculatas, hirsutas & molles, undique per terram ſtratas. folia habet longiora quam uncia, profundius incifa et ferrata, cicutæ folijs non diſſimilia, modicè hirsuta, dodrantalibus aut breuioribus pediculis utrinque adnaſcentia, non tamen in exortu coniuncta. Flores tota æſtate fert in longis & gracilibus pediculis, ab uno principio prodeuntes, paruos, quinqueſolios, colore puniceos, numero quinque ſex aut ſeptem, quibus totidem roſtrata ſuccedunt & reſupina capitula, quorum roſtra acubus æqualia ſunt, ea in maturitate inferius in quinque partes dehifcunt, et contrahuntur, ſingulisque partibus ſingula adhærent ſemina, oblonga, flaua & lanuginofa. Radice nititur oblonga, gracili, in partes diſtracta, candida, & ſemestri: quæ aliquantulum foetet, Saporem habet tota herba aqueum ferè. Naſcitur cultis agris & hortis, & minime in campis aut herbofis locis.

DE VERTICA minore. CAP. LXXI.

VERTICA minor caulem pedalem aut proceriorem erigit, aliquantulum ſtriatum, & aculeatum, folia ex intervallo profert bina, breuibz quidem, ſed ad pungendum & urendum infeſtis ſpinulis armata, unciarum ſerè duarum longitudine, latitudine unius, utrinque acuminata, per ambitum profundius ferræ modo incifa, in exortu contrariis pediculis coeuntia, ſecus que quaterni ſunt in ſingulis geniculis, ueluti exigui racemuli, minimos floſculos proferentes, parietariæ floribus, ſi gura, colore & quantitate æquales, quibus ſuccedunt nigra ſemina lino ſimilia, multò tamen minora. Profert etiam adnata è foliorum alis ſingula ſimilibz folijs & racemulæ uestita. Radice nititur breui, gracili, candida, ſemestri & inutili. Odorem habet dum tractatur grauem, guſtuque dulcis eſt, præſertim ſemen, corpori admota uehementer.

mentissime urit, mirumque est tam parvis aculeis adeo feruidam inesse naturam, ut ignis modo dolorem & pustulas excitent. Nascitur in hortorum areis, fossis, rudibus & areis circa pagos.

* Beyser Vessel.

Urtica minor. T. 1. 1. p. 3. maior ibi male legitur, pro minor.

Chamaepitys prima. T. 1. 25. p. 80.



DE CHAMAEPITYS prima. [Aliqui tertiam hanc faciunt.] CAP. LXXII

CHAMAEPITYS prima ab uno radice capite plures emittit coliculos, longitudine dodrantes, nonnunquam etiam pedales, graciles, teretes, rubentes, hirsutos & solidos, foliis undique plenos, ea breui admodum interuallo, cruciformi & alterno positu à coliculis exeunt, & singulis geniculis bina in exortu coniuncta, ab uno principio internas unciales, angustas, hirsutas et minimè serratas partes diuisa: flores in foliorum alis singulos habet, Polii, Scordii aut Chamædryos floribus similes & equales, colore luteos, floret paulatim ab imis geniculis incipiens, quapropter per totam æstatem flores producit: his singulis quaterna succedunt, parua, oblonga & teretia, semina florum caliculis insidentia. Radice nititur oblonga, candida, semestri & inutili. Herba odorem spirat aliquantulum grauem, resiniferis arboribus non dissimilem, quarum comas forma etiam æmulatur, unde nomen inuenit. Saporem habet amarum. Nascitur in uineis & aruis, plurimumque circa Vuirzburgum, in Boiohemia, & Renano tractu, solum amat aliquantulum pingue & calida loca.

X

T. 1. 78. p. 237.



ces prominent, flores singuli ultra diem non durant, quibus excidentibus calix ipsorum radiatus clauditur, & incrementum capescit, fouetq; in se quaterna (ut plurimum) aut pauciora semina, oblonga, aspera, serpentinis capitibus aliquantulum similia, inferius ueluti angustum collum habentia, ea cum foris nigrum colorem in maturitate contraxerint, apertis denuo calicibus excidunt, & sequenti uere germinant. Radice nititur crassa, breui, candida, carnosae & semestri, nigris do drantalibus fibris nutrimentum attrahente. Saporem habet tota herba dulcem & suauem. Nascitur in hortis, semel autem sata difficulter deletur.

DE ALTERA Buglossa urbana.

CAP. LXXIII.

EST & alia urbana Buglossa siue Borrage, quae solo florum colore à priore differt, omnino enim candidos fert flores.

De

DE HERACLEA [Sideritidem hanc primam faciunt, aliqui Tetrabit aut
herbam Iudaicam nuncupant.] CAP. LXXXV.

HERACLEA, quæ etiam Sideritis Heraclea uocatur, caulem habet dodrantalem, gracilem, quadrangularem & hirsutum, in binos ex interuallo ramulos, alternis & contrariis lateribus exeuntes, ex interuallo distractum. folia statim à terra usque ad summam fert breui interstitio, chamædryos quantitate, profundius & pulchrius ex obliquo incisa, minora & paucioribus incisuris diuisa quo summitati propiora; hæc è singulis geniculis bina alternis lateribus & cruciformi positu prodeunt. flores æstate paruos secus folia, ternos, quaternos aut nonnunquam plures fert, uiridibus, resupinatis & denticulatis caliculis insidentes, scordij aut chamædryos floribus, figura & rubente colore similes, quibus deciditibus demittuntur eorum caliculi, seminaque in se gignunt, exiguum, nigrum, scordio aut Chamædryi æquale. Radice nititur breui, fibrata, candida, annua & inutili; semen cum æstate ceciderit autumnii initio germinat, folia tantum proferens, ea proximo uere enato caule derit autumnii initio germinat, folia tantum proferens, ea proximo uere enato caule flaccescunt; saporem habet amarum, odorem uero acrem, grauem, ueluti si quis uinum & lupulum commisceat. Nascitur in uineis, & earum muris, caluicij apicis & editis locis, nonnunquam etiam in aruis. solum amat pingue, calcario lapidi mixtum.

* Est zeyßgenfraut. Non est Sideritis Euchij, quæ multo maior hac est, & arthriticis prodest. Germanice Berufffraut.

T. 1. 39 p. 122.



DE PANICO. CAP. LXXXVI.

PANICUM æstiuum est frumentum, culmum ex uno semine singularem erigit duobus plerumque cubitis, fecundo solo proceriorem, solidum & geniculis tumetibus præcinctum, in cacumine attenuatum; folia à geniculis singula exeunt longitudine plerumque cubitalia, latitudine unciali, acuminata & arundinea. spicam in summo culmo fert dodrantalem, & nonnunquam pedale duorum ferè digitorum crassitudine, pronam & uulpinæ caudæ similem, semine exiguo, flauo & milio simili, plenam et confertam. prodeunte è foliis, & crescente spica à duobus inferioribus culmi, geniculis, undique in orbem enascitur, & in terram descendunt fulcra, quibus fulcitur ipse culmus, ne pondere nutantis spicæ sternatur, & humi procumbat: tanta est diuinæ prouidentiae erga tam uilem herbam clementia, benignitas et sollicitudo. Radicibus nititur fibratis, gustu et qualitate milio respondet. Seritur in agris.

DE PVLEGIO. CAP. LXXXVII.

PVLEGium exigua est herba per terram serpens, folia habet parua, subrotunda modice acuminata, et obscuris incisuris

X ij



frantem. Nascitur campestribus, nec herbosis locis, fluminum inundationi obnoxius.

DE HORDEO glabro.

CAP. LXXVIII.

HORDEUM glabrum aestiuum est frumentum, culmos ex uno grano emittit decem, uiginti, triginta, aut nonnunquam plures fecundo solo, nostri hordeo similes & aequales, quod etiam spicis & spicarum aristis aemulatur, semen habet hordeo aequale, tritici modo purum, glabrum & nitidum, facile dum tractatur, hordeum & triticum imitatur. Solum amat fecundum.

* Dodoneus, a quo Eiconem hanc mutuati sumus, zeopyron uocat: & ex Galeno etiam Gymnocritikon id est, Hordeum nudum. Tritici (inquit) species est, Zea & hordei similitudinem quandam referens.

De

Hordeum glabrum.



DE CHAMAEPEUCE. [Querendum an hæc Erica altera Matthioli sit,
quam pingit, non describit.] CAP. LXXIX.

CHAMAEpeuce frutex est plurimis à terra assurgens uirgis, in summitate ru-
bete lanugine obsitis. folia habet sesquiunciali longitudine, angusta, gracilia,
retroflexis utrinque laterum extremitatibus, & à tergo modicè hirsuta, flaua, hyeme
uirentia: flores ueris exitu in summis uirgis producit, paruos, candidos, * & folia
ceos, corymborum modo coaceruatos, his singuli succedunt parui, aridiq; fructus,
hordeo minores, in quibus tantillum clauditur semen. Radicibus nititur longis,
obliquis & fibratis, foris in flauo rubentibus. Odorem folia, flores & fructus gra-
uissimum habent: saporem uerò acrem & uehementer tenuem. Nascitur macris,
putridis uliginosisq; locis, sub Tædis arboribus.

Dioscori
des flores
rose ei tri-
buit, quod
forte perpe-
ram legi-
tur. Plinius
florum non
meminit.

* Hæc non Cordi Chamæpeuce, mihi ignota: sed nostra est.

Chamæpeuce. T. 1. 189. p. 555.

Mercurialis mascula sylvestris.

DE MERCVRIALI mascula sylvestri. CAP. LXXX.

MERCVRialis mascula sylvestris, masculæ Mercuriali in cultis locis nascen-
ti, caulibus, foliis & semine similis existit, folia tamen nigriora, duriora, sicciora
q̃ habet, semen etiam multò maius. Radicibus nititur obliquis aut transuersis,
(à quibus plures exeunt fibræ) iisq̃ non annuis, ut urbana, sed diuturnis & perennibus.
Qualitate urbanæ respondet, non tamen adeò efficax est in soluenda aluo.
Nascitur in pinguibus syluis.

DE MERCVRIALI fœmina sylvestri: [Aliqui fœminam in hoc genere esse
negant: nec ego reperisse memini.] CAP. LXXXI.

MERCVRialis fœmina sylvestris, Mercuriali fœmine in cultis proveniente si-
milis est, nigrioribus tamen foliis, & maioribus seminum racemulis constat,
neque annuam habet radicem, sed perennem, obliquam, & fibratam: qualitatibus
Masculæ respondet, iisdemq̃ locis gignitur.

De

BACTRIANUM siue Indicum triticum æstiuum est frumentum. Culmum profert tricubitalem, geniculatum, digiti crassitudine, solidum, intus fungosa medulla plenum. folia habet cubito plerumq; longiora, trium aut quatuor unciarum latitudine, uenosa & arundinea. spicas in summo culmo fert dodrantes, plerumq; graciles & raras olyre spicis similes, & similiter florentes, aliquando quindecim, uiginti aut triginta, quæ postquam defloruerunt exarescunt, & nullum semen producunt, quæ uerò fructum ferunt spicæ, inferius è culmi geniculis exeunt, nonnunquã tres aut quatuor, at à singulis nodis singulæ, longitudine dodrantes aut maiores, manum implente crassitudine, multis foliaceis tunicis testæ, tam strictæ in summitate conuolutis, ut ne aquam quidem transmittant quæ spicas corrumpere possit spicæ cum ad iustam magnitudinem peruenerint florum uice numerosos, longos, & candicantes producunt, ueluti capillos è stricto cacumine prominentes, & singuli singulis adherent seminibus, ea detractis (cum exaruerunt tunicis) conspiciuntur pili maioris quantitate, & sine glumis aut aristis octo aut decem uersibus in longitudinem porrectis, fungosum mediastinum undiq; amplectuntur, tamq; arcu con iunguntur, ut propter compressionem angulosa fiant, & nonnunquam rumpantur, colorem habent flauum aut croceum, inuenitur etiam peculiare genus, omnino rubentibus & nigricantibus granis. Radicibus nititur multis, obliquis & fibratis, quibus etiam accedunt fulcra quædam ab imo geniculo undiq; exeuntia, & in terrâ demissa, quibus uento agitata seges sustentatur: solum amat pingue & humidum, Saporem semina habent cæteris frumentaceis dulciorem & suauiore.

* Türkisch oder Indiamisch Korn.

Triticum Babrianum. T. 2. 26. p. 65.

Asarum. T. 1. 20. p. 64.



ASARVM breues per terram spargit coliculos, à quibus folia exeunt hederacea, trium digitorum aut duarum unciarum latitudine, densa, rotunda & iuxta pediculum in sinum recedentia. flores iuxta terram, foliorum pediculis annexos, primo uere producit, Hyoscyami uasculis similes, minores tamē trifido labro, & introrsum curuato, colore purpurascens, in quibus semina sunt uitis acinorum nucleis similia, minora tamen, angulosa & breuissimis ueluti aculeis exasperata. Radices per terrae superficiem spargit perennes, numerosas, in geniculis fibratas, iuncē gracilitatis, in pallido fuscas, sapore aromaticum modo acri & iucundo, odore ad modum grato, uehementi & Nardum æmulante, quæ mansæ uomitum cient, uiret tota hyeme, & radicibus se propagat, nascitur etiam ex semine. Prouenit montanis & fruterosis locis, solum amat pingue & densum, plurimumq; sub corylis.

DE CORRUDA. [uel syluestri Asparago aculeato.] CAP. LXXXIII.

CORRUDA Asparagi species est, syluestri Asparago similima, præterquā quod folia non mollia, sed aculeorum modo dura & acuminata habeat. Nascitur iisdem quibus syluestris Asparagus locis. rarò tamen simul proueniunt. maior enim Germania pars syluestri Asparago abundat. ex uerò Germaniæ regiones quæ Viennam Austriae circumiacent, Corruda scatent, qualitates habet easdem quas incultus Asparagus.

* Corruda siue Myacanthæ imaginem ex Dodonæi libris apposui.

Corruda.

Phyllitis. T. 1. 188. p. 549.



De

PHYLLITIS, quæ etiam Hemionium appellatur, plura ab uno cespite folia emittit dodrantalia aut pedalia, duarum unciarum plerumque latitudine, acuto Rumici similia, obtusiora tamen, speciosiora, glabra & densa: à tergo ab utraque spinæ parte oblongos, hirsutos, flavos aut rubentes, ueluti uermiculos, deinceps per transuersum, & fere obliquum dispositos ferentia. Radicibus nititur numerosis, masculæ filici similibus, implicitis foliorum uestigiis consistentibus, fibratis, foris nigricantibus, intus autem in pallido uiridibus: neque caulem, neque florem, neque semen fert, & uermiculis tamen foliorum, in puluerem resolutis & sparsis nascitur. Viret tota hyeme, & ab eisdem radicibus noua folia singulis annis profert, prioribus numerosiora: saporem habet tota herba adstringentem, cum tenuitate aliqua. Prouenit umbrosis & saxosis montibus: solum amat pingue, non tamen ex ipsa terra immediatè nascitur, sed ex musco lapides & præsertim calcarios tegente.

* Vnser Girschgung.

DE POLYGONATO tenuifolio [aliqui erectum, uel angustifolium cognominant.] CAP. LXXXVI.

T. 1. 132. p. 400.




POLYGONATUM tenuifolium, caulem (aut aliquando plures) erigit cubitalem, iuncæ gracilitatis, teretem, leniter striatum, aliquantulum asperum & purpureis punctis seu maculis conspersum, foliis uenosis, glabris, digito paulò longioribus, semunciali latitudine, & utrinque acuminatis uestitum, secus quæ ueris exitu oblongi candidique flores sunt, quibus parue rubentes & rotundæ succedunt baccae, unum atque alterum * cartilagineum semen continentes. * imò tria semper. Radice nititur perenni, longa, digitali crassitudine, geniculis ex intervallo præincta, in quibus singulorum caulium uestigia eaque impressa apparent, foris sufflata, intus candida & fragili in transuersum sub terræ superficie sparsa, tenuibus fibris capillata, Polygonato simili, ea gustu dulcis, simulque amara existit. Baccae eius asparagi baccas glutinosa substantia & sapore imitantur. Nascitur editis & montanis syluis, plurius in Hercyniæ syluis.

DE POLYGONATO, [quod uulgò sigillum Salomonis uocant.] CAP. LXXXVII.

POLYGONATUM caulem erigit cubitalem (nonnunquam etiam plures) iuncici modo gracilem, teretem & glabrum, ex intervallo singulis uestitum foliis, digitali longitudine, & duorum digitorum aut unciarum latitudine, uenosis, glabris & utrinque in obtusum mucronem turbinatis, secus quæ flores medio uere erumpunt candidi & oblongi, foliis numerosiores præ-

Polygonatum. T. 1. 132. p. 339.



ferim à radice incepta supputatione, quibus singulae succedunt baccae, pisi medio-
cris quantitate & rotunditate, primum uiride-
des, in maturitate uerò nigrae, cartilagineo
semine farctae. Radice nititur perenni, lon-
ga, digitali crassitudine, ex intervallo geni-
culis praecincta (in quibus foliorum impres-
sa uestigia apparent) candida, fibrata, fra-
gili & transversa, quae gustata glutinosum,
subdulcem et nauseabundum cum saporem
tum odorem remittit, baccis eadem est qua-
litas. Nascitur in syluis tam planis quam
montanis.

* Polygonatum curuum seu latifolium, Germanice
Weyßwurz/ Gelengfwurzel.

DE POLYGONATO anguloso, [quod superio-
riori simile est, sed caule anguloso, etc.] CAP.
LXXXVIII.

POLYGONATUM angulosum uulgariter
Polygonato per omnia respondet, praeterquam
quod caulem non teretem, sed angulosum
proferat, & flores multo maiores, & ab inferiori
parte subuirides, radices quoque non adeo tumidis
turgent geniculis, & fibras non solum ab inferiori
parte, uerum etiam à superiori proferunt, qualitatibus
autem uulgarè polygonatum æmulatur.

DE MALVA sativa laciniosa.

CAP LXXXIX.

MALVA sativa laciniosa, caulem singularem erigit, humana statura plerumque
multo proceriorem, numerosis & cubitalibus adnatis ramosum, iuxta terra-
ram unciam & nonnunquam duos digitos crassitudine uincentem, modicè angu-
losum, glabrum, intusque angusta concavitate peruium. folia fert glabra, sub ramu-
lorum exortu singula, inferius dodrantali quoquo uersus latitudine, in quinque, se-
nas aut septenas (non tamen profundius incisae) per ambitum crebro laciniolas
& infractas partes diuisa, quae uerò in summis uirgis folia sunt, his magnitudine ce-
dunt, flores per totam æstatem secus folia fert plures, paruos, candidos & quinque-
folios, quibus singulis plura succedunt semina in orbem mucroni cuidam ueluti
centro circumposita, quinquepartito calice insidentia. Radice nititur semestri, pede
longiore, inferiorem caulis partem crassitudine æquante, singulari, candida & fibra
ta, tota herba gustu dulcem, lubricum & glutinosum refert saporem. Triti caules
muco similem lentorem remittunt, feritur in hortis.

De

*Malua hortensis crispa.**Malua sylvestris recta.*DE MALVA *sylvestris recta.*

CAP. XC.

MALVA *sylvestris recta* rectum erigit caulem sesquicubitalem, minimi digiti crassitudine teretem, raris pilis hirsutum, statim à terra in ramos diuisum. folia habet longis pediculis insidentia, quinque digitorum aut unciarum latitudine, & quinquepartita. flores æstate fert secus ramos & folia sylvestribus rosis similes & æquales, quinquefolios, & in ruffo candicantes, quibus in orbē disposita succedūt semina. Radice nititur semestri, pedali aut longiore, digiti crassitudine, candida & in partes distracta, tota herba gustu dulci & glutinoso sentitur. Nascitur in aggeribus, hortorum areis, & circa rudera.

Y ij

DE OCIMO nigro, [Basilici specie, cuius nigra sunt semina. Herba Ocimo maiori cognata uidetur, cuius eiconem è Trago addidimus. CAP. XCI.

Ocimum nigrum. T. 1. 8. p. 31.



OCIMVM nigrum caulem emittit pede proceriorem, per interualla binos ramulos contrario exortu & alterno positu proferentem, colore purpureos & glabros. folia sub ramulis habet sesquiuncialia plerumq; paulò angustiora, in mucronem desinentia, glabra & modicè per ambitum incisa, folani foliis similia, minora tamen, in summis uirgis breui interuallo se proferunt, ueluti uerticilli colore in purpura nigricantes: à quibus candidi & hiantes prominent flores, superiori & erecta parte rubescens, quibus dilabentibus succedunt exigua & nigra semina denticulatis caliculis insidentia. Radice nititur longa, gracili, fibrata, semestri & inutuli. Tota herba uehementer odorata est. saporem habet dulcem, modicè acrem & tenuem. seritur apud nos in hortis odoris causa.

DE INTYBO nauseoso. CAP. XCII.

INTYbum nauseosum folia habet digita longiora, unciali plerumq; latitudine, utrinq; in partes diuisa, & hirsuta, undique per terram strata. è quorum medio duo aut tres assurgunt caules, in plures dodrantes ramulos & surculos diuisi, in quorum summate lutei et capillati sunt flores, in pappos canescentes, qui una cum oblongo semine auolant. floret particulatim & diu. folia enatis ramulis pereunt. quæ uerò in uirgis sunt folia prædictis multò minora existunt, radicem habent parua & fibrata, quæ una cum foliis inferioribus liquorem incisa remittit non omnino candidum, gustu uehementer acrem & nauseabundum, cuius qualitas nullis uerbis exprimi potest. Nascitur in editis uineis, solo pingui & glutinoso.

DE COLOCYNTHIDE grandi, oblonga. CAP. XCIII.

COLOCYNthis grandis, oblonga, ab una radice uiticulam emittit digitali aut pollicari crassitudine, quæ in multas alias angulosas, undique per terram aliat aliquantulum reptando progressæ digiti ferè crassitudinè consequuntur, ex eodem dodranti interuallo geniculis præcinguntur, secus quæ capreolos emittit, & singula erigit folia longitudine & latitudine pedali, in tres partes lupuli modo secta, tætu aspera & breuib; aculeis horrida, pedali bus aut cubitalibus, teretibus, asperis, conca-

concauisq; pediculis insidentia, ab iisdem geniculis radices in terram demittit tenu-
es, quibus nutriendo fructui succurrit, flores secus foliorum exortum profert dupli-
cis generis, fecundos & steriles. Steriles longo concauoq; insident pediculo, lili-
ce figuram & quantitatem habent, præterquam quod intus hirsutus & colore luteus
sit, atq; labrum ipsius in quinque tantum partes dissecetur, reliqua floris pars conca-
ua & continua est, in cuius medio cachryi simile capitulum eminet, retro ipsum flo-
rem nullum extuberat tuberculum, quod secuturi fructus spem faciat, fecundus au-
tem flos breuiori, solidiori & crassiori nititur pediculo, intusq; tria crassa, hirsuta, lu-
teaq; tubercula, staminum uice continet, quibus in fundo floris melleus liquor cir-
cumfunditur: retro florem capitulum eminet, quod decedente flore in grandem &
humum procumbentem excrescit fructum, longitudine plerumq; dodrātem, ea cras-
situdine, quæ utraq; manu circumamplecti uix possit, duarum ciuiliū librarum
pondo habet, is primum uiridem colorem, postea candicantibus maculis consper-
gitur, in maturitate postremo totus in luteo pallet, & circa pediculum eminentibus
angulis distinguitur, dissectus, corticem primum ostendit durum, lignosumq;, mox
flauam, cartilaginosaq; carnem, & in medio eius sex ordines seminum candido-
rum, oblongorum, acuminatorum, latorum & planorum. in quibus candidus est
nucleus. Radice nititur semestri & admodum breui, a qua aliæ multæ candidæ in di-
uersas partes exeunt, longitudine cubitales, & funiculorum modo tenues. quod si
quis plantam hanc humi reperire nolit, supra cameras perticis extructas ducas, ea e-
nim ratione capreolis baculos apprehendet, & attegias siue scenas faciet. Saporem
fructus habet amarissimum & grauem odorem, seminis autem nucleus dulcis est.
Seritur spectaculi gratia in latis hortorum areis.

DE COLOCYNTHIDE *grandi, rotunda.* CAP. XCIII.

Colocynthis grandis, rotunda, oblonga grandi et colocynthidi, uiticulis, ca-
preolis, floribus, foliorum magnitudine, radicibus, asperitate atq; omnibus
aliis accidentibus similis & æqualis est, duobus tantum differt. folia namq; in qui-
nas partes diuisa habet, fructusq; minores superficie æquali, pondere ciuilem librā
excedentes, & globi instar rotundos aut modicè planos utrinq; tam circa pediculū
quā floris uestigium modicè eminentibus angulis distinctos: quibus color est pri-
mum uiridis, in maturitate uerò pallidus, qui dissecti substantia, seminum ordine
& figura oblongis similes sunt, præterquam quod nonnunquam octonos seminū
ordines habeat, ac totidem quoq; oblongæ colocynthidi contingere possunt. Sapo-
re et odore oblongæ respondet.

DE ZVCHA *rotunda, mediocri.* CAP. XCV.

Zvcha rotunda, mediocris uiticulis, capreolis, foliis, floribus, radicibus,
asperitate, atq; omnibus aliis proprietatibus oblongæ & grandi colocynthi-
di similis existit: fructum uerò habet globi modo rotundum, aut modicè compres-
sum: in superficie modicè, ita ut uix appareat tuberosum, quā grandis, rotundæ
colocynthidi paulò maiorem, pondere ciuilis libræ unius cum dimidia: principio
uiridē, deinde maculosum, in maturitate uerò luteum: qui dissectus luteam carnem
ostendit, & in medio eius sex latorum, oblongorum, acuminatorum, candidorumq;
seminum ordines, quibus candidus inest nucleus. Saporem habet fructus dulcem,
semen uerò dulciorem, seritur prædictorum modo.

DE ZVCHA *rotunda minore.* [Zucha Italica Cucurbita est. Matthiolus zu-
chas Indicas depingit.] CAP. XCVI.

Zvcha rotunda, minor per omnia mediocri similis est, præterquam quod fo-
lia latiora habeat, fructus autem minores, sed eminentioribus angulis striatos,
Y ij

& in superficie magis tuberosos, quorum etiam cortex multo lignosior & durior est quam mediocris zuchæ, carnem habent ferè croceam, et senos seminum ordines, sapore mediocri zuchæ responderet, cui etiam similiter colitur.

DE COLOCYNTHIDE *turbinata*.

CAP. XCVII.

T. 2. 98. p. 828.



Colocynthis turbinata uiticulis, capreolosis, folia & flores grandi & oblongæ colocynthidi similes profert, & similiter per terram repit, sed omnes partes tenuiores habet. fructum producit piri modo turbinatum (cuius pyramis circa pediculum est) oculo maiorem in maturitate flavum, & candicantibus lineis per longitudinē distinctū, foris durū et lignosum, intus autem fungosa carne plenum, in qua quatuor oblongorum, planorum, parvorum ac candidorum seminum ordines continentur. Radicibus nititur prædictis similibus, sed minoribus multo, quibus seminis est uita, è geniculis autem nullas in terram demittit radices. Saporem habet amarum, ut prædictæ colocynthis species, quibus etiam similiter colitur.

DE COLOCYNTHIDE *oblonga, glabra*.

CAP. XCVIII.

Colocynthis oblonga, glabra, uiticulis, capreolis, foliis, flore & radicibus suis dodrantē uix excedunt, & non longè à mucrone duabus incisuris, sed non procul a mucrone in tres partes diuiduntur: fructum habet oblongum, eidem colocynthidi similem, sed sine angulis & omnino glabrum, minoremque, nam longitudinis circumferentia quindecim uncias: raro excedit, latitudinis uero duodecim uncias complectitur, colorem habet primū uiridem, in maturitate uero obscure luteum ac in pallostantia colore ac sapore prædictas colocynthides æmulatur, quibus etiam similiter in hortis colitur.

De



CUCURBITA *cameraria* quæ ante *camerarum* fenestras feritur, uiticulam ab una radice emittit, quæ in multas alias angulosas, teneras & modicè concauas uiticulas diuiditur, folia ex intervallo proferentes, singula ferè rotunda, nil in iis anteriori maxime parte tres plerūq; acuminati anguli eminerēt: eadem emittentis quibusdam breuissimis rarisq; per ambitum circumuallantur, & tactu mollia sunt, foliorum *Althææ* modo, magnitudo eorum seu latitudo secundum natalium diuersitatem uariatur, fecundo autem aprico et humido solo, apud nos in Germania pedem cum quadrante interdum latitudine excedunt: pediculus iis est longus, tener, leniter hirsutus, modicè concauus et prope modum teres, si non modicè canaliculatus esset eo latere. quo superiori foliorū parti respondet. capreolos secus folia producit singulos, quibus affixos baculos

& perticas apprehendit, in magnam altitudinem ascendens, flores iuxta folia & capreolos fert figura liliaceos, partim steriles, partim uerò fecundos, utriq; quinis candidis, intus hirsutis, sesquiuncia longioribus, uncia paulò angustioribus, forasq; modicè reflexis & repandis constant foliis, differunt tamen inter se. Siquidem steriles breues habent in medio apices & hirsutiores sunt, nec quicquam habent tumidi post se (ubi pediculo iunguntur) quod sequuturi fructus spem faciat. Fecundi uerò in medio tria crassiuscula, bifidaq; stamina continent, nec immediate pediculo iunguntur, nam inter ipsos flores & pediculum paruum & leniter hirsutum extuberat, quod tenera cucurbita est, capitulum, iuxta annexum in angustum collum desinens, quod marcescente flore paulatim accrescit, deinde ab autumno in magnam molem, quam cucurbitam uocamus auctum maturescit, magnitudo & forma non est eadem omnibus cucurbitis: quædam enim longæ sunt, quædam uerò inferius uentrosæ existunt, & superius in angustum collum coarctantur. Cum apud nos in Germania feliciter enata maturuerint, longè quinos, senosq; pedes longitudine & dodrantem cum uncia assequuntur, maxime si pensili licentia concessa, liberè pependerit. Ventrosæ autem interdum in duorum pedum longitudinem & pedalem latitudinem adolescunt: utrumq; tamen genus frequentius minus capit incrementa

tum. eam enim magnitudinem quam posuimus non semper nec ubiq; consequuntur, color omnibus est in maturitate flauus, durusq; & ligneus correx, pulpa teneris est candida, gustu dulcis, maturis uerò fungosa, seminibusq; plena, præterquam in collo: nam eo loco uentrosæ nullum semen continent: longitudo semini uncialis est, latitudo autem semuncialis: idem planum et compressum est, atq; anteriori parte modicè acuminatum, posteriori uerò latiusculum, duobusq; eminentiis cornutum. corticem habet lignosum, candidum, acuminatum, compressum, gustuq; dulcem nucleum claudentem. Radice tota herba nititur candida, in multas tenues partes distracta, eaq; semestri: in hortis sata cameras perticis extructas ascendit & obtegit, facitq; iucundas frigidâsq; scenas, latis foliis solem arcens, feritur etiam in hortis pensilibus, ante cameras & fenestras, ut dictum est. unde hoc cucurbitæ genus camerarium Romani appellabant, ut Plinius testatur.

DE CVCVRBITA Plebeia.

CAP. C.

CVCVRbita Plebeia uiticulis, foliis, floribus & semine camerariæ similis est, fructum tantum dissimilem producit, cui duorum dodrantum aut nonnunquam cubiti apud nos est longitudo, latitudo uerò quincunx aut sextans, forma sunt inæquali: nam inferius longum habent uentrem, à quo in longum nec angustum collum desinunt, interdum etiam incuruantur. Est & alia, quibus distinguuntur, differentia. cameraria altitudinis auida est, plebeia uerò humi prorrepit, quousque uersus uiticulas suas spargens. Saporem habet dulcem, carnemq; cum tenera adhuc est, quæ edendo sit.

DE BRYONIA nigra, [quæ baccis tantum nigris ab alba differt.] CAP. CI.

BRYonia quæ nigras fert baccas, ab una radice uiticulas emittit plures, tenues, longas & angulosas, foliis asperis, scabris & forma uitigineis similibus uestitis, secus quæ singuli, longi, intortiq; exeunt capreoli, arbutorum uirgas & sepium sarmenta apprehendentes, quo facilius ipsæ uiticulae, alioquin infirmæ, sepes scandant, quas ubi ascenderint, in omnes partes reptantes se expandunt: flores à ueris exitu usq; post medium æstatis fert paruos, foliaceos, colore pallidos, pauca in stamina habentes, quibus singulæ succedunt baccae seu acini, mediocris pisi quæritate, forma rotundæ, colore primum uirides, in maturitate uerò nigrae, & in exiguis racemos congestæ, tactu molles, intusq; lubrico & glutinoso succo plenæ, quousque senæue semina continentur, cannabis colore & quantitate, sed modicè acuminata, in latitudinem compressa, & candidum nucleum intra se claudentia. Radice natiua perenni, secundum ætatem grandi carnosâq; longitudine plerumq; cubitum excedente, crassitudine brachij aut tibiae, longo rapo aut Raphano simili, capite multis ceu uerucis tuberoso, in profundo in duas uel tres partes distracta, colore, foris incandido cineracea, intus autem candida, aut buxi modo pallida, quæ gustu amara & subacris est, cum adstrictione non pauca, & aliqua nauseosa qualitate abundanti, eadē lubrico & glutinoso succo, & grauem odorem spirat, bacce siue acini, radicem qualitatibus æmulantur, minus tamen siccant. Colligitur primo uere, mox prodituris asparagis, ex radice aqua, præfecto radicis capite, & excauata radice, quæ in cauum, (singulis diebus matutino tempore tollenda) confluit, ischiadici utilis. Nascitur in sepibus.

DE BRYONIA alba seu ruffa. [Radix enim alba est, acini rubent.] CAP. CII.

HANC Bryoniæ speciem ob radicis candorem albam nominare cuius licet, eandem propter acinorum ruborem ruffam uocare minimè absurdum est, ut
ticulis

Bryonia alba. T. 2. p. 820.



ticulis, foliis, capreolis, floribus, acinorum figura & substantia, & radice mole nigrae similis est. differt tamen ab illa quod acinos habeat rubentes, et radicem tam foris quam intus candidiorem. succum radix habet nigra paulo viscosiorem, easdem habet cum illa qualitates, sed efficaciores. Nascitur iisdem quibus illa locis, plurimaque in Vuirtembergensi Suevia atque Renana prouincia, in Hestia uero, Saxonia, Vuestphalia, Pomerania, Marchia, Vuirtembergensi Electoratu, & Misnia nondum uidi nasci. nam hae regiones nigra tantum abundant.

* Stuckwurz/Teuffelsfirsche.

DE ZVCHA maiore longa, [cuius fructus grandi et oblonga Colocynthidi similis ac dulcis est.] CAP. CIII.

ZVCHA maior longa, uiticulis, foliis, capreolis, floribus, seminibus, radicibus & asperitate, grandi oblongaque colocynthidi similis existit. fructu uero eiusque sapore ab illa differt. siquidem figura est longus, in longitudinis circumferentia uiginti sex plerumque uncias complectens, latitudinis uero ambitu octo decem uncias raro excedit. Pondere autem quinque libras sex uncias superat, pediculo haeret crasso, anguloso, nigro, solido & tactu aspero: a cuius annexu contigui inter se & tereti superficie exeunt anguli, ipsum fructum circa pediculum ueluti crassioribus striis ornantes, colorem

habet principio uiridem, & candicantibus maculis conspersum: in maturitate uero citrinum, superficie constat aliquantulum tuberosa, cauernosaque, gustu dulcedinem resipit. Colitur in hortis.

DE ZVCHA maiore rotunda.

CAP. CIIII.

ZVCHA maior rotunda, uiticulis, foliis, capreolis, floribus, seminibus, radicibus atque asperitate iam dictae longae zuchae similis est, folia tamen figura aliquantulum ad uitis ac ficus folia accedunt. Fructum fert globi modo rotundum, aut modice in latitudinem depressum, crasso, anguloso, aspero, solidoque pediculo herentem, (a quo longae iusta anguli circumquaque exeunt) longitudinis circumferentia uiginti duas aut nonnunquam plures, paucioresue uncias complectentem, ambitu uero latitudinis uiginti quatuor uncias nonnunquam excedentem, pondere autem quinque libras atque octo uncias habentem, colore & cauernosa superficie longam maiorem zucham aemulantem, saporem habet dulcem, aqueo succo dilutum. Colitur ut longa.

Queren-
dū an haec
sit zucha
Indica Mat-
thioli.

Z

ZVCHA magna, glabra, rotunda, maioribus zuchis uticulis, foliis, capreo-
lis, floribus, seminibus, radicibus & asperitate similis est. fructum producit
grandi & rotundæ zuchæ figura similem, tam longitudinis quam latitudinis am-
bitu viginti duas plerumque uncias complectentem, pondere autem quinque libras
duabus uncias excedentem, pediculo crasso, anguloso, aspero, nigro, solidoque hæren-
tem, à quo eminentes prodeunt anguli, undique per fructus latera transeuntes, donec
circa floris uestigium collecti, rursus coniungantur. colorem habet etiã circa maturi-
tatem in nigro subviridem. Si uerò serenus & tepidus fuerit autumnus citrinum
colorem induit, quod si cælum frigidum & triste fuerit, tepido loco fouendus est, ut
citrinescat. Carne constat flaua & dulci. Colitur prædictorum modo.



MELON quem ue-
teres cucume-
rem appellant ui-
ticulas per terrã
spargit asperas,
bicubitales aut
nonnunquam lon-
giores, à quibus
breui intervallo
folia exeunt, in ro-
tundo modice
angulosa, plerũ-
que trientalia
aut quadratãlia,
iuxta pediculum
quam alibi lati-
ora, aliquantulũ
incisa, modice ser-
rata & aspera, se-
cus quæ singuli
intortique se pro-
ferunt capreoli,
& iuxta hos flos-
res foliacei in pal-
lido flauo, qui par-
tim steriles, par-
tim fecundi
sunt, steriles post
se nihil habent tu-
berosum: fecun-

di uerò à tergo habent tuberculum, quod paulatim in fructum excresecit grandem,
globosum, per longitudinem undique impressis angulis striatum, subscabrum, colo-
re in cæso flauum, magnitudine secundum regionum temperiem uariantem, ple-
rumque tamen tam longitudine quam latitudine sex uncias excedit, uariat etiam figu-
ra, partim enim exquilitate sunt rotunditatis, partim etiam oblongi: dissectus per lon-
gitudinem fructus, primum ostendit subviridem corticem, mox carnem teneram,
mollem,

mollem, succosam, colore in flauo croceam, gustu dulcem, suauem atq; aliquantulum odoratam, in medio autem fructu pulpa est mollis, mucilaginosaq; candidis, oblongis, acuminatis atq; compressis seminibus plena: quibus foris est lentus cortex, intus uero candidus nucleus gustu dulcis, cum siccatus fuerit, pinguis & oleosus, semina integra longitudine semunciam habent, eam tamen plerumq; excedunt. Radice nititur oblonga, candida, carnosâ & semestri. Colitur in hortis, copiosissimusq; Bambergi.

DE MELONE moschatellino.

CAP. CVII.

MELON moschatellinus uiticulis, foliis, floribus, fructu, radice et asperitate, uulgari si milis est, omnia tamen habet minora, teretioraq; folia quoq; concinniora sunt, fructus gustus suauitate uulgarem excellit, atq; aliquem moschi odorem præ se fert, unde nomen inuenit. Culturam apud nos diligentiorē desiderat.

DE PEPONE.

CAP. CVIII.



PEPONON habet suum proprium genus, à Melone diuersum. Nam ut Plinius inquit libro nono, capite quinto, Cucumeres cum magnitudine excessere pepones uocantur. Veteres namq; (ut antè etiam dictum est) cucumeres appellabant, quos modo Melones uocamus, neq; usquâ inuenitur apud antiquos scriptores, Melonis uocabulum in hac significatione.

Est itaq; Pepo grandis melon seu cucumis, ob magnitudinē & maturitatē, molliori, fluidioreq; carne & pulpa constans, huius

plures species nouerunt hortulani, uulgares gustu Melones imitantur. qui uero Germanicè *Melpeben* appellantur, quasi *Alphitopepones*. farina modo in gustantium ore dilabuntur, succoq; qui propriè sic uocetur carentes. Bambergi felicissimè proueniunt.

COL Ocynthis oblonga, candida, grandis, uiticulis, foliis, capreolis, floribus, fructus quantitate, semine, radicibus, asperitate atq; amaro sapore, oblonga, grandi & flaua colocynthidi similis est, solo ferè colore huius fructus ab illius fructu differt, siquidem principio uiret, mox albicantibus, in aequalibus maculis ceu nubeculis aspergitur, postremo in maturitate totus albecat. Colitur in hortis prædictorum modo.

COLOcynthis leuis, quæ in frequenti usu est, uiticulas per terram spargit asperas, Meloni similes, in quibus folia sunt aspera & scabra, longitudine quadrantali aut maiore, latitudine paulò minore, in mucronem desinentia, atq; utrinque ex obliquo, & profundius in ternas plerumq; partes secta, ipsæ quoque partes suas incisuras habent, flores secus folia producit luteos, partim steriles, partim fecundos, quos ex prædictorum descriptionibus discernere licebit. Fecundos autem flores fructus sequuntur pilæ quantitate & rotunditate, à principio uirides, in maturitate uerò flauæ, qui postq; exaruerunt ferè extremam leuitatem acquirunt, cortice uestiuntur propemodum coriaceo, quo detracto, candida apparet leuisq; inanis, & fungosa pulpa, in qua per orbem longæ cauernulæ sunt, piro similibus seminibus plena, colore spadiceis, duro cortice candidum nucleum claudentibus. Radice nititur oblonga, fibrata, candida atq; semestri. Fructus saporem habet amarissimum, nulla alia saporis specie admixta. Colitur apud nos, sed paucissimis. trans maria uerò in calidioribus locis sponte in asperis gignitur.

CVCMis puniceus, quem pleriq; Momordicam & Charatiam uocant, uiticulas emittit numerosas, graciles & angulosas, longitudine bicubitales aut tricubitales, undique foliorum plenas, quæ uitis aut Bryoniæ foliorum modo in partes secta sunt, tactu aspectuq; glabra & mollia, latitudine quoque uersus trientalia, quadrantaliaue, capreolos secus folia singula producit, quibus intortis uicinos furculos Bryoniæ modo apprehendit, affixas uirgas ascendens. Flores æstate è foliorum sinu enascuntur, antequam aperiuntur uiridi inclusa alabastriculo, postea se in quinque foliola ad florum foliorum spacia trāsitura, aperiente quinque paruis, modicè ex rotundo turbinatis, rugosis, luteisq; foliis constantes, latitudine interdum unciam excedentes, quorum aliqui steriles, aliqui uerò fecundi sunt. Steriles pauca, breuia, luteaq; stamina in medio habent, sed nullum post se tuberculum quod secuti fructus principium sit. Fecundi uerò terna reflexa, bifidaq; stamina in medio continent, & retro se oblongum capitulum secuturi cucumeris rudimentum, quod dilabentibus florum foliolis, paulatim in fructum excrescit oblongum, figura plerumque ouatum, superficie tuberosum, aculeis horridum, colore in ruffo puniceum, longitudine interdum Bessis, latitudine uerò sesquiunciam raro excedentem, cartilaginea & rubente carne constantem, qui cum autumno iam iam imminente gelu maturitatem consequutus est, rumpitur ac dissilit, grauidamq; aluum seminibus ostendit, longitudine semuncialibus, latitudine angustioribus, anteriori parte modicè acuminatis, posteriori autem rotundis, planis ac ueluti compressis, fusconigræ, aliquantulum rugoso, aspero, atq; ualde duro cortice, candidum nucleum, propor-

T. 2. 130. p. 899.



proportione, toti semini similem, claudenti
bus. Radice nititur semestri, breui, minimo
digito graciliori, et in fibras desinente, foris
candicante, intus pallida. quæ gustata pri-
mum aliquam dulcedinem resipit, mox
parua amaritudine atque acrimonia mani-
festa, gustus organa afficit, saliuam ciens, nu-
clei dulcem habent saporem, cum qualitate
nauseam minante. At ipsius fructus cartila-
go Colitur apud nos magno studio,
solum amat pingue, suspensum, crebram
rigationem atq; assiduos solis radios.

FINIS LIBRI I.

Z ii

VALERII CORDI DE plantis, liber II, quo illas præci- PVE PERSEQVITVR, QV ARVM HI Storia à ueteribus uel exactè tradita non est, uel omnino præterita.

Quàm uarijs rerum ludat natura figuris,
Sola uel herbarum turba docere potest.

DE RANUNCVLIS: Et primùm de primo uel palustri: deinde de
reliquis tribus à Dioscoride descriptis formis: tum de alijs quibusdam.
CAP. I.

Ranunculus palustris. T. 1. 30. p. 93.

* Vulgò
Stosch
pfeffer.



* Sardous
Ranuncu-
lus.



RANUNCV-
lus multas speci-
es habet: quarum
prima in pingui-
bus, aquosis &
uliginosis locis
prouenit. caulem
profert cubita-

lem, & aliquan-
do proceriorem. habet is adnata ramulosq;
multos. folia coriandri modo incisa sunt,
multò tamen maiora, pinguiora, pallida &
glabra. flores fert copiosos, unde & polyan-
themus appellatur, foliaceos, (ut omnes
eius species) luteos, & aliquando purpure-
os (hos autem rarò apud nos) minores es-
tiam quàm reliquæ eius species. semen par-
uum, densum & copiosum, in oblongo ceu
capitulo. radices habet multas, candidas &
capillatas, ex uno capite prodeuntes, sapore
subamaro & acri: caules quoque, folia, flo-
res & semina gustu acerrima sunt. Habet
hæc præ cæteris apud nos prouenientibus,
exulcerandi uim maximam.

SECUNDA species.

ALTEra Ranunculi species copiosè
in Sardinia nascitur, unde illi Sardox
uel Sardinia herbæ nomen, differt à priore,
quòd lanuginosa, & pluribus foliorum inci-
suris spectetur.

Tertia

TERTIA species.

TERTIA minima est, nascitur in dumosis, subhumidis, & stirpibus confectis locis, coliculo assurgit ferè dodrantali, & unico: cui tria folia contrariis pediculis canalium modo cauis adnascuntur. folia singula in plures diuiduntur incisuras: e quorum medio unus flos luteus, foliaceus, intus eiusdem coloris, stamina rosarum modo habens, emicat. dilabentibus florum foliolis, remanet in medio capitulum, unde enascebantur stamina, quod fabæ magnitudinem capessit, leuiter aculeato semine constans. Radicè mittit transversam, crassitudine iunci, foris subrubram, intus uerò candidam, sapore ualde ingrato, qui uix definiri possit. folia & pars coliculi flori uicinior maximam habent acrimoniam.

QUARTA species, cognata tertia.

QUARTA huic figura similima est, sed magnitudine paulum excedit: folia tantum nigriora habens. florum uerò foliola candida sunt: in quorum medio lutea (ut in tertia) stamina uisuntur, nascitur iisdem quibus tertia locis: utriusque radix uenenoſa esse dicitur. Hæ autem sunt ranunculi species, quarum Dioscorides meminit, præter has uerò sunt aliæ, quas nos enumerare iam incipiemus.

Ranunculi genus, quod uulgò à mense Martenbli-men uocant, id flores uel albos, uel roseos, uel luteos profert.

T. 130. p. 95. ad tertiam speciem.



Ranunculus aruensis. ad quintam speciem.



Z iiii

QVINTA species.

QVINTA plerumq; in cultis prouenit, primæ similis, minoribus tamen & tenerioribus foliis: graciliori, cōcauo et singulari caule, paucioribus floribus colore luteis, quibus singula subnascuntur capitula, in quinque, sex aut septem aculeatas partes (quæ semen sunt) diuisa. Radicibus nititur polyanthemis similibus, cui qualitate etiam respondet. Nascitur in aruis.

* Ranunculus segetalis, Acker Hancsüß.

SEXTA species, flammula. [Nostra Flammula ceu rapulum in radice habet. Vide in octaua.]

SEXTA est quæ à quibusdam ob igneam mordacitatem flammula uocatur, iisdem nascitur locis. latioribus foliis iisdemq; hirsutis, pluribus ab una radice hirsutis caulibus. flores hæc maiores profert egregii splendoris, dilabentibus florum foliolis, capitulum e medio enascitur rotundum, asperumq; paruis planisq; seminibus constans.

Ranunculus multiplex, ad septimam speciem.

T. 1. 30. p. 94. ad octauam speciem.



SEPTIMA species.

* Gefülter Ba-
nenfüß. **S**EPTIMA coronaria uocatur, quæ in hortis ad usum coronarum seritur: estq; factitia potius quam natiua, folia habet circa cubitales caules apio similia, hirsutaque, profundius secta: flores luteos egregii splendoris, non quinque sed pluribus foliolis factos.

Tragus

* *Tragus Ranunculum sylvestre tum dulcem tum acrem, cultura multiplicare flores ait. Nos etiam albidum multiplicem habemus in Heluetijs.*

OCTAVA species. [Hec fortè est quam pingit Tragus libro 1. c. 30. hac Icone, nisi sexta sit preposita.]

OCTAVA lata, nigra & profundius secta habet folia: circa cubitales ferè caules, floribus, capitulis & qualitatibus sextæ similis.

NONA species. [quam nostri *Flammulam* uocant, non sextam.]

NONA subasperis & incultis locis prouenit, cognomento rotunda: folia, flores, capitula & caules sextæ similes profert, ni breuiores essent caules, radicem habet paruam, globuli modo rotundam, à qua graciles & candidæ descendunt fibræ. Germanicè *Grüßwurz* appellatur.

* *Runder Hancensüß.*

Ranunculus minor, flammula. ad nonam speciem.

T. 1. 137. p. 413. ad decimam speciem.



DECIMA species. [quam aliqui *Anemonis* adnumerant, Germani *Buchenschell* uocant.]

DECIMA leptophyllon & comatum cognominare possumus, folia habet agrestis pastinacæ similia, è quorum medio singularis exit caulis, cuius mediū aliud folium incisuris diuisum, ac si multa essent amplexitur: in summo unicum florem sustinet, grandem, purpureum, foliis oblongis & repandis constantem. in quo

stamina lutea . quæ uerò in medio sunt stamina in hirsutam comam mutantur, sub quibus semen est clematidi simile.

* Anemone quibusdam, Buchschell/Zackerfrant. Ad Rhenum, Gadelosen.

VNDECIMA species.

VNDECIMA in montibus nascitur, quartæ speciei caulem foliaq; similia habet asperiora tantum, florem item candidum sed maiorem, è cuius medio, postquâ folia floris defluerint, capitulum auellanae magnitudine enascitur, totum candida lanugine constans, in qua semen paruum, acerrimi saporis inuenitur. Radicibus nititur nigris, tenuibusq;.

* Weyße bigwurz Helueticis, uel Grawmeile, uel Groß Schneeglöckchen, eadem uel cognata est.

DVODECIMA species.

DVODECIMA platyphyllos non improprie diceretur. Caules cubitales erigunt, foliis oblongis, inferius uestitos lauri similibus, gracilioribus tamen flores, capitula, & radices octauæ respondent.

Ranunculi species duodecima Cordo. Reperitur & laevis & serratis folijs.

Chelidonium minus. T. 1. 35 p. 113.



De

DE CHELIDONIA minore. CAP. II.

CHELIDonium minus cuius florem Virgilius in quarto Georgicorum amelum uocat, folia primo uere (circa hirundinum aduentum) ex una radice multa fundit longis pediculis, hederæ foliis similia minora tantum, mollia & pingua, & quæ pediculis iunguntur in sinum utrinque excurrentia: inest mediis foliis purpurea macula, quæ tamen in locis plus æ quo humidioribus illis deest, coliculos ex uno radice cespitem, multos eosque singulares sine ramulis mittit, teneros, rubentes & concavos binis plerumque contrariis foliis uestitos, in quorum summitate flos est luteus & aurei splendoris, stellæ modo per ambitum radiantibus, in eo foliolis pallidioribus, nec adeo splendentibus, ubi in medio staminibus (quæ & ipsa lutea sunt) iunguntur, radices subsunt candidæ, multæ, coaceruatæ tritici granis similes, maiores tamen, & ad oliuæ cornicis nucleorum magnitudinem accedentes, quarum superior & germinibus propior pars gracilior existit, radices quoque triticeis granis similes, ex coliculorum geniculis iuxta foliorum eruptionem emittit ubi ipsi coliculi in terra sternuntur. Sapore tota herba est subacri & aspero, nascitur humentibus & planis, & incultis locis.

DE CHELIDONIA palustri, [Ego Caltham palustrem uocârim: nostri
Wiesenblumen,] CAP. III.

T. 11. 44. p. 142.



CHELIDONIUM palustre, minori Chelidonio similis est, per omnia tamen maius, minus rubent huius coliculi, folia item profundiore circa pediculum sinu constant, & purpureis maculis carent. est etiam alia differentia, quod minoris Chelidoniae coliculi sine ramulis nascantur, hoc uero circa singula in coliculo folia binos emittit ramulos cum in minore Chelidonia bina semper folia singulares coliculos uestiant. Flores in summitatibus singulorum coliculorum singulos producit luteos, paucioribus tamen rotundioribus, multoque maioribus foliolis quam illius, constantes: in quorum medio stamina eiusdem coloris uisuntur. radices uero subsunt minori Chelidoniae dissimiles: hellebori radicum fibris similes, foris obnigræ, intus candidæ, longæ, graciles & insipidæ, folia florisque similem minori Chelidonio saporem habent. nascitur uliginosis pratis & palustribus locis: iisdem quibus minor Chelidonia temporibus.
* Capitulum seminum est echinatum.
* Wiesenblumen / Wotterblumen.

DE CHELIDONIA phragmitis, [falso hactenus usurpata pro Aristolochia rotunda apud Germanos.] CAP. IIIL.

CHELIDONIA phragmitis, quam Aetius Capnium, Plinius uero Capnum phragmitem & pedes Gallinaceos appellat.



lat. Nomē suum inuenit, quod primo uere circa hirundinū aduentum germinet ac floreat. Capnium uerō & Capnium phragmitis dicitur, quoniam herbae priuatim capnus dicitur, floribus et foliis similis sit, quodque circa sepes & dumos nascatur. Dupliscis est hęc, ut subiungemus iam, differentię, una eius species coliculos, plerumq; duos diuaticos, rubentes, longitudine dodrantes ex una radice profert: in quibus folia sunt tria semper, ex uno pediculo exeuntia, & in plura incisa, media inter capnum, rursamq; figura & quantitate tenera, ab inferi ore parte tenuissimas uenulas ceu lineas habentia. subest coliculis ubi terrę iunguntur, folliculus pallidus, concauus, superius apertus, gallinaceorum calcaribus similis (unde & nomen) in quo antequam prorrumperet tenella adhuc germina continebantur. flores primo uere profert in summis coliculis purpureos, paruos, oblongos, concauos, ex una parte in acutam caudam, ex altera uerō ceu in bubonis caput desinentes, habetq; totus flos antequam aperiatur minime cuiusdam auiculę figuram, qui deinde circa caput inhiantem rictum panditur. Semen in siliculis breuibus & latiusculis fert nigrum, rotundum & lentis modo planum, splendidissimum, duplici ordine, nam utrisque silicularum commissuris adnascitur, ipsi quoq; semini candidum quiddam adnascitur. statim primo uere ex uiridibus adhuc siliculis fissis semen excidit. Radicem habet globuli modo rotundam, minimi mespili magnitudine, tenui & sufflauo cortice uestitam, intus uerō candidā, cuius exterior pars cum floret rara & flaccida, interior uerō spissior nucleum modo existit, quę & ipsa in se adhuc minimum nucleum ceu centrum continet. Altera illius species huic similis est in omnibus partibus, quę supra terram sunt, flore tantum copiosiore, cuius color in iisdem natalibus in alio coliculo purpureus, in alio candidus, & in alio in candido uiridis interdum apparet, habentq; flores minima quędam circa se foliola, ubi ex coliculo nascuntur. Radicem uerō priori similiter bulbosam, quę quamprimum herba floruerit, rumpitur & concaua fit, quę concauitas deinde terra repletur, radices hęc foris densiores sunt, & confractę, in uiridi pallidū colorem ostendunt, nascitur similiter ut prior illa circa ueteres uiuas sepes atq; uicpres, pinguius tamen quā illa solum diligit.

DE SISYRINCHIO, [cui radices plerumq; duę, pisi quantitate, sibipfis insidentes, etc. flores lutei.] CAP. V.

SISYRinchion primo uere folia croco similia emittit: secus quę coliculum tenet, longitudine ferē dodrantali producit, in quo unum & alterum solum est, antedictis multo breuius, & hirsutum: ē quorum alis pro numero foliolorum eorundem


dem flores lutei Chelidonii minoris foliis * similes, nascuntur: quorum * ^{forte flo} foliola foris in luteo uiridia existunt. stamina in flore numero & positura folio- ^{ribus.} ribus respondent: in quorum medio exerit se triquetrum capitulum, ut in uiolis purpureis post florem, pallidum, eiusdem coloris apicem habens. Radices subsunt plerumque duæ pisti quantitate, sibi ipsis insidentes, foris interdum luteæ, intus uero candidæ, dulces & hordeum * pistumque aqua maceratum sapore imitantes, numero = * ^{Inde} sam à radice remittit sobolem milii quantitate & figura: quæ postquam proximo ^{quidam} anno excreuerit, (non eodem sed altero anno,) caules floresque producit. Nascitur ^{Erde} arenosis, iis que aliquantulum humentibus aruis. Qui uero in pingui planoque solo sub ^{malis apa} arboribus nascitur, quò fluuiorum inundationes perueniunt, maior quidem est, sed ^{pellant.} sapore & uiribus ignauior.

* Sparganium minus olim Odus appellabat. Vide an Hyacintho paruo cœruleo Euchsij cognatum sit, uel potius Gladiolo.

DE PETASITE.

CAP. VI.

T. I. 138. p. 475.



PETASITES, quæ propter foliorum cum petaso similitudinem sic dicitur, Bechio cognata est, & statim primo uere cum bechio & Chelidonia omni erumpit ceu uua purpurei coloris, quam paulatim coliculus rubens digitali fere crassitudine protrudit, ceu foliolis oblongis, rubentibus, & in cavitatem inflexis ab inuicem distantibus plenus, quæ operimentum in terra adhuc contentæ uuae fuerant. uua autem ipsa postquam eruperit, in multa et ab inuicem distantia capitula diuiditur: in quibus numerosi minimi & stellæ modo radiantes, intus purpurei, in extremitatibus uero candidi nascuntur flosculi, singuli in medio singulare stamen candido colore exerentes. coliculus processu temporis resolutis in pappos floribus flaccescit & perit, à quo tempore folia, quæ à radice post florem erumpunt, incrementum accipiunt usque ad autumnum, ea sunt prius bechii foliis similia, nigriora tantum, cum uero ad iustam magnitudinem peruenerint, cucurbitinis foliis figura similia fiunt, quibus neque magnitudine etiam in autumnio cedunt. Radicem habet magnam geniculis præcinctam, cui à lateribus aliæ graciliores ceu propagines adnascuntur

geniculata & ipsa. habet tota herba cum radice, praesertim si digitis conteratur grauem odorem. Nascitur pinguibus & uliginosis locis, & iuxta pigros profluentes.

* Pestilenz wurz / Groß Letzchen

DE POLYGALO: [Quidam non rectè Hedy sarum, neq; melius alij Fœno-
græcum sylvestre nominant.] CAP. VII.

POLYGALON caules dodrante longiores profert cui utrinq; folia usque ad summum cacumen adnascuntur, ea alterno ordine ex oppositorum spacijs prodeunt, & lenti similia sunt, latiora tantum, & multa contrarijs utrinq; pediculis uniramulo innituntur, extremitate uerò unum folium plerumque imparium numerum efficit. exeunt è singulis alis secus folia longi pediculi, quibus in summo est coma purpureis floribus plena, qui cum casuri sunt paulatim flauescunt, floribus succedunt uiciae similes siliculae: in quibus semina lentibus aequalia sunt, radicem unam atq; alteram dulci & leniter acerbam.

* Glycyrrhiza sylvestris. conuenit enim glycyrrhizae sapore radicis.

Polygon. T. 2. s. p. 599.

Erucula maior. T. 1. 32. p. 101.



De

ERVcula olus est mediam quandam brassicæ & Erucae similitudinem referens, folia habet erucae modo diuisa, modicè pinguiora & brassicæ modo leuiora, sapore acri & amaro, ramulos ex uno caule statim à radice fert multos, cubitales & interdum maiores, in quorum summitatibus flores sunt Leucoiis similes, in pallido candidi, nigricantibus uenis distincti, qui quatuor tantum foliolis constant. diu floret & ob id semen totis ramulis adnascitur, quod paruum, nigrum & oblongum est, & in erucae similibus non tamen hirsutis siliculis clauditur, in summo ubi nullum inest semē, compressis & acuminatis. radicem habet paruum, lignosam, & ob id inuilem.

DE GLADIOLO palustris: [quem quidam Theophrasto sic dictum suspicantur: sed Theoph. Cyprium, *λίανρον*, Gaza Plinium secutus Gladiolum uertit, *Χιόφιον* uero ensem. CAP. IX.

GLadiolus palustris, folia ab una radice erigit multa, iridi similia, angustiora tamen, triquetra, & superius in mucronem desinētia, e quorum medio caulis dum triumue cubitorum altitudine erumpit, insigni leuore & æqualitate præditus, in cuius summo flores multi, longis pediculis, ex uno principio nascuntur, in purpura candidi, tribus foliolis constantes: sub quorum interuallis alia tria (sed illis minor) sunt. stamina in se flores habent numero plerumque nouem, croceo in summitate puluisculo manus atrectantium inficientia. Habent singuli flores in medio capitulum, semini ferendo natum, & sex partibus diuisum, quibus sunt singuli in summo repandi apices. omnibus huius capituli, angulis singulæ adhærent guttæ, admodum paruæ, crystalli modo translucidæ: sapore & substantia mellis. Radices habet duas, quarum gracilior & nigrior descendit: crassior uero superius ferè in superficie terræ transuersa fertur. utriusque propagines aliquot & multæ fibræ adnascuntur. habent radices saporem dulcem & glutinosum. nascitur autem pinguibus, limosis & humenibus locis, quod fluuiorum inundationes peruenire possunt.

* Gladiolus Theophrasti hic uidetur: alius uero Dioscoridis Gladiolus in segetibus nascens, nempe Victorialis nostræ rotunda uel foemina.

DE STRUTHIO uocato hodie, [uulgò Astrantia uel Imperatoria.] CAP. X.

STRUTHION folia habet lata, in singulis pediculis tria: quorum posteriora duo in eo latere, quo pediculo propiora sunt, singulas habent profundiores usque ad spinam diuisiones, tertium uero quod in anteriore parte constitutum duas, nam in utroque latere usque ad spinæ principium diuisum est, omnia præterea similiter per ambitum serræ modo incisuras habent. Caules ex uno radicis cespite erigit plures concauos & geniculatos: e quibus ramuli & adnata umbellas latas, candidis flosculis plenas ferentia nascuntur. floribus succedunt candida, plana, latiuscula & anetho similia, sed paulo maiora semina. Radices ex uno trunco nascuntur multæ, pollicari similia, sed paulo maiora semina. Radices ex uno trunco nascuntur multæ, pollicari crassitudine, geniculatæ, quæ partim in terram descendunt, partim obliquæ & transuersæ undique feruntur, quibus se mira fecunditate propagat. radicibus multæ ac tenues fibræ adhærent. dissecta radix caules & folia candicantem, pinguem & copiosum fundunt liquorem, qui gustu acerrimus & tenuissimarum uirium percipitur, non tamen talem acrimoniā habet qualem coccos gnidius uel Tithymalli, quæ fauces similiter urere possit, sed illa acrimonia sola partium tenuitate constat.

* Meyster wunzel.

a iij

Struthion. T. 1. 144. p. 433.

Lepidium maius. T. 1. 28. p. 88.



DE LEPIDIO maiore.

CAP. XI.

LEPIDium siue Hiberis maior, caules habet bicubitales * teretes, in quo candidum quiddam ad cœruleum uergens colorem appareat, quod digitis facile cum minimus pulvis abstergetur. Cauli ramuli & adnata plura adnascuntur, plena candidis, minimis, copiosis & muscosis flosculis, quibus odor inest ligustri florum odorem referens, sed non adeo fragrans. folia à radice cauli & ramulis adnascuntur, quæ densa & satis crassa sunt, & lauri foliorum formam habent, multò tamen maiora, quæ quò summitati & cacumini propinquiora fuerint, eo minora, angustiora & acutiora spectantur. Radicem habet digitali crassitudine candidam, & ualdè longam, quæ in ipsa terra se propagat, & procul etiam à cespite è terra diuersis locis erumpit & germinat. saporem radix & folia habent ualdè acrem nasturtio similem.

DE POLIO maiore, [supino] quod in Germanina non infrequens est, ut sequens quoq; sed aliud peregrinum nobis & nobilius polium est, folijs serratis, etc.

CAP. XII.

POLIVM maius frutex est paruus, graciles, copiosos & dodranali longitudine ramulos undiq; per terram spargens, plenos folijs, thymo similibus, maioribus

Polium maius.

bus tantum, recta
& sine uenulis spi-
na per media folia
transit, quæ infe-
rius candida et te-
nui lanugine ob-
ducta sunt, supe-
rius uerò uiridia
spectatur. ramuli
in summitate sin-
gulos habent co-
rymbos, candidis
floribus, ex acule-
atis & candicanti-
bus caliculis ena-
scētibus, plenos,
post flores in cali-
culis, quaterna
plerumque semi-
na sinapi simi-
lia inueniuntur.
folia & corymbi
grauiter, non sine
suauitate odorata
sunt. Radicem ha-
bet superius ferè
digitum crassam,
quæ in multas fi-
bras diuidatur.
habent folia &
flores ualdè ama-

rum saporem. quæ hyeme non amittit, sed semper uirentia conseruat. Nascitur mar-
morosis, calcariis, caluis & apricis montibus inter calculos.

* Nascitur Iene, ubi Wilden Rosenmarin & Tollen Rosenmarin uocant.

DE POLIO minore, [recto, aliàs cognato superiori.]]


CAP. XIII.

MINVS uerò Polium, non per terram sternitur, sed recta assurgit. est autem
paruus, ramosus & dodrantali altitudine frutex, qui totus candida & tenui
dictamni Cretici modo lanugine uestitur. folia habet plurima, maiori similia, mino-
ra tantum, & undiq; cana lanugine cādicantia. in cacumine ramulorū singula capitula,
quibus flores & semina corymbacea priori similia fert, sed minora omnia, magisq;
candicantia. Odoris suauitate & aromatico sapore hoc polium maiori præfertur.
Nascitur iisdem quibus illud locis, sed non in omnibus terris inuenitur: hyeme simi-
liter etiam ut maius folia referuat & uiret.

* Quidam de Polio Germanis peregrino eum loqui putant, et omittere foliorum serraturam in ambitum in-
star Chamedryos. mihi non de peregrino, sed Germanico altero loqui uidetur.

DE PEUCEDANO. [Tragus, Eufsius, Dodonæus, & ut uidetur, etiam Matthioli, eandem pro peucedano herbam pingunt, quam hic è Tragi libro exhibemus: quæ an cum Cordi descriptione conueniat, querendum.] CAP. XIII.

T. 1. m. p. 881.



PE Vcedanum densum foliorum, foeniculo simile, cespitem ex una radice producit. foliorum autem talis est forma & constitutio. pediculi è radice exeunt multi, densi, lenti & rectis uillis nervosi: qui singuli, in tres diuiduntur ramulos, qui & ipsi in tres, & hirsutius in totidem, qui & postea aliquoties in tot, sed minimas diuisuras, quæ folia sunt, erumpunt. Caulem (et si hunc aliquid quando & in quibusdam locis non ferat) erigit bicubitalem, & aliquando maiorem, densum, foeniculo similem, sed paulò tenuiorem, geniculis uerò magis quam in foeniculo protuberantibus distinctum. ex quibus longi & singuli nascuntur ramuli, qui in nullos deinde diuiduntur, sed singulas ferant umbellulas, quæ propterea quod longis & tenuibus consistunt pediculis, principio cum ex folliculis eruperint, pendent, robustiores uerò facti sursum rigent, flores habet minimos, ad luteum inclinante colore. semen uerò latum, duplex, anetho simile, sed maius in candido parum nigricans: umbellæ huius pediculi, medii & inferiores, breuiores. exteriores uerò longiores, quo fit ut concava reddatur umbella. Radicem habet foris nigram, intus candicantem: grandem, interdum bicubitalem longitudine in terram descendentem: crassitudine qua manum implere possit, superius uerò, ubi in multa capita diuiditur, crassiores fibras, in latere obliquis plerumque ordinibus descendentes, planam, hæc copiosum, flauum & graueolentem liquorẽ dissecta è cortice suo remittit, qui statim exiccatur & sulphuri flauo similis fit. saporis radix & liquor feruidum habent. folia uerò his similem, sed multò ignauiorẽ. Nascitur montanis locis, inter parua arbuscula, nonnunquam etiam in apricis & pinguibus pratis.

DE CHAMAEDRY. CAP. XV.

CHAmædry coliculos, tenues, duros, hirsutos & dodrantes erigit, qui interdum in binos ramulos geniculatim diuiduntur, eos uestiunt serrata, hirsutis uirgulis sub floribus multò quàm in inferiore parte minora sunt, & aliquantulum concava, flores habet purpurascetes, exiguos & deorsum pendentes, unico foliolo, ceu coclear, concavo constantes, quibus in summo duo, triaue tenuia stamina adnascuntur, habentque totum cum caliculis flores formam et magnitudinem, cum polii maioris floribus eandem. cui semina quoque similia in paruis, denticulatis & aculeatis caliculis producit. Radices graciles, numerosas et geniculatas per terram spargit, sed inutiles, tota quoque herba odorata est et gustu amara. Nascitur apricis, caluis et calculosis montibus.

De

*Chamedrys. T. 1. 67. p. 204.**Lotus sativa. T. 2. 2. p. 388.*

DE LOTO sativa, [quam aliqui non recte Trifolium simpliciter nominant,
Germani Sibengezeyt.] CAP. XVI.

SATIVA lotus concavum, angulosum & duorum pedum altitudine caulem pro-
fert, ex quo per intervalla in singulis pediculis tria nascuntur folia, anteriori pol-
licis articulo ad indicem compresso & dilatato similia, minora & oblongiora quo
cacumini propinquiora. quæ per ambitum leniter acutis nec profundis incisuris
divisa sunt, ex quorum alis singuli prodeunt pediculi, habentia in summo parva ca-
pitula, exiguis & ferè cœruleis flosculis plena, quibus fœnogræco similia semina,
sed multo minora, in molliter aculeatis utriculis contenta succedunt. Radice nititur
gracili, lignosa & inutuli. tota herba odorata est, præsertim siccata, tum enim magis
quàm viridis redolet.

DE CORIANDRO.

CAP. XVII.

CORLANDRUM circa inferiorem caulis partem folia in singulis pediculis quina
plerumq; inferius nitentia producit, eo ordine ut bina per intervalla in pedicu-
lo contrariis nitantur pediculis, in pediculorum summitate quinto intercedente, &

b ij

parem numerum turbante, habent hæc folia apii similitudinem, multo tamen minora & crebrius incisa sunt, quæ uerò in summo caule sunt foliola, inferioribus multo tenuiora & foeniculi modo secta uidentur. Caulis illi est teres, tenuis, glaber & cubito altior, in cuius summo multa graciliâq; enascuntur adnata, paruas umbellas (candidis & nonnunq; purpurascensibus flosculis plenas) ferentia. Semen floribus succcedit, globuli modo rotundum, magnitudine * quod siccatum ualde leue redditur. Radice nititur tenuis, oblonga & lignosa, odorem tota herba habet inter cicutam & cimices medium, unde & nomen accepit.

Coriandrum. T. 1. 36. p. 119.



Anisum. T. 1. 31. p. 453.



DE ANISO.

CAP. XVIII.

ANISVM postquam ex semine suo exierit, duo triâue pollicis latitudine, Coriandro similem & aequalem, hirsutiorem tantum, in geniculis folia incisuris diuisa, satui petroselini foliis similia habentem, eaq; superius minora quam inferius, e caule adnata coriandri modo exeunt, umbellas latas minutis candidisq; floribus plenas habentia, quæ post florem semina cinericei coloris ferunt.

Radi-

Radicem habet breuem, lignosam, tenuem & fibratam. folia, caules, flores & semina gustu dulcia & leniter acria percipiuntur, estq; hic sapor gratus ualde.

DE AMMI. CAP. XIX.

T. 2. u. 8. p. 374.



AMMI circa terram & recenter è semine enatum, sambuci nuper erumpentibus foliis similia habet folia, pluribus tamen incisuris diuisa, quinaplerumq; ex uno pediculo coriandri ordine nascentia. pediculi autem in quibus ea harent, superius canalium modo concaui sunt. caulem fert bicubitalem, minimi digiti ferè crassitudine, teretem, modicè striatum, & statim à terra in multos diuisum ramulos, què uerò circa eum folia sunt inferioribus, multò sunt minora & pluribus incisuris diuisa, ramuli & adnata latas, planas & aniso similes umbellas ferunt, in quibus candidi, exigui flores, ac post hos minuta, oblonga & cumino similia nascuntur semina, sed minora multò, sub umbellis item foliola sunt, coronopi foliorum anterioribus partibus similia, tenuiora tamen: hæc hirsuta. Radicem habet digitali ferè crassitudine & lignosam.

DE SATIVA siue leni smilace, [quam & Dolichum uocant.] CAP. XX.

DOLICHUS ab una radice plures mittit clauiculas, longis baculis affixis se circumuoluentes, ita tamen, ut semper contra solem circumagantur: ex quibus per interualla longi & angulosi enascuntur pediculi, tria folia hederæ similia, sed maiora fe-

rentes, ex his quod in anteriori parte cõstitutum est, longiori annectitur pediculo, & spinam per medium transeuntem habet. alia duo utrinq; breuè admodum annexi harent: atq; exteriore latere longius à spina recedunt, gibbumq; faciunt, habet clauiculæ & folia lenem asperitatem quandam, flores ex omnibus alis à radice usque ad summitates clauicularum erumpunt numerosi, foliacei (ut omnium leguminũ) qui aut candidi aut pallidi, aut lutei, aut rubentes cernuntur. floribus subnascuntur longæ, ac deorsum pendentes siliquæ, in latitudinem extensæ, in extremitate incuruæ & auium unguibus simili apice armatæ. Lupini siliquis similes, longiores tamen & tenuiores, quæ postquam maturuerint semina in se continent, sex, septem, octo aut nouem numero, fabis magnitudine equalia, & forma ouium renibus similia, nisi leniter in latitudine compressa essent, quorum multa sunt genera, colore tantum distincta. nam inueniuntur candido, pallido, luteo, nigro, rubente & uario colore, quos colores flores etiam sequuntur. sunt ex smilace hac scenæ, & tabernacula æstate, ascendit enim triginta pedum longitudine uirgas, si radicibus quotidie humi prope cumbit, tardè germinans, & difficulter fructificans.

b iiij

DE PHASEOLO, [qui superiori cognatus, hoc ab eo differt, quod nullam asperitatem habeat: nec tam altè excrescat, etc. Semina profert candida, minora rotundioraq; quàm superior.] CAP. XXI.

PHASEOLO, siue phaselo, siue phasiolo proprium & diuersum à prædicta similace seu dolicho genus est: quamuis magnam cum illa affinitatem habeat. clauiculas & folia à radice profert dolicho similia, ac eodem modo contra solem baculis aduoluitur, differunt tamen, quod nullam asperitatem habeat, nec in tantam altitudinem adolescat. folia etiam in superiore parte candicantem lineam per medium transeuntem ostendunt, ac iuxta fastigium rotundiora sunt. ex caule iuxta terram dodrantem longi nascuntur pediculi, mediocriter crassi, leniter striati, ac sursum erecti, quibus candidi flores papilionibus similes erumpunt, dolichi floribus multo maiores, eadem die qua aperiuntur rursus se claudentes, foris in uiridi colore pallentes, quorum magna pars apud nos caduca existit, erumpunt etiam ex clauicularum geniculis flores, quibus omnibus longæ, nigrae, teretes & sursum rigentes subnascuntur siliquæ, dolichi siliquis graciliores & teretes magis, nullo in extremitate apice, qualem dolichi fructibus esse diximus, quæ 7. 8. 12. 13 aut 14 colore candido in se claudunt semina circa annexum nigricantia, & dolichi seminibus similia, sed rotundiora minoraq;.

Phaseolus, T. 2. 13. p. 615.



Nigella cornuta.



De

DE NIGELLA cornuta, siue sylvestri, Equam Dioscoridis Cuminum sylvestre alterum facit, sicut et Fuchsius à quo depingitur. Mattiolius reprehendit Monachos, qui in Mesuen commentarios edidit, quod nigellam Citrinam (id est, subflaua seminis) Cuminum Syluij primum fecerint.] CAP. XXII.

NIGELLA cornuta, quam Dioscorides alterum sylvestre cuminum uocat, fruticosa est herba, ab una radice caulem fundens, statim à terra in multos, cubitali ferè longitudine, ramos diuisum: qui adhuc in plura adnata ac alas diuiduntur, exillis inferiores undiq; per terram supini sternuntur. folia sub ramulis ac alis exeunt breuia & tenuia, peucedani extremis foliis similia: (non tamen eo ordine incisa) quorum eruptiones siue partes in latitudinem reflectuntur. singula adnata in summitate singulos ferunt flores, in cœruleo candicantibus foliolis in orbem dispositis cōstantes, multis intus staminibus, sed duplicis generis, nam exteriora breuia, latiuscula, ac singula in binos apices diuisa sunt, & rotæ figura orbem constituunt, colore uarium; interiora uerò longiora & graciliora sunt, partimq; per interualla prædictorum ad latus feruntur, partim etiam erecta, modice resupinantur: è quorū medio plures sursum eriguntur corniculorum figura siliculæ, in quibus semen figura, odore & sapore nigellæ simile, sed minus clauditur. radice nititur flaua, gracili, lignosaq; idcōq; inutili. Nasctur in segete & agrorum aggeribus, æstiuu herba est.

DE NIGELLA. CAP. XXIII.

Nigella. T. 1. 37. p. 117.



NIGELLÀ caulem habet tenuem, circa quem folia sunt sylvestris pastinacæ foliis similia, minora tamen & tenuiora. caulis in plures diuiditur ramulos, in quibus rotæ figura flores sunt, colore in candido cœrulei, cornutæ Nigellæ floribus similes, è medijs floribus paulatim enascuntur oblonga, angulosa & superius quinque plerumque aut sex apices ferentia uascula, ceu papaueris, multo tamen minora, interiorius quinque aut sex membranis recta descenditibus in totidem camerulas seu loculamenta discreta: quibus milii quantitate nigra, angulosa continentur semina, intus candidam medullam habentia. Radice nititur tenui et superuacua. Habet eius semina pastinacæ odorem & saporem, multo tamen acriorem utrumq; æstiuu herba est. Est & alterum huius genus semine tantum differens, quod candidum seu flauescens habet.

DE NIGELLA Damascena.
CAP. XXIII.

QVAE uerò Damascena appellatur, nigella & ante paucos annos ad nos allata est, prædictæ tota similis existit, statim tamen à terra multis alis surgentibus fruticosior. Vascula uerò maiora producit, quorum eminentiores partes purpurascentem habent colorem, profundiores uerò in uiridi candicantem, sub ipsis uasculis

b iij

VALERII CORDI HISTORIAE

ubi pediculis iunguntur, admodum tenuia foliola in orbem disposita enascuntur. semen item prædictæ simile fert, sapore tamen & odore minus efficax, ideoq; uiribus etiam ignauius. Radicem habet tenuem paucis fibratam cirris & superuacuum. & hæc æstiuæ est herba.

DE ASCLEPIADE, [quam uulgo Hirundinariam appellant.]

CAP. XXV.

ASCLEPIAS ab uno radicis cespite, plures erigit furculosos fractu contumaces, solidos & teretes caules, longitudine cubitali, & interdum proceriores; in quibus folia sunt è latitudine in acumen fastigiata, hederaceorum figura, circa inferiorem caulium partem breuiora & latiora, superius uerò paulatim angustiora & oblonga. Flores in summis uirgis initio æstatis candidos, foliaceos & paruos profert, grauiter cum suauitate aliqua, quemadmodum rapi flores odoratos. floribus singulis singulae succedunt triquetrae, & in mucronem desinentes siliquæ, minimi digiti longitudine, nigris, angulosis & candidæ lanugini annexis seminibus plenæ. quæ in maturitate in alas apertæ figuram uolantium hirundinum præ se ferunt, unde etiam Germanicum illi nomen factum est. Radices subsunt numerosæ, candidæ, graciles, partim oblique descendentes, grauiter odoratas, sapore modicè acri, amaro & tenui. Nascitur montanis, calculosis, saxosis & stirpibus conserctis, apricisq; locis, quamuis in campis & pratis quibusdam etiā humidioribus copiosissimè gignatur, ut Spiræ, semine eò de montibus per torrentes & fluuiorum inundationes delato, Radix hyemem illæsa perfert, singulisq; annis regerminat.

* Vincetoxicū. Germanicè Schwalmenwurtz, id est, Hirundinaria: et Fasant, à multis capillamentis radicis.

Asclepias. T. 1. 58. p. 128.

Orchis maior. T. 2. 82. p. 778.



De

DE ORCHI, siue Testiculo maiore. [Idem, aut cognatus uidetur Orchis, hic primus Tragi.] CAP. XXVI.

ORCHIS siue testiculus herba, folia à radice & inferiore caulis parte lilio similia profert, paulò tamen minora: caulem singularem in nullos ramulos diuisum, tenerum, longitudine pedali, maiorem interdum, nonnunq̃ uerò etiam minorem: in summitate purpureis floribus undiquaq̃ circumdatum, Capni, Chelidoni floribus similibus, singulis floribus parua admodum, oblonga et acuminata subnascuntur foliola. Radices habet duas oblongas, magnitudine palmi, superius qua caulis erumpit iunctas, paucisq̃ ab annexu descendentes fibris & testiculis similes: quarum una plena, carnosaq̃ est; altera uerò flaccida & rara, saporem utraq̃ habet glutinosum & aliquantulum dulcem, nascitur montanis, calculosis locis, & interdum asperioribus, editis, & stirpibus conferctis campis. Alterum genus huic similitimum est floribus tantum in candido luteis differens, omnium testiculorum radices alternis annis flaccescunt, & carnosæ fiunt.

DE TESTICULO minore, uiolaceis floribus, etc. [Hic aut similis fuerit Orchis sextus Tragi, quem hic exhibemus: nostri uocant Teuissels anclur.] CAP. XXVII.

Orchis minor. T. 2. 62. p. 783.



ORCHIS hic folia & caulem prædicto similia habet, tenuiorem tamen caulem & minora folia. Flores in summo caule quinq̃, sex, septem aut octo, à se inuicem distantes, & deinceps dispositos profert, grato aspectu, purpureis uiolis figura & colore similes, inferius latiore & hiantè prominentes parte: in qua parua & pauca sunt stamina, superius uerò in tres partes ceu tenuia foliola diuisi. horum profundior & gratior aspectu purpura est, quàm uiole. Radices fibrasq̃ habet prædicto similes, minores tamen multò & rotundiores, & sapore magis dulci. Nascitur editis, siccisq̃ campis.

DE TESTICULO alio, [cui flores rubent, etc. Conferri cum hoc possunt posite à Trago Icones hæc duæ.] CAP. XXVIII.

EST & alius testiculus dodrantali aut maiore, gracili, tereti & glabro caule: foliis singulis liliaceis, multò tamen minoribus, minimi digiti longitudine, deinceps amplexus in summitate comam sustinens, rubentium florum plenam. Radicibus nititur binis, paruis, globosis, altera flaccida, altera autem uegeta, saporem tota herba cæteris testiculis eundem habet, Nascitur in humentibus & macris pratis.

c

T. 2. 82. p. 779.



T. 2. 82. p. 780.



DE TESTICULO candido, odorato maiore. [Odoratus est præcipue hic etiam Tragi Orchis.]
CAP. XXIX.

ORCHIS siue testiculus, candidis, maioribus et odoratis floribus, folia tria à radice profert: quorum duo lili foliis paulò minora, tertium uerò multò mino foliolo uestitus, flores in summitate ex interuallo profert candidos, striatis & intortis pediculis annexos, quadripartitos, tribus deorsum prominentibus partibus, quarta breuiore & duplici, ueluti galea prioribus superius insidente, à quibus singule retrorsum exeunt uncia breuiiores, graciles, incuruæ & concuæ caudæ, in medio cribus oliuis, candidis, carnosiss & caudatis: quarum altera uegeta, altera uerò flaccida existit, quibus dulcis inest sapor, flores admixtam dulcedini amaritudinem habent, suauiterq; olent. Nascitur humentibus, nec adeo pinguibus pratis &

De

*Testiculus candidus. T. 2. 82. p. 782.**Testiculus pumilio. T. 2. 82. p. 784.*

DE TESTICULO pumilione. CAP. XXX.

Deest descriptio. Nos Testiculi minimi è libro secundo
Tragi iconem hîc exhibere uoluimus.

DE TESTICULO candido, odorato minore. CAP. XXXI.

TESTICVLUS odoratus minor, folia prope terram habet tria quatuorue admodum parua, oblonga, acuminata atq; aliorum testiculorum modo pinguia & glabra, longitudine unciam raro excedentia, latitudine autem quartam unciae partem æquantia, ut plurimum erecta. è quorum medio exiguus, tener, gracilisq; exit coliculus, longitudine quadrantalîs, à mediâ sui parte usq; ad cacumen continua, minimorum candidorumq; florum, intus melleum liquorem continetium, serie circumuolutus. Radicibus nititur duabus oblongis, paruis, nonnunciam etiam ternis, semunciam longitudine excedentibus. Tota herba glutinosum saporem habet, flores insuper amaritudinem resipiunt. Radices dulcedinem aliorum modo. Flores odorem habent suauissimum & fragrantissimum. Nasctur editis campis, usq; subcaluis.

DE PALMA Christi, [folijs maculosis. Tragus palmas Christi Orches scæminas
appellat.] CAP. XXXII.

PALMA Christi folia habet pauca iuxta terram, lilio similia, minora tamen, purpureis maculis plena: è quorum medio caulis assurgit pedalis ex interuallo, foliatus, purpureis in summitate & caudatis floribus orchis similibus. radicibus nititur binis, crassis, latis & pinguibus, in partes ueluti digitos diuisis, unde etiam nomen accepit, sapore testiculum imitatur. nascitur in pratis. Altera eius species iuxta terram nulla habet folia, caulem tamen altiore, & in purpura candicantes flores. nascitur iisdem locis. Tertia multò longiora habet folia, & angustiora, hiacyntho similia circa cubitalem caulem, rarò purpureis punctis distincta. flores in longa spica priori similes, interdum uiolaceos, nonnunquam etiam candidos. gignitur in herbosis montibus.

Palma Christi. T. 2. 82. p. 781.



Palma Christi alia. T. 2. 82. p. 780.



DE PALMA Christi alia, [folijs non maculosis.]

CAP. XXXIII.

EST & alia palma Christi, caulem habens pede longiorem, plerumq; glabrum, minimo digito graciliorem, ex interuallo singulis liliaceis folijs acuminatioribus

bus paulò minoribus sine purpureis maculis amplexum. flores summitate ueluti in longa spica dispositos, inæquali colore purpurascens; sub quibus singula sunt angusta & parua foliola, in purpuram uergentia. Radices habet binas, latas, crassas, carnosas & candidas, in binas, tres aut quatuor partes ueluti digitos distractas, quarum una strigosa, fungosa & nigrior est; altera uerò uegeta & solida. saporem prædictis eundem habet, nascitur humentibus & macris pratis.

DE SYMPHYTO syluestri. [Species est pulmonariæ Plinij.]

CAP. XXXIII.

Pulmonaria Plinij.



SYMPHYTUM syluestre caulem primo, uere cum nigra uiola emittit, hirsutum & in eo folia oblonga, in mucronem definentia, tactu aspera et strepentia, flores circa caulem in hirsutis, herbaceisq; caliculis ruffos, floribus symphyti maioris similes, minores tantum in quorum caliculis quatuor plerumque colore nigra semina Echii seminum similitudine inueniuntur, quæ cum caule statim amittit, ab eo deinde tempore folia, quæ circa radicem sunt, incrementum capessunt, & in palmæ unius latitudinem, duarum uerò longitudinem adulescunt. iuxta pediculum lata & figura hederacea, anteriore parte in acumen

turbinata. Radici nititur tenui ueluti præmorsa, ex qua aliæ graciliores in diuersas partes distractæ oriuntur. Tota herba saporem lubricum & glutinosum habet, quemadmodum proximè descripta Solidago magna.

DE PAPAVERE cornuto.

CAP. XXXV.

CORNUTUM papauer, in multos annos durans herba est, ideoq; prima quæ seritur æstate, neq; caulem, neq; florem, neq; fructum producit, sed tantum folia crassa, pinguia & hirsuta, longitudine spithamæ, latitudine uerò quatuor digitorum, uesbasci foliis quadamtenus similia, nisi per ambitum serrata, et profundius

c. iij

Papauer cornutum. T. 1. 39. p. 123.



incisa essent, humiea proci-
bunt, & hyemis iniuriam
contumaciter perferunt. se-
quenti deinde æstate cau-
lem promit geniculatum, &
in multos ramos diuisum.
folia uero quæ e caulis geni-
culis prodeunt prædictis
minora sunt, & parcius inci-
suris diuisa, quo summitati
propiora fuerint, aliqua he-
deraceorum foliorum simi-
litudine, e cuiusq; autem si-
nu bina plerumq; erumpit
germina, unum indiuiduū,
florem fructumq; ferens. al-
terum iuxta alterius folii si-
num rursus in bina prædi-
cto modo diuiditur, eaq; di-
uisio usq; ad summitatem ra-
mulorum ab hac herba ser-
uatur. minora igitur & indi-
uidua germina seu pediculi
singulos ferunt flores, colo-
re luteos, papaueris satiuī
floribus æquales, quatuor la-
tis tenuissimisq; foliis con-
stantes: in quorum medio
eiusdem coloris numerosa
stamina capitulum constitu-
unt, ex quo deinde incurua

& gracilis siliqua tāgenti aspera, longitudine digitali erumpit, œnogræci siliquæ
equalis, non tamen adeo in acumen delinens, sed in summitate nigricans, capitulum
alata sagittæ quandam similitudinem præ se ferens habet, sed obtusa acumine sili-
qua utrinq; lineam profundā ceu incisam per longitudinem transeuntē habet, quæ
commisuræ eius sunt, quibus matura aperitur, semina intus continentur papaueri
similia, colore admodum nigro. Radice nititur crassa, longa, foris nigricante, quæ
quotannis regerminat. seritur apud nos in hortis. in calidioribus uero regionibus
sponte in asperis maritimis exit. grauem habet tota herba odorem, & amarum sapo-
rem, qualem reliqua papaueris genera.

DE CYCLAMINO.

CAP. XXXVI.

Cyclaminus asari folia habet inferius purpurea, superius uiridia, utrinq; ta-
men candicantibus maculis distincta, coliculos a radice rubentes, graciles bre-
uesq; emittit, & in singulis singulos flores rosæ syluestri similes, minores tamen, &
colore purpurascens, quibus parua succedunt uascula, & in his semina asari semini-
bus quadātenus similia, coliculi adueniente seminum maturitate in spiram inuoluū-
tur, humiq; procumbunt. Radix subest rotundo rapo aut malo æqualis, in latitudi-
nem se pandens, foris in ruffo colore nigra, intus candida, sapore ualde acri & ama-
rescente.

rescente. nascitur editis, montanis & stirpibus confectis locis, solum amat luto-
sum, quemadmodum Asarum.

* Erdscheibe/Schweinsbror.

Cyclaminus. T. 1. 134. p. 906.

Gentiana. T. 1. 56. p. 174.



DE GENTIANA. CAP. XXXVII.

GENTIANA à radicis capite quinq; sex, aut aliquando plura profert folia, ma-
iori plantagini similia, cum ad consistentiam peruenerint, aliquantulum rube-
scentia, è quorum singularis, grandis, concavus & in flauo colore nitens exit caulis
duorum & aliquando trium cubitorum longitudine, circa terram pollicis, aut medii
digiti crassitudine, superius uero iuxta cacumen minimo digito gracilior, in nullos
omnino ramos uel adnata diuisus, à media sui parte, usq; ad summitem geniculis
maioribus interuallis præcinctus, ex quibus singulis bina exeunt folia, inferioribus
multo minora, leniter per ambitum incisa, basi sua caulem amplectentia: è quorum
sinu plures & oblongi oriuntur caliculi, & ex his singuli stellati & luteo colore flo-
res, Amelli floribus similes, nisi oblongiores & graciliores haberent radios, semen
florum caliculis, in duas partes se aperientibus inuenitur numerosum, leniter ru-
bens, forma & quantitate Leucoii simile semini, leuius, tantum, nec ita carnosum, ra-
dicem habet duum plerumq; digitorum crassitudine, longitudine uero pedali, in
c. iiii

plures partes distractam, colore cum recens est sufflauo, cum uerò exaruit rufescen-
te: sapore ualdè amaro. Nascitur altissimis, umbrosis, humidisq; mōtibus, quamuis
aliquando etiam humilioribus quibusdam conuallibus gignatur, radix singulis an-
nis regerminat, cum uerò semine se propagat, rarò altero & uix tertio anno caulem
producit,

DE SINONE siue Sifone. [Tragi Sifon, cuius Iconem damus, cum hoc conferatur.]
CAP. XXXVIII.

T. 1. 154. p. 461.



Bicubitali ferè altitudine herba est, cau-
les habet circa radicem minimo digito
graciliores, crebris geniculis, breuibus in-
teruallis præcinctos, et in multos ramulos
diuisos. Folia circa radicem multa profert,
humì prostrata, eaq; non indiuidua simpli-
ciaq; sed in gracili & pede longiori pedicu-
lo utrinq; sena, quina, quaternaue, contra-
rio inuicem exortu, et ab inuicem distantia,
posteriore sui parte, (qua utrinq; profun-
diorem habent incisuram) unciam latitudi-
ne excedentia, & digitum ferè longitudine
æquâtia, in angustum cacumen fastigiata,
& undiq; aculeatis incisuris diuisa, in ante-
riore uerò pediculi parte, tria ab uno exor-
tu exeunt folia, quorum duo exteriora ad
latera uergunt, medium rectâ extenditur,
quæ uerò sub ramulis & adnatis è genicu-
lis prodeunt folia, prædictis multo minora
sunt, paulatimq; decrescunt, quo ad cacumi-
na propius accesserint. Singula adnata exia-
guas ferunt umbellas, in quibus minimi &
candidi sunt flosculi, quos deinde parua sub
sequuntur colore nigro semina, petroselinî
fatiui seminibus æqualia. Radice nititur di-
giti crassitudine, longitudine dodrantali,
candida, in fibras distracta, & postq; fructi-
ficauerit pereunte, semina gratam ceu aro-
mata resipiunt acrimoniam. radix semini-
bus imbecillior est, folia uerò radice. Serit-
ur apud nos in hortis, sed difficulter nostro
cœlo prius sata comprehendit.

DE IRIDE nostrate fatiua. CAP. XXXIX.

IRIS quæ apud nos in hortis, uineis ac murorum coronis seritur, ab uno cespite
plura & erecta erigit cubito longiora folia, duûm digitorum latitudine, rectius
nia, inferius in radicum capitibus coniuncta, ceu ex omnibus unum fiat, & sibi inui-
cem inserta, singulorum aperto & inciso uentre seu carina alterius dorsum excipien-
te, superius uerò alæ modo in latitudinem explicita, & in mucronem gladii figura
desinentia: è quorum medio caulis assurgit sesquicubitalis, rectus, teres & glaber, ue-
luti cinereo polline conspersus, faciliè abstergentibus cedente, quinq; aut sex genicu-
lis inter-

Pingitur hæc herba etiam à Dodonæo: qui aliquos
pro Meo ea uti scribit.

T. 2. 51. p. 703.



lis interseptus, ex quibus singula exeūt sine pediculo caulem amplectentia folia, inferioribus eo minora, quo summitati propinquiora, flores in summitate post medium ueris per interualla erumpunt, primum conuolutis in turbinem membranis, paulatim se in nouem folia explicantibus: ex his tria inferiora digitali sunt longitudine, circa exortum angusta, reliqua sui parte uncia multò latiora, deorsum inflexæ, lingue figura, foris liuidi coloris in cinereo, & iuxta principium uiridia, intus uerò purpurea, latis & lacteis uenis se uiolaceo splendori miscentibus, maximè ubi uersus exortum gracilescunt, adhæret iis in interiori sinu inferius lutei coloris & in longitudinem exporrecta lanugo, oblongis pilis, hirsutæ campæ aliquam similitudinem referens, in summa totum folium Iridis omnes colores representat, unde nomen inuenit, lanuginem cuiusq; folii aliud paruum obteggit folium in summitate in duas partes dissectum, ab utroque latere herbacei coloris, in medio liuido ex-tante dorso, reliqua tria folia, & ipsa lingue aut colearis formam habent, primis tamen latiora, & paulò breuiora existunt. & quemadmodum illa deorsum incuruata ascendunt, sic hæc sursum uersus reflexa iunguntur, color his est utrinque in cinereo liuidus, quæ uerò prioribus alterno positu adnectuntur purpureæ maculæ luteo colori insperguntur: durat ferè octiduum flos, deinde contrahitur, exiccatur & decedit, inferius oblongum, ac sexangu-

d


larem folliculum relinquens, intus in tria loculamenta interseptum, in quibus rotunda sunt et oblonga semina. Radicibus nititur multis, inuicem in latitudinem sibi adnatis, duum digitorum crassitudine, geniculatis in transversum striatis, per superficiem terrae sparsis, foris modice in flauo rubentibus, intus autem candidis, ex inferiori parte longas, tenuesque fibras in terram agentibus, ex his aliquot, quae adhuc nascuntur lutei coloris in fine aut capite existunt, grauiter tota herba, ut sambucus ferè dunturitur, spirat, praesertim radix, quae etiam gustata, coccognidii modo fauces exurit.

DE IRIDE *sylvestri*. CAP. XL.

SYLVEstris Iris satiuæ similis est, paucisque notis à satiuâ distinguitur, foliis minoribus & hyeme prorsus non apparentibus, cum satiuæ folia hyemis sæuitiæ contumaciter resistant. caulem etiam quam satiuâ breuiorē fert, quo flores ferè utriusque diebus ante satiuæ flores erumpunt, colore magis purpureo, quibus defluentibus pollicari quantitate succedunt folliculi, sex lineis concavis in longitudinem striati, in maturitate tribus commissuris se aperientes, rotundo & cartilagineo semine pleni. Radicem habet digitali crassitudine, dodrante breuiorem, geniculatam, transversam à posteriore parte singulis annis putredine tantum ferè amittentem, quantum ab anteriori parte æstatibus capiti restituitur, nec satiuæ in modum densum cespitem constituentem. Sapore & odore atque aliis qualitatibus satiuæ respondet. Nascentur editis & cliuosis locis inter arbuta.

* *Lilum Scheyberhense bey Selsster, quod omnium primò floret.*

T. 2. 133. p. 904.



DE XIRIDE, [quæ uulgò spatula foetida dicitur.] CAP. XLi.

XIRIS sylvestris Iridis species est, folia, caules, flores & radices satiuæ æqualia & similia producit, nisi aliquid impediret. nam flores magis saturata arrident purpura, quibus succedunt sylvestris Iridis folliculis similes utriculi, sed paulò maiores & triquetri rotundo, rubroque semine pisi quantitate pleni. Radicibus nititur magnus cespitem constituentibus, positu, figura & colore sylvestris Iridi similibus, sed paulò crassioribus, habent semina & radices grauem & sambuci ferè odorem, & gustata satiuæ modo, fauces scarificant, folia uerò supra modum foetent, unde etiam alio nomine spatula foetida recentioribus appellatur.

DE IRIDE tenuifolia, [quæ apud nos etiam non procul Tiguro nascitur.] CAP. XLii.

TENVifolia Iris prædictis omnibus tenuior est, foliis dodrantalibus aut pedunculatis, semunciam latitudine nunquam superantibus, plurimis à densò radicum cespitem assurgentibus. Caules satiuæ Iridi similes profert, multò tamen graciliores, in apricis pratis cubitales, in frutetosissimis uerò proceriores, flores foliorum numero positi & forma satiuæ similes habet, nisi quod minores magisque purpurei sint & flaua erucæ similes.

msili lanugine careant, cuius uices occupant: iuxta singula tria inferiora & inflexa folia, totidem ludentis in purpura coloris stamina. Radices sub sunt multae, transuersae, graciles, in superficie nigricantes, & propter uetustas foliorum reliquias uillose, intus candidae, sibi ipsis implicatae, a quibus praedictarum Iridum modo exeunt fibrae & cirri, trita, recentis adhuc, folia medium inter syluestrem Iridem & gramen odorem spirant. Radices uero praescriptarum more fauces exurunt. Nascitur in apricis planisq; pratis, & frutetosis ac humentibus campis.

DE IRIDE lutea siue Pseudoacoro.

CAP. XLIII.

PSEUDOACORUS folia, caulem & radices satiuæ Iridis quales & similes habet, præterquam quod folia, utrinque extate dorso iuxta mucronem euanescente, ab aliarum Iridum foliis differant. Flores item quantitate eiusdem, forma uero tempore florendi & partibus, tenuifoliae Iridis floribus respondentes, quibus singuli succedunt folliculi, longitudine & crassitudine pollicari, figura triquetri, intus trifido septo in tria loculamenta secundum longitudinem diuisi, latis, tenuibus, forisq; rubentibus, intus autem candicantibus & substantia cartilagineis seminibus pleni, sibi ipsis pulchro ordine superpositis, & multo quam lentes maioribus. Radices propter foliorum uestigia & uenosas reliquias foris uillose nigrae sunt, intus uero rubentes, substantia porosa, & ceu filis quibusdam uenosae, quae gustatae uehementer sine quauis alia qualitate adstringunt. Odorem tanta herba nullum spirat. nascitur ubiq; in palustribus.

* Gälbe Schwereln.

Iris pseudoacorus. T. 2. 49. p. 699.

Filix latifolia. T. 1. 186. p. 543.



d ij

DE FILICE latifolia, [Eadem aut proxima uidetur, quam ex Hieronymi Tragi
libris hic addidimus.] CAP. XLIII.

LATIFolia filix ab uno radice cespitè plures emittit pediculos bicubitales, iunco multò crassiores, inferius ab interiori parte canaliculatos & utrinque his angulis striatos, glabra & omnino leui superficie. ij iuxta terram præcisi lunæ nondum in globum tumentis figuram ostendunt: à quibus utrinque ex intervallo usque ad summam alii erumpunt minores pediculi, non omnino in annexu sibi respondentes, longitudine dodrantes, qui uerò inferius & in summitate constituti sunt, mediis breuioribus existunt, exeunt ab iis tenera & glabra folia, duarum ferè unciarum longitudine, iuxta exortum semuncia paulò graciliora, paulatim in mucronem non adeo acutum fastigiata, tenuissimis & obliquis uenulis distincta, quina, octona, dena, undena aut duodena, ex utroque pediculorum latere, breui admodum intervallo ut se contingant ferè, exeuntia in fine pediculorum inter utrumque ordinem unum rectè prominere, parem numerum unitate in impari permutans. tota herba filicis modo pennata, & in latitudinem explicata est, à medio eius cespitè alii etiam eriguntur cubito maiores coliculi, ultra medium foliis prædictis similibus pinnati, ab ea uerò parte usque ad cacumen, foliorum uice hirsutas, asperas, crassasque habet diuisiones, colore in rufis flauas. Radicibus nititur tenuibus innumeris, uillo sis, ueluti cirris in magnum & inextricabilem nodum implicitis, in superficie nigris, intus uerò in uiridi pallidis, quæ in medio, ubi omnes coniunguntur, amissorum coliculorum reliquias & uestigia retinent. Saporem diuersum diuersis habet tota herba partibus: superioribus enim & asperis incisionibus, præter exicantem qualitatem, nulla alia inest: folia uerò uehementer amara sunt, pediculi autem quæ radicibus iunguntur glutinose lentore & cucumeraceo sapore linguam edulcorant: reliqua sui parte aqueam præ se ferentes dulcedinem. radices postremo cum modica dulcedine adstringunt. Nascitur putridis, uliginosis, macris & humentibus locis, circa aliorum truncos.


DE BVGLOSSA longifolia. [Tragus Buglossam italicam uocat.]

CAP. XLV.

BVGLOSSA longifolia à radice capite plura emittit dodrante longiora et aspera, e quorum medio caules erumpunt plures bicubitales, plerumque foliis asperiores & teretes, in plures ramulos diuisi, flores in summis ramulis profert (sole in Geminos eunte) singulos, paruos, purpureos, exiguis quinque foliolis, breui, concuæ, teretibus ueluti fistulæ annexis constantes, in medio tenuissima stamina ceu breues pappos habentes, facile dum trahuntur, à calice suo quinque constante, hirsutis & acuminatis foliolis recedentes, singulis floribus quaternis, ternis, binis aut singulis succedunt nigra semina, Buglossi quam Borraginem uocant similia, paulò tamen maiora & rugosiora, intus candidum nucleum habentia. Floret particulatim, ideoque semen totis ramulis adnascitur, inferius maturius, superius uerò recentius. Radicibus nititur longis, teretibus, digitali crassitudine, foris nigris, intus candidis, glutinosis & mucilaginosi, tam gustu quam tactu Symphyti radicibus similibus & per sam & Echion. Sparso eius semine prima quidem æstate caules fert, uerum breues, sequentibus autem annis, ex eadem radice maiores emittit. Seritur apud nos in hortis, interim etiam sponte prouenit.

De

Buglossa longifolia. T. 1. 77. p. 232.



DE ARGEMONE. [Tragus papauer erraticum Argemonen facit, non recte.
 Cordus hic similem herbam, nobis ignotam: luteo liquore acri & amaro ma-
 nantem.] CAP. XLVI.

ARGE MONE caulem habet ferè cubitalem, teretem, & hirsutum: circa què folia sunt inferius maiora, superius uerò minora, crebro profundis & obliquis incisuris diuisa, hirsutàq; minori Rhæadi similia. florem item, sole Geminos ingrediente, in summis furculis fert similem & æqualem, quo defluente oblongum capitulum remanet, papaueri Rhæadi simile, paulatim incrementum sumens, donec unciam longitudine superet, in summitate latum, inferius uerò angustum, in quo semen clauditur papauere minus, colore rufum. Radicem habet annuam, digito longiorem, gracilem, teretem & fibratam, colore flauam. Tota herba luteum liquorem incisa remittit, Chelidonio maioris modo, gustu acrem & amarum. Nascitur in editis uineis, glutinoso & pingui solo.

DE PAEONIA scemina. CAP. XLVII.

PAEONIA scemina primo uere rubentibus erumpit in purpura coliculis, una cum foliis in summitate sibi inuicem inuolutis, clausarum in pugnum manuum & unguium figura, iuxta terram eiusdem coloris aperta quædam inuolucra,
 d iij

T. 1.200. p. 581.



imbricibus similia, relin-
quentes, quibus nondum
enata clauderantur germi-
na. Coliculi apertis foliis
paulatim cubiti altitudine
assurgunt, angulosi sunt,
purpura se in uiriditatem
dilutam immutante: habet
adnata aliquot caules lon-
gitudine dodrantalia, quæ
in ternos diuiduntur, &
uni geniculo annexos pedi-
culos in terna folia delinen-
tes: ea profundius incisa, &
smyrni modo in partes dis-
secta sunt, longitudine du-
arum aut trium unciarum,
latitudine uero unius, su-
perne uiridia, inferne cine-
racea, & ramosis uenis di-
stincta, in summis caulibus,
sole Taurum occupante, flo-
res fert puniceos, papaueri
similes, crassioribus tamen
foliis constantes, in quorum
medio bina eminent corni-
cula, luteis circumuallata
staminibus, quæ sola, reli-
quis decedentibus florum
partibus, remanent ac pau-
latim usque ad sesquiunciale

longitudinem & uncialem ferè crassitudinem adulescentia, extrorsum reflexa & hix-
suta lanuginosæque superficie, ea in maturitate superius unica commissura aperta semi-
na ostendunt, pili maioris quantitate quinque aut sex, foris nigro cortice, intus candi-
do nucleo constantes: Radices habet numerosas, longitudine dodrantes, interdum
digitales, nonnunquam etiam breuiores, crassitudine pollicari sibi ipsis angustius
quibusdam ueluti isthmis coherentes, foris nigricantes, intus ex candido modicè
ad rubedinem tendentes, & diuturnas in summa farciminum, sepius per intervalla
funiculo præstrictorum formam imitantur. Saporem habet radix dulcem, acrem,
subamarum & nauseabundum, semen gustu radicibus respondet, non tamen adeo
nauseam facit. Odorem uero grauem, nec multum absimilem Sambuco tota herba
spirat.

DE THYMO nostrate.

CAP. XLVIII.

THYMVS nostras qui in hortis colitur, frutex est paruus, ramosus, pede raro
procerior, foliis uestitur totus minimis, modicè oblongis, acuminatis & hix-
tis, breui intervallo geniculatim furculis circum adnata. in summis furculis capitula
sunt, post medium ueris minimorum in candido modicè rubescentium florum &
caliculis in labro serratis insidentium plena: quibus defluentibus semen in caliculis
gignitur

Thymus nostras. T. 1. 12. p. 43.



gignitur, minimum in ruffo nigricans, quamuis Theophrastus & Plinius nullum esse Thymo semen afferant, contra rei ueritatem. Radix cenitur lignea, in fibras distracta & inutuli. habent folia teneriq; cum flore coliculi gratam in gustu acrimoniæ & iucundum admodum odorem.

DE THYMO *capitato*.
CAP. XLIX.

QVI uerò ex Creta & oriente ad nos affertur Thymus nostrati quidē similis est, sed hirsutioribus & asperioribus foliolis, capitulis in summo nostrati tenuioribus, sed densioribus, confertioribus, & ueluti in spicam turbinatis, acriore gustu et odore, magisq; aromatico.

DE ACHILLEA, [quam Tragus uidetur Millefolium uulgare nuncupare, hac eius icone proposita.] CAP. L.

ACHILLEA dodrantes aut pedales quotannis à perenni radice caules emittit, numerosos, rectos, graciles, furculaceos, modice angulosos & lanuginosos, à terra breui spacio usq; ad summam sesquiunciali longitudine, & unciali ferè latitudine, foliis uestitos, in obliquas & crebro utrinq; minutim incisas partes, ex intervallo in utroq; latere diuisis: ea quamuis coriandrinis non dissimilia sint, tēstante idem Dioscoride, tamen maiorem habent cum Tanaceti foliis similitudinem nisi multò minora essent, sed eadem illis est forma & proportio, in cacumine cuiusq; caulis inæqualiter dispositi, furculi umbellam constituunt, minimis floribus in medio subluteis, per ambitum candidis, & nonnunq; purpurascētib; plenam, ea florere incipit sole in Geminis existente, usq; in æstatem durante flore. Radicibus nititur tenuibus, in fibras distractis, lignosis, ideoq; superuacuis. Tota herba terrestri tūtur tenuibus, in fibras distractis, lignosis, ideoq; superuacuis. Tota herba terrestri stratiotifimilima est, nisi latiora folia haberet. saporem & odorem folia cum floribus medicamentosum nec ingratum habent Matricariæ similem, non tamen adeo grauem, neq; eo usq; amarum. Nascitur in quiescentibus, planisq; sed editis aruis, solum amat pingue & lutosum.

* Matthiolus Millefolium minus nominat. Achilleam aliam facit.

d iij

Achillea. T. 1. 160. p. 476.



Ruta sativa. T. 1. 22. p. 68.



DE RVTA sativa maiore siue latifolia.

CAP. LI.

R VTA sativa maior, frutex est caudice cubitali, aut altiore, crassitudine digiti
 tali, colore cinereo, in multos ramos diuisus. ex his ueris initio plures emitte
 longos, teretes, egregie uirides & flexiles surculos, in quorum summitate ueris exi
 tu, & aestate inaequali ordine flores sunt Leucoio similes, minores tamen, quatuor
 aut interdum quinque luteis & coctearis modo concavis foliolis constantes, sursum
 spectante eorum concavitate, in medio flore quadripartitum aut nonnunquam quin
 quepartitum est capitulum, colore uiride, exiguum quendam apicem habens, stami
 na ab ima eius parte exeunt lutea, octona aut dena in latitudinem resupinata: ex his
 medius numerus supra foliolorum concavitatem extenditur, reliqua autem quatuor
 foliolorum spaciis interposita sunt, semen in mediis florum capitulis fert para
 uum, in rotundo modice oblongum, colore nigrum, folia omnibus ramulis adna
 scuntur, in longis pediculis incerto ordine disposita, parua, in plures & inaequales
 partes secta, uirentia, mollia & pingua. ex his maxima pars semunciam longitudi
 nis non excedit, latitudine multo minore. Radice nititur ex uno principio multifa
 da, numerosa, capillamentis fibrata, colore flaua. uiret tota hyeme, non flaccescen
 tibus foliis, antequam nouo uere alia enascantur, quo tempore etiam surculi qui se
 men

men protulerunt, in summitate exarescunt, coma eius acrem, aromaticum, interimq̃
grauem spirat odorem, eadem sapore amaro, feruido & tenui palatum excalefacit,
maximè uiridia adhuc florum capitula. Colitur in hortis.

DE RVTA *fatua tenuifolia.*

CAP. LII.

RUTA tenuifolia Latifoliae per omnia respondet, præterquam quòd mul-
tioribus constet omnibus partibus. folia siquidem fumo terræ modo in exi-
les partes diuisa habet, non tamen in tantam latitudinem diffunduntur. floribus
& capitulis latifoliae similiter respondet. semen habet oblongum, nigrumq̃, gustu
uehementer acre: reliquarum partium qualitas & sapor latifoliam æmulatur. Scri-
turq̃ similiter ut illa in hortis, parè apud nos, sed frequentius in Italiae quibusdã
locis ubi hanc tantum Rutam nouerunt.

DE LVPINO *fatuo.*

CAP. LIII.

T. 2. 15. p. 622.




LVPInus satiuus legumèn est recto, sel-
quicubitali, tereti, lanuginoso, con-
cauo, et singula assurgens caule, folia habet
quina, sena, & ut plurimum septena, quum
digitorum longitudine, latitudine ferè uni-
us, utrinq̃ fastigiata, superius glabra, infe-
rius lanuginosa, è summitate pediculorũ,
ueluti ex uno centro radiorum modo ex-
euntia, interdum splendens sole erecta, no-
ctu uerò omnino se demittentia. pediculi
quibus hæc insident longi sunt et inæqua-
li ordine ex intervallo cauli adnascuntur.
in summo caule, & nonnunquam etiam in
adnatis deinceps dispositi flores, sole Ge-
minos occupante, erumpunt figura, papili-
onum, colore candidi, quibus defluëtibus
succedunt digitali longitudine & latitudi-
ne siliquæ, figura planæ, lanuginosæ, &
principio crassæ carnosæq̃, cum maturu-
erint, tenues & flauæ. in quibus semina
sunt rotunda & plana, foris in flauo candi-
da, intus uerò detracto cortice flaua, latitu-
dine semuncia paulò minora, ea qua anne-
ctebantur parte concauitatem exigua
ueluti umbilicum habentia, crepitaculi
modo in siliquis resonantia, cum arefacta
herba agris euellitur, radice nititur singu-
lari, tenui, lignosa, candida & superuacua,
paucis capillamentis fibrata, quibus non-
nunquam parua tubercula adnascuntur, sic-
ca tellure, subitaneis imbribus irrigata, ef-

ficacissimum semen est, ideoq̃ solum in usu medicinae habetur propter amaritudi-
nem, medium enim saporem habet inter cicera & absinthium.

CORONOpus ab uno radice capite folia emittit numerosa, longitudine ferè do drantalia, graminis modo angusta, canaliculata, crassa, pingua & in extremitatibus hirsuta, supra medium utrinque in partes ueluti ungues distracta, multoque magis diuisionibus suis ceruinis cornibus similia, propter copiam humi undique orbem prostrata, inter quæ indiuidui coliculi ueris exitu erumpunt, longitudine do drantales, teretes, subhirsuti & uehementer graciles, in summitate singulas uelut spicas plantaginis modo ferentes: ex quibus stamina tenuissima exeunt, quæ flores eius sunt, semen in paleacea est spica, copiosum concipit minimum ac rubens, aliquantulum oblongum & compressum. Cum liberè nascitur hoc olus resupinatos erigit coliculos, densius autem satum rectos emittere cogitur. Radice nititur singulari, candida, tereti, do drante breuiori & minimo digito graciliore: quæ gustu cum aqua dulcedine & modica acrimonia parum adstringit, folia saporem dulcem, & aliquantulum falsum habent. Seritur apud nos in hortis, estque annuum & acetarium olus.

Coronopus. T. 1. 31. p. 99.

Rhodia radix. T. 2. 137. p. 913.



DERHODIA radice.

CAP. LV.

* imò
Rhodia radix ab una radice numerosos emittit coliculos longitudine do drantis, in
 crassiores. ceteræ gracilitatis, teretes et glabros, statim à terra usque ad summitatē, unciali longitudine
 & se

et semicirculari latitudine foliis undiq; inaequali ordine uestitos, in extremitate modice nec profunde incis, substantia crassi, carnos, & in uiridi coeruleis, in summa media am habent figuram folia, inter crassulae maioris & portulacae folia, in summis coliculis aestate paruae erumpit umbellae simile capitulum, paruis & in candido pallidis floribus plenum, semen fert exiguum. Radice nititur dodrante breuiore, crassitudine pollicari, ramosa, inaequali & tuberosa, coelio, squamoso & facile recedente cortice uestita, intus uero in candido rubente, fungosa & pondere leui. quae trita, & gustata ac naribus admota medio inter rosas & salicis flores sapore & odore percipitur. herba etiam cum amaritudine aliqua adstringit. Nascitur in alpibus Germaniae non longe a Salisburgo.

* Adfertur ex Austria.

DE TORDYLO, [Nostri uocant Bärwurz, aliqui pro Meo accipiunt.
Tragus Daucus adnumerat.] CAP. LVI.

T. 1. 148. p. 445.



odore nares opplent, sapore uehementer tenui, aromatico simili, & iucundo, minima quantitate: gustate longo tempore gustum atq; olfactum obsidentes, folia mediam qualitate inter radices & foeniculi folia tam gustu quam olfactu habent semen postremo praedictis partibus qualitate responderet, nisi aliqua admixta amaritudine dilueretur. Nascitur excelsis, planis & apricis latorum in cacumine montium capis, iisdemq; aliquantulum humentibus, ut iuxta claustrum Knibusium in nigra sylua, inter Dornstadium & Lustenauium oppida, quae ex Tubinga uersus Argentoratum itur.

c ij

TORDYLO, quod ab aliquibus Sese-
li Creticum appellatur, numerosos ab
uno radice cespit pediculos emittit, longi-
tudine dodrantes, graciles, ab interiore par-
te ex tereti figura in angulum desinentes,
uenosos & iuxta terram in purpura nigri-
cantes, a quorum medio usque ad summita-
tem ex intervallo prodeunt minutissime in-
cisa folia breuissimorum capillamentorum
figura, gracilibus surculis utrinque in exor-
tu sibi coniunctis circumposita, horum sur-
culorum primi longissimi sunt, quibus reli-
qui paulatim longitudine cedunt, donec in
summitate in turbinatam figuram desinat
omnium foliorum coma, quae per omnia foe-
niculi foliis similia sunt, praeterquam quod
multo breuiores huius Tordyli incisurae
sint. Caulem paulo post medium ueris unum
atque alterum producit, longitudine peda-
lem aut dodrantalem, gracilem et concavum,
uno atque altero in cacumine adnato, & in
singulis paruum umbellam candidorum
flosculorum plenam: quibus succedit ob-
longum, angulosum, duplexque semen in fus-
co sufflauium, media intercuminum satiuum
& Sese-li figura & quantitate. Radicibus ni-
titur multis, ab uno capite in diuersas par-
tes distractis, longitudine dodrantalibus, mi-
nimo digito multo gracilioribus, foris ni-
gricantibus, intus uero candidis, quae supra
modum acri, suauis, aromatico & tamen graui



nora tamen pedali pediculo, geniculatim utrinque enascentia, in terna aut quatuor
na plerumque paria diuisa, adnata omnibus caulium geniculis singula egreduntur,
in quorum summitate umbellae sunt foeniculo similes & aequales, luteis & paruis
floribus. aestatis initio plenae, quibus succedunt oblonga, angulosa, duplicia & foeniculo
similia semina tam figura quam colore, maiora tamen. Radices habet superi-
ditate aut maiore descendentes, colore candicantes, quae incisae flauum colorem ex-
se remittunt. Sapore habet tota herba modice acrem, tenuem & aromaticum; odo-
rem uero apio multo acriorem & grauiorem, non tamen iniucundum. Radici recen-
ti efficaciores sunt, quam reliquis partibus qualitates praesertim liquore, sed pro-
rumpuntur. Semen uero quia siccus est, in multos annos prorogatur. Colitur in
hortis: amat terram pinguem & locum umbrosum desiderat: ideoque feliciter iuxta

LIGUSTICUM satiuum
pediculos ab uno ra-
dicis cespite plures emittit
cubito plerumque longio-
res, & minimi digiti cras-
situdine teretes, striatos,
glabros & concauos: acu-
ius medio per interualla ul-
que ad cacumen bini mino-
res exeunt pediculi, quorum
inferiores longitudine pe-
dali conspiciuntur, reliqui
uero breuiore, & ex his in-
terstitiis discreta bina fo-
lia in geniculis coeuntia,
glabra & nitentia, trium
aut duum digitorum latis-
tudine, longitudine pau-
lo maiore, turbinata pro-
fundius in anterioribus la-
teribus apice modo incisa, &
summis pediculis, unum
recta egreditur parem pre-
dictorum numerum in im-
parem uertens. Caules eri-
git humana statura ple-
rumque multo proceriores,
pollicis aut digiti crassitu-
dine, geniculis praecinctos:
in quibus pediculi & folia
sunt praescriptis similia, mi-

De

DE MILLEFOLIO terrestri maiore: [Tragus Millefolium nobile nuncupatur
re uidetur.] CAP. LVIII

T. 1160. p. 476.



STRATIOTES terrestris maior, quem aliqui Millefolium terrestre uocant, multa ab una radice folia emittit digito longioribus pediculis utrinque breui intervallo adnascencia, semuncia longitudine se ipsa inuicem contingentia, plurimis, capillatis, breuibusque incisuris diuisa. Totum pediculis folia magnam habent cum auicularum pennis similitudinem, caules emittit rectos, longitudine plerumque digitali, teretes, furculosos & indiuiduos, ab ima parte usque ad cacumen inaequaliter dispositis foliis plenos praedictis similibus, breuioribus tamen. In summis caulibus latum est capitulum, corymbi aut umbellae figura (si omnes eius furculi ab uno principio exirent) paruis, candicantibus & in medio luteis flosculis plenum, candida florum foliola quae luteo tuberculo circumponuntur, quibusdam locis purpurascens colore conspiciuntur. floret diu, incipit enim sole in Geminos transiente usque, post solstitium durante flore, cui semen paleaceum & acerosum succedit. Radice nititur perenni, gracili, fibrata, ligrosa & inutili. Saporem habent folia & flores subamarum et subacrem, odorem uero acrem, abrotano albo non dissimilem, estque hic non iniucundus, praesertim florum si terantur. nascitur secus uias, fossas, et in aggeribus solo plerumque aspero & aprico.

DE STRATIOTE siue Millefolio terrestri minore.

CAP. LIX.

STRATIOTES terrestris minor, maiori in cunctis similis, multo tamen minor, raro enim do drante altioribus caulibus assurgit, tenuissimisque foliorum incisuris constat, odore magis acris, in attritu uehementi & aromatum modo iucundo, saporem habet maiori multo acriorem, amariorem, magisque tenuibus partibus constantem, alioquin tam similes inuicem sunt, ut non facile a quouis dignoscantur: nec credendum est, has duas herbas unam eademque esse, & natalibus tantum differre, nam minor haec in apricis tumulis ex pingui terra congestis, & in pinguium editiorumque aruorum marginibus, iisdemque diu non cultis provenit: maior autem illa in asperis & macris tantum. Cum itaque omnia in asperis & macris nascentia, eiusdem speciei in fecundo solo, genitis acriora, efficacioraque sint, necesse esset, maiorem stratiotem in macris nascentem, in pingui, letoque solo exeunti, acriorem & efficacioram fieri, sed in lato solo nata, in macro natali genita multo efficacior existit, tam gustu quam odore, ergo rationi minime repugnat, minorem stratiote m

e in

diuersum à maiore, & proprium genus habere. Prouenit autem copiosissima inter Halam Saxoniam & Merseburgum, inter Halam & Eyslebiū, & in tumulis olim congestis circa montem Petri & uicinis locis.

DE HEMEROCALLE rubente, [quod Italorum Martagon uidetur, quo pro Asphodelo imperiti quidam hactenus abusi sunt.] CAP. LX.

T. 2. 83. p. 787.



membranis ceu parietibus in tres camerulas per longitudinem diuiditur, in quibus bini cōtigi, paruorum, latorum, planorum, leuium sibi inuicem superiacentium & flauorum seminum ordines continentur. Radicem habet bulbosam, diuturnam, iusti nucamentis sursum spectantibus compositam: à qua alii exigui prodeunt bulbi, quibus se propagat. Saporem habet lentum, glutinosum & nauseosum, tam flores editis quàm planis.

DE SONCHO syluestri lata radice. [Nos talem serè quandam Lactucam syluaticam habemus, sed multo procriorum plerumq; , duorum generum: unum luteis, alterum purpureis floribus.] CAP. LXI.

SYLVEstris Sonchus caulem habet cubito procriorum, foliis per ambitum diuisis, sinuosis et ueluti circumrosis amplexum, Sonchi foliis similibus, minoribus

bus tamen. Flores fert in summis uirgis paruos, capillatos & luteos: in pappos canescentes, & unâ cum oblongo nigroq; semine auolantes. Radice nititur semestri, breui, sesquiunciali, lata, in partes duas aut tres diuisa, foris flaua, intus candida. Tota herba copiosum & lacteum incisa liquorem remittit, gustu amarum & subacrem. Nascitur frutetosus locis, plurimumq; circa montem Petri.

Lactuca syluatica.



Aster Atticus. T. 1. 48. p. 152.



DE ASTERE Attico, [radiculis odoratis. Videtur eadem, prima species herbe: quam Florem tinctorum Tragus uocat, Germanicè Scharrenkraut. Fuchsi-
us quidem suo Asteri duos à radice caules producit, Matthiolus quatuor.]
CAP. LXII.

ASTER Atticus caulem unum atq; alterum cubitalem erigit, solidum, lignosum, nigricantem, & in ramulos diuisum: circa quem oblonga & utrinq; acuminata folia sunt, duabus uncis longiora, dimidia uncia latiora, nigricantia, hirsuta & aspera, atq; propè terram, folia è caule exeunt maiora sunt, quæ uerò in summitate minora, flores æstatis exitu in summis uirgis fert Chamæmeli floribus similes. in medio enim luteum habent capitulum, quod instar stellæ undiq; oblongis & angustis foliolis ueluti radiis circumdatur: quibus flaccescentibus luteum capitulum in pappos resoluitur, & unâ cum oblongo semine auolat. Radice nititur in partes & fibras distracta, eaq; perenni. saporè folia habent modicè amarescentem. radices uerò caryophyllatæ aliquem odorem adiunctum habent. Nascitur montanis, lapidosis & herbosis locis: plurimaq; circa lenam & Tubingam.

e. iiii

OX Ycoccum coliculos per terram spargit dodrantes plerumq; setarū modō
tenues, et in flauo rubentes; paruis & thymo similibus, supernē uiridibus, infer
nē autē candicantibus aut rubescētibus, singulisq; foliolis breui interuallo uestitos.
flores in extremis et capilli instar gracilibus furculis fert admodū paruos, colore pro
pmodū puniceo; quibus æstate singulæ succedunt baccae pisi quantitate, figura ro
tundæ & cordis modo inferius iuxta annexum turbinatæ, superius uerō exiguo &
quadripartito umbilico ueluti coronatæ, colore foris primum candicantes: mox pu
niceæ & purpureis contiguiscq; maculis et punctis conspersæ: intus uerō in candido
modicē rubentes, & quatuor exiguis cavitatibus parua & ueluti abortiua semina
quam absconditæ latent. Radicibus nititur breuibus, capilli modo tenuissimis &
flauis, saporem coliculi & folia habent adstringentem: baccae uerō egregiē & simpli
citer acetosum. Nascitur incultis, macris, humidis, putridis, uliginosis, muscosisq; lo
cis, ac frequenter iuxta Salsiroram, plurimūq; propē Vuittembergam.

* Heluetijs Noßbeer, id est, acini palustres, nascuntur enim muscosis & humentibus locis.

Oxycoccum. Aliter uel alia species
pingitur à Dodoneo.



Ricinus, T. 1, 98, p. 288.



De

RICINUS caulem ex uno semine erigit singularem, trium plerumq; cubitorum altitudine, aut proceriorem, pollice crassiore, arundinis modo genicula- tum & concauum, glabrum & ueluti in purpura cinereo puluere confersum, duo- bus, tribus aut quatuor adnatis ramosum. folia habet dodrantis aut pedis latitudi- ne, in septem, octo aut nouem, nonnunquam etiam plures partes incisa, & per am- bitum ferrata, glabra, mollia & aceri arbori similia, longis, crassis & teretibus pedi- culis insidentia: ea ubi pediculo iunguntur, neruos ueluti e centro per medias foli- orum partes a tergo emittunt. flores astat fert pedibus pediculis instar longi ra- cemi circumpositos, eosq; duplicis generis, inferiores enim ante quam aperiantur se- re pisti rotunditatem & quantitatem habent, apertis autem caliculis muscoli & pal- lidi corymbi speciem acquirunt, graciliq; pediculo adhaerent: qui in medio iunctu- ram quandam habet, a qua ipse flos, postquam flaccescere incipit, recedit & decedit, nulla spe secuturi seminis aut fructus post se relicta, steriles enim omnino inferiores hi flores sunt, & tantum rudimenta ac praeludia quaedam. Alterum uero floris ge- nis a molliter aculeatis capitulis procedit, singulaq; capita terna, hirsuta, furcata & rubentia stamina proferunt, quae floris uicem explent: hisce crescentibus capit- ula accrescunt, donec paruae castaneae quantitate confecta fuerint, ea in tres (ut plurimum) partes seu utriculos diuiduntur, nonnunquam etiam in quatuor, semina in utriculis singula habet. Ricino animali forma & quantitate aequalia, foris liuido aut maculoso cortice, intus autem candida medulla constantia, lignoso utriculi cor- tici inclusa, quo propter siccitatem in maturitate repente fisso & contracto, ipsa semi- na cum impetu & crepitu ueluti tormento aliquo emissa, longius prosiliunt. Radice nititur pedali, multifida, candida & semestri, seminis tantum usus est, quod gustu fauces exasperat nauseam & uomitum ciens, intra corpus uero grana aliquot sum- pta cum anxietate maxima utrinq; purgant. herba ipsa, cum teritur, grauem habet odorem. Seritur in hortis.

DE CVCVMERE *anguino.* CAP. LXV.

CVCV mis anguinus, qui etiam asininus appellatur, uiticulos per terram spar-
git bicubitalis, minimi digiti crassitudine, teretes, breuibz aculeis exaspera-
tos, solidos, & anguinum modo inflexos, folia ferè longis, crassis & aculeatis pedicu-
lis insidentia, sex uncium longitudine, posteriori parte quatuor aut quinque un-
ciumpallidiora & crebris, intricatisq; uenis rugosa, utrinque tamen aspera, flores ex
foliorum alis tota æstate profert, quinque latis acuminatis & flauis foliolis, uncia
paulò breuioribus constantes, in quorum medio ternæ hirsutæ & flauæ furculæ
staminum uicem explent, retro flores hirsutum & oblongum extuberat capitulum,
quod flaccescente flore, paulatim unâ cum suo pediculo accrescit, donec maxime
glandis quantitatē superauerit, hoc undiq; breuibz aculeis armatur, & in maturi-
tate cum splendere, gliscere & candicare inceperit, sponte sua aut leuiter ta-
ctum à pediculo recedit, & cum impetu ueluti tormentum aliquod oblonga fo-
ris nigra, intusq; candida semina unâ cum aqueo succo eiacularur, producit e-
tiam alios adulterinos & steriles flores, quos nulli fructus sequuntur, eos à genuinis
& fecundis dignoscēs, quòd intus terna, trifida ueluti complicata, & per am-
bitum crocea, nec hirsuta stamina contineant, nullumq; à posteriori parte capi-
tulum producant, quod secuturi fructus rudimentum existat. Radice nititur do-
drantali, crassitudine sua manum ferè complente, candida, carnosa & semestri,
f

oblongo rapo simili. Tota planta uehementer amara est, sine aliqua alia qualitate, folius seminis medulla dulcedinem habet, quæ etiam mures alliciat. quapropter miror Galenum huic semini amarum saporem adscribere libro de facultatibus simplicium, fortè superficiem tantùm gustauit, quæ amara est, non ipsum nucleum, qui propriè seminis appellatione uenit: purgat egregiè aluum succus totius herbæ. Nascitur asperis locis, circa pagos & rudera. cum uerò feritur, multò maiora folia producit.

Cucumis anguinus. T. 2. 99. p. 832.

Cichorium. T. 1. 91. p. 272.



DE CICHORIO. CAP. LXVI.

CICHORIUM siue agreste litybum, caules erigit cubito proceriores, inferius teretes & hirsutos, superius autem angulis striatos, pluribusq; adnatis ramis, angusta cauitate peruios, donec uirent lentos & infragiles: folia habet circa imam caulium partem dodrantalia ferè per ambitum inæqualiter diuisa, sinuosa, hirsuta, trium plerumq; digitorum latitudine, & in mucronem desinentia, maximè summis uirgis exeuntia, quæ minora etiam sunt, & paucioribus incisuris diuisa, folia uerò quæ antea caulium productionem à radice capite exeunt, & per terram sternuntur, multò maiora existunt & obtusiora. flores à ueris exitu in foliosis caliculis proferre incipit usq; ad autumnum, rotæ modo in orbem circumpositis foliolis constantes, colore cœruleis, uncia breuioribus, & in extremitate serratis, stamina in me-

in medio flore sunt eiusdem coloris, singuli autem flores unum tantum durant diem: manent enim prodeunt, uespere uero flaccescunt. semina post flores in iisdem caliculis fert oblonga et angulosa, sine pappis hyeme excidentia. Radice nititur perenni, cubitali, bifida plerumque, superius minimi digiti crassitudine, carnosa & candida, per quam lignosus transit neruus, folia incisa pauco lacte manant, tota herba amarum habet saporem, non tamen usque adeo uehementem. Nascitur campestribus & asperis locis, circa regias uias & arua.

DE CICHORIO satiuo.

CAP. LXXVII.

CICHOR lum satiuum, quod ab Italis etiam Endiuia hortensis seu simpliciter Endiuia uocatur, agresti figura & florum colore similem existit, folia tantum maiora minusque incisa habet, pauloque minores flores maioribus foliosisioribus hirsutioribusque caliculis insidentes. Radice nititur do drantali, lignosa, multis capillamentis fibrata, hyeme una cum herba pereunte. Sapore agreste Cichorium amulatur, quamuis minus amarescat, Seritur acetariorum causa in hortis Italiae frequentius quam Germania.

Cichorium satiuum. T. 1. 91. p. 273.

Helenium maius. T. 1. 55. p. 170.



f ii

Helenium maius, quod ab alio nomine Inula siue Inula cāpana uocatur, grādia à radice emittit folia, pedali & cubitali plerumq; longitudine, latitudine interdum dodrantali in mucronem desinentia, per ambitum modicè & inaequaliter serrata, superius in uiridi pallentia, inferius autem candicantia, hirsuta & uenis obliquis distincta, uerbasci foliis similia, caulem alternis (ut plurimum) annis fert tricubitalē, digiti crassitudine, nigricātem, in tereti striatum, solidum et singulis foliis (quā inferiora sunt) paulō minoribus ex intervallo uestitum, & in cacumine in adnata aliis diuisum: à quibus magni & orbiculati flores aestate prodeunt, foliaceis caliculis insidentes trium unciarum latitudine, inaequalibus partibus constantes. in medio longi, angustiq; & eiusdem coloris foliolis radiorum modo circumdatur: hisce flaccescentibus interiora stamina in tenues pappos soluuntur. & unācum oblongo, gracili, nigro semine auolant. Caulem quibusdam locis non fert, aut rarō. Radice nititur perenni, grandi, crassitudine sua manum implente, in pedales partes distracta, foris subruffa, intus autem candida & carnosā, à qua ueluti oculi alia germina exeūt, quibus auulis & positis propagatur, intus in ipsa radice liquor flauus guttatim dispersus continetur. Saporem radix habet feruidum, tenuem & amarum. flores & folia cum parua acrimonia amarescunt, semen foliis acrius est, & nihil ferè amaritudinis obtinet. Nascitur pinguibus & fecundis campis, à quibusdam etiam in hortis colitur.

DE CHONDRILLA *tenera, [Cichorio simili, floribus è coeruleo modicè in purpureum uergentibus, etc.]*

CAP. LXIX.

CHONdrilla tenera, Cichorio, id est, agresti Intybo similia habet circa terram bitalis, tenerq; exit caulis, superius in adnata diuisus, in quibus flores sunt Cichorio similes, modicè in purpuram ex coeruleo uergentes, semen habet oblongum, Radice nititur perenni, pedali, cubitali aut longiore, digitali crassitudine: foris tenui, squamoso & nigro cortice uestita, intus candida, carnosā, tenera & admodum fragili. Tota herba lacteo turgēt liquore, & gustu dulcis est. Nascitur editis apricisq; uineis & montibus. solum amat albicans, pingue & calcario lapidi mixtum: lenae itaq; copiosissima nascitur.

DE MILIO (*uel Panico*) *Indico, quod semestris est frumentum. [uulgò Sorgi appellant.]*

CAP. LXX.

MILIVM Indicum tres aut quatuor praegrandes, ex uno grano emittit culmos, septem, decem aut nonnuncq; tredecim pedum longitudine, crassitudine digiti, nouenis ut plurimum geniculis interceptos, solidos & maturiscente semine nerubentes. folia è geniculis singula profert cubito longiora, trium aut quatuor digitorum longitudine, tritico Bactriano similia, per ambitum minutissimis sed acutis dentibus armata: qui si deorsum mulceantur, teneros digitos etiam uuldrante plerumque longiores, quatuor aut quinque unciarum latitudine, plurimis paniculis constantes, & commodo in mucronem desinentes. hæ postquam omnino ex inuolucris aestate prodierunt, flores proferunt exiguos, oblongos, flauos & pendulos, quibus defluentibus spica rubescere incipiunt. autumno

Milium Indicum. T. 2. 30. p. 660.

Allium campestre. T. 2. 69. p. 748.



DE ALLIO campestri. [Tragus Allia syluestria tria simul depicta exhibet, uti hic ponimus. è quibus medi-
um syluaticum est, & Germanis nominatur Waldfnoblauch/ Ramseren/ Gerinsel. hoc Dioscori-
dis Ophiochorodon esse putat: aliqui ur sinum cognominant. Extremorum alterum quod binis folijs pin-
giur. Caninum uulgo cognominari ait à fetore, Funderfnoblauch, in uineis & locis cultis nasci, un-
de Ampeloprasen esse conijcit. Fuchsius syluestre allium uocat. Wilderfnoblauch. Alterum quoque
Allij canini speciem facit, sed non describit. hoc as allium campestre Cordi sit, inquirendum. (Id autem
esse uidetur, quoniâ Fuchsius Germanicum eius nomen prodit. Felfdnoblauch, hoc est, Allium cam-
pestre.) Meminit præterea Allij canini minoris, quod alibi depingens Hyacinthum secundum facit.]

CAP. LXXI.

ALLium campestre, ab uno cespite plures erigit indiuiduosq; caules, longitu-
dine plerumq; cubitales, iunceos, solidos & angulosos. Folia circa terram tan-
tum habet dodrātia, ualdē angusta, & modicē canaliculata. in summis caulibus sin-

guli erecti sunt corymbi, purpurascensibus flosculis æstate pleni: singulis floribus triquetri, nigricantes & exigui folliculi, qui aperti sena, oblonga, nigraque ostendunt semina, succedunt, semina uni pediculo annexa. Radicibus nititur multis, exiguis, bulbosis, fibratis & inferius crasso uinculo connexis, ita tamen, ut singuli bulbis singulos ferant caules. saporem & odorem Allii habet. Nascitur in campis et pratis, maxime fluuiorum inundationi obnoxiiis lutofo solo.

DE MENTHA corymbifera minore, [quam Itali herbam Iuliam uocant, aliqui Eupatorium Mesue: cuius qualemcumque ex Tragi libris Iconem adiunximus. accuratorem dedit Matthiolus, maiorem describit infra, cap. 17.] CAP. LXXXII.

MENTHA corymbifera minor, plures ab una radice emittit uirgas, longitudine (ut plurimum) cubitales, admodum graciles & solidas, sesquiuncialibus longitudine, & semuncialibus latitudine foliis per ambitum ferre instar incisis, uestitas. In summis uirgarum surculis, corymbi æstate se proferunt, sole Leonem occupante, exiguis luteisque floribus diu durantibus pleni; quibus exigua, oblonga & palacea succedunt semina. Radice nititur exigua, fibrata, candida & semestris: quæ gustata pyrethri feruorem habet, quo saluam proliciat. Colliculi uero folia, flores & semina iucundum spirant & uehementem odorem, Menthe corymbiferæ maiori et Tanaceto similem, saporem eadem partes amarum, & cum acrimonia tenuem habent. Nascitur in montibus Vuitzburgi, seritur à quibusdam etiam in hortis odoris causa.

Mentha corymbifera minor, T. 1. 175. p. 515.

Sanguisorba maior, T. 1. 157. p. 470.



De

DE SANGVISORBA maiore.

CAP. LXXIII.

SANGVISORBA maior, caules erigit cubitales, graciles, angulosos, solidos & ramiferos: folia iuxta terram se proferunt, longitudine sesquiunciali, unius latitudinis, per ambitum serræ modo incisa, ut plurimum canalibus instar complicata, superius uiridia, inferius cinerea, à dodrantali angulosoq; pediculo exeuntia, ex utroq; latere quina, sena aut plura, in extremitate pediculi unum inter utrumq; ordinem intercedens recta prominet, in summis caulium furculis circa ueris medium capitula profert oblonga, anteriori medii digiti articulo æqualia rubentibus & palaceis floribus plena, quibus defluentibus semina succedunt angulosa, exiguaq;. Radice nititur perenni, minimi digiti crassitudine, obliqua, foris nigricante, intus rubescente, in plures partes distracta, quæ gustata adstringit, folia & reliquæ herbæ partes glutinosum & dulcem saporem habent, odorem uero cucumeris. Nascitur in lutosis pratis, fluuiorum inundationi obnoxia, plurimaq; Lipsiæ, Halæ, Merseburgi, etc.

DE SANGVISORBA minore.

CAP. LXXIIII.

SANGVISORBA minor maiori similis, folia tamen & capitula minora fert, flores quoque non paleaceos, sed lanugineos producit, alibi in ruffo candidantes, alibi rubentes, tantum semen maiori æquale habet, & triquetrum aspera superficie. Radice nititur perenni, minimi digiti crassitudine, dodrantali aut pedali, non obliqua sed recta descendente (nisi quid impediatur) saporem & odorem maiori similes habet. Nascitur lutosis, calculosis apricisq; collibus, & secus uias.

DE DAVCO tenuifolio, folijs pastinacæ sylvestris, multò minoribus, glabris, etc. [Querendum an hæc sit *Caucalis Matthioli* li. I.] CAP. LXXV.

DAVCVS tenuifolius primo anno, quo è semine prodiit, folia tantum profert, sylvestri pastinacæ similia, multò tamen minora, glabra & per terram strata. Sequenti postea anno caulem erigit pede proceriorem, teretem & foliis circa genicula præcinctum singulis, iis quæ circa terram sunt minoribus, umbellam in summo caule æstate unam atq; alteram fert, minimis candidisq; flosculis plenâ; quibus singula succedunt duplicia semina ante maturitatem superius rubentia, satiuo petroselino æqualia. Radice nititur annua, admodum gracili & sufflata, quæ gustu aliquantulum acris est, folia sylvestri pastinacæ similem saporem habent. Semen uero feruore cæteras partes uincit. Nascitur asperis, apricis & editis locis, plurimumq; quæ ex Hildesheimia Hanoueram itur, unius miliaris germanici spacio ab Hildesheimia.


DE ALLIO satiuo multifido.

CAP. LXXVI.

ALLII satiuo duo sunt apud nos discrimina. unum enim capite grandi constitit, pluribus nucleis coactum, huius superficies candidis tenuissimisq; uestitur membranarum, quæ in uniuersum detrahantur, nucleis adhuc separatim uestitis, folia hoc habet cubitalia, uenosa & canaliculata, sibi ipsis inserta ita, ut caulibus figuram ubi omnia coniunguntur expriment, primo cum deponitur anno neq; caulem, neq; semen fert, an uero altero ferat uidendum.

Allium sativum multifidum. T. 2. p. 745. Ex duabus his Alliorum formis à Trago exhibitis, altera vulgaris Allij est, capite multifido. alterum Scordoprasum nominat, ac describit postea cap. 70. libri eiusdem, id est, secundi. Medio matrices muliercule (inquit) in hortis Allij genus, etc.

DE ALLIO satiuo amphicarpo, [quod ita congnominat, quod ex radicis nucleis seratur, et seminibus quæ nucleos similitudine referunt.] CAP. LXXVII.



ALTERum satiuum Allij genus, quod amphicarpon appello siue semine, siue nucleis ponatur, caput non adeo grande acquirit, membrana tenuissima & purpurea scente circumdatum, quæ sponte etiam ruptur. Nucleos habet non separatim, ut primum genus uestitos, sed nudos ferè, numerosq; pauciores, indiuiduos & caulis basi circumpositos. Caulem emittit prima aestate, utroq; modo satum, cubito proceriorem, teretem & glabrum, ab ima parte canaliculatis foliis uestitum, priori Allio similibus, paulò tamen minoribus. In summis caulis utriculus candicans enascitur, in longum & acuminatum cacumen desinens: quo in crescente caulis sub ipso utriculo bis intorquetur ueluti in spiram, nec rursus in rectum diducitur, antequam utriculus quantitate caput in terra retentum magnitudine ferè æquauerit, & rupta aestate membrana iam mature scientia semina ostenderit, quæ globuli figuram habent, & magnitudine anteriorum partem minimi aut annularis digitum æquant, (colore foris purpureo, intus autem candido,) racemi modo confecta, & substantia acrimoniaq; nihil à capitum nucleis differentia: inter quæ intortæ ueluti caudæ se proferunt rudimentum quoddam futuri floris, sed frustra ostendentes. Vtrūque Allium sapore acerrimum est, & fumo suo odore caput tentat.

DE ALLIO simplici utroq; [Lege quæ scripsimus supra cum effigie Allij satiuum multifidum.] CAP. LXXVIII.

ALLium simplex, indiuiduumq; quale in Aegypto nasci scribit Dioscorides, utrum suum peculiare & diuersum à prædictis genus habeat, non ausim affirmare: siquidem apud nos huiusmodi Allium frequenter nascitur, ex utroq; allio genere, cum nucleis aut semen ponitur, quod in nullos nucleos diuidi aptum sit. Præstat ita utriusq; huius Allii simplicis differentiam ostendere: simplex itaq; Allium quod ex indiuiduo maioris Allii nucleo natum fuerit, oblongum est & utrinq; acuminatum, pluribusq; ac candidis membranis uestitur. Quod uerò ex amphicarpo Allio nascitur, è nucleis non gignitur sed semine, non tamen quouis, uerum eo tantum, quod simplicissimum natura sit, & in nullas partes distrahi natum. cum adoleuit, porri caput magnitudine æquat & globuli rotunditatem habet, unâq; aut altera

tera purpurea uelatur membrana, hoc autem omnino Aegyptiaci Allij descriptio-
nem repraesentat, utrumq; autem caule & semine caret, ueluti imperfectum sit, &
quamuis simplex Allium quod oblongum est, altero anno ponatur, non tamen cau-
lem fert, quantumuis adolescat, & in nucleos diuidatur in terra caput. an itaq; sim-
plex Allium quod rotundum est, & purpureum similiter in nucleos diuidatur, &
caule careat animaduertendum.

DE LYCOCTONO satiuo tricarpo, sic enim à triplici siliquarum ordine
nominamus. [Hic fortè Napellus est, qui apud nos in hortis colitur. flori-
bus cœruleis, alicubi purpureis: cuius iconem Tragus hanc dedit.]
CAP. LXXIX.

Lycoctonum satiuum tricarpum. T. 1. 82. p. 248.



LYCOCTONUM satiuum, quod à tri-
geminis folliculis tricarpon uocatur,
caules, folia, flores, folliculos & semina syl-
uestri similia fert: suas tamen habet, quibus
ab hoc dignoscitur, differentias. folio est
profundius usq; ad pediculū inciso, nigrio-
re, glabro & inferius supra modum splen-
dente. floribus capacioribus, colore purpu-
reis, folliculisq; in summitate sibi annuen-
tibus, ut plurimum, ternis: in quibus nigra
sunt semina. Radicem habet crassam, mul-
tis nigricantibus cirris fibratam, secus quā
aliae enascuntur, ueluti oculi aut bulbi, se-
quenti anno caulem producturæ, raro au-
tem una tantum inuenitur radix, cum enim
nō transfertur, in terra se propagat, quo fit,
ut unius cespes multis constet radicibus, si-
bi inuicem cohærentibus. Saporem *

DE LYCOCTONO satiuo pentacarpo, [quod
à quintuplici siliquarum ordine sic nominat Cor-
dus. Flores quā superius maiores habet, colore
in purpura cœruleos, & candicantes: eiusdē alio-
qui generis proximi, ut apparet.] CAP.
LXXX.

LYCOCTONUM satiuum pentacar-
pon, prædicto simile est, non tamen
adeo profundè sectæ foliorum partes sunt,
nec adeo splendida: flores quoq; maiores
fert, colore in purpura cœruleos, & candi-
cantes, quibus siliquæ succedunt quinæ, prædicti siliculis longiores, semine nigro
plenæ. Radicibus nititur tricarpo æqualibus & similibus.

DE ABSYNTHIO. CAP. LXXXI.

ABSYNTHIUM uirgas cubito proceriores emittit, minimo digito paulò gra-
ciliores, striatos, admodum breui lanugine canos & solidos, quibus totis usq;
ad summitatem ramuli adnascuntur semine exiguo, fursuraceo, in nutantibus ueluti
g

Absinthium. T. 1. 110. p. 335.



racemulis contento flauoq; onusti: quod tantilli æstate præcedunt flosculi, colore lutei, qui concussis uirgis instar pulueris decidunt. folia antequam caules proferat circa radicem habet in latitudinem explicata, et in minimas partes rutæ modo diuisa, ab utraq; parte breui, & cinericea lanugine candicantia. quæ uerò in summis uirgis sunt folia, paucioribus partibus constant. Radice nititur digitali crassitudine, fibrata, lignosa & perenni: saporem habet uehementer amarum, tenuem & aliquantulum adstringentem: odorem uerò admodum grauem & acrem: semen cæteris partibus tenuius amariùsq; existit, caput tam gustu quàm olfactu in saporem trahit & aggrauat. Nascitur asperis locis, circa uias, pagos & arces.

DE ABSINTHIO dulci.

CAP.

LXXXII.

ABSINTHium dulce Artemisiæ sapore æmulatur, figura uerò absinthium. Radice nititur similiter ut Absinthium perenni.

DE ARTEMISIA maiore. CAP.

LXXXIII.

ARTEMISIA maior Absynthio similior. differentia in colore & sapore consistit. caules enim purpurei et spadicei sunt coloris, folia superius uiridia sunt, inferius uerò incana. seminum quoq; capitula magnitudine absynthio cedunt, magisq; rubent. Radice nititur perenni, saporem habet tenuem & iucundum odorem. Nascitur iuxta sepes & profluentes.

DE SATVREIA.


CAP. LXXXIIII.

SATVREIA siue Thymbra satyra, pedalis & interdū cubitalis est herba, caulem ab ima parte satis crassum, solidum, hirtum & nigricantem habet. Tota herba numerosis geniculis præcingitur, & in plures uirgas diuiditur, ita ut à singulis geniculis bini ramuli alterno positu exeant. folia sub ramulis uncialia plerumq; habet, eaq; angusta & acuminata, superius modicè hirta, inferius ueluti punctis quibusdam distincta. flores æstate in summis surculis fert exiguos, & in candido rubentes, in capitibus ceu breuibus spicis contentos, foliis permixtos: quibus nigra succedunt femina caliculis insidentia. Radicibus nititur lignosis, fibratis, semestribus & inutilibus. folia & flores gustu acris sunt non sine gratia aliqua, odorem habet acrem, & iucundum. Seritur in hortis.

De

Artemisia maior. T. 1. 13. p. 344.

Satureia. T. 1. 13. p. 45.



DE THYMBRA, [id est, Satureia sylvestri, quæ è Creta affertur.] CAP. LXXXV.

THYMBRA, quæ sylvestris satureia est, sativæ satureiæ in cunctis similis existit, durioribus tamen & magis hirtis foliis constat. saporem & odorem acriores habet, si uerò nimium gustetur uomitum minatur. Nascitur asperis & saxosis locis, in Creta & uicinis regionibus: unde ad nos affertur. Quæ uerò circa eam nascitur Cuscuta Paulo Aeginetæ & reliquis Græcis, epithymbrum uocatur.

DE STACHY. CAP. LXXXVI.

STACHYS plures erigit uirgas, longitudine cubitales, & quadrangulas, è quibus per interualla bini, alterno positu exeunt ramuli. folia habet Marrubio æqualia, oblongiora tamen. flores æstate circa summas uirgas profert paruos, candidos, hiantes & in quinas partes sectos, denticulatis caliculis (exigui & rari uerticilli modo) coniunctis insidentes: quibus exigua nigraque succedunt semina. uestitur tota herba tenui, candidaque lanugine. Radice nititur fibrata, lignosa & perenni, sapore & odore Marrubium emulatur, saporem tamē Marrubio habet paulo acriorem, odorem uerò imbecilliorē. Nascitur asperis, & aliquantulum editis locis circa pagos, ut inter Seburgum & Eyslebium.

*. Steiandorn. Rara Germania herba.

g ij

Stachys. T. 1. 2. p. 9.

Scolymus. T. 2. 115. p. 866.



DE SCOLYMO, [quem uulgò Artifchock uocant.]

CAP. LXXXVII.

SCOLYmus Carduus est satiuus, & in cibos receptus, prima qua seritur aestate, grandia profert folia, crassa, angulosa & canaliculata spina, utrinque in dodrantales, rugosas, & in cinericeo colore cauas partes usque ad ipsam spinam secta: quae & ipsae suas peculiare diuisuras habent, singulis aculeis armatas. ea hyeme sub niue latent, sequenti uero aestate caulem emittit sesquicubitalem, striatum & incuruū: in cuius cacumine grande est caput, conī & pineae nucis figura, aculeatis carnosisque squamis circumuallatum, quod in summitate aperitur circa solstitium, latam comā ostendens, purpureis & capillatis floribus plenam & confertam: quibus semina succedunt Cnico similia, non adeo tamen angulosa, pauloque minora, colore caesia & interdum maculis conspersa. Radice nititur cubitali aut pedali, crassitudine sua num implente, foris nigra, intus candida, & antequam fructificet carnosa: postea uero lignosa & pereunte: quae gustu amarescit: folia quoque amarum saporem habent. Seritur in hortis capitis causa luxuriosis Italis, nobis tantum spectaculi uice colitur.

De

DE HIPPOSELINO, [quod uulgò Petroselinum Macedonicum uocant.]
CAP. LXXXVIII.

T. 1. 145. p. 436.



HIPPOSElinum prima ætate cum
est semine prodierit, folia tantum pro-
fert Apio similia, multò tamen maiora, se-
quenti uerò anno caulem emittit bicubita-
lem, angulis striatum, modicè concuum, &
in adnata seu ramulos diuisum, in quorum
summitate umbellæ sunt latæ Libanotidis
figura, antequam diuidantur conferstorum
corymborum formam referentes, luteis flo-
sculis plenæ: quibus duplicia, grandia, angu-
losa, nigra cartilaginea succedunt semina.
Radice nititur perenni, dodrantali aut pe-
dali, pollice crassiore, pastinacæ satiuæ mo-
do indiuidua, foris nigricante, intus candi-
da & carnosæ. quæ gustu acris, subamara, o-
dorata & aliquantulum feruida existit. Se-
men acrius amariuscque est, & aromatum præ-
sertim myrrhæ odorem habet. folia similes
habent qualitates, sed aqueo humore dilu-
tas. Nascitur umbrosis & humentibus lo-
cis. In Germania tamen parcius, interim eti-
am colitur apud nos in hortis.

DE BRASSICA agrestis quadratis siliquis,
floribus candidis, etc. CAP.
LXXXIX.

BRASSICæ agrestis una species cubita-
lem habet caulem, teretem, glabrum,
aliquantulum concuum, & in ramulos di-
uisum, folia ex intervallo singula profert se-
cus ramulorum eruptiones, trium aut quatuor unciarum longitudine, paulò angu-
stiora, subrotunda, glabra & Brassicæ modo carnosæ: flores ueris exitu candidos &
oblongos fert, quibus singulæ succedunt siliculæ, digito longiores, angustæ, &
quadrangulares, oblongo, nigroque semine plenæ. Radice nititur exigua, ligno-
sa, semestri & inutili. Folia Brassicam gustu imitantur; semen uerò amariuscque est, &
aliquantulum acre. Nascitur pinguibus agris, lento & glutinoso solo.

DE OCIMONabathæo. CAP. XC.

OCIMVM Nabathæum, uulgari ocimo æquale & simile est, candidioribus
tamen uirgīs & foliis constat; nec adeo grauem, sed iucundiorē odorem spi-
rat. Seritur in hortis.

g iii

DE OCIMO caryophyllato. [Videtur de eo sentire, quod inter Ocimi generâ
minimum est.] CAP. XCI.

OCIMVM caryophyllatum, prædictis quidem simile est, sed multo minoribus uirgis assurgit, minoribusq; foliis constat, iisdemq; candicantibus. odorem habet inter utrumq; Ocimum & Caryophyllas medium, unde nomen inuenit. Seritur in hortis.

Ocimum caryophyllatum. T. 1. 8. p. 30.



Drosium. T. 1. 174. p. 511.



DE DROSIO, id est, Alchimilla. [Nomen è Germanico finxit.] CAP. XCII.

Δροσέα seu Δρόσιον, siue *vidua*, quam uulgò Alchimillam uocant, do drantales
tos, in summitate singula folia ferentes, eosq; iuncea, propemodum teretes & leniter hir
explicentur tunicae modo complicata, cum uerò se explicuerint, quinque unciarum
quoque uersus latitudinem acquirunt, rotundaq; fiunt, præterquam quod per am
bitum plerumq; octonis profundis incisuris diuisa sint, & quæ inter eas partes seu
spacia sunt, semicirculum exprimunt, & serræ modo incisa sunt. præter eas sectio
nes sinum adhuc habent usq; ad pediculum recedentem, à pediculo singuli nerui ad
arti-

partium extremitates transeunt, ipsis foliis ros in guttas coactus continetur, non-
nuncq̃ etiam singulis incisuris ros Margaritarum modo insidet, unde etiam Græcū
& Germanicū nomen accepit. Colículos ueris medio dodrantes, iunceos, teretes
hirtosq̃ emittit, exiguis foliis interceptos & in plura breuia adnata & furculos diui-
sos, in quorū summitate minimi luteiq̃ flores sunt, substantia muscoli, & post hos
tātilla semina, quæ uix uisu percipi & dignosci queant. Radice nititur minimi digiti
crassitudine, foris nigricante, intus autem flaua, ferè lignosa & perenni, à qua undiq̃
que numerosæ exeunt fibræ. tota herba adstringit, maximè autem radix. Nascitur
pinguibus, herbosis, frutetosis & editis locis.

DE SAMSUCHO. CAP. XCIII.

T. 1. 9. p. 33.



SAMSUCHUS quæ Latinis Maiorana
uocatur, odoratus frutex est caudice
breui, minimi digiti plerumq̃ crassitudine,
multis dodrantalibus ramulis, iisdemq̃ in
latitudinem expansis fruticosus, foliis ue-
stitur totus, in rotundo oblongis, tenui fo-
liæ Nepetæ similibus & æqualibus, molli-
bus, leniter hirtis, & hyeme uidentibus. flo-
res æstate fert in summis furculis admodū
exiguos, muscosos & candidos, ab exiguis
squamosis hirtisq̃ capitulis prodeuntes: se-
men iisdem capitulis continetur admodū
paruum, colore spadiceum. Radice nititur
multifida, lignosa & perenni. semine satum
eadem æstate fructificat, & binos ē singulis
geniculis ramulos profert, postquam uerò
adoleuerit incertus sit ramulorum ordo:
odorem habet fragrantem, admodum iu-
cundum & suauem, saporem uerò tenuem,
& subacrem. Caput tam gustu quàm olfa-
ctu ueluti futuro somno mulcet & mitigat.
Colitur apud nos in hortis.

DE ROSMARINO syluestri seu
maiore. CAP. XCIII.

ROSMARINUS syluestris seu maior, odo-
ratus est frutex, caudice assurgit digita-
li aut pollicari crassitudine, pluribus cubita-
libus bicubitalibusq̃ uirgis ramosus. folia
circa uirgas breui intervallo fert sesquicū-
cia

lia, angusta, superius uiridia, inferius autem canescentia, modicū ab utroq̃ latere in-
flexa & Chamæpeucæ similia, quæ hyeme non amittit. flores uere in uirgis secus fo-
lia profert paruos, hiantes, colore in cœruleo candicantes, denticulatis caliculis infla-
dentes, pauca stamina exerentes, quibus exigua nigraq̃ succedunt semina, (quæ
uis Plinius illi falso semen neget.) Radice nititur lignosa, in plurimas fibras distra-
cta & perenni. Odorem habet suauem, iucundum. simulq̃ grauem, saporem uerò te-
nuem, modicè feruidum, subamarum & saluam elicientem. Nascitur in Narbonen-
si Gallia.

Rosmarinus minor. T. 1. 17. p. 55.



ROSMARINUS minor seu tenuifolius, uirgis, foliis, floribus, semine & reliquis facultatibus maiori similis est: præterquam quod minoribus cõstet hisce partibus, odorem etiam suauiores nec adeo graue spirat. Colitur apud nos in hortis.

DE PITYOSPERMO. [Finxit hoc nomen Cordus à resinaceo seminis odore saporeq;. Memini banc herbam locis Helueticorum montanis inuenisse, & in horto plantasse, folijs cicuta, semine oblongo, etc.]
CAP. XCVI.

PITYOSPERMON caules emittit cubito multo proceriores, geniculatos & striatos. folia à radice profert longis pediculis in latitudinem diuisa, cicuta similia, præterquam quod hirsuta sint, et paulo maiora. umbellas in summis caulium uirgis fert ammio æquales, ueris exitu exiguo cãdidoq; flore plenas: quibus duplicia succedunt semina, cumino multo longiora, angulis striata, nigricantia, & substantia cartilaginea. Radices habet perennes, ab uno cespite in plures dodrantes aut pedales partes distractas, minimi digiti crassitudine, colore candidas, fibratas & interdum foris nigricantes. à quarum capite alię exeunt radices geniculis præcinctæ, sub terræ superficie sparsæ, quibus se propagat. Rarum tum odorem, & radice efficacius est. Nascitur umbrosis, lapidosis, humentibusq; locis, solo subpingui iuxta gelidos riuulos, opacis montibus & syluis delatentes.

DE MALVA syluestri supina, [alij minorem uel pumilam cognominant. est autem uulgarior, & ubiq; obuia.] CAP. XCVII.

MALVA syluestris supina caules per terram spargit cubitales, teretes, uirides & solidos, in quibus folia sunt longis pediculis trium unciarum latitudine (nonnunquam etiam latiora) per ambitum serrata rotundaq;, præterquam quod ab una parte in profundum sinum recedant usq; ad pediculi annexum. Flores secus folia fert paruos quinquefolios, alteri syluestri Maluę similes, minores tamẽ, in candido rubentes, quibus exigua succedunt semina in orbem disposita. Radice nititur lentorem remittunt. Nascitur circa hortos, sepes, pagos & rudera.

De

Malva sylvestris supina. T. 1. 120. p. 369.

DE OLSENICHIO. CAP. XCVIII.

HERBA quam Germani Olsenichappellant, folia à radice profert in latitudine: è quorum medio caulis assurgit sesquicubitalis, non adeò crassus, angulis striatus et geniculatus. folia in geniculis singula ferens, inferioribus minora. umbellae state in summis ramulis fert anetho similes, candido exiguoq; flore plenas, quos Anetho similia & duplicia semina sequuntur, minora tamen. Radice nititur perenni, foris subnigra, intus candida, ab uno capite minimi digiti crassitudine, in obliquas, tenues & dodrante paulò breviores partes distracta: quæ gustu feruida, tenuis & subamara existit, semen similes habet qualitates. Nascitur uliginosis, putridis palustribusq; locis, iuxta Alnorum truncos, nonnunq; etiam in eorum musco.

DE SANTONICO maiore, [quod ferè magnitudine tantum à sequenti differt.] CAP. XCIX.

SANTONICUM maius Absynthio cognatus & odoratus frutex est, caudicem habet pollicari crassitudine numerosas, cubitalesq; uirgas emittentem, tenera canaq; lanugine obductas, uncia longioribus, canis & Ericæ modo in brevissimas carnosasq; partes diuisis, & hyeme durantibus foliis unadiq; uestitas. In summis uirg

h

VALERII CORDI HISTORIAE

gis flores lutei sunt, breuibus staminibus in paruum orbem dispositis facti : se-
mē habet tenue & fursuraceum. Radice nititur lignosa, in plurimas fibras distracta.
Saporem folia, flores & semina leniter amarum tenuemq; possident, odorem uerò
iucundum & aromaticum. Colitur apud nos in hortis, in Narbonensi uerò Gallia
sponte nasci fertur, si Dioscoridi & iis, qui nostra aetate ibidem genitum uiderunt,
credimus.

DE SANTONICO minore, [id est, Chamæcyparisso uulgari.]
CAP. C.

SANTONICUM minus, quod à Plinio Chamæcyparissus uocatur, maiori in
sunctis simile est: paulò tamen minoribus uirgis & foliis constat, remissioremq;
habet cum saporem tum odorem. Colitur similiter apud nos in hortis cypressino-
mine, quamuis Cyparissus siue Cupressus proceratior sit arbor: à qua hoc nomen ad
hunc odoratum fruticem translatus est, ob aliquam foliorum (quam cum arbore
habet) similitudinem. Nascitur & hoc copiosissimè in Narbonensi Gallia.

Santonicum minus, T. 1. 24. p. 77.



Hyacinthus sylvestris, T. 2. 79. p. 772.



DE HYACINTHO syluestri. [Idem est, ni fallor, aut planè cognatus, Hyacinthus maior Tragi et
Fuchsij, cuius iconem addimus: quanquam cœruleis floribus, cum Cordus suo purpureos tribuat.]
CAP. CI.

HYACINTHUS syluestris, folia statim à radice profert dodrantalia, nonnunquā eti-
am longiora, latitudine serè semunciali, rectiuenia, canaliculata, & in teram
incli-

inclinata: e quorum medio caulis assurgit, dodrante (ut plurimum) procerior, sine foliis teres, uiridis, crassitudine culmi, & inferius rubentibus maculis confusus: in cuius summo coma est purpureorum * & deorsum procumbentium florum * in coe ruleo. plena, singuli autem flores oblongi, teretes atq; ab ima parte latiores, concaui, praeclosi sunt: sub ipsa coma alii flores sunt praedictis similes, sed latiores, pallidiores, & positi rariores: quibus singuli triquetri & exigui succedunt folliculi, neq; deorsum nutantes, neq; sursum erecti, sed cauli, pediculo breui ueluti inserti, & recta eminentes: qui in maturitate tribus commissuris aperti, terna semina figura omnino rotunda, nigra, & substantia cartilaginea, ostendunt. Radice habet perennem, bulbosam, mediocris iuglandis quantitate, tenui nigricanteq; membrana uestitam, intus candidam, carnosiscq; tunicis compositam: inferius tenuibus candidiscq; capillamentis terrae inhaerentem. Tota herba lentum, glutinosum & aqueum saporem habet: semen uero gustu subamarum & modice acre est. Abrupti folliculi, caules teneri & folia lentum in trahendo sequacem & clarum humorem remittunt. Nascitur apicis tumulis mediocri solo.

* Verus est Hyacinthus medicorum. Nascitur autem Schenberge bey Hersterh: ubi propter floris colorem Scieinlingf appellant.

DE LIMNOPEUCE: [sic est nomen ab eo, quod in stagnis nascitur, folijs Teda seu Picea.] CAP. CII.

LIMNOPEUCE singulares erigit caules, iuncto multo crassiores, in tenuitatem desinentes: e quibus breui admodum intervallo folia exeunt Teda similia, breuiora tamen, mollioraq;: quibus singula adnascuntur ceu grana milio minora. Radicibus nititur perennibus, transuersis, nigricantibus: plurimis capillamentis fibratis, & in limo haerentibus, quibus se propagat. Herba ipsa insipida est, & modicum styptica. Nascitur in lacubus & stagnis, inter Eislebium & Seburgum.

DE PHYLLITIDE lacustri. [Potamogetoni cognata est herba, folijs Phyllitidis, nascitur & in nostro Felium lacu, si bene memini.] CAP. CIII.

PHYLLITIS lacustris, ex limo sub aqua uiticulam profert, longam, teretem, olorinae pennae crassitudine, foris Tiphæ modo asperam, hirsutam & fuscam: intus autem uiridem, & concauam, e qua raro intervallo aliq; oriuntur uiticulae, iunctae gracilitatis, foris uirides & glabrae, intus autem concauae, quae ubi supra aquam emerferint, folia ferunt Betæ aut Phyllitidi similia: minora tamen, colore in uiridi pallida. Tota herba gustura dstringit. Nascitur in lacubus, copiosissimaq; in lacu qui est inter Seburgum & Eislebium.

DE TESTICVLO bifolio. CAP. CIIII.

TESTICULUS bifolius, duo à terra profert folia, Lilio similia, latiora tamen: e quorum medio caulis assurgit cubitalis, tenuis et angulosus, minimis singuliscq; foliis ex intervallo uestitus in summo caule ex foliorum alis candidi flores auticulae uolantis figura, prodeunt: e quibus à tergo unciali longitudine exeunt caudae tenues concauae, in fundo melleum succum continentes, per caudas ueluti per uitrum transparentem. Radicibus nititur geminis maturae oliuae aut carei oblongiscq; pruni ferè magnitudine, iisdemq; oblongis & caudatis: supra quas aliae tenuiores exeunt, Damasonii radicibus æquales. Sapore praetensem Palmam imitatur. Nascitur pingui, herbosiscq; solo raris arbutis obfesso.

h ij


PALMA montana Hyacintho similia è terra profert folia, paulò tamen maiora, è quorum medio caulis exit Bifolio testiculo similis, similiterq; foliolis uestitus, non tamen angulosus, sed teres. Flores etiam fert similes, numerosiores tamen & minores, colore purpureos. Radices habet geminas, pratenfi Palmae similes, maiores tamen: quæ gustu reliquas Testiculorum species æmulantur. Nascitur in montibus pingui solo.

DE LILIAGINE. [Phalangium aut Phalangium hanc aliqui putant: quòd hæc ferè apud nos effigie nascitur.] CAP. CVI.

LILAGO statim à radice folia profert Hyacintho similia, angustiora tamen, è quorum medio caulis affurgit cubitalis, aut aliquando maior, tenuis, teresq; superius uno atq; altero intervallo singula habens folia, prædictis multò minora. In summo caule et adnatis flores producit sex, oblongis uncialibusq; foliolis constâtes. ^{† uel potius Asphodelo uero} è mediis floribus, luteis apicibus, stamina prominent, in summa Lilio ^{† ut etiam in Asphodelo.} flores sunt, multò tamè minores, nec ita resupinatis partibus repædi. Radicibus nititur multis, culmi crassitudine, lentis, pinguibus, glutinosis, perennibus, ab uno capite [†] in diuersas partes distractis, longitudine doctatis. Saporè habet glutinosum & nauseosum aliquantulū. Nascitur editis apricisq; locis, iuxta rara & parua arbuta. * Nos Asphodelum Germanicam uocamus, propter radicem & florum similitudinem, seminumq; formam & colorem conuenientem.

Phalangium

Alisma quorundam



De

DE DAMASONIO tenuifolio. [Id uidetur hæc quam exhibemus, aut proxima genere herba, syluis & montibus nostris non infrequens. Duæ aut tres eius species, magnitudine colorq; florum præcipue differunt. Sed flores in nostro non uidetur foliacei: quamobrem accuratius perpendendum fuerit.] CAP. CVII.

DAMASONIUM tenuifolium caulem habet dodrantalem aut pedalem, teretem ac leniter striatum, per interualla acuminata, & liliacea folia proferentem: tenuiora tamen & uenis durioribus striata, ipsum caulem quæ ab eo exeunt amplectentia; super folia usq; ad caulis summitatem, ueris exitu flores se proferunt candidi, foliacei, nullos apices habentes, quorum media pars ceu luteum labrum exerit. Semen * Radicibus nititur tenuibus, perennibus, forma & substantia syluestri Damasonio similibus. Saporem habet amarum, glutinosumq;. Nascitur editis & opacis locis, solo pingui.

* Helleborine Dodonæi.

DE DAMASONIO Calliphyllo, [altera specie superioris.] CAP. CVIII.

DAMASONIUM calliphyllo, tenuifolio Damasonio floribus, semine, caule & radice simile est; caulis tamen paulo crassior est; folia uero multo speciosiora habet, media inter syluestre Damasonium & Polygonatum figura, paulo tamen minora pulchrioraq;. Nascitur pingui nigroq; solo, Alabastrite aut Gypsarum saxum obtegente, plurimumq; iuxta Northusium, ad Hercyniam syluam.

T. 1. 40. p. 128.

DE ANEMONE tenuifolia. CAP. CIX.



ANEMONE tenuifolia caulem erigit cubitalē, teretem, striatū, solidumq;, statim à terra ex interuallo folia proferentem, Nigellæ aut Chamæmelo equalia, & in adnata se diuidentem: in quorum summitate singuli sunt flores minoris Helleborinæ aut Chamæmeli floris figura, quorum medium in purpura nigricat, reliqua pars uero puniceo colore fulget: in medio flore incisum est capitulum pineo cono simile, paruis nigrisq; staminibus cinctum. decidentibus ueris exitu florum foliolis capitulum increfcit, donec sesquiunciale consequatur longitudinem, totumq; horreat aculeatis seminibus, obliquo ordine circumuolutis. Radice nititur minimo digito graciliore fibrata, lignosa & semestri. fœtent aliquo modo triti flores & gustu ferè insipidi sunt, nisi tantillam possiderent amaritudinem. Nascitur pinguibus aruis in segete.

* Non est hæc Anemone, ut neq; sequens: sed Chamæmalum Eranthemum Dioscoridis: cuius semina ad frangendum calculum efficacissima sunt: Turingi uocant Teuffels auge / propter colorem florum, prunæ non abstemilem, quasiq; ardentem. Acrimoniam nullam habet, quæ propria est Anemone.

DE ANEMONE tenuifolia altera, [colore tantum floris alio. Vide scripta cum præcedenti.] CAP. CX.

ANEMONE tenuifolia altera, iam descriptæ in cunctis similis est, præterq; quod flores pallidos habet, in medio tamen similiter nigricantes. Nascitur iisdē, quibus prior locis, cui gustu etiam respondet.

h iii

VALERII CORDI HISTORIAE

DE CORALLOIDE, [cui nomen finxit à radice albo Corallio simili. Aliqui,
ni fallor, Saniculam albam uocant. alij temerè aconitis adnumerant, nos Iconem
à Ioanne Kentmano acceptam apposimus.] CAP. CXI.

Coralloides.

Coralloidis alia species.



CORALLOIDES caulem emittit cubitalem, iunceæ gracilitatis, inferius nigricantem. folia prope terram habet sex aut septem, ab uno pediculo prodeuntia, aliquatenus Cannabi similia: in summo caule uerò multò minora pauciora, in quorum alis paruae ueluti baccae hærent, colore in purpura nigricantes, & in partes modicè incisæ: an aliud quoque semen habeat uidendum. Radice nititur perenni, trās uersa, adnatis inæquali, candida & dum ei uitur splendenti, albo Corallio simili, unde nomen inuenit: quæ gustu acrem & subamarum habet saporem, ceu Raphani aut Rapi cortices. Nascitur umbrosis montibus, solo pingui saxa tegenti: plurimèque inter Stolbergum et Northasium ad Hercyniam syluam.

* Aliqui consolidam Sarracenicam nominant. Est autem Aconiti species, baccata sub folijs & non flore, quæ ferti puniceum. Sapor radice est nasturtij.

DE ACONITO monococco. [Solani non Aconiti generibus adnumerari hæc herba debet: quoniam niam & refrigerat, & acinos habet cæteris Solanis similiter.] CAP. CXII.

ACONITUM seu Pardalianches monococcon, caulem erigit teretem, singularem & iudiuudum, longitudine dodrantalem aut maiorem, in cuius summitate

rate folia sunt plerumq[ue] quatuor, rarissimè autem plura, Parietariæ & Cyclaminis aut Hederæ figura, paulò tamen maiora, utrinq[ue] in acumen fastigiata, sed anteriori parte obtusiora, æqualiter ab inuicè distantia, & sibi ipsis in uno centro iuncta. è medio foliorum brevis & gracilis oritur pediculus, similiter quatuor oblongis, parvis acuminatisq[ue] foliolis circumdatus, è quorum intervallis alia quatuor multò minora tenuioraq[ue] erumpunt, & ex illorum medio rursus octo prodeunt stamina, luteo polline confersa, quæ paruum, purpureum, concavum, cuboq[ue] obtulis angulis similem florem, eundemq[ue] singularem circumdant, quatuor apices plerumq[ue] eiusdem coloris habentem, ex quo paulatim rotunda nigraq[ue] bacca gignitur. Radice nititur lōga, gracili, geniculata, foris subfusca, splendēte, è geniculis laterales sub terra viticulas spargente, transversa & perenni: quæ gustu cum amaritudine adstringit, si mulq[ue] insipida ingrataq[ue] dulcedine & tenuitate nauseosa palatum afficit. Nascitur umbrosis locis, solo, ut plurimum, pingui.

* Germanice, Eynbeer.

Aconitum monococcum. T. 1. 102. p. 308.

Dracunculus primus. T. 2. 81. p. 777.



DE DRACUNCULO primo siue Polyphyllō.

CAP. CXIII.

DRACUNCULUS primus siue polyphyllus, quem recentiores Lophocarpum ab incisifoliis appellant, caulem erigit rectum, tripedalem, crassitudine digitali, teretem, glabrum levemq[ue], versicoloribus maculis, maxime purpureis confersum & varium, serpenti adeo similem, ut etiam cauto ex improviso oblatu serpens

h iij

esse credatur. folia habet dodratalia, acuto rumici similia, quina, sena aut septena, in uno pediculo simul coniuncta. in summo caule ueris medio inuolucrum foliaceum fert longitudine dodratali, quo aperto pistillus prodit aro similis, multo tamen maior et post hunc oblongus racemus, primum uiridibus, in maturitate autem puniceis baccis factus: in quibus crocati sunt durissimi nuclei. Radice nititur perenni, crassa, rotunda, bulbosa, candida, tenui cortice uestita, magnitudine mediocris mali, multis candidis capillamentis fibrata, cui oculi cum exigui bulbi adnascuntur, quibus in terra se propagat. Tota herba Aro nostrati gustu & reliquis facultatibus respondet, paulo tamen efficacior existit. Colitur apud nos in hortis, in calidioribus uero locis sponte umbrosos locis, & iuxta sepes prouenit. In comparatione saporis cum Aro hoc sciendum est, quod Aron in calidioribus regionibus minime acris sit, apud nos uero acrisimum, & facultate Dracunculo proximum.

DE DRACUNCULO altero seu henicophyllo, [folijs Ari, maioribus, & maculis candidis conspersis. Matthiolus hunc Dracunculum maiorem uocat & pingit.] CAP. CXIII.

DRACUNCULUS alter seu henicophyllos, quem recentiores Luph plantum appellant, priori per omnia similis est, praeterquam quod folia habeat minime in hyemale solstitium illi apud nos raro decidunt. easdem habet quas prior facultates, nascitur iisdem natalibus, apud nos uero in hortis colitur.

* Aron maculosum.

Dracunculus maior.

Hepatica alba.



De

DE HEPATICA alba, [quam Germani Läderblümle uocant.]

CAP. CXV.

HEPATICA alba colicolum emittit do drantalem, indiuiduum, gracilem & angulosum, infra cuius medium unicum duntaxat est folium, longitudine ferè unciali, subrotundum, modice turbinatum, & figura hederaceum, sine pediculo colicolum amplectens, & in sinum recedens: in summitate singularem fert florem, quinque candidis & subrotundis foliis constantem, in cuius medio turbinatum & cædicans eminet capitulum, quinque oblongis candidisque radiis circumuallatum: è quo rum interuallis tenuissimi prodeunt apices, luteum quiddam in apice ferentes, sub ipso flore quinque exigua sunt foliola, quibus flos antequam aperiretur, clauderetur, defluentibus autem floris foliis capitulum increfcit, donec parua auellanae magnitudinem assequatur, hoc in maturitate apertum, parua, oblonga & flaua, aut rubentia semina ostendit. Radice nititur admodum parua & nigricante, tenuissimis capitamentis fibrata, tota herba subamarum, leniter acrem & modice adstringentem saporem habet. Nascitur macris & putridis pratis, quæ nunquam omnino exiccantur.

* Gramen Parnasi quibusdam.

DE VERBASCO leptophyllo, [Ea uidetur quam Germani Goldfndpsle uocant, Rheni accolæ Schabenfraur, Mottenfraur. Tragus Blattariam facit.]

CAP. CXVI.

Verbasum leptophyllum. T. 2. 146. p. 925.



VERBASUM leptophyllum singularem erigit caulem, longitudine bicubitalem, teretem, intusque fungosum, statim à terra usque ad mediū foliis uestitum, longitudine quadrantali, latitudine sesquiunciali, iuxta annexum angustis & leniter per ambitum serratis: hæc quo summitati propiora fuerint, eò breuiora euadunt. supra folia flores æstate lutei, foliacei, in medio croceum quiddam habentes, cauli usque ad summitatem adnascuntur: quibus singuli succedunt ueluti globuli pisi quantitate, colore fusci, exiguo, fusco, anguloso, & papauere minori semine pleni. Radice nititur do drante breuiori, in multas fibras distracta, candida, lignosa & semestri. Folia gustu subamara sunt, quemadmodum & flores: semen ferè insipidum est. Nascitur circa oppida & in lutosis aggeribus.

* Verbasum tenuifolium, forte Blattaria, Goldfndpsle.

DE MENTHA corymbifera maiore, id est, Mētha Sarracenicæ. [Aliqui Costum hortensæ, alij Mentham Græcæ appellānt. Minorem descripsit supra, cap. 72.]

CAP. CXVII.

MENTHA corymbifera maior, quam uulgo Mentham Sarracenicam appellant, multos ab uno radicis cespice cau

les emittit longitudine bicubitales, angulosos & solidos, folia longis pediculis (an-
tequam caules erumpant) numerosa ab radice erigit quinque unciarum longitudine,
latitudine uero duarum cum dimidia in obtusum mucronem desinentia, utrinque ue-
luti impressis punctis quibusdam distincta, subtus modica tenuique lanugine pube-
scentia, & per ambitum serrata, quae uero in caulibus & ramulis sunt folia, inferiori-
bus multo minora existunt, ac sine pediculis uirgas amplectuntur, & iuxta annexu
utrinque profundius secta sunt. caules in plures ramos distrahuntur, qui & ipsi in sum-
mitate in numerosos tenuesque pediculos diuiduntur: in quorum cacumine aestate
aurei coloris flores sunt, densis ueluti paleis farchi, qui autumnus in fuscum acerofum-
que semen transeunt. Radicibus nititur minimo digito paulo gracilioribus, nigri-
cantibus, lignosis atque perennibus, per terrae superficiem sparsis, multa lateralibus ger-
mina propagationis causa emittentibus: a quibus aliae tenuiores radicales substan-
tia carnosae, foris fuscae & hellebori fibris aequales in terram descendunt. flores & fo-
lia amarum, feruentem tenuemque saporem habent, ueluti si quis simul Mentham &
Abrotonum gustet, odore etiam tam Abrotonum quam Mentham aemulatur. Est
que hic non sine gratia acerrimus, Colitur in hortis.

* Marien Münze.

Mentha corymbifera. T. 1, 53, p. 163.

Lingula uulneraria. T. 1, 106, p. 323.



DE LINGULA uulneraria. [Huic Fuchsius Ophioglossi nomen sinxit, aliqui
Lanceam Christi uocant.] CAP. CXVIII.

LINGula uulneraria, singularem emittit colicolum, longitudine dodrantalem
aut proceriore, gracilem, glabrum & mollem: a quo triū aut quatuor unciarum
a terra

à terra altitudine folium exit singulare, sine pediculo colicolum amplexens, trium ferè unciarum longitudine, latitudine uerò unam excedens, ac in mucronem non adeo acutum desinens, nulla spina nullisq; uenis distinctum. In summo coliculo infecto, aut uermiculo cuidam aliquid simile est, uncialem habens longitudinem, crebrò utrinq; à lateribus incisum. Radicem habet exiguam admodum, tenuibus fibris capillatam. Neq; florem neq; semen fert. Saporem habet herba subdulcem, modicè tenuem & aliquantulum glutinosum. Radix paululum amarescit & subacris est. Nascitur montanis locis, plurimàq; Ambergi atq; Oeniponti.

DE PSYLLIO. CAP. CXIX.

T. 154. p. 167.



PSYLLium furculosa est herba, coliculo assurgit dodrantali aut pedali, solido, anguloso, hirsuto & geniculato, folia à geniculis utrinq; prodeunt oblonga, angusta & modicè hirta, longitudine bellis, latitudine uerò quintam uncia partem non excedentia. Ramuli è foliorum sinu enascuntur tenues, in quorum summitate & coliculi cactamine oblonga & paleacea sustentur capitula, quantitate nucis auellanae, minimis, pendulis, pallidis & tritici similibus flosculis circumdata, à paleaceis caliculis propendentes: quibus singulis bina succedunt duraq; semina, quae sibi inuicem coniunguntur, modicè canaliculata, quantitate & colore pulicum, (unde nomen inuenit) aqua maceratum lentam mucilaginem superficie tenuis remittens, intus uerò candida est, seminis substantia, capitula quoq; foliolis circumuallantur, praedictis minoribus. plerumq; recta assurgit psyllium: spargitur tamen nonnunq; etiam humi, à radice capite emissis ramulis, acciditq; hoc frequenter cū rectus ille coliculus decerptus fuerit. Radice nititur oblonga, gracili, candida, lignosa & semestri: semen aestatis ferè exitu excidit, quo sparso recens enascitur herba usq; in autumnum uiuens, principio cum prodit numerosa profert à radice capite folia, humi procumbentia: quae enato caule exarescunt, saporem folia habent amarum, seminis uerò mucilago dulcis est: odorem, donec uiret, tota herba grauem spirat. Nascitur asperis, sabulosis densioreq; arena constantibus locis, secus agros, plurimùmq; Vuit tembergæ, Sidæ, & Guterboci.

DE TANACETO. CAP. CXX.

TANACEtum primo uere numerosa folia ab uno radice cespite emittit, non indiuidua, sed multis partibus composita, & filicis modo alata, siquidem à dodrantalibus purpureisq; (aestate) pediculis utrinq; exeunt foliola, longitudine ses-

i ij

quiunciali, latitudine uerò semunciali, ab utraq; parte ex obliquo profundius incisa: quibus enatis caules assurgunt ab eodem cespite plures, longitudine sesquicubum frequenter excedentes, teretes, trientis aut bellis intervallo geniculati, minutissime striati, colore in purpura nigricantes, & solidi, quos geniculatim singula uestiunt folia, prædictis similia, sed brevioribus pediculis insidentia. folia quæ circa terram sunt adultis caulibus exarescunt, ipsique caules in summitate in numerosos ramulos diuiduntur, quorum cacuminibus exigua orbiculataq; insident æstate capitula, latitudine tertiam unciam partem æquantia, breuib; paleaceis atq; aurei coloris flosculis dense compactis constantia, corymborum modo coaceruata erectaq; quæ tota æstatis exitu in cassia & paleacea semina Santonico aut Absynthio similia conuertuntur. Radice nititur breui, crassitudine digitali, lignosa & perenni, plurimis cirris, & capillamentis fibrata, à qua etiam aliæ exeunt radiculæ, uiticulis similes et geniculatim sub terræ superficie, donec in Germen erumpant repentes. Sapor rem folia & semina habent amarum, tenue, subacrem & Seriphii semini omnino similem, odorem uerò acrem, grauem & cum eodem Seriphio certantem. semen tam foliis multo acrius est tam gustu quam odore. Nasquitur in aggeribus, & iuxta agrorum fossas, solo mediocri, subaspero aut arenoso, omnino autem pingui terra nunquam uidi provenire.

Tanacetum. T. 1. 51. p. 158.



Daucus Selinoides. T. 1. 156. p. 466.



De

DE DAUVO Selinoide, [Apio simili folijs, acerrimo, ulcerante. (infra cap. 141. meminit latij folij Selinoidis Dauci.) Est autem hæc fortè Saxifraga minor, Pimpinella similis, cuius Iconem Tragus dedit huiusmodi.] CAP. CXXI.

DA Vcus Selinoides, folia à radice capite emittit utrinque à pediculis exeuntia, Apio similia, paulò tamen oblongiora, nec ita splendida & glabra, sed aliquantulū rugosa, ambitu inciso, & per terrā sparsa: è quorum medio caulis assurgit cubitalis, gracilis, striatus & geniculatus, singulis folijs geniculatim uestitus, prioribus multo tenuius incisis. habet adnata & ramulos aliquot caulis, in quorum summitate parvæ sunt umbellæ, æstate candidis flosculis plenæ: quibus succedunt exigua, oblonga, & in fusco rubentia semina, singulisque flosculis bina & sibi inuicem coniuncta. Radice nititur duorum plerumque do drantum longitudine, minimo digito paulò graciliore, terete, colore candida & perenni. Nascitur campestribus lutosisque locis ac pratis. Radix gustu acris & feruida est, quæ si diutius (cum recens adhuc est) atrectetur, manūque ad os & nares ferantur, eas partes quibus admotæ sunt manus leniter exulcerat, idem efficit decoctæ uapor & halitus, insuper etiam capitis grauedinem, attractoria ui, quam efficacem habet, facit. odorem spirat similiter acrem. semen utraque facultate radici respondet.

DE DAUVO Cyanopo. [Sic autem cognominat à cœruleo radice liquore prædicto similem, sed minorem facit. Querendum an hæc sit Pimpinella (melius Saxifraga) Tragi tertia & minima species.] CAP. CXXII.

DA Vcus Cyanopus folijs, caulibus, umbellis, earumque colore seminibusque Selinoidi similis est, præterquam quod caulis breuior & magis teres sit, & uix euidenter striis, sulcetur: lanugine etiam tam caulis quam folia tenui breuique uestiuntur. Radice nititur perenni, paulò minore quàm Selinoides daucus, foris nigra & aliquantulum tuberosa, intus autem candida, quæ præcisa, aut abrupta omnino cœruleum liquorem remittit. Saporem & odorem daucum Selinoidem emulatur, sed paulò imbecillior existit. Nascitur asperis, arenosis, sabulosis & aliquantulum editis locis, congestisque arena tumulis, & aggeribus, plurimusque Vuittembergæ.

DE DAUVO coriophyllo, [cui folia ferè coriandri, radix oblonga, acerrima, &c.] CAP. CXXIII.

DA Vcus coriophyllus, folia circa radice caput profert, partim coriandro, partimque pastinacæ similia, per terram strata, à quorum medio caulis exit pedalis, aut nonnunquam cubitalis, gracilis, teres, solidus, geniculatus, subtilibus striis sulcatus, & in purpura (cum in consistentia est) rubens, umbellis, flosculis, eorumque colore & semine, Dauco cyanopo similis existit. Radicem habet pedis, aut nonnunquam duorum do drantum longitudine, Selinoide graciliorem, teretem, candidam & perennem. Saporem & odorem exulcerante, acrimonia tota herba Selinoidi dauco respondet. nascitur ubique in cultis campis & secus uias, solo qualicunque.

DE DAUVO coniophyllo, [id est, Cicutam folijs referente, &c.] CAP. CXXIIII.

DA Vcus coniophyllus caulem habet Dauco Selinoidi similem: folia uero in brachiatis utrinque pediculis producit in latitudinem explicita, & cicute modo in tenues partes incisa, adnata caulibus à geniculis emittit longa, in cacumine latiusculas umbellas candidis flosculis ferentia: quibus semina succedunt Selinoidi similia. Radice nititur candida, coriophyllo dauco æquali, aut nonnunquam maiori, & perenni, facultatibus Selinoidi respondet. Nascitur umbrosis, herbosis atque editis locis, solo pitugui.

DE POLYCHRESTO, [umbellifera herba, liquore radice lacteo. Nomen unde indiderit Cordus, ex descriptione non uideo. Nam si nomen fingendum sit, à foliorum crebris incisuris, aut furculorum, qui umbellam constituunt diuisionibus, Polymetum fuerit dicendum, non polychrestum.] CAP. CXXV.

POLYchrestum foliosam à radice capite emittit comam, undique per terram sparsam. ipsa autem folia non simplicia atq; indiuidua, sed multifida, omnium ferè umbelliferarum modo: siquidem pediculi tenues à radice exeunt, crebrò articulis intercepti, qui in singulis articulis in ternos furculos saepius & multis uicibus subdiuiduntur. ultimis, extremis minimisq; pediculis folia insidēt exigua, in multas tenues partes secta, & crebris incisuris partim coriandro, partim satiuo petroselino similia, cum fructificare inceperit arescentia. Caulem è media foliorum comā erigit unum atq; alterum, (aut nonnunq; plures secundum radice aetatem) curbito plerumq; proceriorem, teretem, modicè striatum, longo interuallo geniculatū, intus fungosum, atq; per omnia Anetho similem, paulò tamen tenuiorem, folia è geniculis proferentem, inferioribus similia, sed multò pauciora minoraq;: in cuius summitate umbella expanditur lata, quinq; aut sex unciarum latitudine, quadrantalibus plerumq; furculis constans, candicantibus flosculis plena. siquidem singuli umbellæ furculi, in plures tenuiores furculos subdiuiduntur, minoris umbellæ specie referentes, semina singulis floribus succedunt bina, coniunctaq; tanquam unū sint, anetho latiora crassioraq; colore subfusca, sub ipsa umbella tenuia oblongaq; exeruntur ceu folia. Radice nititur † tricubitali, aut nonnunquam pro aetate longiore breuioreue, superius crassitudine digitali, candida, carnosa et perenni, quæ præcisa, lacteum remittit liquorem. saporem radix habet Pastinacæ satiuæ similem, si mulq; amarum & subacrem. semen gustu radici respondet. Lacteus uerò liquor ceteris partibus efficacior est: folia imbecilliora sunt: flores postremo medium tenent inter folia & radicem temperiem. Nascitur asperis, sabulosis, arenosis campis, tumulis & aruis, plurimumq; in Vuittembergensi electoratu.


† Mirum hoc cum caulem dixerit uno cubito dumtaxat, plerumq; proceriorem esse.

* Fortè vielguitha, id est, ualdè bona: etsi alia uidetur ualdè bona Italicorum: & Toutte bone, id est, Tota bona Gallorum.

DE HIRCIBARBA. CAP. CXXVI.

HIRCibarba, folia à radice capite profert, do drante plerumq; longiora, angustiora, croco similia, paulò tamen latiora. nam semunciam ima sui parte aliquando attingunt, ad terram inclinata: è quorum medio caulis assurgit, in statu durus ex interuallo foliis, sine pediculo amplexus prædictis breuioribus, cui successiue per totum uer et aetatem ramuli adnascuntur breuioribus foliis amplexi. flores toto uere usq; post medium æstatis in summis ramulis profert, sibi inuicem succedentes, orbiculatos, luteos, staminibus dense stipatis constantes, oblongo calici insidentes, quod euidentius in primis floribus circa ueris medium apparet flores in oblongos pappos resoluuntur, unà cum longo striato & fusco semine, inferius annexi in aurâ abiturî, semen intus candidum dulcemq; nucleum complectitur, atque dum adhuc cum pappis in calicibus continetur, quam hircinæ barbæ speciem præ se fert, unde nomen apud Græcos, Latinos & Germanos inuenit. Radice nititur oblonga, mini mi digiti crassitudine, candida, antequam fructificet carnosa & gustu suauis, postea uerò arescente. Saporem teneri coliculi antequam semen ferant admodum dulcem & suauem habent. abundat tota herba copioso & lacteo liquore. Nascitur in montibus, campis & pratis.

De



PORTVL Aca sponte nascens, statim à radice in plures crassos, pingues, carnosos, teneros, rubentes & undiq; per terram sparsos diuiditur colículos: qui & ipsi in numerosiores subdiuiduntur ramulos, totius autem herbæ in terra iacentis quantitas dodrantis aut pedis spacium occupat. folia habet numerosa, crassa, pinguiâ nitidaq; longitudine ferè uncialia, anteriore parte rotunda, paulòq; quàm posterioriore latori, semunciam latitudine raro excedentia, secus qua flores sunt exigui colore lutei, quibus succedūt oblongi, acuminati atq; hordeo æquales & similes utriusculi, per transuersum commissuram habentes, à qua superior folliculi pars recedit, nam pileoli modo auferri potest, saluo adhuc seminis receptaculo, quod & ipsum in transuersa commissura aperitur, minima nigerrimaq; semina ostendens. Radice nititur oblonga, fibrata, carnosâ, subrubente & semestri. Saporem coliculi & folia habent glutinosum & modicè acetosum. semen paruam resipit dulcedinem. Radix postremo iniucundo sapore ferè nauseam mouet. Nascitur in uineis tam pinguibus quàm arenosis, nascitur etiam in arenosis sabulosisq; fossarum aggeribus, circa pagos & arua.

Portulaca fatua. T. 1. 125. p. 382.

PORTVLACA *fatua*, solo cultu ab agresti differt, hinc est quod in hortis facta, ob alimentii copiam maioribus & speciosioribus foliis exeat, atque propter saporis gratiam & succi bonitatem magis quam agrestis edendo sit.

DE GAROSMO, id est, uulvaria, [obsceno gari odore herba, unde nomen confinxit Cordus, est autem Atriplicis agrestis minima species.] CAP. CXXXIX.

GAROSMUM agrestis Atriplicis minima species est, coliculos per terram spargit iuncos, longitudine dodrantes, aut nonnunquam pedales, in quibus oblonga sunt folia, uncia breviora, flosculos, racemulos producit paruos, & in his uix eidentes flosculos: quibus rotunda & papaueri æqualia semina iisdem racemulis contenta. Radice nititur tenui atque semestri. Tota herba uehementer foetet instar putridi halecum gari, eadem manibus tractata, foetore eas adeo inficit ut integrum diem oleant. sapore quoque garo non est dissimilis. Nascitur asperis locis circa macerias, sepes et itinera.

DE MENTASTRO. CAP. CXXX.

MENTASTRUM caules erigit cubitales, quadrangulares & hirsutos, folia ex interuallo in contrariis lateribus, alterno ordine & cruciformi positu proferentia, longitudine beslis, latitudine autem unciam quarta aut tertia parte excedentia, rugosa atque lanuginosa pube obducta. Ramulos supra medium plerumque caulibus foliorum sinu producit, uere & æstate numerosis undique floribus in candido rubentibus & hiantibus, denticulatis calicibus insidentibus, & positu quandam spicæ imaginem referentibus circumdati: quibus exiguum nigrumque semen succedit. Radice nititur multis capillamentis fibrata, laterales uiticulas propagationis causa in terra spargente & perenni. Saporem habet amarum, acrem & adstringentem, odorem uero grauem & acrem, *fatua* *Mentha* multo iniucundior. Nascitur secus gelidos riuulos, solo pingui, interimque saxoso, arenoso autem nunquam enatum uidi.

De

Mentastrium. T. 1. 5. p. 20.



DE SONCHO leui. [Sonchum utrumq; aliter Matthiolus, aliter Euchsus pingunt, cognatas tamē herbas. ad quas etiam Lactuca sylvestris Tragi pertinet. Euchsus asperum Germanicē Genßdistel, leuem Hasenfßl interpretatur. Tragus asperi Sonchi genera duo describit 1. 90. Iconibus omisis.] CAP. CXXXI.

LENIS aut leuis Sonchus caulem erigit singularem, cubito plerumq; proceriorē, minimo digito paulō graciliorem, angulosum, glabrum, rubentem, tenerum & concavum, folia ex intervallo proferentem, longitudine dodrantali (aut maiora) latitudine uerō quadrantalī aut quincuncialī, mollia, tenera & utrinq; profundius usq; ad spinam in quaternas plerumq; partes secta, inter utrumq; latus anteriori parte singularis folii portio intercedit, rectaq; exporrigitur. Ramulos in summo caule ē foliorum sinu emittit paucos, in quorum summitate lutei orbiculatiq; flores toto uere & æstate usq; in autumnum se proferunt, latitudine unciali, capillamentis dense stipatis cōstantes, quæ in pappos resoluta, unā cū paruo oblongo & in fusco rubente semine auolant. Radice nititur oblonga, candida, fibrata & leuīssima, abundat lacteo liquore tota herba. Saporem caules et folia habent amarum, aliqua aquea dulcedine mixtum. Semen dulce est, odore herba papaueremulatur. Nasquitur sponte in hortis & fossis.

k

DE SONCHO aspero maiore. [Lege quæ ad præcedentis capituli Lemma annotauimus.] CAP. CXXXII.

SONchus asper maior, caule, ramulis, flore, semine & radice, lacteo liquore leni Soncho similis est, foliis tantum differt, quæ longitudine quincuncem interdum excedunt, latitudine uerò posteriori parte trientem æquant, antè uerò in mucronem fastigiantur. eadem sine pediculis caulem amplectuntur, nec in partes secta sunt, sed per ambitum inæqualia, & breuibus, nec adeò duris aculeis horrida. Saporis amaritudine lenem sonchum aliquantulum superat, nasciturq; iisdem locis.

DE SONCHO aspero minore. [Vide annotata cum capite 131.] CAP. CXXXIII.

SONchus asper minor, maiori per omnia ferè similis est, sed multò minor existit. Caulem enim producit pedalem, duos dodrantes rarò longitudine excedentem, aliquantulum teretem, nec adeò tenerum, sed solidiorem foliis uestitum, triente breuioribus, per ambitum maioris modo spinulis horridum. Saporem habet amarum. Nascitur circa sepes, aspero & arenoso solo.

DE LACTUCA agrestis, quam hodie falso apud nos Endiuia uocant. CAP. CXXXIII.

T. 1. 89. p. 268.



LACTUCA agrestis Galæni tempore Grecis thridacine appellata, & quam hodie ubiq; in Germania à ueritate aberrantes, Intybum & Endiuia tam Medici quàm pharmacopole uocant, primo uere ab erumpente semine folia emittit oblonga, tenera, modicè per ambitum sinuosa: è quorum medio caulis exit singularis, selquicubitalis aut interdum bicubitalis, teres, uiridis, glaber & solidus, statim à terra ferè usq; ad cacumen folia proferens, longitudine propemodum dodrantalia, latitudine bessem (ut plurimum) excedentia, utrinq; in profundos breuibusq; spinulis inæquales & serratos sinus excauata, colore in uiridi cinerea, à tergo, id est, inferius, oblongis fragilibusq; aculeis horridum & spinosum dorsum habetia. anterior folii pars in mucrone desinit. At Brema in Saxonia ea folii portio non turbinè fastigiatur, sed in rotunditatem

ditatem exit, ramulos caulis supra sui medium producit numerosos, in quorum summitate copiosi, parui luteiq; flores capillamentis stipati, ueris exitu se proferunt, ob longis caliculis contenti, qui in pappos resoluti unâ cum olongo, & in fusco cæsisamine auolant. Radicem nititur semestri, oblonga, foris in consistentia fusca, intus autem candida, antequam caulem edat tenera, postea uerò lignosa. abundat tota herba copioso, lacteo & crasso liquore. saporem habet uehementer amarum & euidenter acrem, odore papauer imitatur. Nascitur incultis asperisq; locis, aggeribus, rudibus, muris, & iuxta sepes.

DE SMYRNIO, seu Angelica uulgo dicta.

CAP. CXXXV.

T. I. 140. p. 421.



SMYRNium, quod hodie ab omnibus ferè Europæ Medicis & Pharmacopolis Angelica nominatur, primo anno cum è semine prodierit, pediculos emittit cubitales, crassitudine digitales, teretes. teneri, glabri & in terrâ repandi, utrinq; in binos, ternos, aut nonnunc quaternos, minores pediculos ceu brachia diuisi & expansi, in quorum extremitate folia sunt figura Apii foliis similia, sed multò maiora, in ternas plerumq; turbinatas partes antrosum spectantes secta, propius ad aceris Cinereæ folia accedentia, interdum ad dodrantem tam longitudine quàm latitudine accedentia, & tota hyeme uirentia: sequenti aut tertio anno caulis è medio foliorum assurgit, duum aut nonnunc trium cubitorum altitudine, crassitudine pollicem plerumq; superans, teres, geniculatus, glaber, in candido liuente & absterfu fa-

cili polline ueluti conspersus, & concavus, geniculatim foliis ornatus, prædictis multò minoribus. habet ramulos & adnata aliquot caulis, in quorum summitate magnæ sunt umbellæ, quinq; aut sex unciarum latitudine, forma conuexæ, candidantibus flosculis plenæ, quibus bina succedunt semina, inuicem coniuncta, oblonga, angulosa, paleacea et in candido cinerea: oblongum, planum, foris nigrum, intus candicantem & cartilagineum nucleum paleaceo & anguloso cortice claudentia, umbellæ antequam enascantur, in posteriori foliorum parte instar utriculi tumida continentur, quæ intra ipsum utriculum auctè, rupto utriculo, erumpunt, quandam conferetiracem speciem referentes, donec in eam quam descripsimus formam ado-

k ii

lescant. Radice nititur antequam caulis enascatur crassitudine plerumque manum complente, nonnunquam etiam crassiore, oblonga, in multas dodrantes aut pedales partes distracta, foris nigricante, intus candida, carnosae, molli, succosaeque: quae praecisa flauum liquorem seu lachrymam, ab interiori corticis parte remittit, cui similis liquor etiam in foliorum uenis continetur, sed aquosior. Cum uero caulis maturo semine perit, ipsa quoque radix putrescit. eadem etiam quamuis tempestiue effoditur, ob excrementicii humoris copiam facile ab innascentibus uermiculis perfunditur. Sapore radix semen & folia habent acrem, fauces scarificantem, subamarum, tenuem & aromaticum: odorem uero similiter acrem, uehementem, medicatum atque aromaticum similem. Efficacissimus omnium partium liquor est, mox semen, deinde radix: flores & folia postremum locum tenent. Nascentur umbrosis, humentibus, uliginosis, palustribus, petrosisque, tam editis, quam planis locis, plurimumque in Pomeraniae palustribus atque Noruegiae montibus. Interim etiam feritur Friburgi in Brisgoia, quae Pomeranicam bonitate uincit, siccioribus locis enascens, ideoque non tam facile teredinem sentit, ut illa.

DE SOLANO nigro, uulgari.

CAP. CXXXVI.

SOLANum nigrum cubitalis herba est, multis angulosis, inaequalibus et sublaebris adnatis ramosa. folia habet plerumque trientalia, latitudine paulo angustiora, in mucrone turbinata, per ambitum incisuris diuisa, & tactu mollia. Flores tota aestate, contra quam aliae plantae ex mediis foliorum interno diis profert paruos, in singulis pediculis ternos, quaternos, quinos aut senos, quin exiguus oblongis, acuminatis & candidis foliolis, instar stellae radiorum, dispositis constantes: in quorum medio lutei minimique apices, in unum coniuncti eminent, floribus. singuli succedunt acini quantitate pisi, figura rotundi, substantia molles, primum uirides, in maturitate uero nigri, intus subuiridi, glutinososque succo atque paruis flauentibus compressisque seminibus pleni, ab uno pediculo, instar corymbi aut parui racemi dependentes, & in terram annuentes. Radice nititur oblonga, fibrata, candida, semestri atque inuiti. saporem folia habent aqueum, simulque adstringentem. acini uero glutinosum & aliquantulum uinosum, odorem spirat grauem & foetidum. Nascentur ubique in urbium hortis, iuxta macerias, muros, rudera & sepes, tam cultis quam incultis locis, umbrosis natalibus, mire frondium magnitudine & temeritate luxuriat, iisdemque frequentius & felicius prouenit.

* Vulgo *ſtaphis* dicitur.

DE SOLANO puniceo, [altera specie praecedentis, ita ut colore ferè solam differat.]

CAP. CXXXVII.

SOLANum puniceum, ramulis, foliis, floribus acinorum, figura & quantitate, radice, sapore, odore & natalibus nigro Solano simile est: differt tamen, quod paulo asperioribus constet ramulis, acinosque in croceo colore puniceos producat, quia quae ut nigri baccae ante maturitatem uiuent.

DE XANTHIO.

CAP. CXXXVIII.

XANTHION caulem habet cubitalem, circa terram digiti crassitudine inaequalem, & aliquantulum angulosum, subuiridem, solidum & nigris in purpureis maculis conspersum, longis, crassis et cauli similibus adnatis, statim a terra usque ad summam incondito ordine exeuntibus ramosum: in quibus folia sunt longis pediculis insidentia, longitudine trientem plerumque excedentia, posteriore sui parte triente raro angustiora, in mucrone fastigiata, per ambitum inaequaliter incisa, in summa Attriplici similia, a quorum sinu ueris medio atque exitu oblonga exeunt capitula, corni aut oliuae nucleo similia & aequalia, in candido purpurascens, breuibusb

bus stipatisq; ceu apicibus obsita, quæ flores eius sunt: eadem paulatim castanearum modo aculeis armatam duramq; superficiem acquirunt, binosq; intra se autumno, cum maturuerint et induruerint, nucleos claudunt, colore candidos, nigricante tenuique membrana uelata. Radice nititur oblonga, multis capillamentis fibrata, candida & semestri. Saporem exterior fructuum pars acrem habet; nuclei uero dulcem & gratum. odore partim Solanum, partim Nasturtium herba æmulatur. Nascitur iuxta urbes et pagos, planis humetibusq; locis, ubi hybernas aquas æstas exiccauit.

Xanthion T. 2. 102. p. 839.

Hippiaminor. T. 1. 126. p. 385.



DE HIPPIA minore, [quam uulgo Morsum Gallinae, eruditi pleriq; Alsineruocant.] CAP. CXXXIX.

HIPPIA minor, egregie teneritudinis herba est, coliculos per terram spargit numerosos, pedales aut do drantales, admodum graciles, teretes, teneros, glabros, uirides & geniculatos. folia in singulis geniculis bina profert, uncia plerumq; multo breuiora, posteriori parte rotunda, anteriori uero modice acuminata atque Anagallidi similia, molliora tamen. flosculi è foliorum sinu exeunt minimi, colore candidi, stellæ modo radiati: quos perexiguus subsequitur utriculus, pauca femina intra se continens, papaueri similia. Radiculis nititur semestribus, capilli modo tenuibus, euulsu tamen in runcando difficilibus, quantumuis gracilibus. Sapo

k iii

rem tota herba aqueum & ferè insipidum habet, aliquantulum tamen Betæ simile, nitrosa succi qualitate. Gallinæ huius herbæ pastu delectantur. Nascitur cultis hortorum arcis.

DE CALCATRIPPA candida.

CAP. CXL.

Calcatrippa candida. T. 1. 195. p. 659.



CALCATrippa candida, caule, ramulis, foliis, florum figura & semine, in arvis nascenti similis existit. flores colore differunt, qui illis in candido est rubens. Colitur coronarum causa in hortis.

* Vulgò Ritterspozen, id est, Consolida regalis. Vide supra lib. 1. cap. 16.

DE DAVCOIDE maiore, [folijs hirsutis, &c.] CAP. CXLII.

DAVCOIdes maius folia habet per terrā strata, apio aut Latifolio, id est, Selinoidi Dauco similia, hirsuta & per terram strata: e quorum medio caulis exit sesquicubitalis, aut aliquando maior, aliquantulum asper & geniculatim foliis uestitus, iis quæ inferius sunt minoribus, in summo caule umbellæ sustentur æstate in candido rubentibus flosculis plenæ: quibus singulis bina, subrotunda, crassiuscula & lapparum modo aspera, & prætereuntium uestibus adhærentia, semina succedunt. Radice nititur oblonga, candida, tenuis, antequam caulem proferat, carnosæ, gustuque cum acrimonia subamara, quæ maturo semine perit. Semen tritum odore cimices et Buprestides imitatur, gustuque admodum ingrato est. Nascitur decliuibus, campestribus locis, inter fruteta.

DE DAVCOIDE minore. CAP. CXLIII.

DAVCOIdes minus, caulem maiore tenuiorem producit, in summo adnata & ramulos proferentem. folia geniculatim exeunt, in latitudinem explicata, & in tenues partes secta, partim pastinacæ sylvestri, partim cicutæ similia, minora tantum & aliquantulum hirta. flosculos æstate in parvis umbellis fert, in candido rubentibus, quibus semina succedunt in maturitate candicantia. Aniso similia, sed paulo minora, aspera & lapparum instar prætereuntium uestibus adhærentia. Radice nititur tenui, lignosa & semestri, gustu maiorem imitatur, non tamen adeo ingratum & asperum saporem habet. Nascitur frutetosus locis, secus vias.

De

DE CONYZA sylvestri hirsuta, [Conyza Tragi, quam hic exhibemus, ut cum Cordi Conyzis cōferatur, uidetur conyza minor Matthioli. Videtur & illa species conyze, quæ quinq; aut plures ab una radice transversa caules producit, communi herbe vulnerarie nomine ab eo uocata.] CAP. CXLIII.

T. 1. 54. p. 166.



T. 1. 164. p. 488.



CONYZA sylvestris hirsuta caules emittit pedis aut duum dodrantum altitudi-
 ne, rectos, graciles, solidos & subhirsutos, oblongis, hirsutis, mucronatisq; fo-
 liis, besse interdum longioribus, uncia uero paulo angustioribus. in summis cauli-
 bus capitula sunt singula & subtus aspera. in quibus æstate & ueris exitu flores lu-
 tei sunt, figura orbiculati, campestri conyze similes, longioribus tamen, per ambitū
 capillamentis stipati & radiati, quæ in pappos resoluta, una cum oblongo fuscoq;
 semine auolant. Radice nititur lignosa, fibrata, nigricante & perenni. Saporem flo-
 res habent amarum & acrem. folia gustu mitiora sunt, odorem spirat grauem, suba-
 crem, præsertim flores. Nascitur incultis, montanis & frutetos locis.

* Est Conyza montana, odorata.

DE CONYZA sylvestri, glabra.

CAP. CXLIII.

CONYZA sylvestris glabra, caulibus, capitulis, floribus, semine & radice, hir-
 suta sylvestri similis est, caules tamen glabros, nec adeo aspera & hirsuta ca-
 k iiii

pitula producit. folia habet longiora, paulò latiora, superficie leui & glabra, per ambitum tamen tenuibus incisuris, aspera, sapore & odore hirsuta imbecillioribus constat. Nascitur montanis, herbosis & fruterosis locis.

DE CONYZA Helenitide.

CAP. CXLV.

CONYZA Helenitis, foliis, caulibus, flore & sapore Helenio, id est, Inule similia est: multò tamen minor. Primo anno, cum è semine prodierit, folia tantum profert longitudine trientalia, quadrantalium, latitudine uncialia, in mucronem acuminata, subtus tenui lanugine hirsuta, & in terram refracta. altero deinde anno caulem profert plerumque cubitalem, nonnunquam ab eadem radice plures, graciles, teretes, solidos, foliis iam dictis minoribus uestitos, interdum in adnata diuissos: in quorum summitate singula sunt capitula, à quibus lutea exeunt stamina, florem constituentia, longitudine plerumque unciali, undique in orbem radiorum instar explicata: in quorum medio breviora eiusdemque coloris stamina sunt, densius stipata. quæ in papos resoluta, una cum oblongo fuscoque semine auolant. In summa Inulæ speciem capitula, flores & semina referunt, nisi minora essent. Radice nititur ferè lignosa, fibra campestribus, lutosis locis, quos fluuiorum inundationes hyeme & uere operiunt.

† Vide an
perenni.

Conyza Helenitis. Eadem aut similitudine
datur Matthioli. conyza maior.



Chamaelema. T. 2. 8. p. 797.



De

DE CHAMAECELEMAE, [quod nomen author confinxit, vulgus Hederam
terrestrem uocat.] CAP. CXLVI.

CHAMAECELEMA, quam ubiq; in Germania falso Hederam terrestrem, Germani uero Gundelreben proprio nomine appellant, uiticulas per terram spargit numerosas, iunco graciliores, modice angulosos, teneros, glabros & geniculatos, longitudinis incertae, siquidem interdum & frequenter orgiam excedunt. folia a singulis geniculis bina prodeunt, longis pediculis infidentia, rotunda, per ambitum incisa, non tamen serrata. nam incisurarum interualla rotunda sunt, uenis cor rugata, superius uiridia, inferius autem pallidiora, & iuxta pediculum in sinum excauata, latitudo iis est plerumq; unciarum duarum. flores secus folia fert oblongos, hiantes, chamædryos aut Galiopsios floribus similes, colore in purpura cœruleos, quibus exigua nigraq; succedunt semina, ueluti Chamædryi. Radice nititur tenui, si brata, quin etiam a singulis geniculis in terra radices demittit. saporem folia & flores subamarum & modice acrem habent, odorem grauem, non tamen inuicundum spirat, uiret tota hyeme, coquitur cum carnibus. Nascitur iuxta macerias, sepes & incultis locis.

* Gundelreben.

DE PARTHENIO, [Matricaria uulgò dicta.] CAP. CXLVII.

T. 1. 50. p. 156.



PARTHENIUM, quod hodie ubiq; per totam Europam Matricaria nominatur, folia circa terram numerosa fert, utrinque in partes longitudine unciales, latitudinem uncia angustiores, crebro ex obliquo incisas diuisa, partim Coriandri, partim etiam Tanacetii foliis similia. e quorum medio caules plerumq; plures assurgunt, pede frequenter proceriores, graciles, angulosi, adnatis ramosi, & sub horum exortu singulis uestitifoliis, quibus eadem est inferioribus figura. flores in ramulorum summitatibus fert orbiculatos, latitudine semunciales, in medio luteis breuib; staminibus dense stipatis, uittello simile capitulum constituentibus, quod undiq; breuib; exiguis, numerosis, candidisq; foliolis circūuallatur. media est lutea pars florum mutato colore in seminata nacetio similia permutatur. Radice nititur plurimis candidisq; capillamentis fibrata, atq; perenni. Saporem tota herba amarū, & cum tenuitate acrem habet, odorem uero Trago. acrem & ualde grauem, ueluti Tanacetum, sed acriorem, cui gustu etiam respondet. Nascitur in antiquis urbium muris, iisque aliquantulum humentibus, & petris quibusdam urbibus uicinis, plurimumq; Marpurgi in Hessa, Freiburgi & Rochlicii in Misnia, plurib;que aliis regionibus: iis uero locis quibus sponte nō prouenit, in hortis colitur, arenosis minimè sponte exit.

T. 2. 103. p. 841.



TRIBVLI lacustris fructus aestatis præteritæ exitu, sparsus in limo latens, eiq; tanquam anchora inhaerens, caulem saluo & integro tam operimento quam nucleo ex angusto foramine emittit, secundum aquæ in qua nascitur diuersam profunditatem, duum, trium aut quatuor cubitorum, longitudine bessis seu trientis, interuallo geniculatum, teretem, inferius ubi est fructus exit iunco multo graciliorem, paulatim uersus summitatem crassescentem, atq; superius ueluti in clauam intus fungosam, longitudine plerumq; quadrantalem, crassitudine uero pollicarem desinentem. à singulis geniculis binas ceu capillatas & uillosas spicas, inferiori caulis parte breuiiores, superiori autem longiores proferentem, colore subfuscum, intusq; ualde angustis sistulis, Nymphaeæ modo, per uia internodia habentem. Folia è superioris clauæ capite profert numerosa, trientalibus aut nonnunquam quadrantalibus, & interdum bessem non excedentibus, uiridibus, in medio crassioribus, intusq; fungosis pediculis insidentia, undiq; in orbem per aquæ superficiem strata & expansa, quatuor lateribus, longitudine sesquiunciae aut bessis, Romboidem figuram referentia. ex his duo posteriora latera, pediculo iuncta minime incisa sunt, reliqua autem duo anteriora incisuris serram imitantur. superior foliorum pars omnino distincta, & adhaerentibus diuersi generis animalculis mucosa & sordida existit. Flores aestate sub foliis circa clauam fert paruos, candidos & aqua submersos: quibus singuli succedunt fructus, longitudine et latitudine unciam excedentes, angulosis, quatuor oblongis, duris, ad pungendum paratis, et modice reflexis aculeis armati, atq; iisdem aculeis, ceu cornibus taurini capitis formam exprimentes, & lignoso infrascripto succo, si exprimatur, manantem, gustu dulcem, & ad insipidum saporem simul uersantem. qui cum aruerit, omni carens succo tam aqueo quam oleoso, durus euadit, atq; substantia ad frumentaceorum seminum naturam accedit, adeo ut etiam panis ex eo pinxi queat. Cum fructus deciderint, ipsa claua eorum nigricantibus uestigiis inaequalis redditur. Radices, supra fructum etiam matura & iam flaccescente herba adhuc in limo haerentem, habet numerosas, fibratas & nigricantes: quarum maxima plerumq; pars, non è limo, sed è circumfusa aqua nutrimentum trahit. pauca siquidem ex his limo insident, nisi casu aliquo eo operiantur, ipsa quoq; capillamentando. Caules & folia manifestam adstringendi uim habent, uerum caules multo foliis efficaciores. Nascitur stagnantibus fluuiorum partibus, lutosis lacubus et urbium

bium fossis, quibus omnibus limosus sit fundus. Plurimus Vuittembergæ & Tor-
gæ, ex Albi fluuio emissis lacubus, atq; Lipsiæ in stagnantibus Elisfri partibus, lu-
tolisq; lacubus.

* vulgò Wassernuß, uel Stachelnuß.

DE CICUTA maiore.

CAP. CXLIX.

T. 1. 159. p. 474.



CICUTA maior folia circa terram pri-
mo anno habet, in anguloso, brachiato
et in binos minores pediculos aliquoties di-
uisis pediculis crebrò in tenues partes inci-
sa, & in latitudinem explicita: è quorum me-
dio sequenti uere caulis assurgit procerus,
duùm, trium aut nonnunq; quatuor cubito-
rum altitudine, & digiti uel pollicis crassitu-
dine, glabrum, teretè, geniculatum, liuidis,
fuscis atque subrubentibus maculis con-
spersum, intus fistulæ modo concauum, fo-
lia geniculatim inferioribus similia proferē-
tem, superius adnatis pluribus ramosum: in
quorum summitate umbellæ sunt modicè
conuexæ, candicantibus æstate flosculis ple-
næ: quibus semina succedunt Aniso similia
& æqualia, in maturitate tamen candidiora,
atque in binas partes dilabentia. Radice ni-
titur do drantali aut pedali, crassitudine di-
gitali, tereti, candida, antequam caulem
proferat carnosa, cum uerò fructificau-
rit lignosa sit, peritq;. Saporem radix Galli-
cæ Pastinacæ non dissimilem habet sed cras-
so uenenosoque halitu uitalia tentantem.
semina gustu iniucunda sunt quemadmodũ
& folia, quæ etiam grauem admodum, fo-
dum atq; horribilem odorem spirant. Nasci-
tur umbrosis pinguibusq; locis, circa fossas,
sepes, & templorum umbra septentrionem
uersus.

DE CICUTA minore, [Tragus scribit hoc uitium Petroselinum esse, & aliquo modo
ad cicutam pertinere. Germani uocant Gleyß/Glyssen.] CAP. CL.

CICUTA minor caulem erigit pedalem aut cubitalem, gracilem, geniculatũ,
teretem & nitidum, foliis geniculatim uestitum, maiori Cicutæ similibus, sed
uehementer nitidis & splendidis umbellas, flores & semina maiori similia profert.
Radice nititur tenui, candida ac semestri: odore, sapore, & facultatibus maiorem æ-
mulatur. Nascitur cultis hortorum areis, plerumque inter satium petroselinum
decerpentes fallens, nam pro Petroselino, aut unã cum illo resectum cibusq; insper-
sum uescientium mentes graui periculo turbat, ideoq; cautos esse hortulanos opor-
tet, atque noxiam hanc herbam splendore à Petroselino distinguere, alioquin fo-
liorum incisuris & forma illi non dissimilem.

I ii

VALERII CORDI HISTORIAE

DE PNEVMONANTE, id est, Lungenblüme. [Gentiane minoris speciem esse apparet, qualem hic exhibeo, aut similitam.] CAP. CLI.



PNEVMONAN-
thes caulem qui
busdam in locis pro-
ducit singularem &
individuū, quibus-
dam uerò in binos
sibi contrarios et al-
terno positu exeun-
tes ramulos diuis-
sum, gracilem, folia-
dum, in uiridi pur-
purâq; nigricantē,
folia sub ramulis
proferentem scilicet
uncialia, semuncia-
lata, coloreq; ni-
gricantia: quæ ue-
rò in summis sur-
culis sunt prædictis
magnitudine cedūt:
flores æstate in sur-
culorum cacumine
fert, Modelgeræ si-
miles, sed maiores. si
singularis sit caulis,
unum atq; alterum,
in ramoso uerò mul-
tos, erectos, conca-
uos, oblongos, infe-
rius angustos, supe-
rius latiusculos, pro-


fundius in quinas plerumq; partes sectos, intus hirsutos, colore in purpura cœrule-
os, quinis, ut plurimum, intus oblongum uiridemq; apicem stipantibus. flaccescen-
te flore apex paulatim in uncialem utriculum excrescit papaueraceo semine plenū.
Radice nititur tenui, lignosa, semestri atq; inutili. Flores amarum tenuemq; saporem
habent, folia uerò his multò imbecilliores. Nascitur campestribus uliginosisq; lo-
cis. nascitur etiam excelsorum montium, syluis carentium, opacis atq; meridiano
sole non illustratis partibus, plurimumq; lenæ in Hausbergo.

* Dodonæus violam calathianam uocat, propter floris figuram. Videtur ad Gentianæ species pertinere. est enim radix lutea & amara gustu.

DE COLCHICO nigro, [cuius radix siccata, foris nigricat.] CAP. CLII.

COLCHICI (quod hodie Hermodactylum uocant) tres sunt species. primū
enim cum siccatum fuerit, foris nigrum, intusq; fuscum in candido colorem
habet. Alterum in flauo subrubentem, tertium uerò candidum. Ex his nigrum, pau-
lò ante autumnale æquinoctium florere incipit, usque quo superueniens gelu, sub
ipsis pruinis superbientes flores opprimat. Colicolum itaq; autumnò edit quincun-
cialem, nonnunq; etiam dodrantalem, gracilem, glabrum, candicantem atq; egregie
teneria

T. 76. p. 759.



teneritudinis, in cuius summitate flos est. Lilio non dissimilis, sed minimè repandis & re flexis deorsum foliis, sex ut plurimum foliis longitudine sesquiunciam aut bellem & quā tibus, latitudine uerò uncia paulò angustioribus, utrinque acuminatis, glabris, nitidis, pinguibus, in attritu glutinosis, primū clausis & conuolutis postea se explicantibus constans, colore in subrubente purpura albicans, in medio luteo colore stamina, numero ipsa floris folia non excedentia continens, qui postquam unum atque alterum diem durauerint flaccescunt. deinde paulopost sequentis ueris initium folia profert longitudine dodrantali, latitudine uerò uncie aut sesquiuncie, acuminata, crassa, Liliaceis forma & substantiæ lentore similia, sed longiora, sub terra coeuntia, & teretem, tenerum candicantemque pediculum constituentia: in quorū medio prope terram utriculus extuberat acuminatus, triquetrus, longitudine sesquiunciam plerumque accedens, latitudine uerò unciam ut plurimum æquans, rotundo, milioque maiori, primum candido, æstate deinde post solstitium maturescens & ad rufum in nigro colorem transeunte semine plenus, quo sparso folia flaccescunt. Inueniuntur nonnunquam duo aut tres utriculifimul coniuncti & ab una radice prodeuntes, cum eadem radix totidem flores produxerit, sed unus tantum ex his magnitudine præstat, alii ueluti abortiuū sunt. Radice nititur longitudine sesquiunciali, modicè in planā compressa, latitudine unciam plerumque quarta eius parte excedente, superius turbinata, inferius autem latiuscula parte ueluti in paruum unguem desinente, & candidas fibras in terram demittente, & paruis bulbis circa latera enatis se propagante: foris multis in rufis nigris tunicis uestita: ex quorum numero eius ætatem cognoscere potes. singulis enim annis singulas superinduit tunicas, quibus detractis reliqua radice pars carnosā, totaque candida & lacteo succo plena est, eadem ab una parte rimā ueluti sulcum habet, per quā floris coliculus transiit, hunc enim non est superioris & acuminata parte maioris radice autumnō promit, sed ab inferiori flaccescentis ungui & latiore, contra reliquorum bulborum morem, ea uerò radix a cuius mucrone flos & folia emittuntur, sulco caret, usque in autumnū, donec subnascens paruula alia emissio flore priorem sulcet. Hinc est quod radices, quibus uere & æstatis principio folia insident, canaliculatum istum sulcum non habeant. Folia cum exaruerint, uestigium quoddam turbini impressum relinquunt. Eadem radix quæ priore anno germinauit, sequenti anno flaccescit, autumnō succedit alia admodum parua, inferius adnascens, a cuius superiori parte autumnō flos prodit. nam hic minime a maiore exit, minor hæc radix una cum flore adolefcit, in uere autem & æstate sequenti simul cum semine ad iustam magnitudinem peruenit, quo tempore prior omnino perit. Siccata radix tam foris quam intus fusca fit. Saporem radix habet dulcem simulque amarum, tenuem, saliuam prouocantem, & aliquantulum nau-

VALERII CORDI HISTORIAE

seosum. Odorem uerò omnes herbae huius partes, grauem & nauseabundum spirant. Nascitur in pratis tam planis quam montanis solo pingui, plurimumque in Vuirtembergensi Sueuia, ubi autumnno omnium ferè montium decliuiâ, campi & prata his floribus albicant.

DE COLCHICO subrubente, [quod à colore radice siccatæ ita cognominat.]
CAP. CLIII.


COLCHICUM subrubens, nigro in omnibus notis & proprietatibus assimulatur, præterquam quòd siccatæ eius radix, quamuis excorticata, rubescat. Sapor quoque & odorem nigro similem habet, nasciturque eiusdem naturæ natalibus: rarissime tamen iuxta se simul nascuntur.

DE COLCHICO albo, [cuius radix etiam siccatæ albicat, tum foris, tum magis intus.]
CAP. CLIIII.

COLCHICUM album flore, foliis, semine & radice prædictis simile est, qualitate tantum ab illis differt. siquidem radix etiam cum siccatæ fuerit foris albicat, quanquam interdum flauescat cum inueterascit, intus uerò candidissima, tenera, in tundendo mitis, mollis & tractabilis existit: quæ tusa farinam triticeam aspectu refert. Saporem habet dulcem & ualde suauem, nulla amaritudine mixtum. Sponte in Germania nascentem nondum uidi, sed cultam tantum & è longinquis allatam locis.

DE CROCO. CAP. CLV.


T. 2. 77 p. 763.



CROCUS autumnni initio, cum Sol in libram ingressus est germinat. primum folia multa protrudit oblonga, ualde angusta, acuminata et uenosa, prope terram atque in ipsa terra coniuncta fasciculorum aut scoparum instar, ac membrana tenui inuoluta. e quorum medio coliculus erumpit quincuncialis, gracilis, tener, glaber & nitidus, in cuius summo flos est sex foliis, besis longitudine, uncia paulò angustioribus utrinque acuminatis, & inferius ubi coniunguntur omnino purpureis constans, intus sex staminibus ornati, ex his tria, breuia, angusta, colore lutea, positu erecta & superficie pulueracea sunt, reliqua tria longitudine ipsa floris folia paulò excedunt, cum etiam ex clauso conuolutoque flore iam iam ex terra prodeunt, exertis capitibus proficiant: eadem inferius angusta, superius uerò latiuscula existunt et subtilissimis crenis, nonnullorum oculos subterfugientibus. incisa color iis est in rufopuniceus. ea collecta, aroma celebre constituent, ab omnibus crocum aut crocus appellatum, gustu amariuscule, subacre & aromaticum simile, odore iucundo, acri, late spirante, oculos aliquantulum mordicante, lachrymas profundere cogente, & modice cum suauitate non ingrata caput aggrauante, somnumque conciliante, eius tam triti quam integri parua portio magnam aquæ aut uini quantitatem, luteo aut citrino colore, & ad puni-

ad puniceum inclinante, tingit. Flores unum atq; alterum tantum diem, postquam aperti fuerint, durant, in summa Colchico similimum florem habet, præterquam quod croci floris color magis ad purpuram uergit, & quod Colchicum tria illa longa, puniceaq; stamina, quæ crocum sunt, minime habeat. Floret etiam cum Colchico aut paulo post, cum ultimis Colchici floribus. Folia quæ cum flore Crocus protulit, hyeme non flaccescunt, sed sub ipsa niue uident, proximoq; uere incrementum capiunt, donec æstate ad iustum statum perueniant, in quo longitudinem habent pedalem, latitudine autem quartam uncie partem non excedunt, eadem substantia uenosa, id est, recti uenia sunt, & ab una parte angustis admodum canaliculis striata, ab altera uero sulcum habent minime profundum, modice candicantem, & per eorum medium usq; ad mucronem transeuntem. Radice nititur rotunda, bulbosa, cum floret autem in latitudinem uncialem aut maiorem compressa, multis tenuibus, capillatis fereq; reticulatis tunicis uictorialis modo inuoluta. detractis tunicis tam foris quam intus candida carnosâ succosâq; in superficie multis circulis cincta: à quibus ipsæ tunicæ initium sumunt: autumno cum floret singulari, sequenti autem uere & æstate duplici atq; altera, alteri superius insidente. Cum enim ueris initio folia increscunt, superior radice pars à qua folia exeunt increscit, donec æstate parentem sub se referentam quantitate æquet; hac itaq; uigentem, solidam succosamq; constitutionem nacta, ipsa parens languida et flaccida redditur, atq; autumno tota euanescit. Propagat se bulbosis oculis, ipsi radici adnatis: fibras ab inferiori parte in terra agit tenues candidasq; nutrimentum attrahentes. Saporem radix habet dulcem, aliquantulum nauscosum & tenuem, ideoq; saluam modice elicientem. Colitur apud nos in agris.

T. 2. 150. p. 935.

DE GLYCYRRHIZA.
CAP. CLVI.

GLYCYRRHIZA, ab uno radice capite caules altheæ uirgis similes emittit, secundum radice gratem plures, duum aut trium cubitorum altitudine, iuxta terram minimi fere digiti crassitudine, teretes, solidos, lignosos, in uiridi suffluuos, intus fungosa medulla plenos, atq; inferius tactu asperos, ex interuallo inæquali ordine folia proferentes: è quorum sinu ramuli enascuntur singuli. folia inferius maiora q̃ superius habet, alata figuram referentia, nã dodrantalibus pediculis utrinq; quina, sena, et nonnunquã septena pari fere interstitio distãtia adnascuntur, ea ratione, ut bina semper in uno exortu coniungantur, atq; breuibus admodum pediculis ex aduerso opponantur, in summitate surculi, à

l. iij

quo omnia folia exeunt: unum recta prominet inter utrumque ordinem, parem foliorum numerum unitate impari commutans, singula sesquiunciale aut besis longitudinem habent, latitudinem uncia minorem aut uncialem, quamvis saepius etiam multo maiora fiant. eadem subcrassa & aliquantulum pingua sunt glutinosamque & splendentem habent pinguedinem, utrinque superficiei insident: ideoque tacta digitis contumaciter adherent, est praeterea iis peculiaris quaedam natura quam cum paucissimis communem habent. Oriente sole singula folia in latitudinem primum aequaliter explicantur, mox una cum ascendente sole eriguntur & ipsa, atque interdum omnino sursum rigent atque una cum pediculo cymbam, aut navium carinam forma referunt: occidente vero eodem sidere, rursus se dimittunt, noctuque intus destitutionibus reguntur. nam si dies sereni fuerint interdum eo modo quo dictum est erecta sunt, pluviolis vero, humilis, tristibus & frigidioribus diebus etiam aestate atque ipso meridie se deorsum submitunt, atque haec de foliis tantum intelligenda sunt et constitutione mutatur. summis caulium alis oblonga quaedam, dissecta & ueluti aculeata prodeunt capitula, (quae Dioscorides pilulis Platani comparat, fructus improprie appellando,) ea se paulatim in quadrantalem & nonnunquam quicuncialem pediculum extendunt, undique usque ad summam parvis, oblongis, papilionaceis & colore in candido caeruleoque purpurascentibus floribus circumdatum, atque eorum positum comam hyacinthi florum referentem, flores omnes ferè caduci sunt, paucissimis exceptis: quibus uncialis, gracilis, subrubens atque in latitudinem compressa prodit silicula, tribus aut quatuor oblongis seminibus grauida. diu haec herba uiret antequam folia amittat, quae postea, ubi foliorum defluuii tempus aduenit, non sigillatim sed uniuersa simul una cum pediculo decidunt, cui etiam postquam deciderit adhuc adherent. Radice nititur superius trunco simili, quo uetustimas radices undique in obliquum exeuntes distracta, quae arenosum solum aut neruosa, flexilis, distractu difficilis: ideo cum inter effodiendum extrahuntur raro abruptuntur, maxime solo arenoso. colorem habent foris in spadiceo aut subruffo pallentem, intus uero buxum. Superior radices pars a qua iam dictae exeunt, & quae ueluti truncus seu caput earum est, peculiares & a prioribus diuersas emittit radices, minimi digiti crassitudine, omnino transuersas, asparagis similes, sub terre longius spacium progressae fuerint, acuminato germine e terra emicant, caulesque producunt, qui sequenti anno deorsum obliquas demittunt radices, quales antea descripsimus, flacciscentibus postea, & pereuntibus, a quibus ortae sunt, transuersis radicibus, quibus in uere in candido pallidus est color, substantia autem tenera, succosa fragilisque ab aestate, deinde usque in autumnum superficies earum in fungosum corticem mutatur, interior uero pars, obliquo radicum modo in neruosam, minus tamen firmam aut lentam, & colore buxeam substantiam transit. Saporem radices habent ualde dulcem, modice adstringentem & subacrem, cui etiam iuncta est minima quaedam amaritudo, qualis leguminibus inest, nam haec quoque planta aequae ad siliquiferum genus referenda est, quam ipsa legumina, quapropter minime absurdum uidebitur, quod unam ei ex leguminum qualitatem tribuimus, quam forsita praesertim Bambergi in Franconia, ubi maximus eius est proventus.

* Lächerige / Eßholz.

DE VETONICA CAP. CLVII

VETONICA a radice capite folia emittit plura, longitudine quadrantalia, posteriore sui parte bessem latitudine attingentia, nonnunquam etiam maiora: imobtus

obtusum mucronem atque subrotundum desinentia, per ambitum incisa: (partes autem incisurarum eminentes, non acutæ, sed obtusæ sunt.) crebris & tortuosis uernis in rugas contracta, trientalibus aut longioribus hirtisq; pediculis, sinui eorum immixtis annexa, partim humi prostrata, partim erecta, partim obliquo positu erigentium se speciem referentia: e quorū medio caulis assurgit erectus, cubitalis, quadrangularis, induratus & hirsutus, uno atq; altero intervallo bina folia e contrariis duobus lateribus proferens, in exortu breuibus sibi inuicem pediculis aduersa, & iis quæ prope terram sunt multò minora. in summo caule oblonga & spicata coma est æstatis initio, Galio ipsi non dissimilibus, atq; in ruffo modicè purpurascentibus floribus plena: quibus quaterna plerumq; succedunt paruaq; & colore nigra semina. Radice nititur perenni, minimo digito graciliori, breui, fusca, in multas tenues nigricantesq; fibras distracta. Saporem folia & flores amariuscule & subacrem habent, à quibus radices quoque gustu non multum differunt. Nascitur in pratis, frutetosis & herbosis locis, solo ferè qualicūq;.

Vetonica. T. 1. 65. p. 198.



Elleborus albus. T. 1. 136. p. 409.



DE ELLEBORO albo. CAP. CLVIII.

ELLEBORUS albus cum primū prodit, conuolutis foliis, enascentis Polygonæ nati formam imitatur, caulem paulatim producit, quem & conuolutis foliis ex-

m

plicat, longitudine plerumq; pedalem, mínimo digito multò graciliorem, foliis ex interuallo singulis uestitum, longitudine quadrantem plerumq; excedentibus, latitudine uerò bessem cum semuncia æ quantibus, utrinq; in obtusum mucronem desinentibus, incuruis liris ab uno mucrone ad alterũ transeuntibus, tam superius quàm inferius sulcatis, tactu rigidis, atque sine pediculo, caulem, ceu tibiali usq; ad proximum folium demisso amplexantibus, hinc est quòd arefcens caulis, cortices, ceu tunicas (ut Dioscorides scribit) demittat. Flores

✱

Radice nititur longitudine bessem excedente, superius unciam latitudine frequenter superante, inferius autem in turbinem seu mucronem, coniformi desinente, foris fusca, intus uerò candida, è qua circumquaq; alia exeunt radice quinque, sex aut septem unciarum longitudine, quinta aut quarta uncia parte rarò latiores, teretes, paucis capillamentis fibratae, & tam foris quàm intus candidæ, intus gracilem neruũ, per totam earum longitudinem transeuntẽ habentes; quibus sapor est primum modicè glutinosus, mox acris, & pyretri modo saluam ciens. Semen præter acrimoniã etiam amariuscum est. Tritæ radices grauem atque aliquantulum fœtidum odorem habent. Nascitur in montibus frutetosis, solo plerumq; pingui, plurimumq; in Vuirtembergensi Sueuiæ finibus circa Aurachum, atq; uicinis montibus.

DE VETONICA alba, [solo colore diuersa à præcedente.] CAP. CLIX.

VETONICA alba genere à rubea non differt, habet tamen suam propriam & ab illa solo colore diuersam speciem, folia siquidẽ, caules, spicam florum communi, semen ac radices rubea Vetonicæ similis sunt, flores habet candidos, quorum colore ab illo dignoscitur. Qualitates rubenti easdem possidet, nasciturq; iussu dem natalibus, inuenitur tamen rarior est.

DE VESICARIO SOLANO. CAP. CLX.

HALICA abus, siue Vesicaria caules emittit utriculis non dissimiles, longitudine cubitales & plerumque maiores, aliquantulum angulosos, geniculatos, subhirsutos, plerumque indiuiduos, & ad terram inclinos. Folia è singulis geniculis bina profert, Solano similia, maiora tamen & oblongiora, nonnunquam sex unciarum longitudine, latitudine uerò quinque unciarum, longis pediculis insidentia, maximè umbrosis locis. Flores secus folia singulos habet tota æstate quinque sessilibus, & in candido pallidis foliolis constantes, quinquepartito caliculis, ac in medio exiguum capitulum continentes, dilabentibus florum foris capitulum claudens. cum quo paulatim increfcit, donec æstatis exitu atque autumni initio, ipse inflati folliculi aut Vesicæ speciem referat, & sesquiunciale latitudinem consequatur, quo tempore etiam capitulum folliculo inclusum Cerasi acinum rotunditate, & magnitudine æquat, qui unã cum folliculo principio uirent, in maturitate uerò medium habent inter croceum & puniceum colorem, acini intus candidis, planis, exiguisq; seminibus, & uinoso succo pleni sunt: folliculi uerò ubi turbinem desinunt foramen habent, quod ambiunt quinque acuminati ueluti apices. radicibus nititur longis, tenuibus ueluti utriculis, partim rectis descendens, partim in transversum propagationis causa reptantibus, candidis, ex interuallo paucis tenuibusq; fibris capillatis, gustuq; amaris. acini in uesicis contenti, uinosum, amarum & tenuem, id est, penetrantem saporem habent, quorum tantum usus inualuit.

Nascitur

Nascitur editis uineis, quāuis etiam planis & humentibus locis iuxta sepēs enatum lenae uiderim: ubi maxima eius est in uinetis copia, solum amat pingue & densum, iis uerò locis quibus sponte non prouenit, in hortis colitur.

Vesicarium Solanum. T. 1. 101. p. 302.

Cnicus Supinus. T. 2. 114. p. 362.



DE CNICO Supino. CAP. CLXI.

CNICUS supinus, qui hodie per totam Germaniam Carduibendicti nomine cognoscitur, caules aliquot ab una radice profert pedales, & aliquando cubitales, rubentes, hirsutos, intus fungosos & modice concauos, cum locum & spacium nacti fuerint per terram se spargentes. folia prope terram ac circa caulem habet quinque, sex, aut septem, unciarum longitudine, latitudine uerò belfis, hirsuta, modice pinguis, mollia, per ambitum sinuosa, inaequaliter dissecta, & teneris aculeis non adeo pungentibus armata. Ramuli à caulibus exeunt plures, foliis inferioribus multo minoribus uestiti, in quorum summitate, acanacea sunt capitula, foliis paruis & maxime hirsutis circumdata, longitudine unciam excedentia, crassitudine digitalia, superius turbinata, squamis acuminatis composita: è quarum mucronibus graciles uncialesque oriuntur aculei, utrinque minoribus transversisque aculeis armati, ob ténertudinem inter pungendum fragiles, atque capitulorum mucronem circumuallantes. Flores è capitulorum mucrone per medium aculeorum emittit Cnicus

m ii

ei & reliquorum carduorū modo capillatos, colore in croceo flauos. Semina habet oblonga, striata, teretia, colore cœsia: quibus superius pappi barbę similes sunt. Radice nititur semestri, lōga, gracili, primum carnosā, autumnū uerō initio lignosa trāsuerlis fibris brachiata & inutili. tota herba, tenera, pingui & tactu aliquantulum glutinosa lanugine uestitur, maximē ea pars quę inter capitula & his circumdata folia est. Folia, flores & semina amarum saporem habent, nullius alterius qualitatē, quę quidem gustu percipi & distingui possit participem. Seritur apud nos in hortis.

* Cardobenedicten.

DE FABA uulgari. CAP. CLXII.

T. 2. 14. p. 618.



FABA uulgaris sata, terram non egreditur ut Lupinus, caulem erigit singularem, indiuiduū, longitudine sesquicubitum, & nonnunquam crassitudine minimi digiti proceriori, quadrangularem, glabrū, intus concauum, erectum, & capreolis carentē. Folia ex interuallo habet bina, teretia, aut quaterna in uno pediculo, oblonga, plerumq; subrotunda, subpinguia & glabra, longitudine trientalia aut interdum quadratalia, latitudine uerō bessem equantia, aut nonnunquam excedentia, secus quę numerosi exeunt flores, non tamen omnes simul, sed successiue florentes, forma papilionacei & oblongi, colore cāididi, quadam tamen sui parte nigri & longitudine uncia plerumq; superantes: ex his primum flōrēt inferiores deinde superiores, siliquę ē flōribus singulę prodeunt cum ad iustam magnitudinem peruenerint, lōgitudine quadrantales crassę & carnosę, intus quina, septena aut octona semina claudentes, quę unā cum siliquis siccata longitudine sunt semuncialia, latitudine uerō paulō minora, aliquantulum cōpressa, & ab una parte uelut lima aspectu, foris in candido palente cortice, intus autem flaua, solida atq; arida carne constantia. Radice nititur oblonga, subfusca, fibrata & semestri. Saporē recentes fabę habent dulcem, siccata uerō modice etiam amarum dulcedini mixtum. Colitur in aruis.

DE FABA nigra minore, [quę à uulgari Fabā solo colore differt.] CAP. CLXIII.

FABA nigra minor, caule, foliis, floribus, siliquis, semine, atq; omnium partium magnitudine uulgari similis est, solo seminum colore differt, qui illis in nigro purpureus est. Saporē fabę uulgari similē habet, sed paulō dulciorem. Seritur in hortis.

DE FABA nigra maiore, [quę magnitudine solum à precedenti differt.] CAP. CLXIII.

FABA nigra maior, minori incunctis similis est, omnes tamen partes maiores producit.

producit. semina eius, quæ fabæ appellantur interdum uncialem non tantum con-
sequuntur, uerum etiam excedunt longitudinem, latitudine uero tertia parte mino-
ra existunt. eadem quam prædictæ fabæ magis planæ & compressæ sunt, colore (ut
paræ) in nigro purpureum habent: quibus etiam sapore respondent. coluntur in
hortis.

DE SYMPHYTO maiore, candidis floribus: Cuius descriptio duobus etiam sequentibus
Symphytis, excepto florum colore, conuenit.] CAP. CLXV.

T. 1. 79. p. 240.



SYMPHYTON ma-
sius, caules emittit ple-
rumque sesquicubitales, et bi-
cubitales, nonnunquam et-
iam longiores, in ramulos
adnata & alas diuisos, cras-
sos, angulosos, hirsutos, in-
tus sonchi modò conca-
uos, circa quos ex interual-
lo singula sunt folia, longi-
tudine dodrantalia, latitu-
dine bessem æquantia, u-
trinque in mucronem desi-
nentia, hirsuta, longis pedi-
culis adhærentia, atque per
omnia maiori & longifo-
lio Buglosso similia, quæ
autem in ramulis superius
sunt, multò minora exi-
stunt, ea uero quæ à radice
unà cum caulibus prodeunt
prædictis multò maiora
sunt, siquidem non raro se-
decim uncias, frequenter
etiam uiginti, atque interdum
bipedem longitudine con-
sequuntur, (præter pedicu-
lum, qui & ipse dodrantem
excedit.) latitudine uero se-
pe sex aut septem uncias ex-
cedunt. Flores in ramulo-
rum cacumine fert numero

fos, successiue per totam æstatem, à medio uere florentes. longitudine unciales, an-
gustos, concauos, apices intus habentes, ab hirsutis & quinquepartitis calicibus
prominentes, et in terram plerumque annuentes, colore in cædido modicè pallescen-
tes, quibus singula bina, terna, aut quaterna semina succedunt grano tritici minora,
acuminata, foris nigro nitidoque cortice, intus candido nucleo constantia, magnitu-
dine & figura, Borraginis semini similia, æque enim collo tenus resecti serpentini
capitis formam præferunt ac Echios, Borraginis, atque reliquarum Buglossarum
semina. Radicibus nititur perennibus longitudine pedem excedentibus, crassitu-
dine digitalibus, ab uno trunco in diuersas partes distractis, foris nigris intus candi-
dis, carnosis, teneris, inter effodiendum fragilibus minimeque nervosis. gustu & ra-
tu glutinoso lentore mollibus & dulcibus, quæ siccata taurini ferè glutinis duri-
m

m iii

ciem acquirunt. Horrēt caules, ramuli & folia aspera & teneris aculeis simili lanugine tactu pruritus excitante, eadem partes dulcem habent saporem & aliquantulum lentum succum ueluti Borrage, atque reliquę Buglosae species. Nascitur humentibus, pinguibus lutosisque locis, pinguibus & humentibus fossis, atque putri arenosoque solo, ut Vuittemberge, ubi omnium natalium eius qualitatem cernere licet.

DE SYMPHYTO maiore rubente, [quod à precedente florum colore tantum differt.] CAP. CLXVI.

SYMPHYTON maius rubens, praedicto candido, caulibus, foliis, florum figura, semine, radicibus, partium magnitudine & qualitatibus omnibus simile est, solo florum colore differt, quem rubeum habet, nasciturque iisdem natalibus.

DE SYMPHYTO maiore [purpureis floribus, nec aliter à praedictis differente.] CAP. CLXVII.

SYMPHYTON maius purpureum, per omnia simile est praedictis duobus, praeterquam quod flores purpureos habeat. Nos autem libenter has tres Symphyti species ab invicem distinximus, et separatim descripsimus, unicuique suum proprium caput tribuentes: quoniam ista coloris in floribus uarietas non ex diuersorum naturalium natura oritur, cum omnes illae tres species non raro iisdem natalibus exeant, & quamuis alio in diuersae qualitatis solum transferantur, suum tamen colorem quaelibet earum retinet, quemadmodum pleraque eiusmodi herbae.

DE CNICO satiuo. CAP. CLXVIII.

T. 2. 105. p. 845.



CNICUS satiuus, qui ab omnibus hominibus Carthamus appellatur, ab uno semine singularem emittit caulem, longitudine sesquicubitalem, aut nonnunquam maiorem, teretem, rectum, colore caesum, foliis durum, lignosum, ac superius in multos rectos, indiuiduos dodrantes, longioresue ramulos diuisum, circa quem singula sunt folia, non magnis intervallis distantia, longitudine fere trientalia, latitudine unciam excedentia, posteriore sui parte in obtusum, mucronem desinentia, anteriore uero, in oblongum acumen, praefixo breui & infirmo aculeo fastigiata, colore uiridia, glabra, per ambitum plerumque minimis, innocentibusque aculeis horridula, & sine pediculis e caule exeuntia, quae autem ramulos uestiunt folia, his similia sunt, sed minora. Capitula, ramulorum summitatibus singula insident, figura rotunda, & acanacea, in latum turbinem fastigiata, latitudine uncialia, oblongis, acuminatis & aculeatis squamis composita, undique paruis acuminatisque foliis, partim in obliquum erectis, partim, recta in transversum acuminatam cuspidem praetendebus, partim etiam demissis circumuallata, ex his maiora sunt sub capitulis orta ac demissa, minora uero subrecta, quae superiorem locum tenent, & Rusci foliorum quantitatem & figuram habent. Flores aetate e capitulorum mucrone erumpunt graciles, capillacei, numero si &

fi & dense stipati colore lutei aut citrini, puniceis croci staminibus, id est, croco aro-
mati similes: quibus collectis fullones luteo colore lanas tingunt, ipsum crocum a-
mulantes. inferior florum pars, capitulis inclusa, in paruos resoluitur pappos, sub
quibus sunt semina angulosa, modicè acuminata, candida, nitida atq; hordeo ferè si-
milia, paulò tamen maiora, foris duro lignosoq; cortice, intus candido pinguiq; nu-
cleo, gustu dulci, subtenui & aliquantulum nauseoso constantia. flores saporem a-
mariuscule & modicè tenuem habent. Radice nititur, semestri oblonga, gracili,
fibrata & inutili, seritur in aruis ac hortis, plurimuscq; Brunsvici & Magdeburgi in
Saxonia, multisq; Turingiæ locis.

DE AMARANTO *purpureo*. [Nostruocant Rote Köhle/alijs Tausent-
[phon.] CAP. CLXIX.

T. 1. 199. p. 579.



est adhibenda. Seritur coronarum causa in hortis.

AMARANTVS, siue Amarantus
purpureus, (ut ab Amaranto citrino,
id est, Heliochryso distinguatur) caulem
erigit cubitalem aut sesquicubitalem, tene-
rum, pingue, modicè angulosum, striatum,
propè terram rubentem, glabrū, intus fun-
gosum & superius multis adnatis ramo-
sum. Folia totam herbam uestiunt, utrinq;
acuminata, longis pediculis hærentia. Ha-
licacabo, id est, uescariæ similia, plerumq;
tamen minora, glabra, in uiridi modice ple-
rumq; rubentia, molliacq;. Flores in ramulis
æstate paleaceos fert, spicarum aut erecto-
rum racemulorum modo coaceruatos, ruti-
lanti purpura fulgentes, in attritu purpure-
um succū remittentes. qui decerpti, & exi-
cati ad hybernas coronas reponuntur, quo-
niam diu eundem purpuræ fulgorem, etiam
aliquot annis non marcescentes, retineant.
unde quoque nomen inuenit. semen matu-
ris floribus insidet paruum, rotundum, mo-
dicè in latitudinem compressum, nigrum &
supra modum splendidum. Radice nititur
breui, tenera, succosa, modicè fibrata ac se-
mestri, gustu & odore nullas habet fatu di-
gnas qualitates (præterquam in semine,
quod subdulce & modicè tenue quiddam
resipit) ideoq; ad hoc usque tempus nullus
eius usus inualuit, tribuuntur tamen illi ui-
res quædam in uulgaribus & impressis her-
bariis, quibus fides sine ratione nequaquã

DE APIO *fatiao*. [Sic nominat Apium uulgò dictum, non Petroselinum uul-
gare ut pleriq; eruditi hodie.] CAP. CLXX.

APIVM fatium dodrantes, pedales, & nonnunquam longiores pediculos
ab uno radicis cespite emittit, eosque angulosos, teneros, concauos & undi-

m iiii



modo odoratum est. Folia subamara quidem existunt, sed feruore & tenuitate semen & aromatico feruore, à semine superantur. Colitur in hortis.

DE APIO agresti, [à quo superius cultu duntaxat differt.]
CAP. CLXXI.

AGRESTE Apium neq[ue] forma neq[ue] specie neq[ue] qualitatibus à satiuo differt, præterquam quod non colatur. nascitur humentibus fossis & circa pigros riuulos solo pingui, Halæ, Seburgi, Merseburgi & uicinis locis.

DE EUPATORIO, [id est, Agrimonia uulgo dicta.] CAP. CLXXII.

EUPATORIVM quod hodie Agrimonia ab omnibus ferè, tam Medicis quàm Pharmacopolis appellatur, ab una radice singularem plerumq[ue] erigit caulem, longitudine cubitalem aut aliquando proceriorem, teretem, hirsutum subrubentem, solidum lignosum, fractu contumacem, & nonnunquam in unum arq[ue] alterum ramulos diuisum. Folia iuxta terram habet septuncialibus pilosisq[ue] pediculis

Eupatorium. T. i. p. 514.



culis breui admodum intervallo adnascen-
tia, utrinq; bina, sena, septenāue, longitudi-
ne ut plurimum sextantali, latitudine autē
unciali, hirsuta, per ambitum serrata, singu-
lis pentaphylli foliis similia, unā cum pe-
diculis per terram strata & circumfusa, in
extremis pediculis unum folium rectā pro-
minet, inter utrumq; foliorum ordinem in-
tercedens. Flores æstate, cauli à media eius
parte usque ad summam, deinceps ad-
nascuntur parui, foliacei, colore lutei: qui-
bus singulæ succedunt lappulæ, cum ad
iustam magnitudinem & statum pertene-
rint, pronæ & in terram annuentes, adeo
asperæ hirsutæque ut siccatae prætereun-
ti uestibus adhæreant. Radice nititur li-
gnosa, in partes distracta, fibrata, in fusco
rubente atq; perenni. odorem tota herba
bonum & Veronicæ non dissimilem ha-
bet. Saporem uerò modicè acrem, tenuem
& aliquantulum adstringentem. Nascitur
siccioribus campis, montibusq; propè
fruteta.

DE EUPATORIO altero, [cognato su-
periori, sed rarò inuentum.] CAP.
CLXXIII.

EUPATORium alterum, ab uno ra-
dicis capite, duos aut tres emittit cau-
les, longitudine cubitales, teretes, conca-
uos et tamen satis duros, prædicto Eupatorio pilosiores, in ruffo nigricantes, rectos,
minimè ramosos, sed indiuiduos, circa quos ex intervallo folia sunt quina septenā-
ue, longo, gracili hirsutoq; pediculo in summitate insidentia, non deinceps disposi-
ta, & ab inuicem distantia, sed uno eodēq; loco ueluti centro simul coniuncta. præ-
dicti Eupatorii foliis omnino similia, longioribus tamen pilis obsita, posita ac for-
ma ad Cannabis folia, aut potius ad Quinquifolii accedentia. Flores in summis cau-
libus, ueris medio numerosos fert, priori Eupatorio forma & colore similes, corym-
borum modo coaceruatos: sub quibus parua sunt foliola, prædictis multò minora.
Semen floribus succedit *

Radice nititur lignosa, in tenues partes distracta, nigra, perenni & gustu uehemen-
ter adstringente. herba uerò glutinosum & subdulcem habet odorem. Nascitur cir-
ca fruteta solo mediocri, ut prope Lipsiam, qua itur uersus Halam, & in Ceiciano
agro. inuentu rara est hæc herba, non enim temerè nec ubiq; nascitur.

DE FILICE mascula, [quæ plures ab una radice pediculos emittit. quæ mihi quidem non mas-
sed semina filix uidetur, ex Theophrasti & Dioscoridis uerbis. etsi pleriq; hodie (Tragum ex-
cipio) eundem faciunt, quem hic Cordus: errore ueluti per manus tradito.] CAP.
CLXXIII.

FILIX mascula, ab uno cespite secundum radice ætatem numerosos gracilestq;
n



emittit pediculos, longitudine cubitales aut proceriores, utrinque oblonga, acuminata, incisa folia proferentes, breui intervallo disjuncta, sibiipsis ferè contigua, & in latitudinem explicata, ita ut tota foliorum pennata & diffusa facies, una cum pediculis autum alas pennasque figura æmuletur. omnibus foliis non est eadem magnitudo, inferiora enim minorasunt, quemadmodum etiam superiora: nam alata illa foliorum series, paulatim in fastigium desinit, quæ verò à mediis pediculis aut paulo inferius exeunt, quadrantalem habent aut maiorem longitudinem, latitudinem autem posteriore sui parte, qua immediati sine ullo pediculo pediculis annectuntur, uncialem aut digitalem, à qua paulatim in fastigium acuminantur. variant tamè magnitudinem, secundum radicem ætatem, vetustioris cespitis & in statu existente.

enata folia à tergo flavam, subrubentem, breuem, densam, in puncta latiuscula diuisam, & ueluti aspersam larvis, nuginem habent. Radice nititur longa, tenuibus capillamentis densèque farctis cirris villosa, secundum ætatem magna, & in plures partes seu capita diuisa, perenni, multiorum præteritis annis exaruerunt reliquæ sunt, composita colore, intus in candido uiridi, gustu adstringente. Folia paulò minus quam radices adstringunt, & grauem odorem spirant. Nascitur montanis, saxosis & umbrosis locis, copiosa quoque etiam in planis uliginosisque locis, iuxta aquas ac profluentes Alnorum, reliquarumque arborum truncis & radicibus adnascens; raro unus tantum aut pauci eius cespites iisdem natalibus proueniunt, sed plures: quamuis neque caulem, neque flores, neque semen ferat, propagat se tamen disperso uentis, hirsuto flauoque puluere, foliis à tergo adharente, seu reliquæ omnes eius mox secutura species.

DE PTERIDIO masculino, [id est, Filice exiguo mascula, uel potius foemina, ut supra. Cognata huic uel eadem potius est Filicula palustribus pratis circa lacum selium nostrum frequens.] CAP. CLXXV.

PTERIDION masculum, Filici masculæ iam descriptæ, per omnia similis est, cōcinniores tamen incisuras habet, multoque minor existit, raro enim bellem & dracon-

drantem excedit, folia eius decerpta & confricata manibus obftrepunt, neque caulē, neque florem, neque ſemen fert. Saporem habet maſculæ filici ſimilem, ſed tenuiorem, odorem uero grauiuſculum. Naſcitur montanis, muſcoſis roſcidisq; collibus, arbuſtorum umbra à ſolis æſtu protectis, ſolo plerumq; pingui, copioſumq; circa Northuſium, in Hercyniæ iugis.

DE PTERIADIO, [quod apud nos etiam prouenire puto in muris, ſed rarius: frequens autem Bade in colle iuxta Limagum, mox infra thermas: ubi & Dryopteris naſcitur: qua cum ne quis confundat cauendum. Pteriadion quidem hac forma dici non probo: neq; enim talis forma diminuendi recepta eſt. Sed à Pteris recte fit Pteridium, ab hoc Pteridarium, quod Pteridio minus eſt.] CAP. CLXXVI.

PTERIADion, maſculo Pteridio undiquaq; ſimile eſt, ſed plerumq; paulò minus: coliculos habet nigrificantes & aliquantulum ſplendentes, foliorum incifurę mediam habent inter Pteridii & Adianti candidi folia, formam & figuram, guſtu quoque utrumq; imitatur. Naſcitur umbroſis, muſcoſis, roſcidisq; petris, nec caulem, nec flores, nec ſemina ferens.

DE TRICHOMANE.

CAP. CLXXVII.

Trichomanes. T. 1. 182. p. 530.

TRICHOManes, ab uno ceſpite plures emittit coliculos, quinque, ſex, ſeptem aut octo unciarum longitudine, ſetarum modo graciles, aridos, in purpura nigro & pulchro ſplendore nitentes, quibus ab utraq; parte tenuia, parua, orbiculata, miniuſſime per ambitum incifa, & lentibus latitudine æqualia, adnaſcuntur foliola, breui admodum intervallo, deinceps uſque ad coliculorum ſummitatem diſpoſita, ſibi inuicem in exortu aduerſa, ſine pediculis adhærentia, interiore ſui parte uiridia & glabra, exteriori uero ſtauo, ſubruſſo hiruſutoq; puluiſculo punctatim diſperſo, filicis inſtar, ceu conſperſa. quæ tota hyeme uiſent, nec decidunt antequam in uere noua flacceſcentibus ſuccedant. Radicibus nititur tenuiſſimis, numeroſis, capillatis, cirroſis, nigris, implicitis, intricatis & perennibus, cuius ſuperiores partes, ex qua germen exit, guſtatae ſubacerbæ ſunt, folia quoq; non parum adſtringunt, & ſenſibilem habent guſtu partium tenuitatem. Naſcitur copioſe umbroſis roſcidisq; petris, quamuis neque caulem, neque florem, neque ſemen producat. propagat ſe tamen foliis à tergo in hærente puluiſculo, quem admodum omnes filicis ſpecies, quod ſemel atq; iterum dixiſſe ſatis ſit. Magnus eius eſt in Hercynia prouentus.

* Duae eiconas, lector, hic, cum ſeparare non poſſemus, neceſſariò adiunximus: quarum prior ad hoc caput propriè pertinet, altera uero ad CLXXXII ſpectat: ubi idem facere cogemur.



n ii

DE PTERIDIO *foemina*: [quae forte Dryopteris quorundam fuerit, cuius Tragus
picturam dedit hanc.] CAP. CLXXVIII.

*† sic use-
cat mono-
clonon, id
est, uno pe-
tiolo surge-
tem: quae
potius mas-
culi est.*

PTERIDION *foemina*, Thelypteridi, id est, *foeminae filici* + *coliculi foliorum* figura secundum proportionem omnino similis est: sed multo minor, ac tenerior. siquidem do drantalem altitudinem rarissime excedit. insidet foliis a tergo hirsutis, subruffus & in puncta dispersus pulvisculus, quo se propagat. nam haec quoque aliarum filicum modo flore & semine caret, pro caule coliculos proferens. decerpita folia & manibus confricata, maiorem edunt strepitum quam masculum Pteridium. Radicibus nititur perennibus, tenuibus, capillatis, cirrosis, nigris, implicitis & a crassiusculo principio, foris nigro, intus herbaceo enascentibus. Saporem habet tota herba acerbum & adstringentem, cum sensibili partium tenuitate. Odorem aliquantulum grauem spirat, ceu mascula Filix. Nascitur umbrosis montanisq; syluis, pingui plerumq; & muscoso in superficie solo: plurimumq; in Hesia, & ad Hercyniam non longe a Northusio.

* In annotationibus suis in Dioscoridem Cordus: Dryopteris (inquit) Thelypteridi similis, multo minor nascitur in uetustarum quercuum muscosis partibus. Germani Eychfaren/Baumfaren/Edtfaren/ & Windfaren appellant.

Pteridion foemina. T. 1. 184. p. 538.



Struthiopteris. T. 1. 188. p. 550.



De

DE STRUTHIOPTERI, [quam sic nominat author, quod aspectu & crispo foliorum habitu Struthiocameli pennas imitetur. Ea forte est Lonchitis altera, quam ut Tragus exhibuit, Asplenii sylvestris nomine, etsi non accuratè pictam, adiunxit.] CAP. CLXXIX.

INVENTA est præterito anno, cum in Saxonia essem, in Hercynia sylva prope Goslariam filicis quædam insignis species, figura admodum spectabilis, hætenus à nullo autore descripta, neq; uulgo, neq; Medicis cognita, cui Struthiopteridis nomen indidi, quoniam aspectu ac crispo foliorum habitu struthionis siue struthiocameli pennas imitatur. Est itaq; Struthiopteris filicis species, pediculis assurgens, pede longioribus, satis crassis, interiore sui parte canaliculatis, colore in flavo rufis, paulatim usq; ad cacumen attenuatis: quibus ferè totis ab utraq; canalibus parte usque ad summam, deinceps brevissimo intervallo adnascuntur foliola: quorum maxima sunt, quæ à mediis pediculis exeunt, longitudine sesquiunciam æquantia, latitudine uerò uix rarò quintam unciam partem excedentia, colore in flavo rubentia & subfusca, ab interiori parte canali proxima glabra: à tergo uerò, in ruffo, subfusco pulvere hirsuta, tenui, flavo & utrinq; conspicuo nervo, per medium in longitudinem transeunte ueluti discreta, transversis incisuris & ceu rursus clausis, secta & imbricata, quæ postquam ad statum peruenerint, utrinq; retrorsum usq; ad nervum contrahuntur, & seipsum adhærentem pulverem inuoluunt, adeò ut ne appareat qui dem, inferiora eorum spacia superioribus maiora sunt, quamuis & ipsa semunciam rarò excedant, eadem paulatim decrescunt, quò magis cacumini appropinquant, nã in summitate ac aliquanto inferius constituta, tam exiguis dirimuntur interstitiis, ut se inuicem non tantum contingant, uerum etiam trudent. quæ an hyeme etiam Phyllitidis modo uireant, nondum expiscari potui: hætenus enim decerptam tantum & non nascentem uidere concessum est, ideo neq; radicem describere possum. Folia gustu, cum tenuitate aliqua adstringunt. Nascitur in Hercynia sylva Saxonie, quæ Goslariam urbem attingit.

* Struthio apud Latinos recentiores tantum usurpatur: Græci *Στροβιλοκάλυξ* dicunt, uel *Στροβόλ με γάλυξ* ἢ *Λυβικὴ*; neq; laudatur compositio Latini & Græci uocabuli.

DE POLYPODIO. CAP. CLXXX.

POLYPODium, folia emittit do drantalia aut longiora, gracili & aliquantulum anguloso pediculo, utrinque in secta & partes diuisa, longitudine unciam, latitudine uerò tertiam aut quartam unciam partem æquantem, aut interdum maiores, nullis incisuris subdiuisas, interiore sui parte glabras, exteriori autem flavo, sub ruffo, hirsuto, atq; in puncta diuiso puluere conspersas, utrinq; pediculo enatas, in exortu sibi minime aduersas, sed spaciis inuicem appositas. Radices habet in ipsa terræ superficie transversas, minimo digito plerumq; graciliores, tortuosas à lateribus alias quoquo uersus emittentes, superius paruis, modicè concauis & cminentibus ceu cotyledonibus, polyporum pedum extremitates, acerbula figura imitantes, foris in spadiceo colore nigras, intus pallidas & subuirides, carnosas & perennes, plurimis, tenuibus, nigricantibus & dense implicitis cirris capillatas, gustu cum quadam nauseabunda qualitate dulces, aliquantulum adstringentes, saluam elicientes, & modicè amarescentes. foliis idem est sapor, remissior tamen. Viret tota hyeme, nec folia amittit antequam in uere flacciscentibus noua succedunt: quibus enatis flaccida exarescunt, & in radicibus singula uestigia, cotyledones constituentia, relinquunt. Nascitur muscosis petris, riuulorum muscosis & saxosis ripis, in uetustis quibusdam muris atq; muscosis arborum, præsertim quercuum, truncis.

n iii

Polypodium. T. 1. 165. p. 540.

Scolopendrium. T. 1. 183. p. 551.



DE SCOLOPENDRIO, siue Aspleno.

CAP. CLXXXI.

SCOLOpendrion siue Asplenon, quod Arabes Ceterach appellant, Polypodio similis herba, multò tamen minor. siquidem ab uno radicis glomere longitudine tantum quadrantalìa, aut ad summum trientalìa emittit numerosaq; folia, utrinq; in partes Polypodii modo, spaciis aduersa, secta interiori sui parte uiridia, exteriori uerò & à tergo flauo, hirsuto squamosoq; puluere, eoq; non punctatim diuiso, sed continuo obducta, quæ siccata contrahuntur tam longitudine quàm latitudine. Radicibus nititur tenuibus, nigris, cirrosis, dense inuicem intricatis & perennibus. Viret tota hyeme ut Polypodium. Saporem folia adstringentem, & aliquantulum tenuè habent. Nascitur in opacis petris, sed in Germania minime frequens, præterquàm in nigra sylua inter Brisgoiam & Vuirtembergensem Sueuiam sita. *

* imò ad
Rhenum
etiam passim.

DE ADIANTO candido, [quod uulgo Rutam murorum uocant, Matthiolus Paronychiam.]

CAP. CLXXXII.

ADIANTum candidum, quod Germani Murariam Rutham, alii murarium petroselinum appellant, pediculos ab uno radicum capite seu cespite plures emittit

emittit, longitudine ut plurimum quadrantales, seta & Adianto nigro crassiores, colore uirides, inferius autem ubi à radice exeunt in fusco rubentes. Superius utrinque in peciolo unciales diuisos, quibus ab utraque parte foliola adnascuntur, parua, incisa, nigri Adianti foliis similia, minora tamen, crassiora quoque, interiori sui parte glabra & uiridia, à tergo uero in fusco rubescere hirsutòque puluere obsita, tota hyeme cum pediculis suis uirentia. Radicibus nititur tenuibus, breuibus, nigris, in densum glomerem intricatis, & ab uno ceu capitulo exeuntibus, folia & pediculi gustu adstringunt cum tenuitate aliqua. Nascitur è lapidum commissuris, in antiquis umbrisque muris, tam lapidibus quam lateribus constructis.

Adiantum nigrum. T. 1. 182. p. 574.



Adiantum candidum. T. 1. 182. p. 530.



DE ADIANTO nigro, [quod in Gallia Narbonensi nascitur.] CAP. CLXXXIII.

ADiantum nigrum, ab uno cespite numerosos emittit coliculos, longitudine dodrantales, septunciales, quincunciales, et nonnunquam etiam trientales, capilli instar tenuissimos, in spadiceo colore nigros & nitidos, in exiguos tenuissimosque pediculos ex intervallo diuisos, à quibus folia exeunt parua, incisuris diuisa, & inferioribus coriandri foliis similia, minora tamen & admodum tenuia, aduersus hyemis iniuriam contumacia, nec flaccescunt, antequam nouo uere alia pereuntibus succedant. Radicibus nititur uillosis, capillatis, nigris, in densum glomerem & cespitem intricatis atque perennibus. Folia gustu leniter Trichomanes modo adstringunt.

¶ iiii

gunt, cum mediocri tenuitate. Nascitur umbrosis humentibusq; locis, roscidis muris, & in puteis, in Germania parcius, in Gallia autem Narbonensi copiosissimè, p̄fertim circa montem Pessulanum.

DE MOSCHATELLA: [Nulla apud nos, alibi etiam rara, prope Basileam in sylua reperisse meminimus: Lausannæ iuxta sepem. Alius quod sciam nullus meminuit.] CAP. CLXXXI. II.

MOSCHATELLA, plerumq; quadrantalī, aut ad summū trientali altitudine asurgit, idq; primo uere, unā cum Chelidonia Capno, iuxta quam etiam prouenit. pediculos profert duos, tres aut quatuor, graciles, teneros et in uiridi pallidos: in quorum summitate folia sunt parua, per ambitum incisa, & in partes Capni Chelidoniz, aut Ranunculi Chelidonii modo secta, minora tamen, tenuiora pallidiora que. Coliculus ē medio pediculorum singularis plerumq; exit, nihil ferè ab ipsis foliorum pediculis differens, in cuius summitate paruum, angulosum ac uiride est capitulum, florum uicem explens, & sub hoc unum atq; alterum folium, prædictis similia, sed paulò minora. Radice nititur breui, parua, candida, longitudine plerumq; femunciali aut aliquantulum maiori, pinguibus, crassiusculis & sursum uersis ceu squamis inæquali, paucis minimisq; fibris capillata, à qua exiguae partes Ari modo recedunt, quibus se propagat, sapore folia habent tenuem. Radix uerò subdulcem & modicè adstringentem, odore folia spirant Moscho similem, unde nomē inuenit. statim flaccescit herbula hæc, quemadmodum Capnos chelidonia, nonnunquam etiam antea. Nascitur umbrosis locis sub arbutis, iuxta Capnon Chelidoniā et Ranunculum Chelidonium, solo plerumq; subputrido.

Moschatella.

Oxy. T. i. 178. p. 120.



De

DE OXY. CAP. CLXXXV.

OXY S, quam hodie Alleluia, atque Trifolium acetosum uocant, exigua herbula est, non uno tantum loco è terra erumpens, ueluti aliæ plantæ, quæ ab uno radicis capite germina fundunt, sed diuersis locis à transuersa & in multas partes sparsa radice enascens: latum cespitem constituens, & pro sui magnitudine satis amplum occupans spacium. Pediculos emittit quadrantales, gracilesque, in summitate terna sunt folia, in mucronem ubi coniunguntur desinentia, colore admodum uiridia, longitudine semunciam excedentia, latitudine uero unciam æquantia, superius unica tantum incisura, paulatim se insinuante, diuisa, & latiusculi cordis figuram referentia. primo uere Sole arietem tenente, cum primum enascuntur complicata, postea autem se instar canalis aut sulci aperientia, donec iustam formam nacta, æqualiter in latitudinem expandantur. Flores Aprili mense profert in summis coliculis, foliorum pediculis æqualibus, singulos foliaceos, Cymbali modò concauos, colore candidos & sanguineis uenulis distinctos, parua intus lutea q̃ stamina continentes, inter quæ etiam secuturi seminis rudimenta apparent, ea dilabentibus florum foliolis semuncia plerumq̃ maiorem capeffunt longitudinem, simulq̃ folliculorum naturam & acuminatam figuram induunt. semen enim continent nasturtio non dissimile, colore croceum, solo tactu dissiliens siliculis, prosiliens. Radice nititur tenui, geniculata, ex interuallo nodosa, subruffa, minimis capillamentis fibrata, in terræ superficie per transuersum serpente, pluribusq̃ adnatis, quouersus sparsis propagante & perenni. Saporem folia & flores habent simpliciter acetosum, nullo alio sapore mixtum aut dilutum. Nascitur in Lucis & syluis supra arborum, præsertim fagorum præcisarum truncos, solo putrido, aut muscoso.

DE FRAGVLA. CAP. CLXXXVI.

FRAGVLA est herba quæ fraga gignit humi nascentia. Pediculos emittit trientales aut quincunciales, graciles, modicè angulosos hirsutósque, in singulorum cacumine terna sunt folia simul eodem loco coniuncta, longitudine plerumque sextantalia, latitudine uero sesquiuncialia, per ambitum serrata, superius uiridia, inferius autem candicantia, utrinq̃ tamen modicè hirsuta. Flores uere, in hirsutis, & foliorum pediculis similibus & æqualibus, aut paulò longioribus coliculis producit foliaceos, in quina foliola sectos, & colore candidos, in quorum medio paruum luteumq̃ capitulum, ipsius fragi rudimentum extuberat, quod defluentibus florum foliolis semuncialem, ut plurimum, longitudinem, pauloq̃ minorem latitudinem, acuminatam in summo figuram, exasperatam superficiem, teneram carnosamq̃ substantiam, & rubentem colorem æstatis initio acquirit, in fructum euadens, fragum ab omnibus dictū, minimisq̃ seminibus per carnem dispersis, plenum gustu uinosum, admodum suauem & uinosum. Radice nititur tenui, oblonga, subruffa, perenni, gustuq̃ adstringente, folia quoq̃ adstringunt, sed remissius. Nascitur in montibus, neq̃ opacis, neque apricis nimium.

VALERII CORDI HISTORIAE

Fragula. T.1.180.p.500.



FINIS LIBRI II

174

VALERII CORDI DE

plantis, liber III, arborum, fru-

CTVVM, ET ARBVSTORVM DE-

scriptiones continens.

Securis animis tantum h. ec cognoscere Cordi est:
 Quos non ambitio, nec opes, nec gloria mundi,
 Nec uarij affectus uana sub imagine torquent:
 Sed dulcis natura iuuat, pascitq; beatos.

DE VLMO. CAP. I.

T. 3. 64. p. 1087.



magis conspicuus transit neruus, a quo alij minores ceu costæ, rectiq; & ueluti pa-

VLMVS speciosa, pro-
 cera, ramosaq; arbor
 est, duplici cortice uestita,
 quorum exterior asper sca-
 berq; est, interior uero car-
 nosus, mollis, lentus & in te-
 nuissimas philuras tilie mo-
 do fissilis, lignum candidū,
 tenerū, & in opere tractabi-
 le. flores primo uere in
 arietē transeūte ex capitulis
 numerosos, exilesq; pro-
 fert, ceu exigua & rubentia
 stamina, seu capillamenta,
 quos copiosum, latū et folia
 ceu semen subsequitur, circa
 annexū angustum, antero-
 re parte latius & in paruum
 sinum inflexū, in Maio ma-
 turescens, in medio semine
 tenuis, planus & candidus
 nucleus est, sapore dulcis
 magnitudine & figura len-
 ticulae similis. folia post flo-
 res se proferunt quinque aut
 sex, uel interdum septem di-
 gitorum longitudine, latitu-
 dine triū aut quatuor utrū-
 que ex rotundo fastigiata,
 undiq; per ambitum incisu-
 ris diuisa, per mediam lon-
 gitudinem rectus & a tergo

o ij

VALERII CORDI HISTORIAE

ralleli ad eminentes incisurarum partes exeunt, in uno tamen latere plures quam in alio, quo fit ut altera foliorum pars alteram longitudine uincat. Folia, cortex, semenque in gustu dulcem lubricumque emittunt succum, ideoque * Nascitur pingui- bus & lutoſis campis.

DE ACERE tenuiſolia, [quæ & Opulus & Rumpotinus dicitur, Germani Maßholder appellant.] CAP. II.

T. 3. 79. p. 1123.



ACER tenuiſolia, caudice & cortice ulmo ſimilis exiſtit: mo ſimilis exiſtit: gracilior tamẽ, breuiorque fragilioremque interiorem corticem, quam uis ſubſtantia philuræ ſimilem habet. Materia eſt alba, recta, tenera & ſiſſilis. Ramos expandit numeroſos, multis latis foliis, longo, uiridique aut rubente pediculo ab his dependentibus uirgineis ſimilibus, leuioribus, mollioribus & tamẽ minoribus. in quinque plerumque potiores partes diuiſis. flores in Aprilifert ab uno pediculo plures, paruosque, colore uirides in candido, paucis intus ſtaminibus et è ſingulis hinc plerumque ſe proferunt ſiliquæ, circa connexum duræ, tumentesque, ob ſingulos incluſos nucleolos, qui parui candidique ſunt, reliqua ſiliquarum pars membranæ modo tenuis & ſcarabeorum interioribus alis eſt ſimilis, colore in uiridi rubente. Tenuis uirgæ, folia & non ſemen & cortex ulmo ſimiles qualitates: nasciturque iſdem quibus ulmus natalibus.

dum aridi fructus, modicum lactei liquoris remittunt, ſi inciduntur. habent folia


DE LYCOSTAPHYLO ſemina. [Noſtri ſambucum aquaticam uocant: Saxones Lupinam uiam, quod nomen græce exprimere uoluit Cordus. De ſemina leges inſiſſis, cap. penultimo huius libri.] CAP. III.

ARBVSCVLA eſt quinque aut ſex cubitorum longitudine, caudice inferius craſſitudine ſua manum complente, cui cinericii coloris, glaberque & fragilis circumdatur cortex: uirgæ ex caudice ſe proferunt longæ rectæque, craſſitudine digiti, aut pollicis, ſambuci modo per interualla geniculis præcinctæ: in ſingulis uero articulis bini erumpunt nodi ſeu ramuli, lignum tenerum candidumque exiſtit &

fit & propter amplam laxamq; intus medullam fragile. Folia habet latitudine & longitudine quatuor, quinque aut sex digitorum et in tres partes diuisa: quo fit, ut paulo minus quam uirginea sint. in summis uirgis Maii initio umbellas fert rotundas, sambuco similes, in quibus flores sunt candidi, magnitudine & forma leucoia fere similes, in quinque foliola obrotunda diuisi, nullis in medio staminibus preter unum aut alterum exiguum inflexumque coloris candidi foliolum: uniuersa tamen umbella simul non florer. incipit enim exterior circumferentia singulis floribus, singulae succrescunt rubentes baccae, minimis uuae acinis aequales: tota hyeme in matre pendentes, in quibus singuli sunt duri planique nuclei. cortex amari & adstringentis est saporis. Baccarum uero succus autumnis amarus modiceque dulcis & acetosus est: in uere autem cum hyeme passus factus fuerit magis adstringit.

Lycosaphylon. T. 3. 25. p. 1002.

Cervi spina. T. 3. 15. p. 979.



DE CERVIS PINA. CAP. IIII.

ARBVSCVLA est quinque aut sex cubitorum altitudine, nonnunquam etiam procerior, cortice foris, ut cerasus transuerso nigrioreque uestita, quo detracto subest alius tenuior colore uiridis. praedicti modo per transuersum ramos uestiens, sub quo est tertius crassior, fetis candidis per longitudinem plenus, nervosus, colore diluto croco similis, quo in aqua decocto antylicium fit. gustu adstringens cum amaritudine aliqua, paucisque aculeis pirastri modo septa materia dura et

o iij

VALERII CORDI HISTORIAE

robusta, folia fert media inter cornum & malum similitudine modicè per ambitum ferrata: flores Maii mensis principio producit admodum exiles iuxta foliorum pediculos colore uirides, in quatuor radios instar crucis diuisos quatuor intus minimis reflexis & flosculo concoloribus staminibus. bacca ex singulis floribus singula nascuntur foris principio uirides, in maturitate uerò nigrae, intus uerò semper uiridi permanente succo, qui lubricus est in maturitate. baccis unus & alter inest nucleus. habent acini eius adstringendi & abstergerendi uim ob amarum & acerbum saporem, cū nauseabunda qualitate aliqua. **Saffegrün** fit ex baccis alternis uicibus allumine mixtis.

DE ACERE maiore, [quam Germani Thorn uocant, aliqui non rectè Platani esse putant.] CAP. V.

T. 3. 80. p. 1125.



ACER maior speciosa, procera, ramosa, est arbor, folia ferrens uiridinea, & quinque partita, superius uiridia, inferius autem candicantia, ac modica lanugine circa uenas obducta flores, fructus fert tenuifoliae acrisimiles, binis aut interdum ternis alis, furce modo propius coeuntibus uni pediculo iunctis, raro autem soli sunt fructuum gemelli, sed plura paria ab uno maiori pediculo dependent. cortice uestitur leui aut non adeo scabro. Materia constat tenera, ac in opere tractabili. Nascitur editis locis, plerumque solo pingui & spisso.

DE SORBO torminali [Tragus interpretatur, Wilder Sperberbaum/Æphrōsel.] CAP. VI.

SORBVS torminalis, speciosa & piro æqualis arbor est, cortice uestita flavo: caudex uerò scabriore libro tegitur. folia habet lata, duriuscula, aceri maioris similia, flores fert fauaceos, candidos numerosos, instar corimbi. uni pediculo annexos. quos singuli sequuntur fructus, magnitudine auellanae, colore spadicei, sapore acido & adstringente, pira atque Mespila æmulantes, in quibus exigui nuclei ueluti

luti in piro sunt. Nascitur montanis locis, solo pingui & interdum saxoso. Plurimaq; ad Herciniam syluam & circa Ienam.

Sorbus torminalis. T. 2. 30. p. 1010.

Sorbus aculeata. T. 3. 18. p. 934.



DE SORBO *aculeata*, id est, *Piracantha* [Oxyacantha Dioscoridis uidetur, et Spina appendix, Plinij.]

CAP. VII.

SORBUS *aculeata*, aspectu *Torminali* sorbo similis est, multo tamen minoribus caudice, foliis & fructu, quin etiam fruticosior est, & duriore materia constat, multisq; spinis pirastri modo armatus, cui aspectu, cortice & materia quoque non dissimilis est. Folia singulis apii foliis æqualia habet, gustu glutinosa: fructus rubent, ac intus unum atq; alterum lignosum nucleum continent, reliqua bacarum pars fragilis est, gustuq; aliquantulum glutinosa, statim satietatem uescentibus affert, & omnino succo caret: nascitur ubiq; tam planis quam editis locis, & in syluis.

DE ANONYMO. CAP. VIII.

ANONYMVS, quæ alio nomine etiam *Euonymos* appellatur, ramosa est arbuscula, quatuor aut quinque cubitorum altitudine, cuius stolones & nuper nati ramuli, propter corticem in quatuor angulos excurrentem, quadrangulares sunt.

O IIII



furculos & ramos profert numerosos, breui intervallo, in singulo exortu binos & sibi contrarios: in quibus folia sunt Chamaeceraso similia & aequalia, paulò tamen minora, nec ferrata. ab iisdem furculis paulò post ueris initium flores profert pallidos, quatuor foliolis constantes, Leucoio similes, sed minores: quibus singuli succedunt fructus seu folliculi, forma quadrangulares, Lathyridis utriculorù magnitudine, colore punicei aut rosei: qui in autumno, postquam maturuerint, aperti, quaterna crocei coloris semina ostendunt. ea croceo uelamine detracto cãdicantes nuclei sunt, figura gallinaeis testiculis similes. Saporẽ uerò habet in amaro dulcescentem, & nauseabundum. Tota etiã arbuscula grauem & iniucundum habet odorem. Materies eius solida, fìsìlis, tenera, & aqualis est. ea cum adhuc succo turget cãsa, diluto croceo pallore etiã Buxum prouocat. Nasçitur in syluis tam planis quã editis.

DE PIRO arbore & Piris urbanis. CAP. IX.

PIRVS urbana, syluestri, caudice, cortice, materia, foliis & floribus similis est, speciosioribus tamen magisq; rectis ramis, foliisq; paulò maioribus constat, ipsorum autem fructuum, quæ pira nuncupamus infinita sunt genera, ex quibus aliquot in Germania prouenientia describemus: adiectis etiã Germanicis eorù nominibus, quæ

tamen secundum diuersas prouincias variant.

Propsbirn/id est, Præpositana ex lata basi, iuxta pediculum in obtusum mucronem delinunt, longitudinem habent quadrantalem, latitudinem uerò paulo minorem, color, is est in uiridi pallescens, uiridibus maculis ceu punctis conspersus: gustu adstringunt, & succi abundantia sitim extinguunt, maturescunt autumnii initio, & cito putrescunt propter frigidioris & aquei succi abundantiam, habentur copiose Islebii propè Herciniam Saxonie.

Speßbirn/id est, Lardina, in medio crasso uentre intumescunt, à quo subito in mucronem delinunt, longitudinem habent tribus uncias maiorem, latitudinem uerò quadrante paulo minorem, colore sunt pallido, & Præpositanorum modo uiridibus punctis conspersa, gustu sunt admodum miti & suauis, & porcini adipis modo in ore liquefcunt, unde etiã nomen inuenerunt, atq; succi abundantia sitim restinguunt, cum excorticantur suauem spirant odorem: maturescunt autumnii initio & Præpositanorum modo facile putrescunt.

Kaulbirn/id est, Globosa, globi ferè rotunditatem habent, nisi iuxta pediculũ in obtusum & uix euidentẽ turbinem fastigiantur, longitudine duas uncias uix, & raro excedunt, latitudine uerò longitudinem modicè superant, colore sunt in uiridi pallescente, sapore & odore Lardina æmulantur, cum quibus etiã maturefcunt: facile & hæc putrescunt. Habentur Islebii.

Hanßbirn/id est, Cannabina, Globosis similia sunt, sed paulo maiora, colore habent

T. 3. 45 p. 1045.



habent viridem maculis
cei punctis distinctum. sa-
pore globosis respondent,
non tamen adeo in ore li-
quescent, simul cum illis
maturefcunt, & facile pu-
tredine corripuntur. Ha-
bentur & hæc Islebi.

Glockenbirn / id est,
Campani, a sessili basi in
angustum ueluti collū co-
arctantur, a quo deinde in
obtusum cei caput desi-
nunt, habentq; omnino ca-
panæ figuram, unde etiam
nomen inuenerūt. Colore
sunt omnino flauo pun-
ctisq; maculoso, longitudi-
ne quadrante paulo mino-
ra sunt, latitudine uero dur-
as uncias nō assequuntur,
odorem spirant non insua-
uem, maximè excorticata,
gustu Cannabinis respon-
dent, pariterq; cum eis ma-
turitatem cōsequuntur. &
facile putrescunt. Islebi
proueniunt copiose.

Künigsbirn uel **Re-
gelbirn** / id est, Regalia,
grandia sunt & uentrosa,
longitudinem habent in-

terdum quatuor unciarum, latitudinem uero paulo minorem, colore sunt cæcio, ea
autem parte, qua solem acceperūt, leniter rubescunt. Gustu adstringunt, & copioso
succo eoq; suauī, & aliquantulū uinoso sitim sedant. Maturefcunt sole in libram in-
gresso, nec adeo facile putrescunt.

Klunfsbirn / id est, turgida, duplicis sunt differentiae, utrumq; tamen genus
Regalibus proportionaliter forma respondet, sed quantitate illis cedunt, differen-
tia in colore est unum siquidem genus, cæcium habet colorem, alterum in cæcio ru-
bentem, succum habent regalibus gustu similem, fortius tamen adstringunt. matu-
rescunt cum Regalibus. in Saxonia magnus eorum est prouentus, maximè Hilde-
heimii.

Bonnebirn / id est, Bonnana, a Bonna oppido Rheno imposito sic appellata,
unde in alias regiones translata sunt. figuram habent ferè globosam, nisi modicè in-
obtusum mucronem iuxta pediculum desinerent. longitudine sunt quadrantalī, la-
titudine uero paulo minore. Color iis est ab una parte uiridis aut pallescens, ab alte-
ra autem, qua sole tacta fuerunt, rubens: gustu modicè adstringunt, succo abundan-
te copioso, eoq; ferè aqueo, actu uehementer os refrigerante, maturefcunt sole ad Scor-
pionem properante. Abundant Marpurgi in Helsingia.

Schmalzbirn / id est, *σαρκώδης*, sic dicta sunt quod adipis, aut liquaminis cuius-
dam instar, in ore liquecant, fructus sunt ferè in ima parte tumidi, ac paulatim iis

xta pediculum, in angustum collum desinunt. Vt cucurbitae longitudo sine sunt quadrantalibus aut plerumque maiori, latitudine uero sextantem, excedunt, semuncia. Colorem habent in pallido flauum, odorem spirant iucundum, gustu autem strenue adstringunt non sine admixtione praecipui & uinosi saporis, non satis matura nec bene confecta dentibus, & nimis auide deuorata, in faucibus aliquandiu manet & anhelitum remorantur, alioquin matura ac bene mansa in ore adipis modo liquefit. Maturescunt antequam sol in libram transeat. Habentur in Hestia praesertim Francobergae, ubi magnus est eorum proventus.

Jundfrawenbirn groß/id est, Virginea maiora, turgidis similia sunt colore et forma, quantitate uero paulo minora. Gustu efficacissime adstringunt, adeo ut fauces exasperent, atque labra in angustum, instar uirginei osculi contrahant, succum haerent aequum ueluti uino austero mixtum. Maturescunt aestatis exitu. Brunsvici in Saxonia copiose proveniunt.

Jundfrawenbirn klein/id est, Virginea minora, a tumido uentre in angustum collum desinunt, longitudinem habent quadrante paulo breviorum, latitudine uero sesquiunciam aliquantulum excedunt, colore sunt pulchro, ueluti si quis careum rubenti ac puniceo misceat, insuper etiam punctis conspersa sunt, gustu adstringunt, simulque facile in ore resoluuntur. Maturescunt autumnii initio. Islebi maxime colluntur.

Hamelswensche/id est, *neper yaspae*, nomen ab eo inuenerunt, quod ueruecum uentricosos tumore aemulantur, ea crasso ueluti uentre turgent, longitudine quadrantem equant, & sepe etiam excedunt, latitudine uero quadrante minora sunt. Colore sunt cespicio, eo autem latere quo solem aspexerunt, subrubente. Saporem habent ualde cum gratia quadam & uinoso succo adstringentem. Maturescunt aestatis exitu. Habentur Sinesulis in Hestia, & uicinis pagis, ibique reliquis piris praeferruntur.

Leonbirn/id est, Leonina, a praestantia sic appellata, ea in Turingia et uicinis locis Hestatica nominantur, insignes sunt fructus, inter omnes autumnii dentes principatum, propter durationem & saporis succique bonitatem, obtinentes. Sunt autem inferius tumida & plerumque inaequalia, longitudinem habent quadrantalem & frequenter maiorem, latitudine uero sextantem non raro excedunt. Colore sunt caesio sub uiridi & modice rufis. Saporem habent adstringentem cum praecipua suauitate. Succo abundat copioso, uinoso, odorato & actu refrigerante: unde sitim aegros recreant. Maturescunt sole in libram ingresso: postremo reposta in longum tempus durant, abundant in Hestia, maxime Marpurgi, eadem Francobergae, Marpurgi uicina urbe, **Schärfbirn**/id est, Tonforiana uocantur, a tonsore quodam qui ea primus eo transtulit.

Hangelbirn/id est, pendula, Steatapiis figura, colore, & quantitate equalia sunt, pediculo dependent longo, unde etiam nomen sortita sunt, gustu a steatapiis differunt, non enim ita uinoso constant succo, nec adeo adstringunt, nam simpliciore maturescunt. Colluntur & haec in Hestia.

Margarethbirn/id est, Margarethana, sic dicta sunt quod circa festum diugetur, longitudine quadrantem, latitudine uero uix sextantem assequuntur. Colorem habent in careo rubentem. Carne constant tenera, succosaeque, gustu uehementer suauis, & in ore facile resolubili, odore sunt admodum grato. Abundant Brunsvici in Saxonia.

Winterbirn/id est, Hyemalia, ex rotundo modice turbinatur, longitudine quadrante minora sunt, latitudine uero sextantem parum superant. Colorem habent uiridem, substantiam uero durissimam, ut uix dentibus cedant, gustu strenue adstringunt & refrigerant.

gerant, succo aqueo simulq; austero sitim sedant. Maturescunt serò in autumno post omnes alios fructus, postquam pruinis & gelu tacta fuerunt. Habentur Francobergæ in Hefsia.

Knochenbirn/id est, ossea, à duricie nomen inuenerunt, ex tumido uentre paulatim in breue & angustum collum desinunt, longitudine sextantem, latitudine uerò sequiunciam raro excedunt. Colorem habent subrubentem, substantia sunt adeo dura, ut cruda mandi non queant, sed cocta tantum. Gustu ualdè adstringunt, maturescunt autumnii initio. Coluntur Francobergæ in Hefsia.

Augstbirn/id est, Augustana, serè rotunda essent, nisi in breuem mucronem desinerent. Longitudine sextantè parum excedunt, latitudine uerò paulo minora sunt. Colorem habent flauum interdum in pallido rubentem, gustu adstringunt cum peculiari succi suauitate, maturescunt tempestiue in Augusto mense, unde etiam nomen inuenerunt. Eadem fugacia sunt nec diu durant. Abundant in Hefsia ubiq;.

Honigbirn groß/id est, Mellea maiora, in oblongum desinunt turbinem, longitudine quadrante, semuncia minora sunt: latitudine uerò sextantè serè asequuntur. Colorem habent in flauo caesum, & superficiem non adeo glabram, gustu adstringunt, succoq; abundant suauiter, maturescunt autumnii initio, aliquandiu durantes. Habentur Vuittembergæ in superiori Saxonia.

Honigbirn klein/id est, Mellea minora, turbinata sunt, longitudine sesquiunciam non excedunt, latitudine uerò paulo minora sunt, colorem habent subrubentem, saporem habent ualdè dulcem & suauem, unde nomen inuenerunt. Liquecunt facile in ore gustantium, maturescunt paulo post Augustana. Abundant in Hefsia.

Muscatterbirn/id est, Muscatellina, parua admodum sunt & turbinata, longitudine unciam paululū excedunt, latitudine uerò uncia paulo minora sunt. Colore in uiridi rubente, saporem habent suauissimum & aromaticum, ueluti modico musco condita essent, unde etiam nomen sortita sunt. Facile in ore liquecunt, odorē quoq; iucundum spirant. Maturescunt in Iunio mense. Coluntur studiosè in Misnia.

Schaffbirn/Melleis maiora sunt. Saporem uerò habent uehementer suauem, modicè adstringentem, facileq; propter carnis & succi teneram molliciem in ore resoluntur. Maturescunt sole ad libram properante. Habentur Francobergæ in Hefsia.

Waybirn/id est, Cærea, inferius uentrosa sunt, superius in turbinem desinunt, longitudine quadrantem paululum interdum superant, latitudine uerò sextantem raro excedunt. Colorem habent flauum aut cæreum, unde nomen illis inditum est, ab ea etiam parte, qua solem receperunt, grato & maculoso rubore intuentes ad comedendum se inuitant. Saporem habent suauem, modicè adstringentem, carne constant miti & facile in ore liquecente. Maturescunt sole in uirginem ingresso, fugacia sunt, nec diu durant. Habentur Marpurgi in Hefsia.

Rostbirn/id est, Rostia, in medio uentrosa sunt, & utrinq; in angustum desinunt, longitudine quadrantem semuncia excedunt, latitudine uerò sextantem cum semuncia equant. Colorem habent flauum, celsis punctis cōspersum, gustu sunt admodum miti & suauiter, ac facile in ore liquecunt. eadem propter nimiam molliciem minime durant. Maturescunt autumnii initio. Coluntur Islebii & uicinis oppidis.

Aschbirn/id est, Cinerea, nomen habent quod cineris modo mollia sint & facile in ore diffuant. Rostia, figura, colore carnis substantia & sapore æmulantur, paulo tamen minora sunt, magisq; in unam partē uersus pediculum turbinata, quamuis interdum Rostiorum modo in medio uentrosa fiant. Maturescunt cum Rostiis, Coluntur Islebii.

Drinkebirn/id est, πόντος, sic dicta sunt, quod alicuius potus instar sitim arceant, in medio tument & in obtusum mucronem desinunt, longitudine sextantem parum superant, latitudine uerò sextantem serè æquant. Colore sunt omnino flauo,

rubescunt tamen ea parte quæ soli exposita fuit, saporem habent suauem, carnemq; teneram & largo potabiliq; succo abundantem, maturescunt cum Rostiis, & similiter ut illa cito putrescunt. Coluntur in agro Islebiano.

Eyerbirn/id est, Ouata, à figura nomen inuenerunt quæ illis est utrinq; brevis oui instar turbinata, alioquin etiam à potimis proportionem & forma non multum differunt, paulo tamen minora existunt, colorem habent flauum, punctis conspersum, sapore Rostia æmulantur, simulq; modicè adstringunt, odorem spirant admodum suauem, maturescunt cum potimis, citoq; putrescunt. Habentur & hæc Islebii & uicinis oppidis.

Pfalzgrauisch birn/id est, Palatina, quæ in Hestia **Mesbirn** uocantur, fugacium omnium generosissima sunt, æqualiter plerumq; in turbinem desinunt, longitudine quadrantem, semuncia dempta, æquant, latitudine uero sextantem raro excedunt. Colore sunt inter croceum, puniceum & rubentem medio. carne constant tenera, succosa, sapore supra modum suauis, & ueluti aromatica. Odorè habent tam integera quam incisa suauissimū, quæ nullum priorum genus bonitate superet. Maturescunt Augusti exitu sole in uirginem ingresso. Habentur in Renano tractu. Francia, Hestia, & multis aliis regionibus.

Spindelbirn/siue **Kautenbirn**/id est, Rombacea, Rostiis figura, colore, et magnitudine similia sunt, paulo tamen angustiora, substantia uero & sapore ab illis differunt, durior siquidē carne constant, ideoq; diutius durant, saporem habent adstringentem simulq; suauem. Maturescunt cum Rostiis. In agro Islebiano coluntur.

Zuckerbirn/id est, Zucharina, longitudine sextantem paululum excedunt, latitudine uero eundem uix aut raro attingunt, colore sunt uiridi. Carne constant tenera facile instar Zuchari in ore, liquecente, gustu suauis & dulcia. Maturescunt cum ouatis nec diu durant. Coluntur in agro Islebiano.

Packelemisch birn/id est, Paclemiana. Zucharinis quantitate & figura similia sunt. Colorem habent uiridē & cæsum, superficie aliquantulum sunt scabra, carne constant dura, succosa & adstringente. maturescunt cum Zucharinis, & si iniuria absit non facile putrescunt, sed aliquamdiu durare possunt, sicut pleraq; alia quæ dura carne & adstringente succo constant. Coluntur in agro Islebiano.

Kirchmesbirn/id est, rotunda & uentrosa sunt, & uersus pediculū in longū, angustū & ualde attenuatum mucronē desinunt. longitudine triente, semuncia breuiora sunt, latitudinis uero diametro sextantem excedunt, quamuis etiam minima nascantur, colore sunt flauo, carne constant tenera succosaq; gustu simul Palatina & potima referunt. Maturescunt autumno, durantq; ferè donec sol sagittarium ingrediatur. Habentur Vuittembergæ.

Knaustbirn/siue **Gelbe Honigbirn**/id est, Tumida & Mellea flaua, latam habent basim, atq; Turgidorum instar tumida & subrotundo sunt, iuxta pediculum in breuem, obtusum ac rotundum mucronem desinunt, tam longitudine quam latitudine, sextantem cum semuncia interdum excedunt, sed raro, colore sunt flauo et punctato, circa pythmen plerumq; Melleorum maiorum colore & asperitatem affectant. carne constant subdura, succosa, & circa seminum receptacula lapidosa. Saporem habent in mellea maiora, & Leonina medium, estq; hic admodum gratus. Maturescunt autumno, & nonnunquam ferè usq; ad hyemale solstitium durant. Coluntur Vuittembergæ uicinis locis.

Klosterbirn/id est, Cœnobiana, inæquali uentre turgent & iuxta pediculū turbinantur, longitudine quadrantem attingunt, qui latitudine quoq; non multum excedunt, colorem habent flauum & uiridibus punctis conspersum. substantia eis est subdura, & aliquantulum lapidosa. Gustu mediocriter adstringunt & modicè glutinosa cum suauitate existunt. Maturescunt cum Tumidis, illisq; similiter durant. Habentur in agro Vuittembergensi.

Glasbirn/id est, uitrea, rotunda sunt & modicè turbinata, longitudine sextantem cum tertia plerumq; uncia parte æquant, latitudine uero, sextantem paululum exce-

excedunt, colorem habent in flauo modicè uirescentem: caro iis est tenera, succosa, gustu adstringēs, suauis & uinosa, maturescunt cū Rostriis, paulò ante autumnii initium, Islebi copiosus eorū est prouentus, uicinisq; oppidis, durant usquequo sol sagittarium ingrediatur.

Rirchbiri/id est, Templaria, oblongam & ouatam habent figuram, magis tamen quam ouum in turbinem delinunt. Longitudine sextantem æquant, latitudine uerò sesquiunciam aliquantulū excedunt. Colore sunt ab unā parte in flauo uiridi, ab altera autem, qua solem receperunt, rubente. Carnem habent duram, modicè succosam, gustu modicè acetosam, ac uehementer adstringentem. Maturescunt æstatis exitu, diuq; durant. Horum quoq; magnus est Islebii prouentus.

Quittenbiri/id est, Cotonearia, Cœnobianorū modò inæquali uentre tumet, iuxta pediculum in breuem mucronem, ueluti turbinata Cotonea, desinunt, pariterq; tuberosa existunt. Vnde etiam nomen illis factum est, sextantem cum tertia uncia parte, tam latitudine quam longitudine excedunt. Colorem habent uiridem, carnem uerò duram, succosam, gustu modicè uinosam & mediocriter adstringentē. Maturescunt autumnii initio, durantq; usq; in hyemem. Habentur Islebii, &c.

Parisbiri/id est, Parisiana, inferius rotunda sunt, & superius in mucronē desinunt. Longitudine sextantem cum semuncia æquant, latitudine uerò sextantem non excedunt, aut raro. Colorem habent ab unā parte flauū, ab altera autē qua solem ferunt puniceū. Caro iis est succosa, gustu cū suauitate adstringens. Maturescunt cū predictis, durantq; in hyemē usq;. Copiosus eorū est in agro Islebiano prouentus.

Weybersterben/id est, Thelyphona, rotunda essent, nisi iuxta pediculū in breuem obtusumq; mucronem fastigiarentur. sextantem tam latitudine quam longitudine plerumq; excedunt. Colorem habent flauum, & iuxta basim croceum, & puniceis punctis conspersum. Carne constant dura aliquantulum lapidosa, succo, gustu modicè acetosa & ualde adstringenti, quemadmodū Templaria, cum quibus etiam maturescunt. Durant in hyemem usq;. Coluntur in agro Islebiano.

Rölbiri/id est, Brassicana, magna, subrotunda & turbinata sunt, longitudine quadrantem æquant, cui etiam latitudo eorum respondet, si semuncia, aut tertia uncia pars detrahatur. Colorem habent in uiridi pallidum, ab altera parte modicè rubentem & punctis conspersum. Carne constant duriuscula, succosa, gustu aliquantulum acetosa & fortiter adstringente, quemadmodum Thelyphona, cum quibus etiam maturescunt, & similiter durant. Islebii coluntur.

Hölpener/id est, Vasta, magna, uentrosa, inæqualia & turbinata sunt, longitudine ne quadrantem cum semuncia interdum excedunt, latitudine autem longitudinem fere æquant. Color iis est uiridis, Carnem uerò habet succosam, gustu uinosam, modicè acetosam, & Brassicanis fortius adstringentē. Maturescunt autumnii initio, diuq; usq; in hyemem durant. Frequens eorum est in agro Islebiano prouentus.

Saffbiri/id est, Succulenta, uastis similia sunt, paulo tamen minora, minusq; inæqualia, colore in uiridi flauo. carne constant solida, quæ incisa copioso succo maneat, eadē manducata fere tota in succum transit, nimium enim quiddā remanet sicci, cum deglutitur succus, qui gustu frigidus, subacidus, uinosus & adstringēs est. Maturescunt autumnii initio, diuq; durant. Habentur Vuittembergæ.

Bierlinge/id est, Oualia, à forma ouali nomen acceperunt. mediam habent inter Potima & ouata figuram ac magnitudinem, color iis est flauus punctisq; subruffis in fusco conspersus. Carne constant dura, succosa, gustu acida, uinosa & adstringente. Maturescunt autumnii initio diuq; durant. Proueniunt Vuittembergæ.

Kruselbiri/id est, Turbinata, figura turbinem, quæ pueri funiculo inuolutam in terram proiciunt ut uertatur, emulantur. longitudine quadrantem attingunt, latitudine autē sextantem semuncia excedunt. Color eis est in uiridi pallidus, multis uiridibus maculis ceu punctis conspersus, carne constant solida, succosa gustu ualde adstringenti, aliquantulum acetosa & suauis. Durant usq; sol aquarium aut pisces superauerit. Abundant in Misnia.

Biatbirn grof/quæ etiam **Fregelbirn**/id est, quæ frigendo sunt, omnium ferè maxima sunt, nonnunquam enim minam cum dimidia pendent, figura sunt globosa, interimq; turbinata, & frequenter inæqualia, colore inter uiridem pallidum rufumq; medio, & ex altera parte magis ruffo. Carne constant cum suauitate succi, ad stringēte, aliquid acetosi participante. Proveniunt in Misnia, præsertim Leisnichi & Coldicii.

Grawchen/id est, à colore nomē inuenerunt, siquidē cineracea, simulq; sub uiridia & sunt, figura globosa paruaq; unciā tam latitudine quā longitudine æquantia, aspectu à syluestrium quibusdam nihil differunt, gustu sunt tenera, mitia, dulcia & suauia cum adstrictione aliqua, durant post solstitium hyemale. Proveniunt autem in Misnia Lipsensi agro.

Gelbrotebirn/id est, Punicea, oblongam pyramidalem figuram habent, quadrantem longitudine paulominus quam semper attingētes, latitudine uerò sextantem. Colore sunt ab unā parte citrino, ab altera croceo & puniceo. Carne constant tenera, gustu adstringente, suauis, subacido & aquoso, maturescunt autumnī initio & usq; ad solstitium hyemale durant, Proveniunt Hildesheimii in Saxonia.

Grünlinge/id est, Prasina, satis magna sunt, siquidem quadrantem nonnunquam longitudine excedunt, latitudine uerò sextantem, figuram habent oblongam at pyramidalem, colorem uiridem, carnem succosam, non segniter gustu adstringentem. Maturescunt autumnō ineunte, & usq; post solstitium durant, proventus eorum Hildesheimii est magnus.

Wasserbirn/id est, Hydrapia, quantitate Prasina æmulantur, figuram habent uentrosam in medio, & utrinq; in mucronem desinunt, iuxta pediculum oblongiorem acutioremq; propè pythmēna uero breuiorem & obtusiolem, colorem ab unā parte habent pallidum, punctisq; conspersum, ab altera autem rubentem, & per oaram pallore dilutum. Carne constant succosa, gustu aquea cū suauitate aliqua, maturantur cum prasinis, nec usq; adeo durant. Proveniunt Hildesheimii.

Regelbirn/id est, Conaria, pinei conii figuram habent, è latiuscula enim basi in mucronem desinunt, longitudo eis quadrantilis, latitudo autem sextantalilis, colore sunt ex una parte uiridi, ex altera uero rubescente. Carne constant succosa, gustu austera, maturitas eis contingit autumnī initio, à quo tempore usque ad hyemale solstitium durare possunt. Nascuntur Hildesheimii.

DE MALIS. CAP. X.

MALORum tam urbanorum quā syluestriū non minor quā pirorū uarietas est, plurima enim & horū genera, partim insitionū natura, partim diuersitate discreta, quæ autē ex his nobis optime cognita sunt, ea deinceps describemus.

Wüßpöfel breyt/id est, Pulmentaria lata, satis magna sunt, latitudine altitudinem superant, nam quadrantem altitudine non attingunt, aut rarò, cum latitudinis diametro trientem nonnunquam excedant. Colorem habent rubentem & modicè purpurascētib; uibicibus mixtum, carne constant miti, **grüselicht** & omnis succundum spirant. Copiosus eorum est Islebii proventus.

Waideszichen/id est, *uoputirbia*, sic dicta sunt, quod figura protuberantes & ferè acuminatas puellarum mammillas imitentur, tam exquisita similitudine, ut etiam pythmē eorum, papillas aspectu referat. Longitudo ijs est sextantalilis, à qua latitudo basis nihil aut parum differt, iuxta pythmēna in obtusum, latum, & umbilici figura cauum mucronem desinunt, colorem habent flauum, carnem uerò teneram succosam, gustu suauem, subacidam, uinosamq; odorem, repōita gratum spirant, maturescunt autumnī initio, & ad hyemis principium usq; durant, uel paulo diutius, Islebiano agro copiose proveniunt.

Wüßpöfel

T. 2. 44. p. 104.



Müßpöfel rund/id est, pulmentaria rotunda, ut plurimum globosa aut rotunda sunt, interdum tamē latitudine longitudinē superant, & ē contra, longitudine latitudinem. magnitudine etiam inter se differūt quantum ad individua attingit, specie autem minime. Ut plurimum autem quadrantē cum semuncia lata sunt, sed altitudine quadrantem uix attingunt, inueniuntur etiam multo maiora. Colorem habent undique ferē rubentem, longis & in purpura roseis cuiuslibet, distinctum. Carne constant miti in dulci modicē acescente, facile in gustantium ore liquecente, mediocriter succosa, gustu suauī, uinosaq. Odorem habēt iucundum. Maturescunt autumnī principio, & ad hyemis initium usque durant, aut aliquanto diutius. Habentur Vuittembergæ.

Müßpöfel klein/id est, Pulmentaria minora, rotun-

dis Pulmentariis forma & colore similia sunt, multo tamen minora, oblongioraq. existunt, carne etiam teneriore, succosiore constant, saporem habent suauem, uinosum & subacidum. Odorem uerō iucundum. Maturescunt cum rotundis similiterq. durant. Proueniunt in agro Vuittembergensi.

Müßpöfel gelb/id est, Pulmentaria flaua, maximis rotundis pulmentariis æqualia sunt. Colorem habent flauum, ab una parte raris uibicibus. Colore sanguineis conspersum. Carne constant suauī, dulci, uinosaq. ueluti rotunda pulmentaria. Odorem bonum spirant. Autumnī initio perficiuntur & in hyemem usque durant. Magnus eorum est Islebiū prouentus.

Süßlinge klein/id est, dulcia minora, forma & colore minoribus pulmentariis similia sunt, sed multo minora, nam rarissimē Coreitithiorum magnitudinem excedunt. Carnem habent teneram, succosam, gustu uehementer dulcem & gratam. Odorem spirant suauē. Maturescunt hec etiā autumnī initio & in hyemē usq. durant.

Pannöpfel/id est, Paterniana, lata & plana sunt, altitudine sextantem cum semuncia æquant, latitudine uerō quadrantem nonnunquam excedunt. Colorem habent flauum, sanguineis uibicibus, Pulmentariorum instar, maculosum. Carne constant tenera, mediocriter succosa, gustu subacida, uinosa & uehementer suauī, odore pulmentaria æmulantur. Maturescunt cum prædictis, durantq. similiter. Proueniunt in Vuittembergensi agro.

Scheiböpfel/id est, Orbiculata, Pateruianis similia sunt figura, odore, & sapore, plerumque tamen paulo minora, pauloque magis in latitudinem compressa existunt. Colorem habent pallidum, interdum flauum in croceo, paucisque uibicibus, ut sanguineis pictum.

Gocharde/siue **Polsöpfel**/oblonga sunt, & in medio aut inferius aliquantulum tumidiora, quorum pythmen profundiusculae insidet superius ueluti lacuna. Colore sunt in spadice ruffa aut fusca. ab altera interdum parte pallidiora ac rubentibus uibicibus maculosa. Longitudinem habent multo plerumque maiorem quadrante, latitudinem uero quadranti aequalē. Carne constant tenera, miti ac rara, fungosa & tamen aliquantulum succosa. Gustu subacida, suauis, & in ore facile dissolubili. Maturescunt cum praedictis, atque post medium hyemis usque durant. Habentur in omnibus Germaniae regionibus.

Karteckenöpfel **Parisöpfel**/uel **Biscope**, id est, uel **Episcopia**, omnium dulcium malorum nobilissima sunt. Figura eis est ut plurimum rotunda, colorem habent ab una parte suauiter, tenuissimis, contiguis roseisque uibicibus rubentem, ab altera uero in candido pallidum uix euidentibus, dilutisque uibicibus confersum, incertum, & descriptum difficilem, unde etiam Cartechianorum nomen inuenerunt. Odorem spirant gratum ac iucundum, longitudine quadrante cedunt, latitudine uero eundem aequant. Carne constant tenerissima, succosa, niueaque. Gustu supra modum suauis, dulcis atque mitis. Maturescunt autumnii initio, & in hyemem usque durant. Habentur in omnibus fere Germaniae nationibus.

Hartlinge weiß/id est, Duracina alba, rotunda sunt atque modice in latitudinem compressa, altitudine sextantem, latitudinis uero diametro sextantem & semunciam excedunt. Colorem habent una parte, qua solem exceperunt in flauo rubentem, altera autem in uiridi candicante: intus albescuntibus maculis, per cutim transparentibus aspersa sunt. Carne constant tenera & tamē solida, succosa, gustu acida, uinosa & suauis, odorem reposita aliquamdiu spirant iucundum. Maturescunt autumnii initio ac totam hyemem durant. Habentur ubique fere in Germania.

Porstoffer/id est, Porstorfiana, eandem habent quam Duracina alba figuram, & proportionē, paulo tamen minora sunt, colore quoque non multum ab eis differunt. siquidem ab una parte pallent, ab altera uero suauiore insipientes rubore delectant. Carne constant iam dictis Duracinis simili gustu uehementer suauis & generaluntur in Misnia, ubi propter saporis nobilitatem ceteris omnibus praefertuntur. Maturescunt cum Duracinis, & similiter fere durant.

Preslitenöpfel/id est, Preslitiana, aspectu sunt pulcherrima, figura rotunda & globosissima, colore rosea, atque Preslitii materiae dilutum prouocantia, magnitudine quadrantem ut plurimum aequant, nonnunquam etiam excedunt. Carne constant tenera, sub solida, gustu dulci, simulque acescente & suauis. Maturescunt autumnii initio, & usque hyemale solstitium durant. Magnus eorum est Hildesheimii prouentus.

Saffrānke/uel **Hanentkote**/id est, Crocina, nobilissimis haud quaquā sunt postrema, figuram habent globosam propemodum, tam longitudine quam latitudine sesquiuncialia, latitudo eorum, longitudinem non raro excedat, paulum tamen, in summa Coreitithiis fere aequalia & similia. Colore sunt inter uiridem maculae tenuesque uibices distinguunt, eo insigni pluuiosis aestatibus destituuntur. Carne consistunt tenera, gustu dulci, aliquantulum subacida, suauis, & aromatico quodam halitu gustantis palatum commendante. quinetiam suauiter & iucunde redolent. Maturitatem adipiscuntur autumnii principio, & usque ad æquinoctium uerni durant, frequenter etiam longius. Habentur Hildesheimii, praesertim in hortis Monachorum in Sulda extra urbem sito Cœnobio.

Saffrānke rot/id est, Crocina rubentia, Crocinis figura & magnitudine equalia sunt,

lia sunt, colore uero pulmentariis & dulcibus minoribus, nam similiter sanguineis uibicibus roseam superficiem distinctam habent, Carnis substantia, saporis qualitate, maturescendi, durandique tempore Crocinis respondent. Proueniunt autem in Saxonia Hildesheimi ac Honouera.

Boldspfel/id est, mala quae Romani Pulmonea olim nominabant, omnium dulcissimum maxima sunt, figura globosa, diametri quoque uersus non raro triangularis, colore flaua, nonnunquam etiam in uiridi pallido, praesertim ubi frigidiori humidiorique aestate enata fuerint, Carne constant rara, fungosa, instar pulmonis, unde etiam nomen sortita sunt, itea digitis confricata & auribus admota strepitum edunt. Saporem habent dulcem, non insuauem, nulla alia qualitate mixtum, maturitatem consequuntur aestatis exitu. Durare aliquandiu possunt, nunquam tamen aut raro hyemale solstitium attingunt. Proueniunt copiose in Hessia.

Weidenboldch/id est, Pulmonea salici inserta, Pulmoneis iam dictis aequalia & similia sunt. Carne constant paulo rariore, gustu dulci atque aliquantulum amarescente, Aestatis exitu haec quoque maturescunt, & similiter modico tempore durant, colluntur a quibusdam in Hessia. Possunt horum ad exemplum etiam alia salici inseri, praesertim, dulcia & alioquin rarae substantiae, acutiusque facilia.

Glasßpfel/id est, Vitrea, pulmoneis similia aequaliaque sunt, non tantum figura uerum etiam colore, praeterquam quod superficiem, nonnunquam etiam carnem habeant obscuri uiri modo pellucidam, quod horum malorum proprium est, item si aliis malis contingat, uicium censendum est. Carne constant dulci, suauiter modice uinosa. Maturescunt aestatis exitu, diu autem durare minimè ualent. Nascuntur Coburgi in Franconia.

Hardlingeror/id est, Duracina ruffa, figuram habent orbiculatam, interimque globosam, magnitudinem uero neque omnia, neque ubique eandem, ut plurimum tamen altitudine sextantem, latitudine autem sextantem & semunciam attingunt colore sunt roseo, sanguineis longisque uibicibus undique distincta. Carne constant admodum solida & densa, attamen ualde tenera, succosa in gustu, acetosa, cum peculiari suauitate. Odorem spirant non ingratum. Maturescunt autem autumnii initio atque omnium diutissime durant, nonnunquam enim usque ad aestatis medium, atque non raro diutius, prorogantur. Proueniunt ferè in omnibus totius Germaniae pomariis.

Weinfeürchen/id est, Oenoximela, Orbiculatis figura & quantitate similia sunt, paulo tamen altiora, nec usque adeo in planum compressa. Colore ab una parte in uiridi pallidoque candicante, ab altera leniter interdum rubescente. Carne constant admodum solida duraque, interim tamen delicata & tenera, succosa gustu, uinosaque suauitate: tenue, austerum, syncerumque uinum aemulante. Maturitatem adipiscuntur autumnio ineunte, & usque post aequinoctium uernum durant. Abundant in Hessia.

Äckspfel/id est, Angulosa longa, ab angulis nomen inuenerunt, a pediculo enim usque ad pythmenam undique angulis crassioribus fulcantur, qui tamen iuxta utrumque caput eminentiores sint, in medio uero, hoc est uentre non tam euidentes. Longitudinem habent quadrantalem, latitudinem sextantalem, nonnunquam tamen in maiorem quantitatem adolescunt. Colorem autem flauum, sanguineis uibicibus, dense confersum. Caro eis tenera, succosa & mitis, gustu inter dulcem atque acetosum saporem media, & suauis ualde. Maturescunt autumnii principio, ac uernum usque ad aequinoctium durant. Proueniunt in Hessia ac Misania.

Äckspfel rund/id est, Angulosa rotunda, angulorum eminentiis, colore, carnis substantia, sapore, maturescendi durandique tempore Angulosis longis similia sunt, in hoc tantum ab iis differunt, quod ut plurimum globosam figuram ha-

habeant, magnitudine sunt quoquo uersus quadrantali, non rarò tamen maiora, quanquam frequenter etiam minora inueniantur. Proueniunt in Misnia.

G:unche/id est, Prasomela, figuram habent oblongam, latitudinem sextantalem, longitudinem autem semuncia maiorem, colore sunt in uiridi pallido. Carne constant tenera, gustu suauis, dulci simulq; acetosa. Maturescunt æstatis exitu, & totam hyemem durant. Proueniunt copiose in Hestia Marpurgenli agro, ac in uicinia.

Weisse Godharde/id est, Gothardina alba, Gothardinis figura, carnis teneritudine, sapore, maturescendi durandiq; tempore similia sunt. Magnitudinem uerò inter Prasomela ac Gothardina mediam habent. Colorem autè in uiridi candicantem. Frequens eorum est Marpurgi in Hestia prouentus.

Augstöpfel/id est, Augustina, parua sunt atque propemodum globosa, sesquinciā tam latitudine quam longitudine rarò excedunt. Colorem habent flauum, Carnem teneram, gustu dulcissimam & ualde suauem. Odorem gratum & iucundum. Maturescunt Augusto mense, unde nomen inuenerunt. eadem fugacia sunt, minimèq; durant. Nascuntur ubique ferè in Germania, sed in Hestia copiosissime, Saxones ea *splitte* uocant.

Rosenöpfel/id est, Rosacea, Presilianis magnitudine & colore similia existunt, carnem habent paulò dulciorem, figuram uerò non usque adeò globosam. Maturescunt æstatis exitu & ad hyemem usque durant. Proueniunt Coburgi in Francia.

Blutöpfel/id est, Sanguinea, figura sunt globosa, quantitate sextante paulò maiore, colorem habent foris roseum. Carnem uerò teneram ueluti in sanguine maceratam, roborisq; gratissimi: gustu dulcem, aliquantulum subacidam & suauissimam. Maturescunt æstatis exitu. Magnus eorum est Coburgi in Francia prouentus, quamuis & alibi non desint.

Süßöpfel groß/id est, Dulcia magna, Pulmoneis figura & quantitate æqualia sunt, paulò tamen minora, rotundioraq;. Colorem habent in uiridi flauescentem, ex altera parte subrubentem. Carnem mediocriter solidam, gustu dulcem, suauemq;. Odorem spirant gratum ac marrubio simillimum. Maturescunt æstatis exitu: abundant in Hestia.

Sauröpfel groß/Oxymela maiora, dulcibus magnis colore, magnitudine, figuræq; similia sunt, in hoc tamè differunt à dulcibus, ferè omnia acetosa, quòd candicantia exiguaq; puncta per cutim transpareant. Carne constant solida, tenera, gustu acetosa, uinosa, suauisq;. Maturescunt æstatis exitu, durantq; in hyemem. Proueniunt in Hestia.

Parelöpfel/id est, Parea, Omnium maxima sunt, figura globosa, modicè compressa, colore in roseo alicubi flauescente, sanguineisq; uibicibus consperso. Carne constant tenera, sapore inter dulcem ac acescentem medio, estq; hic non mediocriter suauis. Odorem spirant iucundum, maturitatem consequuntur autumnii initio, durantq; ad autumnii ferè exitum. Coluntur Islebii, uicinisq; tractibus.

Sauröpfel klein/id est, Oxymela minora, Duracinis ruffis æqualia similiaq; sunt, paulò tamè oblongiora, colore in uiridi candidoq; flauescente, punctisq; candidis per cutim translucentibus conspersa. Carne, sapore, maturescendi durandiq; tempore Oxymela maiora imitantur, paulò tamen acetosiora existunt. Prouentus eorum est in Hestia magnus.

DE COTONEO arbore & *Cotoneis malis.*

CAP. XL

COTONEVS, SIVE malus Cydonia, siue Cotonea, arbor est fruticosa, numerosis, nisi coherceatur caudicibus, hisque ramosis & in æqualiter uirgatis ab uno radicis capite assurgens, altitudine quatuor, quinque aut

T. 3. 43. p. 1039.



aut sex cubitorum, crassitu-
dine manū complente, nō
nunquam etiam multo ma-
iore, præsertim cum ad ius-
tam magnitudinem perue-
nerit. Cortice uestitur me-
diocriter crasso, non rimoso
nec ualde scabro, inferius
colore fusco, superius autē
leuiore & glabro, folia ha-
bet piro arbori non dissimi-
lia, hoc est subrotunda, inte-
rimq; fastigiata, plerumq;
tamen minora, crassiora, ro-
bustioraq; supernē uiridia
& glabra, infernē autem cā-
dicante lanuginosaq; pube
obducta. Flores apud nos
producit sole ac ariete ad
Taurum properante, quin-
que candidis leniter ruben-
tibus, subrotundis, semun-
cia latioribus foliis constan-
tes, apicibus quibusdam in
medio stipatos, propē
quos exerunt se parua que-
dam folia, arboris huius nō
florū foliis similia. hinc est
quod cotonea quædam ma-
la & fere omnia iuxta pyth-
mena foliata sint. Retro flo-
rum folia oblongum lanu-

ginosumq; aliquid extuberat, secuturi uidelicet fructus rudimentum: hoc deciden-
tibus florum foliis incrementum capeffit, donec iustam quantitatem assequa-
tur. Porro ipsa Cotonea mala apud nos in duo præcipua genera conciduntur.
Vnum enim maiorem molem adipiscitur, longitudine quadrantem cum semuncia
interdum superantē, latitudine uerō, quadrantem, iuxta pediculum latiorē, circa
pythmena autem paulo angustiorē, superficie glabram, æqualem, & pauca, non-
nunquam etiam nulla, obductam lanugine, colore in aureo flauescente. Carne rari-
uscula fungosaq;. Alterum multò inferius, magnitudine existit prope pediculū an-
gustius, iuxta pythmena latius, angulis striisq; profundioribus sulcatum, colore in
aureo flauoq; uirescente, densiore lanugine obductum. Odor utriq; generi suauissi-
mus ac late spirans: minoribus uerō, id est, Strutheis uehementior. Caro utriusq; co-
lorem flauum obtinet, minorum uerō densior compactiorq; existit. Semina ferunt
in medio pomo utriculo in cellas discreto, piri seminibus equalia similiaq;, cum nu-
cleo tū cute spadicea, foris mucilaginoso dum madefiunt, lentore lubrica. Strutheo-
rum caro, qua seminum conceptacula ambit, lapidosa existit. Vtrūq; genus dura-
re diu nequit. Radicibus arbor hæc nititur multis, partim rectis, partim obliquis,
fusco simulq; spadiceo cortice obsitis. Seritur auulsione, uiu radice, insitione, ra-
mulis & taleis.

DE CITRO arbore ac malis Citreis. [Tragus trium diuersarum, sed cognata-
rum arborum fructus, Citrea mala, & Nerantia à recentioribus uocata, & Li-
mones uulgò dictos, exprimere uoluit. Accuratiores singularum icones Ma-
thiolus dedit.] CAP. XII.

T. 3. 40. p. 1032.



CITRVS arbor, est fruticosa uelut
Cotoneus, ramos habet uiridi gla-
broq; uestitos cortice, ferendę foetum mi-
li ualde impares & ad terrā pronos, ideoq;
subiectis per transuersum hastilibus, fu-
nisq; fulciēdos. Folia laureis similia, deſio-
rata tamen, multoq; maiora, & ad iuglandis
magnitudinē accedentia, oblonga, utrinq;
acuminata, egregie uiriditatis, splendorisq;
praesertim supernę, infernę enim pallidiora
existunt. Tota hyeme arborem suam exor-
nātia, odoris acerrimi, late spirantis, qualis
in Melissophyllo sentitur, cū grauitate qua-
dam cūmicem imitante. spinis armatur sub
omnium foliorum annexibus, longitudine
uncialibus, rectis, acutis, ac uiridibus. Flo-
res uirentes, gemmarum caliculi emittunt
oblongos candicantes, & quorum duplex
est genus uidelicet, sterile & fructiferum:
sterile nullum post se tuberculū producit:
Fructiferum uero, praeterquam quod a ter-
go fructus rudimento sibi annexo comites-
tur, etiam in medio aliud insigne exerit pen-
sum colo inuolutum æmulans, quod Theo-
phrastus quoq; nouit. Fructus florem se-
quuntur singuli, longitudine non raro do-
drantali, figura ouata, superficie rugosa, tu-
berosaq; colore primum uiridi, in maturi-
tate uero aureo, seu citrino, nec solum oua-
ta nascuntur figura, tum etiam globosum
consequantur habitum, utrumq; eiusdem
est odoris ac foliorū similis. Cortice ambi-

untur gustu amaro, feruido simulq; tenui, cui subest caro cartilagineę duræq; con-
sistentiæ, colore candido, aspectu atq; acetoso sapore conditę capitatę Brassicę trun-
cos referens, in medio malo cavitās quædam est, succo uehementer acetoso, suis mē-
branis contento plena, cui immixta sunt oblonga & semuncialia semina, utrinq; fe-
rē acuminata, cute foris flaua striatāq; intus candido dupliciq; nucleo constantia:
quibus amarus, tenuis & mediocriter feruens est sapor praesertim cutis. nucleus es-
nim dulcedinem quandam admixtam habet, radicibus nititur copiosis & tenuibus:
Coelum amat calidum, hyemis iniuriis minime obnoxium, quod si nactum fuerit,
flores, adolēcentes, maturescentes maturosq; fructus simul producit, non solum
Neapolitano & Hispania prouentus, feritur etiam in Germania, sed frustra, nihil e-
nim praeter folia producit. Verum frigore siderata facile perit, nisi diligenti cura
adhibita, contraq; hyemis seuitiam muniantur, illatis in tepida coenacula aut cel-
laria arbutis, sic enim ad plurimos annos uiuent. Cū fructificat substructis iugis,
hastilibus

hastilibus furcisq; fulcienda est, ne malorum pondere crescente detracta succumbat, ac fracta prosternatur. Verum hoc in Germania timendum minime est, in qua vix frondes ab hyemis saevitia vindicari queunt, quantumvis tepidis specubus foueantur.

DE CITRIO, id est, Arancio arbore, malisq; Arangijs. [Vide Lemma praecedens item ultimum huius libri.] CAP. XIII.

ARANGIVS, seu Citrius arbor est, Citro cortice, radicibus, aculeis, ramis, foliis, fructuq; similis, multò tamen maior ac singulari stipite seu caudice assurgens. quinetiam flores similes producit, sed pulchriores & multo odoratiores, intus subcitrinos, per oram uerò limbi purpurascens, differt tantum foliorum singulari forma, fructusq; cum paruitate tum rotunditate. Folia enim quamvis Citreis similia sint tam colore quam nitore, acuminatiora tamen angustioraq; spectantur, & præter hanc notam etiam singulari quodam proprioq; insigni distinguuntur. quodlibet enim eorum posteriori parte iuxta annexum ferè, utrinque incisuram habet, quibus sibi inuicem aduersus constituitur isthmus, quinetiam spina per foliorum dorsum transiens in ipsa angustia iuncturam habet, qua ueluti in his na folia, singula diuidantur, ita ut posterior eorum pars parua myrtheoq; æqualis sit, uerum obtusa, anterior autem Laurini maioris acuminatq; figuram ac quantitatem habeat. Odor is est quemadmodum & sapor, Citrinorum æmulus, remissior tamen paulò, licet & hæc cimicum uirus non nihil redoleant. Fructus iisdem quibus Citrius temporibus producit, rotundos ac globosos, modicè compressos, magnitudine mediocri mali. Colore primùm uirides, in maturitate postremò fuluos aureiq; fulgoris, cortice, carne & semine constantes. Cortex est crassus & corio similis. Gustu, odoreq; citreos cortices imitans, iucundius tamen redolet, cui subest caro, per longitudinem senis plerumq; aut octonis membranis distincta, uinoso succo plena, qui in altero eorum genere dulcis, attamen aromaticus, uinosusq; existit, in altero uerò acetosus, utrumq; suis dignoscitur indicijs, dulcia superficiem habent glabriorem, leuiorem, mollioremq; corticem: acetosa autem asperiores ac duriores. Semina in carne continentur Citreis similia, paulò tamen minora eiusdem etiam cuius Citrea saporis & odoris. Retinet & hæc arbor suas hyeme comas, quemadmodum Citrus, similemq; cœli constitutionē, curam, cultumq; desiderat.

DE LIMONE arbore, eiusq; fructibus, id est, Limonibus. [Vide Lemma capituli 12.] CAP. XIII.

LIMON quoq; ex Citri genere, multò tamen minore ac fruticosiore arbutus, pluribus ab una radice uirgis exeuntibus, cū large fructificat, subiectis hastilibus ac furcis fulcienda est. arbusto, cortices, ramos, uestiunt priorum instar uirides. Folia multo minora producit, piri Cotoneiq; folijs æqualia, rotundiora tantum, densa, uiridia ac glabra. Spinis armatur ueluti Citrius atque Arangius, minime tamen rectis, sed aliquantulum hamatis, multoq; pluribus quam illæ, quo fit ut eius uirgæ ac ramuli aduncis aculeis quandam rubi imaginem referant. Flores Citrio figura non dissimiles profert, paulo tamen minores, fructus uero Citreis ac Arangijs aspectu, odore, ac sapore non dissimiles, eorum quadruplex ad nos peruenit genus, primum anserini oui formam ac magnitudinem habet. Odore inter Citrium atq; Arangium malum medio. Secundum globosum existit, minusq; predicto, utroq; capite ueluti eminente umbilico insigne, cetera sui parte tuberosum. Tertium oblongum est gallinarum oui quantitate & figura. Quartum tertio æquale est sed globosum, & superficie magis æquali, omnibus crassior, ac aurei palloris cortex, quæ

lis Arangiis. Odore uehemens, gustu amarus, feruidus ac tenuis. Reliquum corpus caro est, rara cauernosaq; per longitudinem membranis quibusdam intersepta, cui immixta sunt Citriis similia figura odore aut gustu, semina minora tantum, succus per totam carnem diffusus est largus, saporis uehementer acetosi ac dentes hebetant. Radicibus nititur qualibus Citricus ac Arangius. Gaudet eodem coelo cura ac cultu semper uiuens fructumq; fundens ac florens. Fructus eius omnis generis cum ex Italia tum Hispania ad nos uehuntur terra marique, partim per se, partim etiam idq; frequentius marina aqua aut alia quapiam muria conditi. Plantam eius in Germania enascentem nullam uidere haecenus mihi contigit.

DE PVNICA malo, ac Punice malis.

CAP. XV.

T. 3. 42. p. 1037.



cina excludendi. Non autem Balauſtia tantum decidunt, decidunt etiam foecundo-
rum florum capita, hoc est, fructuum rudimenta, quos antea Cytinos appellauimus, pluribus enim foetibus grauata parens, alimentum omnibus largiri nequit, sed robustioribus tantum, imbecilliores autem praerepto a ualidioribus succo destituti a pediculo resoluti delabuntur, qui collecti propter insignem quam habent adstringendi uim, magnopere medicinam instruunt. At qui in arbore remanserunt, pugni magnitudine adoleſcunt, figura globosi, breuiq; pediculo ramis annexi, pythomene in summo lato, amplo ac doli plerumq; instar concauo ac profundo. Cortice uestiuntur

PVNICA malus, parua est arbor. E-
uonymo, quae & Anonymus uocatur, magnitudine, cortice, ligni duricia, radicibus ac foliis similis, folia autem multo minora sunt, ac potius oleae equalia, molliora tamen, obtusiora q; longitudine sextantem, latitudine uero digitum raro excedente, grauius cum foetore aliquo odorata, atq; canum halitum, feliumq; urinae graueolentiam aliquo modo referentia; aculeos in ramis fert oblongos ac subrectos. Flores fert duplicis differentiae, hoc est steriles & foecundos, hii a tergo oblonga capita annexa habent, hyosciam uasculis equalia ac similia, ea q; singuli singula, Graecis κούτινοi nominata, quae secuturi fructus rudimenta sunt. Illi autem nihil huiusmodi obtinent, sed nudo latoq; calici insidens. Vtriusq; amplitudo rosae aemula, stipata confertaq; foliorum densitas. Colore ut plurimum rutilo, ac inter sanguineum roseumq; medio, estq; hic aspectus iucundissimus. reperiuntur etiam candidi, mixtiq; e rutilo & albo coloris. Roseorum autem maior inualuit in Medicina usus. Steriles flores cum ad iustam consistetiam peruenerint, ponte delabuntur, ideoq; Balauſtiorum nomen apud medicos habent. Eos eligere oportet densis, rutilis roseoq; colore, foliis confertos, & sanguineo decore aquam inter macerandum coquendumq; tingentes, gustu uehementer adstringentes, qui uero pallidiores fuerint e Medicina

uestiuntur duro, crasso, subscabro, foris in obscura purpura subruffo, intus autem flauo, ac substantia, gustu & demigrandi facultate gallis simili, eo continentur oblongi, angulosi, conferti acini, tenui carne, uinoso succo ac semine constantes, ad fauorum aliquam similitudinem dispositi, numerosis tenuissimisq; membranis distincti, differunt inter se acini colore ac sapore: quidam enim sunt ruffi, quidam, in purpura candicant, quidam etiam cādicant tantum. Sapor aliis acetosus, aliis dulcis, aliis mixtus, omnibus tamen uinosus ac præcipuæ suauitatis. Semina acinis singula, cnico figura ac colore similia sunt, minora tamen, forisq; ligneo cortice, intus autem nucleo constant. Inuenitur etiam singulare quoddam huius mali genus, nullum in acinis semen continens, ob id *απύγμω* Græcis dictum, quod rarissime ad nos peruenit. Cortex priuatim ad Medicinam reponitur, Græcis *ζυδιον*, Latinis Malicorium appellatur, qui nunc corrupto nomine passim in Pharmacopoliis Psidia & cortex psidiae uocatur. Eligito purum substantia flauum, intus nullo situ oblita cavitatem: synceris, minimeq; corruptis aut putrefactis malis collectum. Colitur etiam in Germania Punica malus, magno studio curaq; custodienda, fructum tamen producere nequit, ob Coelinostratis in hyeme rugorē, gaudet enim calidis regionibus, in quibus minime seuit hyems. Prouenit etiam temperatis, ideoq; foeliciter etiam in Hispania, Italia ac Narbonensi Gallia fructificat, cum alias in Pœnis nascatur, unde etiam nomen inuenit.

DE PVNICA SYLVESTRI.

CAP. XVI.

PVNICA sylvestris, satiuæ per omnia similis est, incultior tamē, spinisq; horridior, cuius Balaustia ac Cytini in satiuæ punica natis efficaciora sunt. Nascitur in Aphrica ac in Hispania Herculeo freto uicina sponte, Regno hoc ob id Granati cognomento gaudente.

DE FICO ET FICVBVS.

CAP. XVII.

FICVS fruticosa est arbor, magnitudine mediocris sambuci, caudice breuicō tortoq; uirgas ac stolones ab eadē radice emittit plures, ceu geniculatas, crassitudinis diuersæ: cortice uestitur leui, tenui, simplici: inferius in caudicibus cineraceo, superius uerò in ramulis uiridi. Materia constat molli, infirma, rara, ampla intus cavitatem, cuius inanē crassa fungosaq; medulla ad exemplū sambuci repletū est. Folia habet magna, crassa, lata, tam longitudine quam latitudine, nō raro dodrantalia, in tres partes antrorsum spectantesq; binis profundioribus incisuris diuisa, quarum media recta præ cæteris eminet, reliquæ duæ oblique ad latera tenduntur, quæ uicinarum à tergo per medium hirsuto neruo dirimitur. iuxta pediculum utrinq; singulæ aliæ partes ē prædictis duabus exeunt. Color foliis supernè uiridior, infernè pallidior, utrinq; scabricia quadam oblita sunt, inferius quidem mitiore, superius autem asperiore, præsertim cum uersus pediculum ea quis mulceat. Radicibus nititur multis, longis, firmis, lentis, euulsu distractuq; cōtumacibus, multis capillamentis fibratis, colore flauis, atq; rutæ radicibus per omnia similibus, maioribus tamen multo, abundant cortices & folia lacteo copiosoq; liquore, odore ac sapore ad rutam accedente, quemadmodum etiam reliquæ eius partes. Fructus omnis ferè urbana ficus bis producit, æstatis initio unum, autumnō uerò alterum, utroq; simul fouens, sed diuerso tempore perficiens. Flores, ut omnes hæcenus tradiderūt, fert, sed statim parua fructuum rudimenta, quos grossulos aut grossos Latini uocant, pisco aut fabæ æqualia, ea paulatim crescunt, donec piri mediocris figuram ac quantitatem consequantur, cum ad mediā magnitudinem peruenerint. intra se flores (quod fortasse mireris) concipit figura confectis staminibus similes, colore in candido purpurascens, undiq; carne exeuntes, atq; ad mediā fructus cavitatem se



liis immixtum. Tertium in paruis turbinatisq; e spartho contextis corbibus, Masiliensium cognomento, a prouincia in qua proueniunt dicta, magnitudine cæteris quidem inferiores, saporis uero generalitate superiores. Cælum amat calidum, ac ria uindicanda, ideo apud nos priorem fructum perficit tantum, alterum frigore præueniente.

DE CAPRIFICO. CAP. XVIII.

CAPRIFICUS syluestris est ficus, urbanae per omnia similis, incultior tamen duriorq; grossos fert, quales urbana, sed nunquam maturescentes, liquore maturat quam satia acriore, tam gustu quam odore. Prouenit sponte in calidioribus regionibus, gaudet montanis, aut alioquin editis locis ac uetustis muris, quos insinuatis radicibus etiam disrumpit, ideoq; copiosus eius est Romæ, ueterum in ædificiorum ruinis prouentus. Vbi equis etiam non ingratum pabulum uirge ac fronde eius faciunt. At in Germania nulla penitus sponte exit, cum uix urbanam maximo studio cultam, alere queat, tam difficile est, peregrinas plantas alii quam suo cœlo assuefacere.

DE OLEA, atq; Oliu. CAP. XIX.

OLEA inter nobilissimas arbores haudquaquam postremum locum obtinet, cum

dirigentes, quibus singula minutaq; succedunt semina, colore flaua, quodammodo leniter compressa, milioq; similia, unde etiam Cenchramides a Græcis dicuntur. Ipsæ ficus liquorem habent dum adolescunt lacteum & subacrem, qui maturescere fructu paulatim in dulcem excoquitur succum, ubi ad maturitatem peruenerint, caruitas eorum tota carne & semine repletur, carne primū constant dura, in maturitate uero molli gustu, dulci, odore propemodū nullo, differunt inter se colore: quædam enim candicant, quædam rubent, quædam nigrescant. Prætereo genera earum adhuc multa nobis nondum uisa, ideoq; potius silentio prætereunda, quam ex historia & relatione aliorum describenda, donec aliquando Christo adiuuante, & hæc ipsi conspexerimus. Afferuntur ad nos passarū triplex discrimina. Primum in spartheis magnisq; corbibus. Secundum in similibus sportis, sed lauri fo-

T. 3. 5. p. 1061.



cum tot modis non tantum cibos, verum etiam medicamenta instruat. Est autem proceritatis mediocris, ceu mascula cornus. Cortex ramos uestit levis, glaber ac flavus; folia profert numerosa, longitudine sextantalia, latitudine uero semuncia plerumque excedentia, utrinque acuminata, nullis omnino incisuris serrata, nullisque uenis conspicua, praeterquam unico, per medium dorsum spinæ uice, transeunte neruo, tactu crassa, spissa & glabra. Colore, in uiridi flauescencia, supernè quam infernè pallidiora contraharum arborum naturam, tam breui pediculo adnata, ut surculis ceu infixis appareant. Sapor iis amarus atque subacris, quem admodum & cortici. Flores producit paruos, candidos, foliatis, aspectu muscosos & propemodum racemosos, qui non omnes ad frugem perueniunt in Europa, in iis uero locis, quibus propria est hæc arbor, perueniunt, ideoque congestæ eius baccae confectas uuas æmulantur. Ipsi fructus, quos oliuas uocant, cum ad maturitatem peruenierint, mediocris atque oblongi pruni, cum magnitudine, tum etiam figura spectantur, quantitas tamen diuersis generibus ditersa: quædam enim oliuæ unciam, quædam sesquiunciam excedunt. Colorem habent principio uiridem, mox flauum, postremo fuscum: constant autem carne, succo, semine. Caro primum dura est, in maturitate uero mollis, succus pinguis & oleosus existit, atque aliquid aquei sibi commixtum habet, quod autem pingue dulcè in eo fuerit, oleum appellatur, quod uero aqueum ac amarum, amurca. Semen oblongum, lignosum, durum, & utrinque acuminatum, singulis oliuis singulum intra se candidum nucleum claudens, eiusdem figuræ, cuius ligneus cortex. Materia arboris æqualiter spissa, solida, crispa ac intorta, attamen tenera, gustu amarescens: colore, inter flauum ac spadiceum ferè medio, nonnunquam etiam maculis utriusque coloris inuicè conuolutis conspersa, præsertim cum ad iustam ætatis consistentiam peruenierit. Radicibus nititur partim rectis, partim obliquis, in summo cespite coherentibus. Materia arboris modò solida: gaudet calidis regionibus, ideoque in Syria, Græcia, Italia atque Hispania feliciter provenit. In Germania uero, quamuis diligentissime coletur, nihil præter florem producit, idque in calidiori eius parte.

DE COLYMBADIBVS.

CAP. XX.

COLYMBades, muria conditæ oliuæ sunt, ab innatando sic appellatæ, conduntur tam immaturæ quam maturescences, afferuntur ad nos integræ cum muria sua ex Italia, terrestri itinere, & Hispania per mare, arboris suæ frondibus, ac Thymi manipulis mixtæ. Eligito solidas, æqualiter flauas, unciales ferè, nulla putredinis macula emollitas, superficiei extentæ, ac minime rugosas, pediculis adhuc adherentes. Saporem habent amarum, subacrem, ac propter muriam, salsum, estque hic non ingratus. Vsus eorum in sanitate cum assatis carnibus est, in delicatioribus Germaniæ Gentibus frequens.

OLEVM est succus Olivarum, preli ope expressus, substantia pinguis, gustu dulcis, eius ad nos tria perueniunt genera, Italicum & Hispanicum, utrumque ex maturis oliis expressum, atque Omphacinum, hoc est acerbum, ex immaturis bacis factum, affertur tam ex Hispania quam Italia. Italicum frigore facilius densatur, aquosius enim est, colore cum concreuerit in flauo candidum, aspectu subasperum inaequale ac ueluti harenaceum, qualis consistentia à Germanis *Grigeli* uocatur: gustu dulce ac suauis. Hispanicum contra siue ab Vlisibona allatum pinguius est, aspectu ac substantia aequalius, leuius, tenuius & acrius. Sapore primum dulci, postea uero fauces aliquantulum sacrificante. Omphacinum quod Latini acerbum uocant, uiridius existit, gustuque adstringit mediocriter. Omni recenti Oleo odor suauis, Hispanico tamen acrior paulo, Omphacino praeter suauem quiddam acidi redolens. Contra ineterato cuiuscunque generis rancidus & nauseosus non tantum odor, uerumetiam sapor. Atqui omne recens ac nuper expressum oleum, tria in se continet, oleum, amurcam & fraces, ut paulo ante relatum à nobis est, cum Oleam describeremus. Fraces appellantur fundo insidentes feces, haec fiunt ex comminuta bacarum carne simul expressa ac fundum petente, sapore subamaro ac subacri. Amurca est aquosus ille succus, ab oleo & fracibus recedens, supra fraces & infra oleum constitutus, tenuior quidem fracibus, ponderosior uero oleo: ideoque medium inter utrumque locum occupat, ueluti inter aërem ac terram aqua. Oleum postremo utriusque leuius existit propter aëream pinguemque substantiam, supremum ex hiis locum obtinens, ac omnino similem qualem inter elementa aër. Porro haecenus simplicis, naturae ac proprie nominati olei Historiam recensuimus, alibi facticiorum, & ad Medicinam compositorum oleorum rationem tradituri.

DE CITRIO altero. [Vide supra, Lemma capituli 12.]

CAP. XXII.

EST etiam altera Citritis per omnia similis Citrio, Arangia mala ferenti: fructus gignit Arangiis similes & aequales, multo tamen gratiore, magisque fuluo colore, odore, Arangiis ignauiora multo: sola figura, soloque aspectu gestantium oculos inuitantes. Carne constant Citreis simili, gustu insuauis. Quinetiam in superficie infixorum dentium uestigia habere dicuntur, unde eis Adami pomorum nomen factum est, quo ab Italis cognoscuntur. Colitur & haec arbor in Calabria, mihi nondum uisa, quapropter breuiter eam percurramus.

DE LARICE, [Cuius elegantem picturam Matthiolus dedit.]

CAP. XXIII.

LARIX resinifera est arbor, caudice recto, procero atque Abieti aequali cortice crasso, scabro, fuscoque, ramis supra medium multis foliis capillatis, uillorum instar coaceruatis, longitudine sextante, crassitudine uero porcinas fetas aequantibus, colore in uiridi pallidis, tactu mollibus, teneris, iuxta exortum est singulis ueluti tuberculis, per intervalla dispositis, exeuntibus, leniter odoratis, contra hyemem cotumacibus, nec antequam alia ueris initio succedant, defluentibus: quod ubi contigerit, non uniuersa simul, sed singula paulatim recedunt, aliis successiuè ab iisdem tuberculis prodeuntibus, dilapsorum uices occupaturis. Itaque non defluxisse folia, sed noui iuuentutis habitum induisse uidentur: Conos, (qui fructus eius sunt) è ramulis profert paruos, oblongos & ouatos, longitudinis sesquiuncialis, Cupressi galbulis similes & aequales, tenuioribus tamen squamis compactiles, autumnis maturescentes, semina singulis squamis geminum tegitur, admodum paruū, Tedaë seminis figuram & quantitatem referens, foris cinereo cortice, intus autem candido nucleo constans, sapore dulci, & pineam nucem emulante, seminibus annexae sunt singulae ceu alae, apud siue alterius cuiusdam insecti pennis similes, è dehiscētibus autumno conorum squamis se exercētes, ipsa semina uento dispersa, ut diffusius & rarius spargantur, uehere & impellere nata.

nata: squamis ex interiori parte binæ sunt cavitates, quarum convexa subtus latia-
 tantia femina operiunt. Materia arboris est spissa, dura, colore spadicea, veluti Ce-
 dro & Taxo, corruptioni ac terebinibus minimè opportuna, ideoq; seculis aliquot
 duraturis operibus & edificiis dicata. Resinam fundit larix liquidam, nunquam du-
 rescentem, liquidi mellis consistentia, colore flavam, nonnunquam etiam vitream
 & transparentem, gustu plusquam amarescentem, mediocriter acrem, tenuem, &
 odoratam, quæ hodie non tantum pro Terebinthina in usum recepta est, verum et-
 iam solo Terebinthina cognomento cognita, quamvis à quibusdam Italis etiam
 Largatum & Lachrymum, id est, lachryma appelletur. Nascitur in Alpibus Ger-
 mania, copiosissima autem circa Saltzburgum regionibus, & Silesia Moraviaq;
 montibus, in finibus Boiohemia. * Lerchenbaum/unde Larignaresina est.

Larix. T. 3. 77. p. 119.

Oleaster Germanicus Cordi videtur, aliqui Rhamnis adnumerant.



DE OLEASTRO Germanico. [Hic fortè etiam cognatus frutex aculeatus, qui circa Rhenū
 versus Curiam copiosè nascitur, acinis è luteo rutilantibus, acidis: quem aliqui Rhamni
 speciem esse putant: cuius iconem de nostris addidimus. CAP. XXIII.]

OLEASTER Germanicus, arbor est non adeò procera: cum ad iustam ma-
 gnitudinem peruenit, quatuor, quinq; aut sex cubitorum altitudine, nonnun-
 quam etiam procerior. Caudice aliquantulum intorto, ramis, furculis, corticis, co-
 lore, aculeis, & toto propemodum habitu, sylvestri Pruno, hoc est, Spino pruna fe-

r ij

renti similis, siquidem cortice uestitur foris colore spadiceo: aculeisq; armatur longis, fescuncialibus aut sextantalibus, colore ut plurimum cinericeis. Folia totis ramulis furculisq; adnascuntur oblonga, oleae similia, minora tamen tenuioraq; atq; breuissima, tenuissimaq; lanugine subtus canescentia, superius autem in uiridi cineracea, longitudine sesquiunciam, latitudine uero tertiam digiti partem æquantia, sapore modicè adstringente, odore nullo. Flores totis ramulis adnascuntur quibus singulae succedunt bacca, Myrti baccis similes, paulo tamen maiores, oblongiores, multo tamen molliores, colore primum autumnno, deinde cū ad maturitatē peruenerint, tenui, glabra, fragiliq; cute & succo cōstantes. Succus autē triplicē misturam sortitus est: uidelicet oleū, aquam & carnis parū, qui ē baccis expressus in tria medicamēta, ceu oleae succus seipsum diuidit. Caro enim fundū uasculi petens, in fraces transit gustu adstringētes & acēscētes. Aqua medium locum occupat, supra fraces, & infra oleū constituta, in amurcā conuertitur, consistentia tenuem, sapore ualdē acidam acipsum acetum emulantem. Quod autem pingue in hoc succo est, propter leuitatem in summo amurcæ suæ supernat, pinguedine nihil à uero oleo distans: tenuius tamen, gustu pingue, subacidum & modicè adstringens, odore olei aceto commixti. Tota autem bacca digitis contrita, naribusq; admoda propter acidam amurcam, magis quàm oleum acetum redolēt: quæ uero tota hyeme in arbore remanserint bacca, si terantur, succum remittunt aspectu & colore † post imitantē. Odore aceti ueteriq; rancido oleo cōmixti, corrumpitur enim, putrescitq; gelicidiis in baccis oleum, ut odore tantum ab amurcæ inesse cognoscatur. Semina baccis sunt singula parua, oblonga, utrinq; acuminate, pallenti tunica inuoluta: aspectu foris fusca, intus uero candicantia. Radice arbor nititur multifida & diffusa. Materia eius à Spina, pruna, agrestia ferēt, sola molitia differt. Frondes eius in cubiculum proiectæ mures alliciunt, præsertim siccatæ. Nascitur circa fluuios & amnes, solo lapidoso arenosoq; copiosissima autem in Germania ad Lycum Vindelicię amnem, & ad Danubium ab eiusdem Lyci ostio, usq; ad Petreas fauces, per quas Danubius fluit, tribus millibus passuum supra Kelheyam mium oppidum sitas.

†
Forte Pius
uel Porst.

DE TAMARISCO Fœmina, Fœminam uocat eam speciem, quæ latioribus folijs est, medulla maiore, & ligno minus solido: Marem uero, cui folia tenuiora, medulla minor, & lignum solidius: qualis apud nos, & Argentorati circa Rhenum nascitur. Fuchsius in libro iconum Tamaricem syluestrem fœminam pingit. Tragus non distinguit: figuram tamen, quam ex eius libris exhibemus, illi quàm Fuchsius dedit, persimilis est. 1
CAP. XXV.

TAMARISCV S fœmina, masculæ Tamarisco, uirgarum figura, magnitudine, & colore per omnia similis est, folijs eiusdem instar in uiridi cineraceis, indiuiduis, paruis, oblongis & circa ramulos furculosq; totos undiq; frequentibus, iisdemq; sursum uergentibus. Flores ueris medio circa quadrantales aut sextantalesq; gracilesq; furculos fert, muscosos, exiles, numerosos, in quina ut plurimum acuminata foliola, stellę figura dehiscētes, colore aut candidos, aut in candido purpurascētes. Radicibus nititur foris colore fuscis. Materia uirgis seu baculis à radice præcis est, multo quàm masculę rarior: amplaq; intus & fungosa, medulla inanis & laxa. Saporem cortices, folia & flores habēt adstringentē, simulq; tenuem, & haliū faciliiori respiratione commendantē. Odorem siccatae frondes iucundum exhalant. In summa tam qualitatibus, quàm aspectu masculam Tamariscum immitatur. Nascitur secus rapidos & crebris inundationibus tumidos amnes, solo saxoso: copiosa autem circa Lycum & Vertachum Vindelicię amnes: præsertim Augustiæ, & in ripa Danubii infra Lyci amnis ostium, porro in omnibus hisce locis promiscuè cum Oleastro Germanico prouenit, quamuis humiliores, humidiores & magis lapidosos quam Oleaster natales amet. siquidē hic etiam longius à fluuijs solo, editiore & tamen plano exit, altissimis inundationibus exposito.

DE

Tamariscus. T. 3. 5. p. 955.

Pseudocrania. T. 3. 26. p. 1003.



DE PSEUDOCRANIA, Lix est, falsa Corno. Querendum an hæc sit arbus-
cula, seu frutex, quem à ligni duritia, Germani *Saxriegel* appellat. Plinius
Virgam sanguineam appellauit. Eruditi quidã Cornu sceminam esse cõijciunt,
(sed Cordus mox cap. 30. aliam Cornum sceminam describit.) cuius iconem ap-
posuimus. CAP. XXVI.

PSEUDOCrania, arbor est quatuor, quinque aut sex cubitorum altitudine, cava
dice distorto ut plurimum, crassiore quàm ut manu complecti queat, cortice ue-
stita spadiceo, ramisque pluribus brachiata. Folia habet subrotunda, ac interim in bre-
uem mucronem desinentia, leuissimè per ambitum serrata, rarò sesquiuncia latiora,
figura inter Tiliam, Betulam ac Pirastrum media. Flores post ueris initium secus
folia è surculis ramulisque profert paruos, colore propemodum in herbaceo palle-
scentes, staminibus paucis breuibusque stipatos: in medio flore exiguum & oblon-
gum eminet secuturi fructus rudimentum, quod paulatim, relicto post se flore, in
oblongam excrescit baccam, utrinque modice turbinatam, & corni fructus modò o-
uatam magnitudine principio utridè, in maturitate demum Ra-
dice nititur multifida, quoquo uersus distracta. Nascitur in saxosis collibus inter
petras, quales sunt supra Regensburg urbem (quam Ratisbonam uocant) in utra-
que Danubii ripa.

r iij



TRIFOLIA arbor, octo aut decem cubitorū altitudine adolescit, caudicem habet inferius subscabro, superius autem leui, ac in cinericeo subuiridi cortice uestitum, circa medium ramosum. Foliis plerumq; sextantibus utrinq; acuminatis, minime per ambitū serratis, atque in singulis pediculis ad Trifolii exemplum ternis. Flores post ueris principium producit, in didrantalibus, gracilibus atque dependentibus pediculis numerosos, figura fabaceos seu papilionaceos, quales in omnibus leguminibus est uidere: colore luteos & geniste floribus similes, & quibus singulae nascuntur siliquae,

longitudine quadrantales, sextantalesue, graciles, & in latitudinem aliquam compressae, semine grauidae: colore, figura, & magnitudine inter scenogracum & lenticulam medio, gustu subamaro, ac modice cum nausea quapiam adstringentum Oeniponti, & Francoforti ad Moenum fluiuium siti.

* Cytisus quorundam: Laburnum Plinij, & Anagyris altera (maior) Matthioli.

CYTISVS albus sylvestris frutex est, plures ab una radice perennes emittēs, quibus totis folia adnascuntur numerosa, in singulis pediculis terna, à tergo breui admodū ac pilosa lanugine canescentia, dorso elato, ab utraq; parte in mucronem desinente, carinam referentia: & uulgari alicui Trifolio similia, minora tamen. Gustu suauiter glutinosa & dulcescentia. Flores post ueris initium ab inferiore subpropemodum parte usque ad summitatem uirgarum, & foliorum alis producit oblongos, papilionaceos, longitudine sesquiunciales, Fabae floribus similes, colore luteos, sapore immaturi cuiusdam leguminis, & quorum medio singulae sepe ferunt,

Effigies hæc Cytisi est, qualis circa Scaphusiam in
collibus nuper a nobis repertus est.



serunt siliculæ, prin-
cipio hirtæ & inca-
uæ, æstate mature-
scentes, longitudi-
ne ut plurimum se-
xtantes, angustæ-
quæ. Semine intus
gravidæ, media fe-
re inter Fœnogra-
cum & Lenticulam
figura & magnitu-
dine, gustu uiciæ se-
men imitante. Ra-
dice nititur ligno-
sa, multifida, longa
& quia frutex est,
perenni. Nascitur
montanis locis in-
ter petras & arbu-
sta, isdemq; nō ni-
mium opacis aut
umbrosis sed poti-
us apricis, copiose
autem Ratisbonæ
ad Danubium sitis
collibus, & præfer-
tim eo monte qui
Castein ab incolis
nominatur, inter
urbem ipsam &
Stauffam Danu-
bio imminens op-
pidum, ad sinistra
iacente.

DE PSEUDOCYTISO, siue nigro & maiore Cytiso.

CAP. XXIX.

PSEUDOCYTISVS, siue niger Cytisus, prædicto similis est aspectu, ma-
gnitudine & foliis, hoc tamen differt quod magis in rectum adolescat, ramu-
losq; potius furculosos, quàm uirgas è caudice proferat: ligno etiam constat fragi-
liori, cortice & foliis nigrioribus, nec ita in carinæ figuram elato eorum dorso.
Gustu minus glutinoso, floribus quidem luteis, sed breuioribus, & fusco in siliquis
semine. Nascitur isdem quibus albus locis. Tubingæ autem in Vuirtember-
geni Sueuiæ, solus absq; albo prouenit.

DE CORNO FŒMINÆ. [Vide supra, lemma capitis 26. Corni simpli-
citer, maris nimirum, icon hæc est è Tragi libris.]

CAP. XXX.

CORNVS fœmina, masculæ Corno per omnia similis est: distat tamen
ab hac, caudice minus procero, minusq; recto: flore racemoso quidem, sed

r iij

minore, colore in uiridi pallido, seriusq; erumpente: baccis austerioribus, & materia minus spissa.

* Cornus est arbor durissimo ligno, Germanice *Cornlebaum*, & *Hornfirsche*, & *Welscher Firschenbaum*, Nascitur in Hercynia copiose propè Stolbergam.

Cornus T. 3. 37. p. 1024.



DE COTONEA MALO sylvestri. CAP. XXXI.

COTONEA malus sylvestris, sativæ per omnia similis existit, à qua ramis distat minoribus tantū, caudice assurgit magis recto, iuxta terram minus fruticoso, sed singulari frequentius: eadem numerosioribus scatet floribus, & largius fructificat. Fructus sero perficit, qui etiam sativæ fructibus multo sunt minores.

Nascitur ad radices montium & collium, frequenter etiam inter petras, atque in vinearum sepibus, copiosissime autem supra Ratisbonam & supra Kelheimium oppidum, petrae faucibus, in utraq; Danubii ripa.

DE THYMELAEA minore. CAP. XXXII.

THYMELAEA minor, parvulus est frutex, plures ab una radice emittens uirgas, longitudine pedales aut dodrantes per terram stratas, lentas, flexiles, &

306, 9.7.57



& distractu contumaces, foliis numerosis, undiq; uestitis, figura oblongis, utrinq; acuminatis, crassiusculis, superioribus viridibus, inferioribus pallidioribus, Olea Myrthiq; foliis multo minoribus, ac potius frutesco Polio similibus, paulo tamē maioribus, gustu glutinosis, Flores, sole Taurū occupatē, producit in summis uirgis oblongos, inferius angustos, superius in quaterna folia parua se pandētes, e purā in puniceū atq; candicantem colōrē uergentes, densos, confertos, & ab uno principio se in corymbos diffundentes, suauiter odoratos, & mellis aliqū odorem redolentes, diuq; durantes, quibus coronariū utuntur. Floribus singularē succedunt

Radice nititur longa, candicante, neruosa, lenta, flexili,
infragili, & perenni: gustu ad aliquot horas fauces & palatum Coccognidii modo
excalefaciente & scarificante. Nascitur frutetosus & muscosus, tam planis quam edia-
tis locis, nonnunquam etiam sub Iuniperis. copiosa autem circa Vindelicorum Au-
gustam & Ratisbonam.

DE GENISTA angulosa. [Tragus Chamaespartium nominat. Foliorum in
descriptione meminit, quæ icon non representat.] CAP. XXXIII.

GENISTA angulosa, frutex est, cuius rami in plurimas uirgas diuiduntur, longitudine cubitales, gracilitate iuncea, angulosae, egregie uirenti cortice uestitae, erectae, lentae, flexiles, distractae difficiles, & scoparum modo in densam congeriem stipatae, in quibus folia sunt parua, oblonga, utrinque acuminata, rutae foliis aequalia, & in singulis ferè exortibus terna. Flores medio uere, cū humidior annus fuerit, totas uirgas uestiunt, Papilionum aut Pisi florum figura, colore egregie lutei, magnitudine unciales. ē quibus singulae excreſcunt siliculae, principio leniter hirtae, cum ad iustam magnitudinem adoleuerint, ut plurimum sextantales, in latitudine aliquam compressae, colore nigricantes, intra se semen claudentes lenticulae similes, minus tamen, colore flauum, consistentia mediocriter durum. Radice nititur multi

Genista angulosa. T. 2. 7. p. 602.



fida, nervosa, lenta, flexili & infragili, colore lutea. Totus frutex grauius Sambuci propemodum instar olet. Saporē caudicis ramulorumque cortex, folia, uirgæ, flores, semina & radices habent amarum, ac reliquorum purgantium medicamentorum modo nauseabundum. Folia autumnī exitu amittit, uirgis tota hyeme inter nives grato aspectu uirentibus. Nascitur montanis, asperis locis, solo denso, rubricoso, simulque arenoso, ut in Hestia, Sorlandia; nec non planis campis in mera arena & sabulo, ueluti in toto Nurebergensi agro, præsertim circa Lauffam oppidum. Porro silentio prætereundum non est, hunc fruticem in arenosis campis humilem esse, & duos cubitos rarissime excedere in montibus uero, ubi densius & asperius solum nactus fuerit, arborescere: caudice, qui manu amplecti nequeat, quinque & sex cubitorum proceritate, atque tam densis stipari uirgis, ut quantum uis profundas nives sustineat, nec patiat remere ad radices usque eas delabi: adeo ut liberam uiam & transitum syluæ eius, nives fornices subeuntibus præbeant uiatoribus: maxime autem in Sorlandia montibus, quibus mirum quomodo scaturit, & abundat hæc Genista.

* Günsler zu Siegen, pabulum optimum pro ouibus.

DE GENISTA IUNCEA.

CAP. XXXIIII.

GENISTA iuncea, angulosa & proximè descripta, ramulis, uirgarum rectitudine & uiriditate similis est, tenerior tamen in uniuersum, minime angulosa, sed teretibus, glabris uenosisque uirgis, foris lento, neruoso, flexili & uirenti cortice: intus autem inani, fungoso candidoque habitu, leuem iuncum per omnia referentibus: folia, tenera tantum & nuper enata uirgæ habent angusta, utrinque acuminata, longitudine uncialia, numero pauca, ex interuallo plerumque singula, non ut angulosa, in unoquoque exortu, terna: annua uero & uetustiores uirgæ ramulique, foliis omnino carent, eo tantum loco excepto, quo tenera emittunt germina. Flores quibus singule succedunt similique prædictæ longiores quidem, sed paulo angustiores, quadrantem ut plurimum longitudine æquant, semine intus Angulose simile & æquale. Radicem habet cuius cortex, quemadmodum etiam caudicis & ramorum, gustu Angulosam genistam æmulantur. quin & huius semen gustu, & qualitates illius imitatur, omnes tamen eius partes remissiores sunt tam odore, quam sapore, at extremæ uirgæ & nouella germina nihil graue, nihil nauseosum, nihilque amarum olent aut resipiunt, præterquam herbaceam & inspidam lunci qualitatem. Nascitur

Seritur

Seritur apud nos à quibusdam in hortis, quemadmodum & in Italia aliquot locis, spectandi tantum gratia.

* *Sparthum Hispanicum.*

Genista lincea.



DE LYCOSTAPHILO MASCULA. [De foemina leges supra,
Cap. 3. huius libri, ubi et Iconem inuenies. CAP. XXXV.]

LYCOSTAPHILUS mascula, arbor est fruticosa, multis circa caudicem stolonibus, quinque aut sex cubitorum altitudine assurgens, caudice brachiali crassitudine, ramoloque uirga & furculi ex intervallo ramulis enascuntur gemini: alterno positu cruciformem habitum referentes, eum in modum dispositi, ut bini semper in singulo exortu sibi aduersentur. Folia habet quatuor aut quinque ut plurimum, unciarum latitudine, uittigineis propemodum similia, in tres partes minoribus incisuris serratas dissecta, tactu mollia. Flores in extremis furculis, sole geminos intrante, se proferunt numerosi, conferti, latam, densam & corymbaceam umbellam constituentes, quinque subrotundis foliolis compositi, nullis in medio prorsus staminibus, aut staminum siue uestigijs, siue rudimentis, insignes. Colore candidissimi, nullo odore, sed solo candore commendabiles, & nullam secuturi fructus spem promittentes. Materia arboris est rara, fragilis, grandi intus acinani fungosaque medulla peruia, ueluti Sambucus & Ficus. In summa tota arbor, radice, caudice, ramis, furculorum ordine, folijs, floribus, materia, corticisque odore, & sapore, Ly

VALERII CORDI HISTORIAE

costaphilo foeminae, hoc est, fructiferae similis existit, praeterquam quod masculae flores, nulla in medio, ut foemina, staminum uice foliola habeant. Masculae praeterea nullum fructum deprehendere potuimus, cum foemina etiam hyeme puniceis baccis suis gratum inter niues spectaculum praebat. Nascitur iisdem, quibus foemina, locis: sed in Germania parcius, ideoque in hortos propter florum elegantiam transfertur, praesertim Augustae Vindelicorum, Ratisbonae, ac Nurembergae.

* Videtur esse Schwellen.

DE ANAGYRI. Tragi haec est Faba inuersa, uel ut alij nominare malunt, foetida. Germanice Baumbohnen, Qui plenius pictam Anagyris requirit, a Mattheiolo petat. CAP. XXXVI.

Anagyris. T. 2. 14. p. 619.



ANAGYRIS parua est arbuscula, caudice singulari, rimoso cortice, scabritiem quandam referente, qui in uirgas diuiditur rectas, teretes, flexiles, & fractu contumaces, duplici alterno, alatoque ordine germina ac surculos ita emittentes, ut alterius ordinis surculi oppositorum germinum spaciis ex aduerso innitantur. Folia habet partim oleae partim Vitici similia, latiora tamen paulo, et Oleae foliis molliora, utrinque acuminata, supernè uiridia, infernè in cinericeo canescentia, longitudine sesquiuncialia, nonnunquam etiam promissiora, & in singulis pediculis terna. Quod autè inter ea medium locum occupat, aliis duobus cum longius, tum etiam latius existit. In summa, Trifolii alicuius folia imitatur. Flores

quibus succedunt siliquae, semina intra claudentes renibus, aut Smilacis satiuæ seminibus similia, minora tamen, breuiorâque, & ad minorum fabarum tam figuram quam magnitudinem propius accedentia, superficie glabra, colore inter se diuersa, quaedam enim, arbusculae purpureos, quaedam liuentes, aliae in cinericeo pallidos, foetus excludunt: omnibus in maturitate ossea est soliditas, ac dentibus prope modum inuicta duricies, quam non tantum in cortice, uerum etiam in flaua intus carne obtinent. Radice nititur recta,

descendente, plures fibras in obliquum emittente, flexili lentore uirgas æmulante. Foetorem contrectata manibus, cortices, germina & folia, ædunt foetum, nauscahabet ceu pratense aliquod Trifolium, interim tamen ingratum, semina uerò

* Faba foetida. Baumbohnen Tragi.

FINIS LIBRI III

VAL. CORDI PLAN-

tarum historiarum, liber III, in quo

LIGNORVM, CORTICVM, ET FRV.

Etiam peregrinorum: item peregrinarum radicum & lachrymarum descriptiones habentur.

Quidquid Thuriferis procul Sabæis,
Eoisq; rates uehunt ab oris,
Maurorumq; dat ampla, uasta tellus,
Atq; ex occiduis refertur Indis,
Descriptum modica probè papyro,
Iste paruulus exhibet libellus.

DE GVAIACO, sorte Trogete, seu Thuia, seu Citro.

CAP. I.



GVAIACVM, lignum est proceræ arboris ex Hispaniola insula, ante quinquaginta annos primum ad nos allatum: cuius non unum genus esse multi arbitrantur: optimum autem ex sequenti descriptione cognoscitur. Caudex huius arboris ab incolis in trunco serra inciditur, cuius diameter plerumq; do drantis aut pedis longitudinem habet, cortice uestitur in candido cinereo: quo detracto, materiæ superficies pallida spectatur, pollicari profunditate. quæ uero intra hunc annulum clauditur nigrior materia, solidior est, non unum habens colorem, nigricat enim quædã, quædam etiam in spadiceo colore flauescit, quædam præterea omnes istos colores discretos habet. quare in plura genera hoc lignum ab aliquibus diuiditur: eligendum tamen est quod rufum, spadiceum, flauum, liuidumq; colores simul mixtos habeat. Pectines, quibus in longitudinem findi possit, non habet, sed admodum breues, in rectum, obliquum, transuersumq; diuissos reuersosq; quos Germani lignarii fabri *Widerburstige Schliffen* uocant, densa item, compactaq; est materia, quapropter torno leuigata, polito marmoris, uel cornu similis est, & aquæ iniecta quamprimum fundum petit. Radice aut trunco eius inferiori nihil crispus, cum torto ac sinuoso uillorū discursu, cuiusuis aceris tuber prouocet, acetiæ superet. Saporē habet modice amarū in dulci, leni & mordicante acrimonia adiuncta.

f. iii.

PRESILIVM lignum, aliquam in materia cum Acere habet similitudinē, colore tamen rubet; inuenitur etiam in ruffo candicans, sed prædictum melius est: crassitudine Guaiaco æquiparatur, pectines habet rectos, ideoq̃ facile finditur, scobina asperiore in assulas redigitur, quæ in liquorem, quo decoquuntur, rubedinem suam deponunt, tinctoribus expetitam, scribendis etiam rubentibus literis aptam. Eligito materiam eius ruberrimam, decorticata ad nos affertur, ut pluuias uel alias ex industria affusas aquas facilius inbibere possit: hoc enim pacto id quod pallidius est, floridiorem acquirit colorem: quidam etiam lixiuio humectant, facile deprehenditur, purpurascit enim in superficie, intusq̃ remanente pallore, Saporē habet modice dulcem.

DE PRESILIO citrino, id est, Bugia. CAP. III.

PRESILIVM citrinum, longi sunt baculi, crassitudine qua ferè manum impleant, rectis per longitudinem descenduntibus pectinibus. Colorem habet flauum uel citrinum, dolabris in tenues & fasciis similes assulas scinditur, quæ in aqua decoctæ, luteum uel citrinum remittunt colorem, quo fullones tingendis lanis & pannis utuntur, in gustu ferè nulla qualitate linguam afficit.

DE SANDALO rubeo, id est, Loto arbore. CAP. IIII.

SANDALVM rubeum, peregrinæ & in Africa Indiaq̃ nascentis arboris materia est, crassitudine & pectinibus rubenti præsilio similis, colore multo rubentior & ad nigredinem accedente: huius etiam solidior, & propterea ponderosior est quam illius materia, ideoq̃ aqua iniecta quamprimum fundum petit. Saporem habet dulcescentem adstringentemq̃ leniter: odorem uerò nullum fatum est, tingit hoc etiam quemadmodum præsilium, sed gratior profundiorq̃ huius est quam præsilij color. Decorticatum affertur.

DE SANDALO CITRINO. CAP. V.

QUOD uerò Citrinum appellatur sandalum, diuersum penitus à ruffo mihi esse uidetur, nam gracilius quam illud est, & dissimili constat materia & qualitatibus, sine cortice ad nos affertur, forisq̃ pallidius est, intus uerò solido, ponderoso, pingui, et si aquæ imponatur, fundum petente, leni, tenuissimo, nullamq̃ medullam habente, ligno constat: sapore acri, aromatico, per totum os se diffundente, & ad caput usq̃ penetrante: colore in flauo rubescente. Odorē habet quemadmodum & saporem aromaticum, iucundum, fortemq̃, qui facillimè caput tentet & repleat.

DE ALBO SANDALO. CAP. VI.

EST & tertium sandalum, quod quidam album uocant, sed reuera nullam habet in colore, quia à citrino dignoscatur, differentiam: inuenitur enim quod magis flauo & profundiore sit colore quam antea descriptum citrinum. Quapropter hac nota non est à prædicto discernendum, sed tantum odore & sapore, hos enim ualde imbecilles, uix perceptiles, & citrino dissimiles habet, magnitudine uerò & materia illi omnino simile est, & similiter decorticatum ad nos affertur.

DE AGALOCHO, id est, Xyloaloe solida & ponderosa. CAP. VII.

AGALOCHVM in plures species ab authoribus, præsertim recentioribus diuiditur: quo uerò passim utimur, lignum est duum triumue digitorum crassitudine densum, ponderosum: & aquæ iniectum, fundum petens, pingue, nodosum, pectinibus non adeo rectis, sed interdum in tuber inuolutis, colore uarum, maculosumq̃,

culosumq; nigris, fuscis, & flauis distinctum uenis, gustu acre, amarum & aromaticum: odore, dum prunis inponitur, grato & iucundo: prunarum calore pinguem, rubentemq; remittens liquorem, et spumę modo paruas agentem bullas: affertur & hoc decorticatū sandalorum modo. Nascitur in India & Arabia. Quidam hoc Agalochū, lignum Rhodium siue Rhodisium appellant, & Aspalathum esse affirmant, ut Sueffionensis ille Ruellius, sed errat plurimum, uir alioquin doctissimus, & multę lectionis: sunt etiam qui hoc Oleastri lignum esse credant.

DE TARO, id est, Xyloaloe fissili, leui, & aromatica.

CAP. VIII.

TARVM uerò, quamuis Agalochi species sit, & ab Aëtio Xyloaloe appelle-
tur, diuersum tamen penitus a prædicto Agalochio existit. Crassiore siquidem multo est trunco, ut uix utraq; manu amplecti possit: materiam, & rectos gracilesq; pectines instar fichtę habet, quapropter facile in parua etiā frustra finditur: colore uerò ab abiete multū differt: fuscū enim in cinereo existit. Et ut plurimū maculosum, præsertim si per transuersum incidatur, partim enim fuscis, partimq; caesiis uenis distinguitur, opimum erit in quo nigredo superet: pondere etiam prædicto multo leuius est, nec aquę infectum submergitur, nisi multis in ea diebus maduerit. Saporem habet aromaticum, per totum os, ob partium tenuitatem se diffundentem: odorem uerò siue tritu siue prunis impositum, suauissimum: qui a gustato etiam ad cerebrum ascendat.

DE TARO CRISPO.

CAP. IX.

AFFERTVR & aliud ex India Tarum, prædicto simillimum, leniter sintio-
sis pectinibus, fluctuanti aceris tuberi simile, colore pallidius, materia rarius, odore & sapore imbecillius multo. uidetur tamen ex eadem arbore desumptum esse, atq; a radice potius quam caudice (nam radices arborum Crispiores plerumq; sunt quam ipsi caudices.)

DE CINAMOMO CHARACIO, id est, usuali.

CAP. X.

CINAMOMVM characium, quod nunc ubiq; simpliciter cinamomum si-
ue canella uocatur, cortex est rectus, longitudine cubiti aut maiore fistulę, aut cannalis modo concauus, colore in fusco rubescens, cuius crassiores & inferiores partes, alio cinereo, tenui & scabriori cortice uestiuntur, qui, quoniam inutilis penitus existit, deraditur: baculi autem arboris, a quibus deglubitur, pollicis aut digiti crassitudine sunt. Saporem habet ualde acrem, nō cum molestia pungentem, sed iucundū, & supra omnia aromata, suauī acrimonia linguam titillantem. Odorem item suauissimum, siue gustetur, siue alias tritum, aut confractum naribus admoveatur, spirat. Optima autem est interiora corticis pars tenera, & in longum fissilis: exterior enim scabrior existit, & remissiori acrimonia, eaq; simul adstringente constat. quod uerò cortice continetur, lignum inutile est, ideoq; ab incolis, ubi nascitur, abiicitur.

DE CASIA AROMATICA.

CAP. XI.

CASIAE, apud ueteres multa, quemadmodum etiam cinamomi, genera co-
gnita fuerunt, quę multis seculis iam delituerunt: iam uerò tria rursus afferri coeperunt. Est autem quodlibet horum cinamomo similis frutex aut arbuscula, quatuor plerumque, aut quinque cubitorum altitudine, rectis caudicibus & ramis adolescens, duorum pollicium, aut unius crassitudine: superiores uerò ramuli graciliores sunt. Folia habet densa, laurinis similia, multo tamen maiora, ad Citri potius folia accedentia, utrinque fastigiata, ternas indiuiduasq; uenas per longitudinem transeuntes habentia, quarum mediā crassior rectaq; est, reli-

f. iiii

VALERII CORDI HISTORIAE

quæ duæ leniter curuatur, & in arcu sinuantur, eæ à tergo eminent, & euidentiores sunt quam intus. Fructus fert laurinæ baccis similes, minores tamen & rubentes, calicibus, seu capulis glandis modo insidentes, qui rarissime afferuntur. Cortices uero eius qui iam afferuntur, longitudine cinamomo characio similes sunt, crassiores tamen & nigriores, præsertim duo priores: quorum unus saporem habet acrem & aromaticum, ueluti si quis cinamomum, galangam & Caryophyllos æquis portionibus misceat, modicè insuper glutinosum: alter uero paulo remissior, glutinosum in gustu lentorem instar symphyti, reddens. Tertia species gracilior existit, colore & forma ad cinamomum accedens, cui etiam saporem similem habet, sed remissiore acrimonia & glutinosa lentore leniter adstringentem. Quæ uero passim iam in omnibus pharmacopoliis habetur, appellata Cassia lignea, adulterina est, & à præscriptis diuersa penitus: radicis enim cuiusdã cortex existit, nullum fatu dignum saporem, præter adstringentem, habens. Nascuntur uero omnes Cinamomi & Cassiæ species partim in India, partim etiam in felici & odorifera Arabia.

DE XYLOBALSAMO. CAP. XII.

LIGNVM quod nostra ætate Xylobalsami nomine affertur, tenues gracilesque uirgæ sunt, cubiti longitudine, aut maiores ex uno caudice, minimi digiti crassitudine nascentes, in plures furculos diuisæ, tenui & cinereo cortice uestitæ, gustu lenem & aromaticam acrimoniam respicientes, odore non admodum uehementi, qui dum teritur, uix percipi potest.

DE NASCAPHTHO, id est, Thymiamate. CAP. XIII.


NASCAPHTHVM quod hodie Thymiamata, & Storax rubea in pharmacopoliis uocatur, crassi corticis fragmenta sunt, colore in rufis nigricantia, quæ sola per se aut cum aliis quibusdam ad odores uaporantur: habetque acrem, nec iniurandum in suffitu odorem, gustu nullam ferè qualitatem præ se fert præter siccantem: estque huius rei causa, quod nimis inueteratum ad nos afferatur.

DE NVCE INDICA. CAP. XIII.

NVX Indica grandis, ouatus & triquetrus est fructus: humani capitis plerisque magnitudine, duplici cortice, nudo oculus constans, exterior cortex crassus, carnosus, & nervosis uenis per carnem in longitudinem transeuntibus, plenus est, quo de tracto alter subest solidus, lignosusque cortex, oblonga & paulo minus quam globosam speciem referens. Colore propemodum spadiceus, superficie modicè rugosus, obtusiore capite, rotundo foramine peruius, circa quod duæ aliæ paruæ cauernæ sunt impressæ, his tribus foraminibus faciei aliquam formam æmulatur, ita ut cauernæ oculorum & superciliorum uicem, peruium uero foramen oris impleat: in altero capite tres eminentiores anguli, in unum angulum desinunt. Nucleus lignoso hoc putamine continetur, totam eius cauitatem proportionaliter explens, cum recens est: siccatus uero in concusso cortice uacillat & mouetur. Color ei est in rugosa superficie fuscus, intus uero candidus, substantiam habet mediocriter cartilaginosa, pingue & oleosa, recens gustu dulcem, & butyro non salito similem, inueteratus uero simul rancidam. Habet hic intus cauitatem, qua maturus, & nuper decerpto fructu exemptus, aquam continet gustu dulcem, quæ successu temporis exsiccat: ideoque ad nos allatæ inanem habent cauitatem, propter quam multum nucleo decedit: nam si incisus, qui concavus est, uix minimi digiti crassitudine cernitur, qui cum sicca est, una cum lignoso & integro cortice bilanci impositus, ut plurimum duodecim, tredecim aut quatuordecim uncias pendet: affertur ex India, detracto plerumque exteriori cortice, cuius nervosæ uenæ torquendis fumibus apte sunt. Ligneus autem, et nucleo proximus cortex, argento exceptus, & ornatus poculorum uice, in conuiuia recipitur. Durat aliquot annis propter nuclei soliditatem.

DE

Nux Indica.



DE CVCI, id est, Nuce Indica minore.

CAP. XV.

NVX Indica minor, quam Theophrastus Cuci appellat, iam descriptæ similis est, multo tamen minor: totus enim fructus tres aut quatuor uncias longitudine raro excedit, idē superius latior est, quam inferius, ubi pediculo adnascitur, figura triquetrus, foris carnosio uenosoq; cortice, intus lignoso cōstans, quo nucleus cōtinetur oblongus in summo quam imo latior, utriusq; corticis modo triquetrus, unus tamen angulus harum partium acutus est: reliqui duo obtusi ac teretes, color nucleo est in superficie fuscus, intus candidus, habet etiam in medio cavitatem proportionē toti fructui respondentem, a quo humore plenum, paulatim cum exiccatur euanescens. Substantia nucleus constat primum cartilaginosa, pauloq; durior quam maior Indica nux, sed cum inueteratus fuerit, cornu soliditate æqua, qui pluribus diebus in calida aqua maceratus teneræ cartilaginis duriciem acquirit. Saporem habet, quemadmodum & odorem subrancidum, uelut maior.

DE NVCE moschata mascula uel maiore.

CAP. XVI.

NVX moschata mascula, colore rugoso habitu, intusq; uersicolore uenarum discursu, nuci moschatae similis est, maior tamen, oblongiorq; figura atque

magnitudine ferè ad vulgares palmulas accedit, cuius pericarpium, quale sit, nobis nondum constat. Saporem habet subacrem, aliquantulum tenuem & aromaticum, ideoq; contra difficiles partus eam assumunt Venetae mulieres. Affertur ex India, non tamen copiosè, sed rarò, cum reliquis aromatibus, præsertim nucibus moschat, casu quodam iis mixtae.

DE NVCE MOSCHATA. CAP. XVII.

NVX Moschata insignis est fructus, qui totus, cum ad iustum incrementum peruenerit iuglandis, uiride, carnosumq; putamen adhuc habentis, magnitudine cernitur, triplici cortice, nucleoq; compositus: exterior cortex carnosus consistit ac crassitudine uiuenti iuglandium putamini similis est, cui subest alter tenuior, non continuus, sed in partes sectus, colore in flauo rubescens, qui singulari prius nomine olim macer, nunc uero macis appellatur. Eo detracto apparet tertius colore in fusco purpureus, aut rufus, substantia lignosus nec admodum crassus: facie rugosus, colore cinereum, intus spadiceis candicantibus, discurrentibus intus sumq; liquorem è plaga emittentem, in contundendo fragilem. Saporem habet quemadmodum & odorem tenuem, suauiter acrem, iucundum, ualde aromaticum & adstringentem, qui nux moschata uocatur, & decorticatus ex India affertur. Affertur etiam integri fructus melle conditi, quos nuper coeperunt adulterare, eius singulis nucleis, uiridi iuglandis putamini diuiso, impositis, & rursus composito, qui dolus facillè deprehenditur, mollicia, sapore, & qua diuisa erant commissura. Carnosus enim moschatae nucis cortex iucundum habet saporem, solidioremq; consistentiam, iuglandis uero austeriorem, & molliorem. Similiter quoq; excipiuntur Limonum & Chebulorum (quos sic uocant,) conditorum carne, sed hic dolus commissuris deprehendendus est, quoniam conditorum caro, gustu ferè nihil à nucis moschatae carnosio putamine differt. Medius autem cortex, quem macem uocamus, saporem & odorem habet nucleorum Teda pingui commixtorum, ideoq; a mariusculus est, magisq; caput tentat. Lignosus postremo cortex, gustu insipidus existit. Eligito nucleos maiores, ponderosiores, solidiores, intus spadicei coloris plurimum, candicantis autem ac pallidi minimum habentes, & copiosorem tenuioremq; liquorem è plaga remittentes.

DE MACE, id est, medio Nucis moschatae cortice.

CAP. XVIII.

DE Mace, seu ut ueteres uocant, Macere, iam in Nucis moschatae descriptione, ceu de parte eius diximus, quare denuo de ipso uerba facere opus non elicit, sed cum singulari nomine appelletur, ac separatim per se solum, ceu sui generis medicamentum ex India afferatur, atq; reponatur, non malè me facturum existimo, si proprium ei & peculiare caput tribuero. Est igitur Macis seu Macer nequaquam exterior, ut haecenus nobis traditum est, sed medius nucis moschatae cortex, inferius ubi pediculo proximus fuit, coniunctus, reliqua sui parte diuisus & inaequaliter dissectus, colore in flauo rubescens, non adeò crassus, substantia ferè cartilagineus, friabilis, & subpinguis cum pungitur, moschatae nuci similem liquorem è plaga fundens. Odorem & saporem habet nucis moschatae pauce pinguiq; Teda commixte. Eligendum est integrum crassissimum, fuluum seu rubentius, copiosorem liquorem ex impressa plaga fundens, pinguiissimum atq; ponderosissimum.

DE FAVFELE, id est, auellana Indica.

CAP. XXIX.

FAVFEL, quod Arabum Medicorum interpretes, Indicam auellanam nominant, longitudinis uncialis fructus est, inferius sublata basi, turbinata cauernu-

cauernula, modicè concautus, superius teretis conifigura in mucronem desinens, qui supra mensam basi collocatus, cavitatem tegit, erectæ pyramidis figuram imitans, foris cinereo aut subfusco colore, tenuibusq; rugis, intus uersicolore uenarum discursu, nuci moschatae similis. Saporem habet mediocriter adstringentem, odorem uerò nullum fatu dignum. Afferitur ex India, sed rarissimè, nec nisi casu aliquo cum aliis aromatis, præsertim Zingibere. Eligito maximos, ponderosissimos & gustu uehementius adstringentes.

DE NVCE STYRACINA. CAP. XX.

A. *Styracis fructus uidetur fractus.* B. *Granum quoddam rufum, quod apud pharmacopolas cum Styrace calamite inueniuntur.* C. *fructus quidam cum Styrace rub. apud pharmacopolas.*



NVX Styracina globosæ figuræ fructus est, mediocris auellanae magnitudine, duplici cortice nucleosq; constans, exterior cortex carnosæ substantia & in uiridice sio colore, supremum amygdalæ putamen refert, is in maturitate tribus rimis in tres partes dehiscit alterum lignosum, durum, flavum, aut subruffum corticè ostendens, quo continetur nucleus pinguis, oleosus, gustu acris, odoratus & resinosa Styracis qualitatibus respondens, sed multo acrior, & fauces scarificans: afferitur ex Asia minore frequenter unâ cum Styrace. Eligendæ sunt maturæ, recentes, rubescèntes & minus rancidæ, uetustate enim nuclei rancorem contrahunt propter oleosam substantiam.

DE NVCE VOMICA. CAP. XXI.

NVX uomica, qua hodie utimur, fructus planus, compressus, orbiculatus, latitudine uncialis, crassitudine sextam unciae partem non excedens: superficie, in cæsis candida, ad inclinationes splendente: tactuq; propemodum holoserici molliciem habente, breui densèq; stipata lanugine obsitus, quæ derafa, comminuto Amianto similis existit, in medio utrinq; obscurum, ceu umbilicum, parum & uix euidente tuberculo referens, concretionè duplex, atq; in duos orbiculos fissilis. Substantia, seu materia cõstat candida, dura, solida, & infragili, ueluti cornu, tritu & contusu difficillima, nisi arida ramenta contundantur, quæ & ipsa maximo labore uix teruntur. Cũ in duos orbiculos finditur, uterq; in orbis circumferentia exiguum foramen habet, quo continetur germinaturæ, & ex semine hoc fato exituræ plantæ rudimentum: exiguo pediculo, & ueluti paruo Tiliagineo aut Hederaceo, uenoso, dupliciq; folio constans, tam exquisita perfectaq; figura, ut cum ueri folii consummata forma de perfectione certet, eius unica tantum pars, hoc est pediculus, prædicto foramine uel cauernâ continetur, foliola uerò duplicis fructus commissura, clauduntur. Saporem habet

t. ñ

absq[ue] ulla adstrictione, uehementer amarum, ideoq[ue] nauseam & uomitum prouocantem, unde nomen inuenit.

DE ANACARDIO. CAP. XXII.

ANACARDIVM oblongus est fructus, aliquantulum planus, & in latitudine quādam compressus, longitudine ut plurimum uncialis, anteriori parte in rotundum obtusumq[ue] mucronem attenuatus, posteriori uero ac latiore crasso, angulosoq[ue] pediculo adhaerens. Colorem habet nigrum & splendentem, formam uero, aurum corda aspectu æmulantem, unde etiam nomen accepit, substantia ei diuersa est: intus enim planum candidumq[ue] nucleum claudit, hunc ambit reliqua eius pars seu cortex, quæ incisa, cauernosa & foraminibus, tophi, aut pumicis instar plena est, crassiusculum, uiscosum, glutinosum, lentum, & in ruffo nigrum liquorem cauernosis anphractibus continens, cum inueteratus fuerit arefcentem & coagulatam, spumofum, exiccaturq[ue] sanguinem, unā cum cauernulis referentem. Saporem nucleus habet, primum dulcem, mox acrem, & paulatim eō usq[ue] adstringentem, donec lingua, palatū ac fauces planē cōtrahat: melligo uero eius, seu glutinosus liquor, gustu nucleo respōdet, multo tamē asperior est, ac uehementissimē adstringit, adeo, ut fauces in angustiam constringat, & strangulationis periculo respirationē detineat, contumaciter dentibus, linguae atq[ue] palato adhaerens, idem paulo largius gustatus aut assumptus, uescentes strangulat & interimit. Eligito nigerrima, ponderosissima, candidum, recentemq[ue] nucleum, & copiosiore ac fluidiore liquorem habentia: durat pluribus annis antequam uetustate corrumpatur. Affertur ex transmarinis partibus ad nos in Europam.

DE BALANO MYREPSICA. CAP. XXIII.

BALANVS Myrepfica, quam Arabes granum Ben appellant, fructus est, ut plurimum oblongus, figura triquetrus, colore candidus, aut in candido cinereus: cortice & nucleo constans. Quale autē pericarpium habeat, nobis adhuc incognitum est, nam calice & pericarpio suo exemptus, in Europam affertur, cortex modicē lignosus ei est, interimq[ue] fragilis, & propter raritatem leuis, quo clauditur nucleus, proportionē corticis cauitati similis, colore tam foris quā intus candidus, substantia pinguis & oleosus, in superficie tenui: fungo soq[ue] uelamine circumdatus: sapore subdulci, subamaro, & tenui: saliuam, nauseam atq[ue] uomitum ciens, praesertim cum intra corpus sumptus fuerit. Eligenda est colore undiq[ue] candida, plenum candidum, minimē rugosum, neq[ue] rancidum, neq[ue] flauum nucleum habens. Affertur ex Syria & Aegypto in Europam.

DE SILIQUA Indica, id est, Cassia fistula, quam ueteres Faba Indicam uocant. CAP. XXIIII.

SILIQUA Indica quæ à ueteribus Faba Indica, à recentioribus uero Cassia fistula, seu Cassia fistula nominatur, siliquaceus est fructus, uiginti unciarum, duorum aut trium dodrantum plerumq[ue] longitudine, digitali, pollicari, nonnunquam etiam maiori crassitudine, interdum rectus, frequenter etiam leniter incuruatus, atq[ue] figura teres, lignoso cortice, ligneis interseptis, pulpa atq[ue] seminibus constans. Cortex illi est tenuis, foris niger, reliqua sui parte pallidus, duas cōmissuras uelut suturas habens per longitudinem transeuntes, sibiq[ue] inuicē oppositas, quibus malleo leniter percussus, dehiscit: tota siliqua intus nigra, subliquida, dulciq[ue] medulla, seu pulpa repletur, nō tamen continua, sed planis, tenuibus, transversis, ligneisq[ue] orbiculis, breui interuallo, distincta, crebroq[ue] intersepta: in omnibus interstitiis singula sunt semina, tertiam unciae partem longitudine implentia, latitudine paulo minora, cordis figura turbinata, aliquantulum in planum compressa superficie tenuis, pallida aut ruffa & nitida, substantia solida uelut cornu, aut cartilago lenta, uulgaris siliquæ non inaequalia aut dissimilia, in quorum commissura, flauum duplexq[ue] seu

ceus folium continetur , germinaturæ & ex terra prodituræ plantæ rudimentum ;
crassioribus autem siliquis, & pollicem excedentibus nulla insunt semina, rarissime
enim illis contingunt . pulpa inueterati fructus paulatim omnino exsiccat : quod
fit, ut ad motum intus crepitaculi instar resonent, qualis reiicienda est ementibus,
atque eligenda crassissima, ponderosissima, atque intus liquidiore pulpa repleta.
Assertur ad nos ex Aegypto & India.

DE CARPESIO. CAP. XXV.

CARPE SIV Marboris Asiae coaceruatus quidam fructus est, cuius hæc est constitutio: pediculi ab arbore exeunt in rotundum, et crassius capitulum desinentes, à quo undique plures exeunt teretes fructus, ut plurimum incurui, deorsum pendentes, figura siliquacei, foris nigri, ac ueluti geniculati, modicè quæ apparentibus angustijis, breui intervallo præcincti, substantia nervosa, uenosa, & propterea difficili distractu, pinguique liquore madida constantes: semina intra se contigua, purpurea, nitida, & gigartis similia: sed paulò maiora claudentes, longitudine plerumque sextantales, paulò longiores, frequentius tamen breuiore, crassitudine quam uncia partem æquantes, & nulla commissura neque sponde, neque ui dehiscens. Saporem uenosa eius ac pinguis pars habet acrem, feruidum, aromaticum, & caput tentantem: odorem uero similiter acrem, uehementem, nares ferientem, & caput implentem, maximèque si frangatur aut contundatur. Semina gustu iniucunda, & rancida sunt, ideòque eximendum atque abijciendum, cum intra corpus assumendum, aut medicamentis aroma hoc miscendum fuerit. Eligito nigrius, ponderosissimum, pinguisimum, copiosiori liquore frantium digito inficiens atque perungens, siue à pediculi capite adhuc dependeat, siue ab eo deciderit, nam utrumque simul ad nos ex Syria Asiàque affertur.

DE AMOMO. [sic uocat Rosam Hierichuntis uulgo dictam,
non probo.] CAP. XXVI.

A M O M V M parvus est & dodrante breuior fruticulus, substantia ligno-
sus ab uno caudice, seu trunco minimo digito graciliore, plures emittens ra-
mulus, qui & ipsi rursus in numerosos cirrulosq; surculos distrahuntur, in seipso
introrsus conuolutos, fractu difficiles, & colore spadiceos. Corticem crassiores es-
sius ramuli flauum, aut candicantem habent. totus frutex contracto habitu uix fi-
guram emulatur. Semen interiore sui parte conuolutis surculis rectum contine-
tur, copiosum in singulis pericarpis geminum, alioquin circa pediculos numero-
sum, atque uix modo racemosum, quod in conuoluto frutice uix apparet, qui si a-
qua aut uino maceretur, extensis humore surculis diffunditur, & undique in latitu-
dinem expanditur, omnes seminum racemulos ostendens, humore autem postea
exemptum paulatim exiccatur, & rursus in pristini habitus figuram inuolutis cir-
ris contrahitur. Odorem totus fruticulus habet acrem, suauem, aromaticum, caput
repletum est somnum conciliantem. Saporem autem similiter acrem, linguam Car-
peli instar mordentem, iucundum, atque aromaticum. Eligendum est recens, inte-
grum, non comminutum, ponderosum, semine flauo aut subrufo adhuc plenum.
Affertur ad nos ex Syria, ab ijs qui Hierosolymam religionis gratia haecenus hinc
profecti sunt: eoq; ad imposturas suas hucusque usi sunt monachi & sacrificuli, sim-
plici & credula plebeque persuadentes, rosam id esse circa Hierichum, in sancta
terra natam, ideo in Natali Saluatoris nostri nocte atq; ipsa Natiuitatis hora, spon-
te sua, diuinitus aperiri & diffundi, maxima & execrabili impostura hoc menda-
cium hominibus inculcantes, reuera enim sponte expanditur nunquam, nam quoa-
tiescunque, & quandoque uolueris aperitur, si aqua aut uino persusum mace-
raueris, eodem illi quoque modo expansum populo ostenderunt. quapropter A-
romum ad nos delatum, ignauum tum odorem, tum saporem habet, cum toties
maceratum, in humorem qualitates suas, natura tenues & dissolubiles, deposuerit.

MELLIGETTA oblongus est fructus, & magnitudine, figura propemodum ovo æqualis, folliculo similis, cortice constans uenoso, fractu cōtumaci, subruſſo, aut in pallido fusco supernum pythmena, inferius pediculi uestigium habens, intra se nitidis, angulosis, pipere minoribus, superficie ruffis, intusq; candidis seminibus, crebris, fungosisq; mēbranis distinctis & interseptis plenus. Gustu feruidus ut piper & Zingiber, quibus odore etiam nō dissimilia sunt. Cortici nulla ferē in gustu qualitas. Afferuntur ex India, & regno Melli: cortici exempta eius grana, raroq; folliculo inclusa: eligenda sunt nitida, ruffa, superficie extenta, minimeq; rugosa, solida atq; ponderosissima.

CARDAMOMVM maius, Melligettæ similis fructus est, minor tamen, longitudine raro sextantem superans, superius iuxta pythmena latior, inferius propē pediculum angustior, & ficus aut piri modo turbinatus, nullam cōmissuram habens qua aperiri queat, colore foris in cinereo subruſſus, uenoso & distractu difficili cortice constans: intus seminibus crebrō membranulis interseptis ac distinctis. Colore, figura ac magnitudine Melligettæ grani similibus, obtusioribus tamē angulis, plenus. Saporem grana habent quemadmodum & odorem ualde iucundum, aromaticum, tenuem, subacrem, ac modicē amarescentem. Cortici nulla est in gustu gratia, ideoq; eo exempta semina ad nos ex Syria & Aegypto afferuntur, quamuis interdum etiam integri fructus, quales iam descripsimus, aduehantur. Eligito grana eius nitidiora, ponderosiora, at odoratissima. Fructus autem integri probantur maturi, hoc est superficiem extentam habentes, undiq; preclusi, neq; ex induritia aperti, neq; in redinibus corrosi, ponderosi, & cōsummati denseq; in se factis seminibus pleni. Errant quotquot dicunt, Melligettam, maius Cardamomum esse, Cardamomis enim tenuis minimeq; feruens, sed gratus ac iucundus est sapor, Melligettæ uerō piperis instar acerrimus: qua de re alibi in scriptis in Dioscoridem commentariis differuimus.

EST etiam aliud Cardamomum, figura oblongum, triquetrum, utrinq; acuminatum, colore in candido fuscum, quantitate grandia uellanae nuci æquale, maiore Cardamomo minus, minore uerō maius, ideoq; mediocre a nobis nominatum, intus dense in se factis, maioriq; Cardamomo similibus grani plenus: cortice constat prædicti instar, uenoso, sed multo tenuiore, in tribus suis angulis, quibus maturum dehiscit, singulas commissuras habet. Gustu Cardamomo maiori grana eius respōdent. Afferuntur & hoc ex Aegypto & India, sed paucissimum, idq; perquam raro, cum utroq; Cardamomo.

CARDAMOMVM minus mediocri per omnia simile est, paulo tamen hiscentē uestitum, quo detracto semina apparēt dense in se facta, nullis membranulis distincta, maiori cardamomo similia, paulo minora, magisq; angulosa, in ruffo cineracea, atq; tam arcuē sibi ipsis coniuncta, ut unum semen figura bubulos renes æmulans, appareant esse. Saporem grana habent ualde aromaticum, tenuem, maioriq; Cardamomo similem, sed paulo tenuiorem. Afferuntur & hoc ex Aegypto & India, folliculis suis exemptum, nōnunquam etiam una cum folliculis, idq; copiosius quam maius, solumq; uulgo hodie cognoscitur: maius enim cum parcius aduehatur paucissimis notum est: probatur quod maioris, notas habuerit.

CARYOPHYLLVS immaturus aut minor, exiguus fructus est, in India nascentis parua cuiusdam arboris, solidam, ponderosam, duramque materiam, & lauri folia habentis, uulgo per Europam Caryophylli appellatione cognitus, absque immaturi adiectione: decerpitur enim, cum florēt, tū adhuc est secuturi fructus rudimentum: longitudinem habet transuersi digiti, aut uncia minorem, formam uero exigui & obtusi clauis: nam gracili eius corpori latiusculum & quadrangulum capitulum insidet, in angulis quatuor eminentiis dentatum, lacunula, aut quadrati alueoli instar, superius modice excavatū, conuexo, concavoque ceu tuberculo rectum, friatu facili: quapropter hæc capituli pars, non in omnibus Caryophyllis cernitur, cum solidius eorum corpus, fragilius, in tanto itinere atterat. Materia constat cartilaginosa, modice lignosa, lenta, infragili, tritu difficili tam foris quam intus, innigro & rubente colore fusca: pinguem, oleosum, tenuemque liquorem, cum pungitur, & plaga remittente. Saporem habet piperis modo aerem, tenuem, ualde aromaticum, simul adstringentem, & linguam ueluti stupore quodam afficientem. Odorem quoque aliorum aromaticum modo iucundissimum. Probaturnigrior, solidior, ponderosior, & copiosior liquorem ex inflicta plaga fundens. Afferitur ut dictum est ex India.

CARYOPHYLLVS maior, nihil a minore differt, præterquam quod ille immaturus, hic uero maturus sit: relictus enim in arbore sua, quoad iustum capiat incrementum, acerbus seu minor Caryophyllus, in maturum atque maiorem conuertitur, qui hodie ab omnibus tam Medicis quam Pharmacopolis Anthophyllus uocatur, figura oblongus, in medio crassior, magnitudine mediocri auellanae, aut potius Corni uel oliuæ nucleo similis & æqualis, superius quadrangularem pythamena, quam in Caryophyllo, capitulum a nobis dictum habens. Cortice foris uestitur tenui, quo detracto, duplex apparet nucleus, ideoque in duas partes fissilis, incurua & sinuosa commissura compactilis, ligni aut cornu instar solidus trituque difficilis: Saporem cortex eius, Caryophyllo minori similem habet, nucleus uero multo remissiore.

FESTVCAE Caryophyllorum, aliquibus fusti, aut fustichi nominati, graciles oblongique sunt surculi: quibus ceu pediculis, ipsi Caryophylli adnascuntur, colore & substantia Caryophyllo æquales, gustu uero paulo remissiores, hi ex Caryophyllis separati seorsim ab aliquibus seruantur. Eligantur nigriores, pinguiorres, liquorem fructuum modo remittentes, odore atque sapore ad minores Caryophyllos proximè accedentes.

PIPER longum, oblongus est iulus, in India nascens, gracili pediculo dependens, Coryli aut Betulae arborum apud nos nascentium, iulis similis & æqualis, longitudine plerumque sesquiuncialis, crassitudine tertiam aut quartam uncia partem raro excedens, colore ut plurimum cineraceus, aut fuscus, figura teres, in superficie numerosis & paruis eminentiis, ceu uerrucis, obliquis contiguisque ordinibus dispositis, tuberosus. Semina sub omnibus tuberculis singula latitant, colore foris ruffa, intus candida, figura milio similia, paulo tamen minora, non nisi fracto iulo apparentia, quæ perfecti secuturique piperis rudimenta sunt. Saporem habet modice amarescentē, uehementer acrē, & ignis modo feruidū, non tamen uestigio linguam pungentem, propter extremē tice, ac nondū pereocti humoris copiam, cuius culpa etiā facile a teredinibus perforatur. Odorē spirat modice aromatū instar iucundū. Eligendū est recēs, magnū, solidū, minimē corrosū aut perforatū, ponderosū, feminibus intus, eo quo dictum est modo dispositis, plenum, ac si in aqua decoquatur, aut pluribus diebus maceretur, minimē diffuens: quod uero huiusmodi non

fuerit, ceu inueteratum atque fictitium reprobandum est: adulteratur enim multis modis quos consulto hoc loco praeterimus, ne potius imposturas tradere ac docere, quam dolos deprehendere, uideamur.

DE PIPERE albo & nigro

CAP. XXXV.

PIPER album atque nigrum ex longo fit, dehiscensque eius iulis, & ab inuicem recedentibus, incrementibusque, intus contentis miliaceis granis, donec in oblongos racemulos obliquis seminum ordinibus plenos diuisum, quadrantalem, aut maiorem consequatur longitudinem. singulis granis rotunda figura, & Viciae magnitudo est: ita ut duodecim grana perfecta, obolum pendeant, nonnunquam pauciora: frequentius autem plura. eadem principio uirent, quo tempore inter exteriorem, tenuem, extentumque corticem, & nucleum cavitatis quaedam inanitas intercedit, quae paulatim maturefcentibus nucleis repletur: cum autem ad iustam magnitudinem peruenierint, foris nigra fiunt, & rugis contrahuntur, partimque medullae contumaciter cohaerentem corticem habent, quae nigrum, & simpliciter uocatum Piper sunt: partim uero non rugoso, tenui, & facile ab extento candidoque nucleo, recedente cortice, uestiuntur, quae candidum Piper sunt. Vtrumque odoratum & gustu acerrimum, seruidissimumque est, odoratius tamen acriusque candidum nigrum sentitur: ideoque medias habet candidum, inter longum & nigrum qualitates: tardius enim longi, citius candidi, citissime autem nigri acrimonia gustu percipitur, quamuis Dioscorides candidum, (quoniam acerbum sit) uirideque ignauius esse tradat, quam bene non uideo, cum absurdum quiddam inde oriatur: nam idem noster Dioscorides nigro ignauius candidum, ideo esse rationatur, quoniam acerbius, hoc est immaturius sit nigro, ergo cum longum quoque acerbius, immaturius imperfectiusque sit candido, sequitur necessario longum Piper omnium esse ignauissimum, ergo uidetur aut haec ratio cinatio nullum in ueritate locum habere, aut Dioscorides male tradere, candidum tam longo quam nigro ignauius esse, quae de re in libris de qualitibus & facultatibus medicamentorum latius differemus, in quibus plures huiusmodi controuersias diiudicabimus. probatur in nigro maximum, solidissimum, ponderosissimum, & paucissimis rugis contractum. In candido albidissimum, maximum, solidissimum, ponderosissimum, superficie extensum & minimè rugosum.

DE BRESMATE, id est Pipere abortiuo.

CAP. XXXVI.

BRESMA siue Brasma imperfectum & ueluti abortiuum est Piper, colore & magnitudine nigro simile, sed inane & ualde leue, gustu quoque nigrum & mulans, sed imbecillius, quod a nostris negociatoribus Gerbelier nominatur, praedictis tribus Piperis speciebus in omni usu, (praesertim in medicina) postferendum.

DE CVBEBIS.

CAP. XXXVII.

CVBEBAE longè diuersi sunt à Carpesio fructus, figura rotundi, & nigro Piperi similes, paulo tamen minores, oblongis rectisque pediculis adhaerentes: colore in cinereo fusci, acu aut cultello puncti, Cariophylli modo liquorem remittentes, qui ab India, in qua nascuntur, incolis partim cum adhuc acerbis sunt, partim cum ad iustam maturitatem peruenierint, colliguntur: hinc est quod immaturae leues sint, superficiemque habeant rugis contractam, intus autem in corticis inani concavitate nucleum exiguum, flaccidum & tabidum. Maturae uero in superficie sunt aequales, extensae minimèque rugosae, intus autem caesio, tritu facili, & consumatae magnitudinis nucleo plenae ac distensae, ideoque acerbis ponderosiores. Saporem acerbam, hoc est, ante maturitatem lectam, habent ualde aromaticum, acriter & mediocriter amarum, subtilem, cum maxima tenuitate ad caput in gustu euaporantem.

porantem. quæ uerò ad iustam magnitudinem p̄uenerunt, gustu minus acres, minusq̃ amaræ sentiuntur, magnam penetrabilis & uaporabilis saporis partem & ipsæ retinent, imbelliores itaq̃ acerbis maturæ sunt. Probantur acerbæ, quæ rugosæ, inanes, leues, & ualde aromaticę tam gustu quàm odore fuerint: maturæ autem quæ maiores, ponderosiores, foris æ quali superficie minimeq̃ rugosa, intus plenæ & nequaquam inanes sint.

DE CARPOBALSAMO. CAP. XXXVIII.

CARPOBALsamum quod ad nos fertur, hoc nomine parui, oblongi, & utrinq̃ acuminati sunt fructus, duplo aut triplo pipere maiores, duplici cortice & nucleo constantes. exterior cortex crassior est, rufumq̃ in fusco colorem habet, & quatuor euidentibus commissuras per longitudinem transeuntes, quibus post maturitatem aperitur: exterior uerò tenuior est & candidus, clauditq̃ intra se candidum pinguemq̃ nucleum. Saporem & odorem habet acrem, tenuem & ualde aromaticum, inter Carpesium, Cardamomum atq̃ Cubebas medium. Optimum est grande, plenum, pingue, & liquore Balsami in exteriori cortice plenum, sapore atq̃ odore uehementissimo. Adulteratur ualde similibus granis, quæ multò imbecillioribus qualitatibus & mediastino septo, per longitudinem nuclei transeunte, à dicto Carpobalsamo dignoscuntur & distinguuntur. Affertur ad nos ex Aegypto, sed ualde inueteratum.

DE CVCVLI fructibus. [Vulgò Cocce de leuant nominant.]

CAP. XXXIX.

CVCVLI fructus sunt in Aegypto nascentis furiosi Solani: † racemoso, dū ^{Historia ad} adhuc in matre sua h̄rent, habitu, nouē, decē aut duodecim acinis ab uno pedi ^{pud Dio} culo corymbi figura dependentibus: nigra, succosa, molliq̃ carne, lignoso cortice, & ^{scoride} nucleo constantibus, quorū caro paulatim, exiccato eius succo, tabescit & rugis cōtra ^{Theophrastum non} hitur antequā ad nos ē tam longinqua regione perferatur. Singulis acinis liccatis a ^{respondet} uellang parue magnitudo est, & rotunda, aliquantulum oblonga figura, & circa annexum modice renum instar lima. Nucleum habent candicantem, pinguem, sinuoso, contorto, & lignoso distinctum inter septo, sapore amaricantem, subdulcem, & modice tenuem, quo ad capiendos pisces utuntur. Eligito maximos, ponderosissimos, & candido nucleo intus repletos, nam ad nos allati, ut plurimum inanes & leuissimi sunt.

DE THAMARINDO, id est, Acacia Indica. CAP. XL.

THAMARIND VSceratio, hoc est Siliquæ similis & æqualis fructus est, in India nascens, foris in ruffo niger, splendens, tactu mollis, succosa & melalis despumati spissitudine, liquore plena, per longitudinem nervis uenosa, ac siliquis crassiori carne constans, quo continentur contigua, in angulos & planiciem compressa, cartilaginea ruffaq̃ aut flaua semina, nigro & friabili cortice uestita: duplicia, duabus separabilibus partibus compacta, in fructus longitudine disposita, magnitudine fabis æquali paruis aliquantulum maiora, ita, ut terna aut quaterna drachmam pendeant. Saporem melliginosus carnis succus habet uehementer acetosum, subdulcem & adstringentem. Caro autem gustu succo respondet, ignauior tamen minusq̃ dulcis existit, quamuis fortius quàm succus adstringat. Semina postremo uehementius etiam carne adstringunt, paululum acetosæ qualitatis habentes, dulcedinis uerò nihil. Orientales populi expresso eius succo ceu præstantissimā parte, in medicamentis utuntur, nobis carnem & semina, hoc est abiectas reliquias mittentes: probatissimi in nigro purpurei, succosi, non tamen aceto perussi, atq̃ ualde in gustu acetosi.

MYROBALANVM tam Græci quàm Latini autores sœminino genẽ
re proferunt, cùm à Balano sœminini generis nomine uocabulum hoc com-
positum sit: posteriores uerò, & barbari, grammaticis præceptis non satis instructi,
atque bonos authores neque curantes, neq; obseruantes, ad hunc usque diem ma-
sculinum genus eis tribuunt, quarum tres tantùm differentias uerustiores Arabes
medici tradiderunt, uidelicet Indas, Chebulos & Citrinas, de Belliricis ac Embli-
cis seorsim, ceu sui generis medicamentis diferentes: recentiores uerò etiam hos
duos fructus Myrobalanis annumerant, quinque earum differentias colligentes,
quas hoc disticho comprehendunt. *Myrobalanorum species sunt quinque bonorum, Cuius, Kebulus, Belliricus, Emblicus, Indus.* Reuera autem neque Belliricus, neque Emblicus
ex earum numero sunt, cùm nullam habeant in figura cum Balano, hoc est, glande
similitudinem: glandes enim oblongæ sunt: hii uerò fructus duo, globuli modo
rotundi. At quoniam similiter Myrobalanis adstringant, uentrẽque aliquantulum
comprimendo subducant, ac lignosos, ut ipsæ, habeant nucleos, uisum est recentioribus,
hos quoque Myrobalanorum generi adicere, quorum uestigia nos etiam sequemur,
eodem ordine eas descripturi, sumpto ab Inda principio, cuius etiam Plinius in Palmularũ enumeratione meminit. Porro una eademq; arbor
omnes tres Myrobalanorum differentias gignit, ex quibus Inda seu nigra, acerbis,
immaturus, & adhuc adolefcens fructus est, idẽque nullum intra se nucleum
habet, sed quoddam cauitatis secuturum nucleum excepturæ rudimentum: magnitudinis
est incertæ, quoniam tam intempestiue, quàm tempestiue colligitur. Hinc est
quod aliquæ earum unciam, aliquæ etiam sesquiunciam longitudine excedant.
Colore habent foris in uiridi fuscũ & pallescentem, qui tamen non nisi in absterfa et
lota appareat: nam cũ copiose afferatur, inuicem confricantur & atteruntur, detritoq;
sibi fusco puluere, in nigrum colore tinctæ conuertuntur, figurã habet Oliuæ & utrinque
truncatam. Carne constat densa, solida, ponderosa, dũ confringitur splendẽte
colore nigra aut fusca, gustu uehementer adstringente, aliquantulum acida, subduli-
ci, tenui, saluam prouocante, idẽq; sitim arcente, & oris haliũ cõmendante. Odo-
rem nullum fati dignũ siccata spirat. Eligito neq; minimas neq; maximas, sed medi-
ocres, longitudine uncia paulò breuiiores, aut ad summũ unciales, pondere triobolares
aut 2 3 nonnunquam excedentes, simulq; densas, solidas, intus nigerri-
mas, & splendentes: foris autem in citrino & fusco colore, si abluantur, uirescentes:
minus rugosæ, nulloq; aut admodũ exili & compresso cauitatis rudimento inanes.

DE MYROBALANO CITRINA CAP. XLIII

MYROBALANVS citrina ex Inda fit: relicta enim in arbore sua Inda
quoad increseat & maturefcere incipiat, concepto intus lignoso semine, in eã
quam citrinam nominauimus, euadit: longitudine sesquiuncialẽ et nonnunquam
maiores, crassitudine uerò media & tumentis parte digitalem, utrinque in mucro-
nem desinentem, quinque angulis per longitudinem transeuntibus inæqualem,
modicè rugosam, tenui cortice, densa solidaq; carne & semine constantem. Cortici
color est citrinus: carni ex citrino ad rufum uergens. Semen eius lignosum, candi-
dũ, angulosum, rugosum, scabrum, ualde durũ, figura oblongũ: corni semine duplo,
triplo, aut quadruplo maius, intus candidũ oblongum, utrinque acuminatum nu-
cleũ tenui, pallidãque cuticula uestitum claudens, figura & sapore Pino nucleosimile.
caro gustu Indæ respondet. Probatissimæ sunt maiores, maximè citrinæ
minus rugosæ, densæ, crassæ, & in fracturis splendente subrufa carne, minorique
semine prægnantes, & pondere duas drachmas et scrupulum æquant.

DE MYROBALANO CHEBVLO CAP. XLIII

CHAE Bula appellata Myrobalanus fit, cùm citrina ad consummatam ma-
turitatem peruenerit, quæ Citrinæ figura, carne, semine & nucleo per omnia
respondet

respondet, maior tamē est, molliorīq; crassiore, & minus fragili carne constat, colore tam foris quā intus nigra, gustu citrinæ aut Indæ simili. Eligantur maximæ, ponderosissimæ: foris, cum abluuntur in citrino puniceoq; colore nigræ, carnem crassiore, nigriorem, lentam, mollem, & fractu ob succi copiam difficilem habentes: ad trium drachmarum pondus quam proximē accedentes.

DE MYROBALANO Bellirico. CAP. XLIII.

MYROBALANVS quæ Belliricus appellatur, à prædictis tribus differt, in alterius generis quā illæ, arbore nascens, figuram habet rotundam aut modicē oblongam, superficiem fuscā, æqualem, in longitudine quinq; ut plurimū angulis distinctā, magnitudinem uerō maioris gallæ, pondere quatuor aut quinq; scrupulos superans aut æquans, tenui carne, & magno, lignoso, duroq; semine constans. Chebuli semine multo maiori, drachmę pōdus leuante, & intus oblongo, acuminatum & auellanæ propemodū æqualem nucleum claudente. Saporem caro eius habet proximē ad prædictarum Myrobalanorum qualitatem accedentem: substantiam uerō illis rariorem. Eligito maiores, ponderosiores, solidiorīq; carne constantes.

DE MYROBALANO EMBLICO. CAP. XLV.

MYROBALANUS appellata Emblicus, suū peculiare & propriū genus habet, etiā à Bellirico diuersum: magnitudine Bellirico cedit, eadem nūquā integra affertur, sed in fragmina diuisa & dilapsa: habet enim eius caro sex in longitudine commissuras, quibus cum maturuit dehiscens in totidem partes dilabitur, quæ singulæ adhuc in binas partes digitis findi queunt, crassitudine mediocri, habitu contracto, & aliquantulum rugoso, colore cinereo aut fusco. Totus fructus sub commissuris singulas cavitates habet, quarum uestigia in fragmentis apparent. Semen in medio est lignosum, durum, paulo minus quam rotundum, colore subrufum, æquale, minimē rugosum, paruæ rotundæq; auellanæ æquale: sex angulis & commissuris compactile, & in totidem partes secundum longitudinem fissile, quibus singuli insunt nuclei figura oblongi & triquetri, ligneo, tenui, & tamen duro cortice, intus autem medulla constantes. Saporem caro eius Indæ Myrobalano aut Chebulo similem habet. Eligito fragmenta eius maiora, solidiora, ponderosiora, & minimē rugis contracta.

DE PISTACIIS. CAP. XLVI.

PISTACIAE, quas alii in neutro genere Pistacia uocant, in Syria natæ nuce sunt, amygdalinis fructibus minores, pineis uerō nucibus paulo maiores, duplici cortice & nucleo constantes, figura oblongæ, superius acuminatæ, inferius pediculi, cui adhæserunt, uestigium seruantes, ab una parte tumidiore & in angulum deficiente ventre protuberantes, una commissura, per mediā anguli longitudinē transeunte, cum maturuerunt dehiscentes. Exterior eius cortex carnosus, modicē rugosus est, supremo amygdalæ putamini substantiæ, & colore similis, qui faciliē a maturis fructibus recedens, interiorem ostendit corticem. Colore candidum, superficie glabrum, substantia durum, lentum, fractu contumacem & ueluti osseum, qui intus barbatę, ruffæq; auellanæ nucleo, similem & æqualem nucleum continet: substantia tenerum, pinguem, colore in flauo uirescentem, rubenti cuticula uelatum, gustu dulcem, ualde suauem, tenuem, orisq; halitum commendantes. Eligito maximas, ponderosissimas, candidissimas, sponte sua modicē dehiscente commissura plenum, recentem, & neq; rancidum, neq; rugosum, neq; situ obsitum nucleum ostendentes: quæ autem ab hiis notis, uel ab aliquibus earum recedunt & discrepant, inutiles sunt, neq; medicamentis intra corpus sumendis, miscendæ, sed liuores exictu curantibus, confectionibus relinquendæ.

VALERII CORDI HISTORIAS

Pistacia.



DE AMYGDALIS minoribus.

CAP. XLVII.

AMYGDALAE minores, uulgaribus proportionaliter per omnia similes sunt, quibus etiam sapore & facultatibus respondent: multo tamen, hoc est triplo aut quadruplo minores existunt, eadem in duplicem differentiam diuiduntur, una enim amaras, altera uero dulces nuces producit. Afferuntur adhuc putaminibus suis inclusae cum Gallis Asianis atque aliis medicamentis ex Asia aduectis.

DE PERSICIS minoribus.

CAP. XLVIII.

PERSICA minora ab Armeniacis differunt: nostratibus per omnia respondent: multo tamen minora sunt, ut ex nucibus aestimare facile quis potest, quae cum a uulgarium nucibus lignosa substantia & scabra, cauerno solummodo habitu nihil differant, duplo tamen aut triplo minores sunt paruis, & ex Asia uenientibus Amygdalis. Saporem & qualitates uulgaribus easdem habent.

DE IVIVBIS seu Zizyphis.

CAP. XLIX.

IUIVBAE, quae Graecis Zizypha uocantur, ab Oriente in Europam inuectae, arboris poma seu haec sunt: Corni baccis sanguineo & splendente foris colore, ob longam figuram & singularem intus ligneamque semine similes: aliquantulum tamen maiores, & ad

& ad mediocriſ pruni aut oliuæ magnitudinem accedentes, leui, molli, glutinoſa, guſtuq̃ dulci pulpa ſeu carne conſtantes, in medio ſingulare, ut dictum eſt, ſemen continentes, utrinq̃ acuminatum, foris duro ligno, intus oblongo, aliquantulum compreſſo & ruſſo nucleo conſtans. Afferuntur ex Italia ad nos ſiccata, ideoq̃ ruſſa. Eligito maximas, plenas, recentes, molles, nec adeo ruſſas.

Luiube. T. 3. 36. p. 102.

Myxæ. T. 3. 35. p. 101.



DE MYXIS. CAP. L.

MYXAE uel Sebaſte, quas hodie Sebeſten appellant, & ipſæ eſt Syria tranſlata in Europam, arboris fructus ſunt, luiubis aut cornis ſimiles & æquales, orbiculato calici ceu adnexæ inſidentes, foris nigri, intus lenta, glutinoſa, uiſcoſa guſtuq̃ dulci carne conſtantes, in quorum medio ſingulare eſt ſemen, Corni ſemini æquale, modicè planum, foris duro ligneoq̃ cortice, intus dulci nucleo compoſitum. Eligito maiores, & natiuo lentore madidas, uiſcoſas, & adhuc orbiculato calici adhaerentes.

DE IUIVBIS minoribus, quas Plinius Tuberes nominat. CAP. LI.

IUIVBAE minores, Plinio tuberes appellatae, colore, nitore, carne, molli
u iij

lentore. Sapore & nucleo maiores imitantur: iis tamen minores, nec oblongae, seu rotundae atque similiter flaccidae. Eligantur maiores, ponderosiores, minus flaccidae, & pleniorum carnem habentes. Afferuntur haec quoque ex Italia.

DE FOLIO CASIAE

CAP. LII.

CASIA omnis aromatica, maximam habet cum Cinamomo similitudinem, ideoque folium quod hodie pro Malobathro in usu est, & simpliciter folium, magno errore uocatur, Cinamomi folium a plerisque etiam doctis esse creditur, sed male: est enim a Malobathro penitus diuersum, quemadmodum etiam a Cinamomi folio, nam sine dubio a uiliore & non adeo efficaci Casia producitur, quod pediculi eius sapor manifeste indicat, qui plane rubentem & glutinosi saporis Casiam refert, & nequaquam Cinamomum. Est autem figura oblongum, utrinque mucronatum, speciosum, densum, crassum, atque interiore sui parte glabrum, nitidumque: posteriori autem tribus eminentibus nervis ab uno mucrone ad alterum transseuntibus exaratum, quorum medius crassior est, rectaque extenditur, reliqui uero duo qui utrinque sunt, in arcum flectuntur, utrumque folii limbum sequentes: nullus enim tortuosus, aut in ramulos diuisus est. Magnitudo foliorum non est eadem, plerumque tamen quinque, sex aut septem uncias longitudine aequat, latitudo autem tres, aut circiter. Colorem habet in cineraceo & pallido, cum ad nos peruenit uirescentem: saporem uero glutinosum, tenuem, aliquantulum subacrem, & quandam Cinamomi gratiam respicientem. Odorem quoque subacrem, aromaticum modo iucundum, ueluti si quis Piperis & Cinamomi odores commisceat. Eligito recens, densius, crassius, maius atque integrum, quod tam gustu quam odore proximè ad Casiam accedat. Fragmenta uero & friatorum puluerem, medicamentis ne commisceas.

DE FOLIIS CARIOPHYLLI.

CAP. LIII.

CARIOPHYLLI folia densa sunt, crebrisque & tortuosis uenulis exarata: figura autem & magnitudine tenuifoliae Lauri folia imitantur. Colorem habent iisdem paulò fusciorum: odorem uero ac saporem Cariophyllorum, sed remissiorum. Eligito quae maiora, crassiora, firmiter integraque sint: friata uero in puluerem, aut fragmenta eorum uitanda. Afferuntur cum Cariophyllis, sed raro.

DE SCHOENO, uel Schoenuanto.


CAP. LIIII.

SCHOENVS hoc est teres odoratus iuncus, hodie corrupto uocabulo Squinantum appellatus, in plures species diuiditur, natalibus tantum diuersas, quidam enim in Nabathaea, quidam in Arabia reliqua, quidam etiam in Lybia, prouenit. Is autem qui ad nos affertur, qua regione natus sit nondum comperi: est autem aspectu nostrati iuncu tenuiore non adeo dissimilis: sed colore differt in candido subrufoque purpurascens, neque simplici tunica fungosam medullam continet, sed multis tenuibus inuolutisque in teretem habitum tunicis totus constat, e quorum medio caulis emicat gracilis & teres, in summitate purpureis flosculis pleatus, qui rarissime in Europam aduehuntur, cum a Camelis praerodantur, quod Galieno etiam cognitum fuit. Festucas, quas inuolutis tunicis constare diximus, ab una radice numerosas emittit, inferius crassiores, superius tenuiores, longitudine dodrantes aut pedales: radicibus nititur tenuibus, lentis & lignosis. Saporem stipulae seu festucae habent feruidum, tenuissimum, ualde aromaticum, & Pulegio per omnia similem, multò tamen uehementiorem, atque optima arte destillatam Pulegii aquam respicientem. Odorem quoque inter Rosas & Pulegium mediū, estque hic suauissimus. Eligito integrum, longum, plures stipulas ex una radice proferentem, non candicantem, sed rubentiorum, intus purpurascens, superius in tenuiori coma in rufo purpureoque colore cineraceum, sapore feruidissimum, tenuissimumque, & odore uehementissimum.

DE

Schoenus.

Nardus Indica.



DE NARDO INDICA. CAP. LV.

NARDVS Indica à Syriaca & Gangite nullam habet genere differentiam, natalibus tantum distinguuntur, siquidem omnes in uno eodemque monte gignuntur, ex quibus Syriaca in occidentali eius parte, Syriam respiciente, Indica uero in Orientali parte ad Indiam uergente nascitur. Indica in duas species diuiditur, quarum una in ipso monte prouenit, altera uero in radice montis, non longè à præterfluente Gange nascens. Odore uirosior, atque in monte nata ignauior. Hodie autem hæ nardi species ad nos indistinctæ, iisdem saccis aduehuntur. Planta eius tota qualis sit, nobis nondum constat, pars uero ea quæ Nardi aut Spicæ appellatione affertur, radice caput est, aliqua radice portione, et foliorum caulisque

lentis, uenosis, neruosis, capillatis, & in spicæ figurâ intricatis reliquiis ac uestigiis constans, colore in fusco rubens. Saporem radix habet amarum, tenuem, acrem, aromaticum & Celticæ nardo similem. Odorem uero inter Celticam Nardum atque Schoenum, medium. Spica autem radici insidens easdem qualitates habet, sed multò ignauiolem saporem. Eligito singularem aut unam atque alteram spicam una radice ferentem, mediocrem, hoc est, neque maximam neque minimam, densam, non in uillos distractam, ponderosiore, ruffam, subfuscam, gustu amarissimam, tenuissimam, aromaticam atque odoratissimam, tam spica quam radice, longiorè radice partem habentem. Fragmenta autem friatumque puluerem medicamenti ne misceto.

DE NARDO CELTICA seu Saliunca.

CAP. LVI.

NARDVS Celtica, quam Latini Gallicam, atque Saliuncam Germanico nomine appellant, odorata, aromatica & admodum breuis herbula est, coliculo sesquiunciali aut sextantali, paruis, oblongis, in cinereo pallidis aut flauis sursum uersis, & sibi squamarum instar superiacentibus tunicis, ceu foliis, obsito, in terra plerumque iacente, & cuius summitate terna, quaterna, qui naue exeunt florum uice oblonga, tenuia, uenosaque folia, colore lutea, inferius admodum angusta, superius latius

u iij

Nardus Celtica.



scula, longitudine sesquiuncialia aut sex-
tantalia, quæ cum deciderint, singula ue-
stigia & reliquias post se relinquunt, fo-
liaceas coliculi squamas, seu tunicas con-
stituentia. Radice nititur tenui, oblon-
ga, fusca, fibrata, uillosa & Azaro simili,
tenuiori tamen, quin etiam ex inferiore
coliculi parte terræ incumbenti, fibras &
radiculas demittit. Odorem habet gra-
tiem, uehementem, latè spirantem, uelles
bono halitu commendantem, Cyperum
& ueluti situm redolentem: estq; hic ad-
modum iucundus: quibusdam tamen fa-
stidium, ob nimiam odoris, caput leniter
aggravantis uehementiam. Saporem ra-
dix & coliculi habent amarum, acrem, te-
nuem, aromaticum, halitum oris commē-
dantem, & diu in gustantis palato perse-
uerantem. Squamosæ autem foliaceæq;
tunicæ & flores, neq; odore, neq; sapore
fatu digno, commendantur: ideoq; hæ
partes medicamentis non sunt miscendæ.
Nascitur apricis Germaniæ alpibus co-
piosissimè: quemadmodum in Norico &
Istria, ubi ab incolis una cum radicibus
uellitur, & in manum complentes fasci-
culos ligatur, qui deinde per totam Euro-
pam à Pharmacopolis & mercatoribus
comportantur. Eligito fasciculos maio-
res, radicem & florum plenos: hæ enim
partes recentis signa sunt. Paleacea eius
fragmenta, friatumq; puluerem medica-
mentis intra corpus sumendis ne admis-
ceas.

DE CRETHAMO marino, uel Crethmo ueterim.

CAP. LVII.

CRETHAMVM marinum, siue Crethmum à ueteribus dictum, umbelli-
fera herba est, caulem ab uno radice cespite, unum atq; alterum aut nonnun-
quam plures emittit, longitudine pedales, aut proceriores, graciles, geniculatos, ali-
quantulum solidos, teretes, intus fungosa tenuiq; medulla plenos, pediculos è geni-
culis singulos producit, aliquoties in ternos minores pediculos subdiuisos, supe-
riores atq; extremi singuli terna habent folia, longitudine uncialia, aut sesquiuncias
lia, figura angusta, utrinq; acuminata, crassa, portulacæ modo pinguis, & in ruffo ui-
ridiq; colore albescentia, gustu aliquantulum salsa. Flores in umbellis ramulorum
summitatibus insidentibus, fert paruos & candidos, quibus succedit oblongum, te-
res, modicè angulosum, duplex candidumq; semen, Smyrini aut Libanotidis albae
seminæ quale & simile, foris molle, intus cartilagineum ueluti nucleum habens.
Radice nititur ab uno capite in duas tres aut quatuor longas & teretes partes diuisa,
sa, crassitudine ferè digitales, colore candidas & perennes, gustu subacres, dulces,
tenues & suaves, ueluti si quis pastinae satiuæ, & Crethami agrestis radicem sa-
pores misceat. Semen quoq; subacre & suauis est quemadmodum radices, tenuio-
ribus tamen partibus constat. Nascitur maritimis saxosisq; locis, in lapidum rimis
accommisuris, plurimumq; maritimis Liburniæ partibus.

DE

Crethamus.

Rhabarbaricum.



DE RHABARBARO seu Indico. CAP. LVIII.

RHABARBARUM seu Indicum grandis est radix, herbae cuiusdam Rumici cognata, crassitudine utramque interdum manum complens, foris undique fusca, intus uersicolore, Aceris aut Alni, aut Betulae tuberum modo in crispum habitum intorta, conuolutaque carne constans, pondere leui, fungosa, partim flaua, partim candicante & croceis, puniceis rufisque uenis distincta, gustu mediocriter amara & cum glutinoso lentore aliquo adstringens, eadem humorem in quo maceratur croceo pallore tingit. Eligito propter natium humorem ponderosum, intus multis rubentibus uenis iisdemque peruersicolore carnem sparsis, plenum, odoratissimum, quod minime teredinem senserit, neque antea maceratum fuerit. Affertur ex India, per transuersum in partes, seu crassiores orbiculos secta.

DE CENTAVRIO MAIORE. CAP. LIX.

CENTAVRIUM maius, quod hodie in omnibus Pharmacopoliis, & a cunctis Medicis Rheu siue Rhaponticum appellatur magno errore, insignis herba est, caule interdum fere tricubitali, multis adnatis ramoso, foliis magnis longioribus, colore uiridibus, per ambitum aliquantulum incis, flore in oblongis ac subrotundis capitulis capillaceo, in caeruleo colore purpurascens, semine pap-

x

VALERII CORDI HISTORIÆ

Centaurium maius.



posæ florum lanugi-
ne inuoluto, in capi-
tulo molliter collo-
cato, duro, angulo-
so, colore candican-
te simulq; liuido, ac
Cnico per omnia si-
mili, paulò tamen
maiore. Radice ni-
titur grandi, sæpius
bicubitali, crassitu-
dine sextantali aut
sesquiunciali, non-
nunquam etiã mul-
to crassiore, & ma-
num complente, re-
cta, singulari, in nul-
las partes distracta,
instar lōgi teretisq;
pali in terram acta,
foris fusca, intus ru-
bescente, densa, pō-
derosa, æqualiter
carnosa, et circulos,
cum per transuersum
inciditur, sibi
superinductos plu-
res habere, quibus
singulorum anno-
rum incrementum,
ac uniuersa eius æ-
tas colligitur: copio-

so, ruffo, substantia pingui, oleoso, simulq; fiscofo & aquæ innatante liquore plena,
eundemq; copiosiore exterioribus è circulis fundente, gustu leniter acri, cum len-
tore aliquo modicè adstringente, subdulci ac aliquantulum tenui, cuius usus est: E-
ligito recentem, hoc est plenam, solidam, ponderosam, liquidiore liquore manantē,
à uermibus minimè corrosam, & cum frangitur, Rhabarbari instar uersicolore, propter
pallidam simulq; ruffam substantiam & rubentem liquorem in longis por-
osis angustisq; cavitatibus contentum. Nascitur montanis, apricis & fruterosissimis
cis, solo pingui, copiosissimaq; in Italia monte sancti Angeli, unde ad nos à nostrati-
bus Agyris eò proficiscētibus affertur. Nascitur etiam in Germania, sed uiribus in
Italia natæ, cedens.

DE COSTO ALBO seu Arabico.

CAP. LX.

COSTVS albus seu Arabicus, maiori Centaurio similis radix est, ut plurimū
tamen minor, densa & candida : quæ per transuersum in partes secta ex
Oriente huc affertur. Inulæ campanæ instar subruffum liquorem continens, ro-
scidis guttulis per substantiam eius dispersum. Saporem habet uehementer cum
aromatica gratia feruidum, & sub amarum, odorem autem ualdè acrem, aro-
mati similem & nares ferientem. Eligito solidum, candidissimum, plenum &
minimè teredinibus corrosum. Sapore & odore acerrimus & suauissimus, hæc
nim recentis notæ sunt: nam plerumq; ualdè inueteratus affertur, nunc autem rarissime

simè aduehitur, sed loco eius acerrimæ herbæ radix, ipsius uidelicet Thapsiæ maris in Italia nascentis & præterea Inula in oriente nascente, ueri Costi modo in taleolas aut orbiculos secta, de quibus radicibus mox agemus. Dolus uerò ab iis facillè deprehenditur, qui Enulae nostratis figuram, substantiam & qualitates probe perspectas & cognitās habent.

DE COSTO flauo uel Syriaco.

CAP. LXI.

COSTVS flauus, qui à ueteribus Syriacus appellatur, candido seu Arabico per omnia similis est, maior tamen & ad Centaurii maioris radicem propius accedens, siquidem colorem habet Buxi modo flauum, ac nonnunquam ad Centaurii ruborem inclinantem, quo ferè solo ab Arabico differt, nam gustu & odore eidem omnino responderi uenit hic quoq; ex Oriente per transuersum in frustra dissectus. Eligito plenum, solidum, gustu ac odore acerrimum & iucundum, à uermibus nequaquam corrosum, talis à recenti crebris foraminibus ac contento in foraminibus puluere nimia leuitate deprehenditur. Affertur hodie quam rarissimè, cum impostores hoc dolo, turpi ac Deo abominabili lucro inhiantes, alias pro eo radices uenditent, de quibus in Arabico dictum est Costo, & iam latius dicitur.

DE INULA COMAGENA.

CAP. LXII.

INVLAE Comagenæ ac reliquis in Oriente locis nascentis radix, quæ pro candido, hoc est Arabico Costo, ab indigenis impostoribus ad nos militatur, nostratis Enulae Campanæ radici, forma ac qualitatibus per omnia similis est, densior tamen solidiorq; & magis percocta ob cœli calorem, quapropter siue in orbiculos transuersa secetur, seu secundum longitudinem findatur, minus in exiccando flaccescit & parcius in rugas contrahitur quam nostras, quæ aquei & inconcocti humoris plurimum habet, quo inter exiccandum exhalante corpus remanens flaccescit ac rugis contrahitur. Partim autem hæc Orientalis Enula candicat, quæ bonitate excellit, partim liuet aut fusca est, quod uetustatis aut intempestiue effossæ, ac negligenter siccatae indicium est, partim etiam per transuersum in orbiculos secta affertur, partim etiam in longitudinem fissa.

DE THAPSIA MAIORE.


CAP. LXIII.

THAPSIA maior, umbellifera & ferulacea herba est. Radice nititur grandi, longa, crassitudine manum complente, foris nigra aut fusca, intus autem candida, crasso, carnososq; cortice, & lignosa simulq; fungosa medulla constante. Gustu acerrima, linguam exurente, plurimam saliuam prouocante, ingratißima, nauseosa, & fauces ueluti strangulationis comminatione afficiente. Odore uirosa, rancida, & uetustissimæ cuiusdam rancidæq; pinguedinis qualitates referente. Nascitur in Italiæ calidioribus regionibus, unde ad nos pro Costo ab impudentissimis impostoribus hisce annis militari capta est, execrabili, periculossimo ac capitali pœna digno dolo ac impostura.

x ij

VALERII CORDI HISTORIAE

Tapsia maior.



DE GALANGA MAIORE. CAP. LXIII.

NVPER admodum cœpta est afferri, antea nobis incognita quædã radix, in partes secta, quam maiorem Galangam uocant, quoniam Galangæ, quod ad figuram attinet, per omnia respondet: multo tamen maior est, nam pollicem et duos interdum digitos crassitudine æquat: eadem inæqualis ueluti ramis brachiata, & foliorum candicantibus uestigiis, ueluti zonis & circulis cincta est, & gracilibus nervosisq; cirris fibrata, qui ceu inutiles auferuntur. Colorem habet foris rufum, intus autem uenosam, ualde leuem, candidam, aridam atq; Zingiberi similem substantiam. Odore ualde acrem, in caput penetrantem et sternutamenta prouocantem, non tamen gratam, aut iucundam ut minor. Sapore acerrimam, ingratam & uentriculum subuertentem. Eligito maximam, leuem, plenam, ac uermibus non corrofam.

DE GALANGA MINORE. CAP. LXV.

RADIX hæc simpliciter & propriè hæcenus Galangæ uocabulo cognita fuit, nulla cognomenti adiectione, nunc autem cum alia maior eiusdem nominis afferatur, minoris cognomine ab illa distinguitur. Est autem herba Orientalis ex Cyperi generibus, à quibusdam Cyperus Babylonicus appellata, cuius radix in taleolas secta ex Oriente afferitur, pondere leuis, figura inæqualis, & in transuersum & obliquum tendentibus adnatis brachiata, minimum digitum crassitudine æquans,

æquans, foliorū uestigiis ex intervallo, ceu zonis aut circulis præcincta, foris ruffa et subfusca, intus autem fulua, dura, solida, uenosa cū m frangitur & tritu difficilis. Odore ualde acris, & aromaticum modo iucunda. Sapore quoque ignis instar feruida & aromatica. Eligito nitidam, solidam, mediocriter ponderosam, foris in fusco ruffam, intus fuluam, minimè pallidam, dum cultro inciditur splendentem, nequaquam uermibus corrosam, gustu cū aromatica suauitate acerrimā & odoratissimā.

DE ACORO, qui uulgò Calamus aromaticus dicitur.

CAP. LXVI.

ACORVS uerus qui hodie per totam Europam magno errore Calamus aromaticus appellatur, gladiolacei generis herba est, foliis statim à terra ex-
untibus cubitalibus, latitudine ferè uncialibus, uenosis, se inuicem dissecta aluo ue-
luti carina excipientibus, & sibi insertis, nostratē Iridem figura imitantibus, atq;
gladii modo in aciem & mucronem fastigiatis. Radices habet Iridi syluestri no-
strati similes, perennes, posteriori parte sibi coherentes et implicatas, foliorum ue-
stigiis inæquales, quincunciales aut longiores minimo digito: cū siccatae sunt, ut
plurimū crassitudine æquales, nōnunquam crassiores, præsertim antequam exica-
centur, undique per terræ superficiem in transuersum sparsas, ita ut à superiori par-
te cœlum spectante, folia proferant: inferiore autem qua terræ incumbunt, fibras
deorsum mittant, quarum uestigia, ceu stigmata in exiccatis adhuc apparent. Colo-
rem foris subruffum aut candicantem: intus candidum, aut in candido modicè ru-
bescentem. Substantiam raram, angustissimis contiguisque poris fungosam ac
pondere leuem. Gustu subamaram, acrem, tenuem, & aromaticum modo suauiter o-
doratam. Eligito non crassiores minimo digito, candicantes, densas, minimè rugo-
sas, admodum breui intervallo foliorum uestigiis præcinctas, teretes, tam gustu
quàm odore uehementiores, & non cariosas. Nascitur aquosis locis, in calidiori-
bus provinciis, plurimāque in Asia, unde ad nos affertur.

DE ZINGIBERE.

CAP. LXVII.

ZINGIBER Cypero cognata est herba, in India proueniens, cuius radices
ad nos afferuntur omnibus Zingiberis nomine cognitæ, figura inæquales,
modicè planæ, in paucas bulbosas partes ut plurimū diuisæ, longitudine sesqui-
unciales, sextantales, aut nonnunquam maiores, foris cæsiæ aut in candido subfu-
sca: intus alba, friabili, tenera, & per longitudinem uenis seu setis aut filis neruo-
sa carne constantes. Gustu ceu Piper, feruida, acres, & aromaticum modo odoratæ,
quarum hodie duæ aut tres afferuntur seorsim differentia, scilicet foris, quò ponde-
rosiores fiant, rubrica tinctæ, quæ coloratum Zingiber uocantur, et albæ quæ al-
bum Zingiber. Eligito candidissimum, friabile, & tamen solidum, superficie exten-
tum, plenum magnumq; & quod nequaquam teredinem senserit, facile enim pro-
pter excrementicii humoris copiam à uermibus corroditur. Est etiam fuscum intus
& ueluti corneum Zingiber intempestiuè collectum, quod improbatum.

DE ZEDOARIA, quæ Veterum Arnabo uel Zarnabum est.

CAP. LXVIII.

ZEDOARIA quæ ueteribus Arnabo & Zarnabum appellatur, duplicem
habet differentiam, altera enim longa, altera uerò rotunda est: longam ex A-
rabibus quidam simpliciter Zedoariam uocant, rotundam autem Zurumbet,
ideò nos quoque utrūque medicamentum descripturi, eam distinctionem se-
quemur, utriusque eius speciei suum proprium caput tribuentes. Est itaque Zed-
oaria Arnabi altera species, longam radicem habens, longitudine sextanta-
lem, trientalem aut quadrantalem: crassitudine minimo digito æqualem, utrin-
que in obtusum mucronem desinentem, foris candidam, intus ex cinereo in fu-
scum colorem uergentem. Substantia densam, solidam, pinguem & pondero-
sam. Gustu atque odore uehementer tenuem, subamaram, mediocriter a-
crem & late cum grauitate quadam ac ualde aromatica suauitate, dum tunditur
aut manducatur, spirantem: minima portione diu oris halitum commendan-
tem, & per palatum ac nares in caput penetrantem. Eligito magnam, densam,

* III

plenam, non rugosam, intus ueluti pinguem, lentam, dentibus propter soliditatem aliquantulum repugnantem, gustu tenuissimam odoratissimamq; & nullis foraminibus peruiam, facillime enim eariam ac terebinthem sentit, ob calidi, crassi, lenti & excrementice humoris, quo tota constat, copiam, quapropter etiam ante uetustatem corrumpitur, si humidiori & situm redolente loco seruetur, aut si, ut plerumq; inter uendendum fit, ex uno loco in alterum transferatur, uidelicet ex sicco in udum, aut e contra, praesertim si crebro fiat.

DE ZVRUMBETO, [quam Zedoariam rotundam dixeris.] CAP. LXXIX.

ZVRUMBETVM, siue ut Arabes proferunt, Zurumbet, substantia, ponderosa, soliditate, colore, sapore & odore longae Zedoariae omnino similis est, sola figura differt. Est enim radix rotunda, globosa, magnitudine uncialis, aut interdum maior, nonnunquam etiam minor, superficie aliquantulum inaequalis, ac praecipue fibrarum uestigiis tuberosa: Ari bulbo similis & aequalis, eadem superius in breuem plerumq; mucronem desinit, quo germen terrae adhuc inherens fundere consuevit, Eligito praedictae Zedoariae notis commendabile. Affertur ex India.

DE CVRCVMA LONGA. CAP. LXX.

CVRCVMA quae a ueteribus Cyperus Indica uocatur, duplicis est differentiae, uidelicet longa & rotunda, quemadmodum Cyperus in Europa proueniens, suum tamen proprium, a Cypero nostrate diuersum genus habet. Sunt autem prioris speciei radices ut plurimum sextante longiores, minimo digito crassitudine aequales, Zingiberi simulq; longis Cyperi radicibus similes, teretes, utroq; lateris radicibus aliis minoribus, quarum aliqua breues, & oculaceis bulbis similes sunt brachiatæ, & obscuris foliorum uestigiis praecinctæ, foris pallidae & modice scabrae, intus autem ex croceo colore in puniceum aliquantulum declinantes, ponderosae, densae, & ueluti densato atq; exiccato humore constantes: gustu subamarae, & cum aromatica tenuitate acres & odoratae, quae uino aut aqua macerata, croceo colore tingunt. Eligito densiorem, ponderosior, nullis foraminibus peruiam, gustu feruidissimam atq; odoratissimam.

DE CVRCVMA ROTVND. CAP. LXXI.

CVRCVMA rotunda substantia, pondere, soliditate, colore, odore, & sapore longae Curcumae omnino responderet: figuram uero rotundam habet aut modice oblongam & ouatam, qualem oliua aut radix Ari, quibus etiam magnitudine aequalis est ut plurimum, eadem fibris quoq; ut longa nititur. Odore ac sapore priorem ut dictum est imitatur, multo tamen acrior, feruidior & tenuior existit, praesertim quae substantia constat rariori ut Zingiber: haec enim ferè medium habet inter Zedoariam & Carpesium tam odorem quam saporem. Eligito gustu feruidissimam, tenuissimam, aromatum modo odoratam, diu acrimoniā in gustantis palato relinquentem, orisq; halitum odoris gratia commendantem, & quae nondum terebinthem senserit.

DE DORONICO. [uulgo dicto, quod Romanum cognominant, quo maius est, sed minus efficax, quod in nostris alpibus Helueticorum oritur.] CAP. LXXII.

DORONICVM parua cuiusdam herbae radícula est, longitudine uncialis aut sesquiuncialis, aliquantulum in latitudinem compressa, modice inaequalis uelut squamata, in medio latiuscula, inferius uero atq; superius paulatim in angustum tenuemq; mucronem desinens, ex utroq; latere unum aut alterum oblongum tuberculum ceu pedes emittens, quo fit ut tota radícula minimae tarantulae aut laeae figuram exprimat: colorem habet in candido & cinereo modice flauum aut subruffum,

subruffum, substantiam uerò densam, solidam, recrementiceo humore constantem, gustu dulcem, paululum amarescentem, subtenuem, & rosarum propemodum modo odoratam, Eligito maiusculas, densas, æquales, extensas, lentas, & minimè perforatas: facile enim, dum uetescunt, teredinem sentiunt ob excrementice & a calo re non percocti humoris copiam.

DE TURBITO. CAP. LXXIII.

TURBITVM, siue ut Arabes uocant Turbit, radix est in calidioribus regionibus nascentis herbae, haecenus nondum cognita. Radix autem ad nos affertur ualde inueteratus, in sextantales aut quadrantales partes secta, crassitudinis incerta, partim enim duorum digitorum, partim unius crassitudinem habet, partim etiam festucarum & firculorum modo tenuis est, maiora frusta inæqualia & tortuosa sunt, tenuiora uerò æqualia & recta. Colorem habet foris in cinericeo fuscum, intus autem candidum: substantiam exterius corticosam, interius ueluti lignosam, per longitudinem concavis, angustis & contiguis poris seu canalibus fistulosam, & raram, ideoque pondere ualde leuem. Saporem habet, quod corticosum foris est, acre, paulatim feruere in gustantium ore & faucibus incipientem, saliuam copiosam elicientem, idem inter terendum odoratum quiddam spirat. Eligito cortices eius, æquales, rectos, intus candidos, exiccati liquoris, seu rosidas guttulas in se continentes, leues, & minimè a uermibus perforatos: adulteratur gummi, utriusque extremitati seu capite illito, ut ueluti natui liquore pingue uideatur. Sed dolus cognoscitur, quod gummi hoc illitum, gustu nequaquam ferueat, & quod confractus cortex nullas intra natui liquoris reliquias contineat. Adulteratur etiam immixtis minoris Thapsiae tenuioribus radicibus, quæ candidiores, fractu puluerulentæ & facile in farinam conteri aptæ sunt.

DE THAPSIA MINORE. CAP. LXXIIII.

THAPSIA minor, æque ut maior, ex umbelliferarum & ferulacearum herbarum genere est: radicem habet longam, satis magnam, crassitudine digitalem aut pollicarem, nonnunquam etiā crassiorē uel graciliore, foris nigram, intus candidam, carnosam, crassoque cortice constantē, qui exempta interiori neruoque medulla affertur, substantia tener, in farinam friabilis, leuis, & liquorem ruffum, exiccatum, guttatim dispersum continens. Saporem habet, cum siccatus ad nos peruenit, primum ferè insipidum aut farinæ tribuli aquatici similem, mox tenuem aliquantulum, postremo mediocriter acrem & feruentem, ob excrementice humoris copiam, non uestigio, sed tardius acrimoniam suam linguae ac palato imprimentem. Eligito corticem eius magnitudine mediocrem, crassum, siccati liquoris guttarum plenum, & a uermibus nondum corrosus, quod facile fit ob crassæ humiditatis copiam.

DE MANDRAGORA albo seu masculo. CAP. LXXV.

MANDRAGORA albus, quem masculū ueteres appellant, folia à radicis capite profert magna, iuglandi aut latifoliæ lactuce equalia, oblongiora tamen his, mollia, glabra, in uiridi candicantia, & circa radicis caput per terram sparsa, secus quæ trientales exeunt pediculi, in quibus flos est pallidus & foliaceus seu latiusculo calici insidens, floribus singula succedunt poma, figura rotunda, paruis limonibus æqualia, colore ad dilutum aqua crocum inclinantia, succosa carne constantia, qua continentur pallida aut caesia semina, piri seminibus æqualia, non tamen acuminata, sed modicè plana, & ab una parte renū instar lima. Radice nititur perenni, grandi, longa, crassitudine manum implente, in partes distracta, foris pallida aut incandido subfusca, intus candida, carnosam, succosam & crasso cortice constantem. Odorem tota herba grauem spirat, præsertim poma, quibus succus est aliquantulum gustu uinosus, subamarus tamen odore quā sapore caput aggrauans. Radix amarescit simulque subdulcis est, Eligito cortices radicis crassiores, candidiores, & a uermibus

VALERII CORDI HISTORIAE

non corrosos. Nascitur in Aegypto & Syria, unde ad nos affertur, quamvis in Germania quoque ab aliquot studiose colatur sicut & ipse feci.

Mandragora albus. T. 2. m. 6 p. 809.

Mandragora foemina.



DE MANDRAGORA nigro seu foemina.

CAP. LXXVI.

MANDRAGORAS niger seu foemina, folia habet candidi instar per terram sparsa, minora tamen, & angustiora, tenuifoliae lactucae similia, sed hiis quoque minora, mollia, odore graui, ac in uiridi colore nigricantia: secus quos, pediculi flores & poma sunt albo Mandragorae, succosa carne, seminibusque similia, colore uero paulo pallidiora, duplo minora, Sorbis aut mediocribus epimelidibus, id est, mespilis nostratibus aequalia. Radicem habet priori substantia & figura similem, minorem tamen, in duas aut tres sibi inuicem ut plurimum implicitas partes diuisam, foris nigricantem, intus autem candidam & perennem, quae sapore prioris radicis respondet. Eligito cortices eius maris Mandragorae notis commendabiles. Nascitur hic quoque calidioribus terris ut praedictus, & similiter apud nos a paucissimis colitur, magnam curam, quae a gelu uindicetur, postulans.

DE MACHOLEBO.

CAP. LXXVII.

MACHOLEBVM, seu ut Arabes uocant Mahaleb, nuclei sunt, figura, quantitate & colore Cerasiorum nucleis similes, gustu tamen tenuiores, uel hemenniores,

hementiores, & odorati, ideoq; suavi odore oris halitum commendantes. Eligito recens, hoc est, plenum, in candido subruffum, odoratum, & minimè uetustate rancidum. Affertur ex Africa & Aegypto in Italiam, Galliam & Hispaniam: in Germaniam uerò rarissimè, quia apud nos nullus adhuc eius usus inualuit, Arbor autem in qua nascitur, qualis sit nobis nondum constat.

Macholebum.

Cuminum satium. T. 2. p. 876.



DE CUMINO SATIVO. CAP. LXXVIII

CUMINVM satium, siue ut aliqui scribunt Cyminum, parua & umbellifera herba est, altitudine raro pedem excedens, tenuibus & in plures angustas partes sectis foliis: semine in umbellis oblongo, utrinq; acuminato, anguloso, cartilagineo; in cinereo colore subflauo: longitudine quartam unciae partem æquante: gustu subamaro, tenui, mediocriter acri, & cum gravitate suauiter odorato. Radice nititur oblonga, tenui, & cum maturuit semē, pereunte. Eligito plenum, magnum, flauum, aut pallidum, purum, intus pingue ueluti liquore aut oleo madefactum, minimeq; acerosum, inuehitur ad nos ex Vlisibona & Venetiis, Antuerpiam, ac in reliquis urbes atq; emporia.

y



B marina, quam hodie Soldanellā uocant, coliculos ceu uiticulas per terram spargit graciles, à quibus exeunt folia longis pediculis, posteriori parte latiuscula, anteriore uerò in obtusum mucronem desinentia, hederæ aut Chelidonio minori similia, latitudine plerumque se-

quiuncialia, pingua, crassaque, lacteum liquorem cum præcidentur remittentia: semen habet in rotundis folliculis nigrum, angulosum, durum, cicere minus, intus flauum. Saporem habet herba acrem, amarum & subsalsum, maximè liquor. Nascitur maritimis locis, in Italia & Narbonensi Gallia, unde ad nos affertur.

DE SERIPHIO Absinthio, (sive marino: quod uulgò Alexandrinum aut Zinzæ semen appellatur. Aliud uidetur Absinthium marinum, quod Matthioli pingit.)

CAP. LXXX.

ABSINTHIUM Seriphium, sive marinum Absinthium, ramosa est herba, nostrati absinthio similis, multò tamen minoribus foliis: semen habet paruum ueluti ammi, acerosum, colore flauum, gustu ualde amarum, acre, uehementer tenue & grauer, ueluti si quis Santonicum absinthio misceat, & cum aromatica qualitate aliqua odoratum. Eligito magnum, non puluerulentum, & odoratissimum: Nascitur maritimis locis in Aegypto, unde ad nos affertur, Alexandrinum semen, aut Zinzæ semen appellatum, aliud ab hoc est Santonicum.

DE BDELLIO.

CAP. LXXXI.

BDELLIUM ueteres regionum, in quibus prouenit, nominibus distinxerunt, sed quoniam etiam in iisdem prouinciis diuersa eius genera proueniunt, unum est mihi convenientius esse, coloris & qualitatum differentiis ea distinguere, præsertim cum nobis non constet, neque facile inquiri possit in tanta ignauia, & ueritatis contemptu, ubi quæuis eius species nascatur. Est autem Bdellium densata lachryma, in aqua dissolubilis, Myrrhae concretionem & aspectum similis, in Arabia, India, & uicinis aliquot regionibus, ex arbore quadam Cerafo simili cortice uestita emanans, atque circa ramulos in magnos grumos, pondere sextunciales, quinquunciales, sextantales & unciales concalescens, qui tam integri quam confracti ad nos afferuntur, unà cum adhærente cortice & ramulis: quod in crassiores grumos seu glebas concreuit, Hadrobolon à ueteribus Græcis Medicis cognominatur. Differt autem Bdellium colore & sapore: quoddam enim rufum, aut in ruffo subfuseum est, quod plerumque maioribus grumis constat, & cum frangitur in plures grumulos dissilit, modicè transparet, & mediocriter splendet. Gustu amarum, acre, & tenue existens. Quoddam minoribus est grumis, foris in ruffo subfuscum, intus rufum, cum frangitur in duas tantum partes se diuidens, & ut lutum dissectum prædicto magis translucens, densum, lentum, glutinosum, pingue & lachry-

Primum.

Secundum.

lachrymas albas, seu guttas omnino translucidas, cum in calido loco reponitur, emittens. Est etiam quod pallidum aut candidum habet colorem, grumis oblongis & mediocribus constans, multis longis, inter defluendum densatis guttis congestum: sapore amarum. ualde ingratum, omnibus Bdellii speciebus acerrimum, et fauces uehementer scarificans, adeo interdum, ut anhelitum restringat. Est praeterea nigrum Bdellium, colore foris nigrum, intus autem, cum frangitur, in nigro ruffum: Gustu, glutinosum, lentum, & mediam inter Thus & Cerasi gummi qualitatem respiciens. Affertur quoque aliud Bdellium, foris nigrum, intus fuluum in igneo aut purpureo colore, & omnium maxime translucens: substantia lentum, molle, glutinosum & Cerasi gummi simile, sapore idem Cerasi gummi cum amaritudine quadam & modica acrimonia imitans. Est postremo Bdellium, prioribus speciebus simile substantia, colore & sapore, quod intus paucis, pallidis, aut candidantibus maculis ceu unguibus distinguitur. Odor cuiusque Bdellii generi prunis imposito acris, grauis & aromaticus, ueluti si quis Thus & Myrrham commisceat: differt tamen aliquantulum secundum substantiae diuersitatem. Eligito in quouis Bdellii genere aspectu, cum frangitur, nitidum, cornu ungui aut taurino glutino simile, magis translucens & pinguius molliusque, hoc enim recentis indicium est.

DE MYRRHA. CAP. LXXXII.

MYRRHA in odorifera Arabia nascentis arboris lachryma est, in aqueo aliquo humore dissolubilis, cuius sex ad nos perueniunt genera, non tamen distincta, sed sine discrimine simul in unum saccum coniecta, ex quibus primum rubrum habet colorem. Secundum flauum. Tertium flauum aut subruffum, & maculis ceu candidis unguibus uarium colorem habet. Quartum omnino & aequaliter candidum est. Haec quatuor Myrrhae genera pingua sinceraque sunt, & fractu non difficilia, pondere leuia, paruis & semuncialibus aut uncialibus ad summum grumis constant, globosam & natiuam formam habentibus, ex quibus candidum in gustu Cerae modo lentescit, Sapor omnibus est amarus, acris, tenuis & aromaticus, Odorem habent per se, & prunis imposita, acrem, aromaticum, iucundum, cum grauitate non pauca caput in somnum trahentem. Quintum myrrhae genus, magnis, nigris & compactis glebis constat, substantia aridum, odore & sapore iniucundum, quoniam nimio solis feruore exaruit, aut tenuiores & aromaticas partes propter expressam ex se stactem amisit. Sextum adulterinum est, aloë, gummi Arabico & paucis Myrrhae diluto compactum, & in grumos conformatum, qui dolus facile deprehenditur odore, sapore & prunis: nam naribus admotum non iucundè olet, gustatum aromatica tenuitate & acrimonia caret, & dentibus contumaciter adheret, prunisque impositum sceter ueluti gummi, & cum frangitur, propter ariditatem in multas partes friatum dissilit. Sincera autem Myrrha dentibus non adheret, sed facile resoluitur. Eligito Myrrham pinguisimam, leuem, foris & qualiter flauam & ueluti tabidam ac purulentam, intus autem ruffam, aut flauam, aut uersicolorè, plures candidos ungues habentem, aut candidam atque liquore plenam, quem æstate in rosceidas guttas concretum emittat. Vendiderunt hisce annis impostores maiores Myrrhae grumos pro Bdellio, sed dolus deprehenditur, quod Bdellium gummi instar dentibus adhaereat, nullumque ferè odorem per se spiret, nisi prunis imponatur, si enim grauem, uehementem, Thuriisque non dissimilem & à Myrrha differentem odorem spirat.

DE STACTE. CAP. LXXXIII.

STACTE, pinguis, ruffus aut flauus liquor est, ex recenti, sincera, pinguis sima Myrrha expressus, oleo liquido crassior, infuso aqueo quodam humore dissolubilis, gustu ac odore Myrrhae qualitates cunctas referens, sed multo efficacia

ciores, cum optima illius pars, atque ipse flos existat, probatur odoratissima, medicris et liquida. colore fulua aut ruffa. gustu amara atque tenuissima, nulloque oleo adulterata, qui dolus superinfusa calida aqua facillime deprehenditur: syncera enim Stacte in ea resoluitur: oleum uero, qualecumque id fuerit, nullo modo aquae commiscetur, sed ipsi innatat. Nunquam in Germaniam allata huc usque Stacte est, potest tamen paruo labore, sed magno dispendio, ex optima Myrrha exprimi.

DE OPOBALSAMO.

CAP. LXXXIII.

OPOBALSAMVM, Balsami liquor est ex inflicta cortici eius plaga guttatim destillans, in aqueo humore dissolubilis. Colore, dum musteum adhuc est, candicans & lactescens, atque liquidi olei consistentiam habens, postea cum inueterasceit exhalans quod tenuissimum in eo est, fuluum colorem acquires & crassescens. Odorem habet supra omnia aromata suauissimum, acrem et late spirantem. Saporem autem feruidum mediocriter, cum maxima partium tenuitate per totum palatum, ad caput & odoratus organa penetrantem. Eligito praeter iam dictas notas, lac coagulans, si aquae instilletur, primum fundum petens, & mox a se ipso dissolutum ipsi aquae se commiscens: cum linteo aut panno instillatur, neque maculam, neque maculae uestigium in eo relinquens, postquam potius frigidissima quam calida aqua rursum pannus sit ablutus. Adulteratur enim multis modis, odorato alioquo oleo, aut resina, aut cera: sed deprehenditur hic dolus sola frigida aqua: syncerum enim facile in ea dissoluitur, nec quidquam eo in fundo remanet, aut superius aquae innatat. Adulterinum uero & quod doli causa syncero mixtum fuerit, nequaquam aquae commiscetur: sed separatim, aut fundum petit, aut innatat, aut utrumque facit.

DE CANCHAMO.

CAP. LXXXV.

CANCHAMVM, quod recentiores authores Laccam appellant, in Arabia nascentis arboris lachryma est, colore ruffa, fulua aut flaua: ramulis undique in succini duriciem densata & concreta adhaerens: lumine accensa lucidissima flamma ardens, liquefens, & ardentibus flammantibusque guttis destillans, quae extinctae nigricant & indurantur. Eadem in calida aqua ad ignem dissoluitur, & ei omnino commiscetur, sanguineo aut purpureo colore aquam tingens, qua tingendis pelibus utuntur: ex eadem fit floridus ille & preciosus color, quem pictores eodem nomine Laccam uocant. Odorem prunis impositum iucundum spirat. Saporem habet cum resolutum fuerit amarum actenuem, quale autem per se est, nullum fere odoris aut saporis qualitatem remittit propter nimiam substantiae densitatem. Eligito maiores eius grumos, colore fuluos, translucidos & adhuc furculis adherentes: reprobatur immundum, admixtis corticibus aut aliis rebus plenum, & quod nigrum est. Cum lauare & fordes ab eo segregare uolueris, in feruentis aquae sextarium sex Canchami uncias conticito, & bullire paulatim finito, donec aqua sanguinea aut purpurea reddatur, tum excolatam aquam, abiectis quae in colo remanserint sordibus, ad spissitudinem liquidi mellis decoquito, & liquidis medicamentis, quae Laccam requirunt, misceto. si uero solidis & licetis miscere opus fuerit, diutius coquito, donec refrigeratum pristinam soliditatem ac duriciem recuperet, hoc modo preparatum Canchamum nigrum fit, estque haec genuina lauandi Laccam ratio, poteris etiam pro simplici aqua Schoenanti, aut aliorum epati obstructo conuenientium & aperientium medicamentorum decoctionem aut dilutum accipere: lauatur etiam alia ratione, tritum abiecta aliquoties in qua lauatur decoctione, aut aqua, secundum absurdam & omnibus modis improbandam recentiorum authorum traditionem.

DE

DE SARCOCOLLA. CAP. LXXXVI.

SARCOCOLLA, arbusculæ cuiusdam in Perside nascentis lachryma est, colore ruffa aut candicans, concretionē tenuis, minutis, ueluti friatis, atq; Thuris, Mannæ similibus grumis cōstans: Sapore amara, acris, nauseosa, gummi instar glutinosa, atq; in aqua aut aqueo humore aliquo dissolubilis. Eligito rarum, ueluti spumosum, candidum, amarissimum, & gummi instar glutinosum: ruffus color inueterascentis indicium est: adulteratur minuto & friato gummi, sed facile deprehenditur, adulteratum enim minorem amaritudinem resipit, & minime acre est, neque nauseam, cum deglutitur, prouocat, neq; fauces scarificat.

DE BENZOO. CAP. LXXXVII.

BENZOVM seu Benzoi, quod etiam Asia dulcis appellatur, arboris cuiusdam in India nascentis resinosa lachryma est, quæ ad nos non grumis ueluti Thus, Myrrha, Canthamum atq; alia huiusmodi affertur, sed antea ab incolis, apud quos provenit, expressa, ac demum in magnos pastillos, massas ac panes compacta, qui malleo percussi facile in partes & grumos dissiliunt. Substantiam enim habet aridam & friabilem ceu pix aut resina siccissima atq; Colophonia, alio nomine Græca pix appellata. Colorem habet uarium, ruffum, flauum & candidum, eosq; distinctos & translucētes. Saporem subdulcem, suauem, & modice ueluti arescentem, quemadmodum Guaiacum lignum: commanducatum in ore non dissoluitur propter resinosa consistentiam, sed Mastiches modo inter dentes lentescit, palidumq; in lurido colorem acquirit, translucidum amittens. Odorem spirat ualde iucundum, cum teritur ac tractatur: prunis uero impositum multo acriorem, & propter fuliginosum siccum uaporem fauces siccantem & tussim irritantem. Eligito purum, & quod immixtis foliis & corticibus careat, translucidum, maioribus grumis distinctos colores habentibus, in densam massam compactum & formatum. Substantia constat neutra, hoc est neq; aqua neq; oleo dissolubili, quemadmodum & Viscum. Cortex arbori, ex qua destillat, est Guaiaco similis, sed uenosus: folia uero lata Terebintho aut Lauro similia & æqualia, quæ nonnunquam panibus immixta una cum lachryma afferuntur: materia uero arboris qualis sit nobis nondum constat: uerum quatenus ex sapore & odore sumpta ratiocinatio ualet, magnam habet cum Guaiaco arbore in qualitatibus similitudinem, quid autem figura differant, explorandum.

DE OLEO BENZOINO. CAP. LXXXVIII.

BENZOINVM Moleum duplex est. Primum enim in India ex recenti Benzoo ui exprimitur, quemadmodum ex Myrrha Stacte, substantialiquidum, & tenue, colore ruffu, fuluum & candicans, odoratissimum, nares & caput opplens, atque gustu multo quam Benzoum acrius, facileq; penetrans: quod rarissime sincerum affertur, neq; enim ad hunc usq; diem uulgo eius in Germania usus est, quamuis sit uiribus efficacissimis. Secundum peculiari quodam artificio per destillationem fit prædicto simile, sed multo ignauius tam gustu quam odore: utrumq; adulteratur oleo, sed deprehenditur dolus turbido oleagineoq; colore, & rancida faucesq; offendente in gustu acrimonia.

DE CINNABARI, id est, Sanguine draconis. CAP. LXXXIX.

CINNABARI, seu ut hodie adhuc uocatur Sanguis draconis, nascentis in Aphrica arboris cuiusdam lachryma est, & nequaquam Elephantorū Draconumq; in fabulosa pugna occumbentū sanies, ut olim hominibus inculcauerūt suis uenditationibus mercatores, & ut Plinius credidit. Cōcreuit hoc in densos & picis modo fragiles grumos, coagulato sanguini foris colore, & aspectu similes, qui una cum adherente cortice afferuntur, in paruas micas fractū splendet, & luci oppositū modice ueluti spumosus est, accū teritur roseū floridissimūq; colorē habet, integrū uero

in profundo & saturo colore nigricat, commanducatum inter molares dentes en-
tescit, iisq; tenacissime adhæret propter glutinosam uiscosamq; substantiam: sapo-
rem inter masticandum remittit præter glutinosum lentorem, primum subdulcem,
& modicè ueluti adstringentem, mox ualde acrem, & si gustetur paulò diutius lin-
guæ mucronem instar Cariophyllorum, obstupescientem, & gustati doronici ha-
litum in palato relinquentem. Eligito paruis & cortici ruffo aut candicanti adhuc
adhærentibus cōstans, purum, splendidum, profundū, donec integrum est, coloris:
cum teritur uerò, floridissimi. Adulteratur pluribus modis, Rubrica, arida colopho-
nia, & pauca synceri Cinnabaris quantitate mixtis, quod in magnos pastillos & ob-
longos grumos formatur, ut pendentium in arbore micararum natuam figuram refe-
rat atq; æmuletur, sed dolus facillimè deprehenditur colore turbido, liuido, rubri-
cofo & minimè florido: præterea etiā saporis ignauia. Acrimonia enim atq; doronici
halitus in gustu caret, postremò in oleo statim resoluitur, & colophoniam ad pristini
fuluorisq; colorem redit, ad fundum uasis descendente rubrica: syncera uerò,
neq; oleo, neq; aquæ inter dissoluendum miscetur, sed aquam, in qua coquitur, lac-
team reddit in pallido, cum refrigeratur, uasq; adhæret.

DE PROPOLI. CAP. XC.

PROPOLIS lachryma est resinosa Betulae, Populi nigrae & alpinae arborum
gemmantibus, oculis aut germinibus innascens & adhærens: apibus collecta
& in alueariis circa oras & aditus eorum suspensa, qua hyeme omnes rimas am-
plosq; aditus contra frigoris iniuriam obturant, cuius quatuor sunt differentie. Pri-
ma è nigra populo colligitur tantum, secunda ex Betula tantum, tertia promiscua,
ex nigra alpinaq; Populis & Betula, facillè tamen dignoscuntur. Populo enim nigra
desumpta, cui Aegyriae cognomen sit, colore est flauo aut fuluo, manibusq; tra-
ctata mollis fit, & in longum trahitur quemadmodum uiscum. Odorem habet sua-
uem, iucundum, caput mulcentem & somnum inuitantem ueluti Aegyri, hoc est
Populi nigrae germina primo uere enata, atq; Styraei non dissimilem, sapore eiusdè
Populi oculis respondet. Quæ uerò è Betula sumpta est, Semidea, id est, Betulea
in posterum nominetur. Hæc Betule oculorum odorem spirat, qui Aegyro non est
absimilis: colorem habet inter flauum, cinereum & subuiridem medium, atq; iam
dictæ instar in manibus mollis fit & distrahitur, paulò tamen siccior existit quam
Aegyria. Quarta uerò quæ ex nigra alpinaq; populis, & Betula colligitur, utriusq;
colorem, odorem, saporem & consistentiam mixtas habet, ideoq; mixtae nomen post
hac obtineat. Tertiam ex alpinae Populi lachryma apes faciunt, sed rarò, iisq; tan-
tum locis quibus nulla populus aut Betula, sed Alpina solummodo abundat. Est
propoli natura, ut oleo resoluatur ueluti cera, ponderosior tamè densiorq; est, nam
in aqua liquefacta fundum petit: cera uerò aquæ supernatat. Eligito in quouis ge-
nere odoratissimam, synceram, & minimè admixtam ceram habentem, quod si cera
doli causa adiciatur, in aquam propolis coniiciatur sufficientem, & coquatur, ita e-
nim syncera ad fundum uasis descendet, cera uerò aquæ innabit, quæ refrigerata
facile aueretur.

DE STYRACE. CAP. XCI.

STYRAX nascentis in minore Asia arboris cuiusdam lachryma est, in par-
uas micas aut grumos concrescens, substantia resinosa, pinguis, in longum, ubi
incaluit, ductilis, in oleo resolubilis admodum, cum grauitate non pauca, odorata
ueluti propolis, præsertim cum prunis imponitur, cuius tres cognoscuntur species
colore tantum differentes, prima candicat, altera ruffa est, tertia nigricat simulq; li-
uet, ruffa foris plus rubet quam intus: candida, ac nigra per totam substantiam eun-
dem colorem habet, reperitur etiam flaua quædam inter ruffam & candidam me-
dia. Meminit præterea Dioscorides candidæ pellucidæq; Styraei gummi simili-
tudinem

tudinem habentis, quam mihi uidere nondum licuit, quauis diligentissime eam inquisierim: prædictarum enim nulla pellucet, neque ulla ex his copiose & sola affertur, sed omnes commixtae, atque arboris suae schobe quam plurima adulteratae, adeo etiam ut ex integra eius libra, uix uncia syncerae eligi queat, sic allatam hodie omnes Storacem calamitam uocant. Eligito puram, in longum ductilem, pinguem, odoratissimam, atque cum suauitate caput aggrauantem, & somnum inuitantem. Adulteratam, furfurosam, aridam, cano situ obsitam & schobe plenam, nullis medicamentis admisceas, præterquam iis quæ odoris causa conficiuntur: præstaret tamen iis quoque potius synceram miscere quam adulterinam, liquidem puriorem, uehementioremque uaporem syncera emittit: adulterata autem imbecillior. Fit in quibusdam confectionibus Rubæ storacis mentio, ibi ruffa lachryma Styra-
cis accipienda est, & minimè cortex ille fuscus et aridus, falsò Storax rubæ uocatus.

DE STYRACE LIQVIDO ET OLEO STYRACINO. CAP. XCII.

STYRAX liquidus qui ad nos peruenit, liquidæ aut Laricnæ resinæ consistentiam & crassitudinem habet. Colorem in cineraceo candicantem. Odorem Styraci similem, uehementem, acrem & grauem, præsertim cum prunis imponitur, per se latius spirat, quam prædictus Syrax, propter liquidiorē substantiam. Idem natiuus nō est, sed fit additis paucæ calamitæ Storaci, copiosiore liquida aut Laricna resina oleo & uino, simulque coctis, expressis, atque cum refrigerit donec candorem acquirat, ligneo pistillo agitat: ex ea mixtura duo resultant, uidelicet Syrax liquidus, & oleum Styracinum: dimissa enim uno atque altero mense, quod deinde tenuissimum, liquidissimum, atque odoratissimum in mixto: uero illorum medicaminum substantia fuerit, a crassiore discedit, eidemque ad fundū uasis descendenti, superius innatat oleo crassior, Laricnæ resine liquidior, colore fulua & pellucida, Styracinum oleū appellata, quod à reliquo aufertur, & separatim seruetur, reliquū rursus agitur ut candorē induat. Eligito in liquido Styrace odoratissimam, odore ad purū Styracē propius accedentem: sed multo uehementius & grauius redolentem, colore candicantē in cineraceo. Oleū Styracinū ad nos rarissime affertur, in quo probatur fuluū, pellucidū, odoratissimum, & suauius quam liquida Syrax redolens, & quod lentum sequacissimumque fuerit dum ab intincto digito defluens dependet.

DE THVRE, manna Thuris, & cortice Thuris. CAP. XCIII.

THVS quod in omnibus Pharmacopoliis hodie corrupto à Libano uocabatur, lo Olibanum appellatur, in Arabia nascentis arboris resinosa lachryma est, in oleo liquefscens: cuius plures sunt species, colore & magnitudine grumorum tantum differentes, uidelicet Indicum, mammosum, masculum Orobia & Manna, ex iis Indicum maximis inaequalibusque glebis constat, pondere sextantalibus & trientalibus, nonnunquam etiam grauioribus: colore tam toris quam intus liuidum, nigricans, candicantibusque aut flauis maculis uarium. Mammosum oblongis est grumis Indicoque minoribus, multis oblongis guttis prioribus superuenientibus & inter defluendū densatis, pendulorum mammarū figura cōpositum: colore flauum, cognominatur hoc Stagonia quemadmodū etiā proxime sequens masculum: hoc paruis, rotundis, candicantibus aut flauis est grumis, Auellane æqualibus: minoribus tamē, maioribusque interdū, partim singulis, partim geminis, ueluti testiculis cōhaerentibus cōstans. Orobia autem minimis est grumulis, Eruo aut Vicia æqualibus, & globosis: colore masculo simile, hæ Thuris differentia hodie nō separatim sed mixte afferuntur. Habet omne Thus suauē, acrē, aromaticū, & uehementē odorem, cum per se, itū prunis impositū. Saporem autē amarū, suauiter acrē et teneum. Probatu natiua habens in grumis figuram in quouis genere, nitidum, purū, intus cū frangitur pingue, odoratissimū, & quod quamprimū, si accendatur, ardeat flamma lucidissima. Adulterabatur olim Pineæ resina, et gummi, hodie uero Terebinthina uera: sed facile deprehēditur. Resina enim in tenues micæ & arinā facile frigitur, & in fumū cū uritur, euahescit atque liquefit, Thus solidius est, citissime accenditur nec adeo liquefit, gummi in igne foetet & in oleo nequaquam dissoluitur. Porro manna à ueteribus appellata, Thuris pollen & farina est: crebro motu concussionē et at-

Petrus Del-
ion scripsit
mibi se à
Lusitano
quodam
pharmaco-
pota didi-
isse Syra-
cem liqui-
dam à uera
Styrace o-
minio di-
scere, ef-
fugit resina
è peculiari
quadam ar-
bore manā
tem in mon-
te Fois, in-
ter Galliam
& Hispani-
am. Hac
itaque ratio-
ne due
sunt liqui-
dæ Syracis
species.

VALERII CORDI HISTORIAE

titione in saccis aut cistis elisa, colore candicans. Probatur pura, Thuris grumulis, Orobia minoribus mixta, atq; eundem Thuri odorem ac saporem habens. Vitanda est cribrata, resina adulterata: hæc, cū prunis inspergitur, inequali fumosoq; motu, & obscure ardet, mixtumq; odorem alieno uaporespirat. Cortex uerò, Thuris arboris Thuriferæ cortex est, qui unā cum adhærentibus affertur. Eligito crassum, pinguem, nitidum, leuorem habentē, et qui Thus imbiberit, odore & sapore Thuri similem, sed uehementius adstringentem.

DE TEREBINTHINA RESINA. CAP. XCIII.

TEREBINThina, appellata Terebinthi, arboris resina est: colore candida, sub flaua, uitrea, aut candido cœruleū colorem affectans, interdum pellucida, quæ friata, primū in plurimas micæ teritur, mox lentescit, & glutinosā fit. Odorem habet acrem, suauē, aliquantulū grauem, & Laricæ resinæ non dissimilē, præsertim manibus tractata, & prunis imposita. Gustu modicē amarescit, et inter dentes lentescit, iis dum masticatur adhærens: destillat hæc primū liquida, deinde paulatim arefcit. Eandem hætenus sacrificuli: unā cum Thure accēsā, in templis adoleuerunt, ob id incensum appellantes: quod factum est, ut hodie adhuc cum Thure ex Syria & Aegypto allata, pro Thuris quadam specie uendatur ab imperitis & impostoribus mercatoribus, qui differentiam inter utrumq; facturi, hanc, Incensum siue Thus appellant: (sed magno errore) Thus autem uerū Olibanum, non intelligentes hæc duo uocabula, alterum græcum, alterum latinum, eiusdem rei nomen esse.

DE MASTICHE. CAP. XCV.

MASTICHA, seu Mastiche, quæ hodie Mastix ubiq; nominatur, Lentisci arboris resina est: colore foris propter inhærentem puluerem, attritione elisum, candida, aut flauescens: eo autem absterfo, uitrea, aut propemodum Crystallina atq; omnino translucens: odore suauis: gustu aliquantulū adstringens, tenuis, oris halitum commendans, & inter dentes lentescens: liquida primū destillat, deinde paulatim aridam consistentiam acquirit, & in guttas densatur, ideoq; minutis grumulis cōstat, pondere obolum plerūq; pendentibus, frequentius etiam minoribus, & nonnunquam maioribus. Eligito synceram, puram, candidam, omnino translucentem, odoratissimā, dum manibus tractatur aut masticatur, lentescentem, atq; inter dentes transparentem, qualitatem amittentem, & loco eius niueum candorem induentem.

DE SANDARACE. CAP. XCVI.

SANDARAX maioris Iuniperi resina est: substantia arida, dura, flaua, omni no translucida & aspectu Mastiche similis: longioribus tamen coniunctis & inter destillandum densatis in grumos guttis constat, duriorq; & multo aridior existit, ideoq; neq; inter digitos neq; dentes lentescit. Odorem habet Mastiche, sed acriorē dum teritur, aut prunis imponitur: saporem etiam eidem similē, sed amariorē. Probatur munda, calculorum, corticum & surculorum expers, prorsus transparentem, flaua, atq; odoratissima: aliud ab hac Sandarace est Sandaraca, metallicū medicamentum Auripigmento cognatum.

DE RESINA ELEMNIA. CAP. XCVII.

RESINA Elemnia, quam aliqui gummi Elemni uocant: ex qua arbore destillatur, quapropter hodie adhuc nullus est eius in Germania usus, rarissimē etiam hætenus affertur, idē ab uno aut altero in tota Germania Pharmacopola tantū. Quātum autem ego ex cōsistentia, qualitatibus & facultatibus eius ratiocinari possum, hæc resina nihil aliud est, quā Cedri lachryma: at quoniam hoc nondum certō cō-

peri, ideo Elemnia nomine, pharmacopolis cognito, eam descripturus sum. Est autem Elemnia non gummi, sed resina densa & sicca, in grumos castaneorum magnitudine concreta, foris in flauo sordida, intus flaua, maculis modice candicantibus distincta, et Thuris modo pinguis. Olore acris, uehemens, & Sandaraci similis, sed grauius & uehementius redolet, ueluti hodie uocata Colophonia. Saporem habet inter Thus, Colophoniam & Sandracem medium. Eligito synceram, pinguem, flauam & translucidior.

DE COLOPHONIA. CAP. XCVIII.

COLOPHONIA quæ nunc ita uocatur, pix est arida: colore in ruffo fulua, & translucida, cum grauitate et uehementia quadam odorata. Sapore amariuscula & subacris, magnam habens cum Elemnia resina, olore, sapore, & substantia similitudinem: quapropter si Elemnia Cedri est resina, hæc sine dubio eiusdem arboris pix est: nam nostra Colophonia plurimum à ueterum Colophonia differt, siquidem quæ apud ueteres sic appellatur, resina est liquida: quam uero hodie Colophoniam nominamus, arida pix est, à quibusdam Græca pix uocata. Laudatur purior, fulua atque omnino translucida.

DE LARIGNA RESINA. CAP. XCIX.

LARIGNA resina è Larice arbore emanat, est autem omnino liquida, consistentia oleo crassior, melle uero liquidior: colore flaua, aut uitrea: olore acris, suauis, atque aliquantulum grauis: gustu amara, acris & tenuis: probatissima quæ ab intincto digito contumaciter & æqualiter defluit, aliquantulum translucida, odoratissima atque purissima. In uitrea probatur clarissima & uitri instar lucem transmittens. Hanc hodie ubique ferè per Hispaniam, Galliam, Italiam atque Germaniam Terebinthinam appellant, atque eadem etiam pro Terebinthina utuntur, magno in re errore. Nascitur copiosissime hæc resina eiusque arbor in Germania, uidelicet in Silesia, Morauia, Transyluania & Alpibus, unde in alias Europæ nationes deferitur.

DE LADANO CAP. C.

LADANON neque resina neque gummi est, sed pinguedo quædam roscida, Ladæ frondibus superficie tenuis insidens. Est autem Lada Cysto similis frutice colligitur hæc pinguedo duplici ratione, uidelicet casu & industria. Nam dum capræ frondes huius fruticis depascunt, barbis pinguedinem abstergunt, in hærentemque uillis, domum saturæ portant, dominis suis depectendam: hic collectio nis modus casu deprehensus est. Ex industria autem Ladanum collecturi uillis obfatos funes, aut funes tantum per Ladæ frondes trahunt, itque sic in hærentem pinguedinem depectunt, & in offas latiusculasque massas conformant, medicamentum quod Ladanum seu Laudanum uocatur constituentes. Tactu lentum & mollescens, in oleo dissolubile: colore cum huc affertur, ruffum, aut in purpura fuscum: sapore adstringens: olore ferum, uehemens, acris, & tamen suauis atque iucundum, nec ingrata suauitate caput olfactumque mulcens. Adulteratur calculis minutis, terra & arena, sed deprehenditur facile, pondere, duricia, nigritia atque odoris ignauia: nam syncero multo ponderosius est, neque digitis dum tractatur adeo adheret, neque mollescit: si cultro incidatur, terram & harenam ostendit, cultrique aciem hebetat, atque inter masticandum dentes offendit. Syncerum uero nullo ex iis uiciis dedecoratur, sed dentibus cedit absque ulla eorum offensione. Eligito leuissimum, in sole diffusum & mollescens, inter digitos lentescens, usque adhærens, colore ruffum, purum atque odoratissimum, cum per se tum prunis impositum. Nascitur in Lybia, Arabia et Cypro, unde ad nos affertur.

DE GUMMI CAP. CI.

GUMMI quod Arabicum cognominatur, Crispinæ spinæ modo aculeatæ, si liquas Lupini figura ferentis, contortique aspectus arboris in Arabia atque

Aegypto nascentis lachryma est, in grumos Auellanae Castaneaeue magnitudine concrefcens, frequenter etiam uermium aut lumbricorum contortorum figuram referens: colore uitreum, candidum, fuluum & pellucidum: gustu glutinosum, dulce, dentibus contumaciter adhaerens, eosque glutinose lentore coniunctos detinens, ut difficilime distrahantur: aquam qua dissoluitur in lentam, sequacem liquidamque mucilaginem conuertens. Eligito purum, uitreum, translucidum aridumque.

DE TRAGACANTHO.

TRAGACANTHUM glutinosum est gummi, ex Hircinae spinae radicibus collectum, oblongis, curuis, intortisque lachrymis, ueluti per cribrum aut rarum linteum expressis, constans colore candidum & pellucidum nitorem leuoremque habens: reperitur etiam flauescens, subruffum, & in fusco rubescens. Substantiam habet lentam, glutinosam, tritu difficilem, aquam qua dissoluitur, in densam, coagulatam & tremulam mucilaginem, glutinis instar tenacem, conuertentem: sapore subamarum & mediocriter dulcem. Eligito candidissimum, purum, minime sordidum, aequaliter translucens, & cuius minima portio maximam aquae copiam coagulet. Afferitur ad nos ex Asia.

DE LASERPICIO CAP. CII.

LASERPICIUM ferulaceae cuiusdam herbae densatus liquor est, in Lybia Media & Syria nascens, ex his, qui in Lybia prouenit, alibi natum odoris bonitate excedit. Verum hic in Germaniam aduectus est nunquam. Illud autem Laserpicium quod in Syria ac Media gignitur, ad nos peruenit atque in alias Europae nationes, Asiae foetidae nomine. Scarificantur eius herbae radices & caules: liquor e plagis destillat, & in guttas grumosas concrefcit, colore ruffus, flauus aut candidus: sapore acris, feruidus & subamarus: odore acerrimus & late spirans, uirosa grauitate Allii, Ceparum Porrique odorem superans, caput replens. Eligito candidissimum, purum, lentum, inter tractandum uiscosum, pondere leuiusculum, & nullis feculis sordidum. Adulteratur pluribus modis, plerumque tamen terra, arena & trito marmore, sed deprehenditur facile, duricia, ponderis magnitudine, habitu sordido, minime natuam grumorum figuram referente, atque arena, marmore & terra dissoluitur, ad fundum uasis descendentibus, ac si coletur in colo remanentibus. Resoluitur ad liquida medicamenta aqua, aut aceto, aut uino iniectum supra prunas:

DE SAGAPENO. CAP. CIII.

SAGAPENUM quod hodie Serapinum corrupto nomine appellatur, nascens in Syria atque uicinis ei regionibus ferulaceae plantae densatus liquor est, quemadmodum & Laserpicium, cui etiam colore, sapore & odore non est dissimilis, non tamen adeo magnum, sed mitius uirus redolet. Eligito syncerum, pellucidum, foris ruffis: intus autem cum frangitur flauis aut candicantibus guttis compactum, inter digitos si tractetur lentescens, & propemodum medium inter Laserpicium & Galbanum odorem habens. Afferitur ad nos in hunc usque diem recens, syncerum ac minime adulteratum, quod in posterum quoque ut fiat, opto. Resoluitur quemadmodum Laserpicium.

DE GALBANO. CAP. CIIII.

GALBANUM prouenientis in Syria ferulaceae plantae Metopium appellatae liquor est, grumis tam foris quam intus flauis aut candicantibus compactus: substantia mollis, pinguis, cum tractatur uiscosus & digitis adhaerens: sapore amariuscule, mediocriter acris, odore grauis, caput suauiter implens & somnum concilians,

conciilians, plerumq; caulium suorum assulis mixtus. Eligito syncerum, purum, pingue, cum accenditur clarum & cum impetu ardentem flammam nutriens, neq; nimis liquidum, neq; nimis aridum, sed mediocriter viscosum, micis suis Thureas guttas imitans, colore maximè flauum, tale enim recens est. Resoluitur ut Lasericium.

DE HAMMONIACO. CAP. CV.

HAMMONIACUM, seu gutta Hammoniaca, à veteribus etiam Hammoniicum Thymima appellatum, nunc uerò corrupto nomine Armoniacum, ferulaceæ plantæ Agasyllus nominata, & in Lybiæ harenis, atq; circa Hamonis locis delubrum nascentis densatus liquor est, densis solidisq; grumis, in massas compactus Thuri non dissimilibus, foris flauis, ruffis, aut in fusco flauis, intus autem candidis aut subcandidis, nitidis & splendentibus. Odore ferè Galbanum paucò castoreo mixtum referens, gustu amarum. Eligito syncerum, minimè harenosum, omnino purum, maioribus grumis, foris flauis aut croceis, intus uerò candidioribus congestum, cum accenditur, claram flammam alens, & repentino ictu propæ densatam aridiorem in plures splendidas nitentesq; micas diffiliens, & cum manibus tractatur, cum lentore mollescens, quod huiusmodi fuerit Thrausima à Dioscoride uocatur, quæ uerò minoribus micis est, & arenis plena, ab eodem Phryma dicitur. Afferitur ad nos syncerum & ualdè purum, omnibusq; bonitatis notis commendabile: nonnunquam tamè semine suo permixtum, quod latum duplexq; est, ueluti Anethi semen, sed maius. Resoluitur ad medicamenta quemadmodum Lasericium.

DE OPOPANACE. CAP. CVI.

OPOPANAX, siue Opopanacum, ferulaceæ plantæ, Panaces Herculeum appellata densata lachryma, seu liquor est, pisco æqualibus aut maioribus guttis in massas compactum. Massis, grumis, guttisq; eius foris croceus, uel ruffus in puniceo color est, intus uerò candidus aut flauescens. Substantiam habet pinguem inter digitos lentescentem, saporem amarum, mediocriter acrem & tenuem, Lygustico nostrati per omnia similem, uehementiorem tamen. Odorem quoq; remittit ueluti Lygusticum acrem, latè spirantem, cum grauitate aliqua caput implentem. Eligito croceo foris colore, intus candido, pingue & Galbani instar lentescens, purum, nullis caulium assulis mixtum, gustu uehementissimum, odoratissimum, maioribus grumis constans, atq; propius ad lacteum liquore, dum resoluitur, accedens. Dissoluitur ad liquida medicamenta, quemadmodum Lasericium, eiq; cognati liquores. Quod si aliquem ex prædictis liquorem ab immixtis ferulæ assulis aut succulis purgare uolueris, mediocriter contritum linteo præligato excipito, atq; in fictili suspendito, superinfuso quantum satis fecerit uino, aceto aut aqua, prout conducere aliquis horum liquorum uideatur: atq; paulatim calefieri supra fornacem finito, cum deinde in linteo liquidum factum fuerit, aut fieri cœperit, exprimito quod sincerum est, surculos uerò in linteolo remanentes abiicito. Purgatur etiam alia ratione, cum nodus ita suspenditur ut humorem non tangat, sed ut feruentis tantum humoris uapor per linteum penetrans liquorem emolliat, donec exprimi queat, quod calente adhuc eo fieri necesse est. Afferitur ex Aphrica, Aegypto & minori Asia.

DE OPIO. CAP. CVII.

OPIUM nigri papaueris liquor est, ex scarificato eius uasculo emanans, colore primum lacteus & consistentia liquidus collectus flauescit atq; exiccatur, cum omnino desatus fuerit colorem acquirit ruffum, spadiceum aut fuscum, atq; in massas herbe sue foliis inuolutas conformatur. Odorem spirat acrem, grauem, & caput in soporem trahentem, ueluti tota ex qua colligitur herba, sed multo grauiorem. Saporem habet amarum, acrem, & linguam stupefacientem. Probatur syncerum, purum, in arido mollescens, in sole diffuens, colore quam maximè ruffum aut spadiceum.

ceum, cum frangitur splendore quodam nitens, & qui facile dissoluitur, nec Cera modo lentescit. Affertur ex Aegypto ad nos.

EUPHORBIVM, Euphorbie nominatę plantę liquor est, cuius duo sunt genera. unū in æquales densatur guttas, magnitudine pisi, modicę cauernosas: colore flauas & mediocriter lucem transmittentes. Alterum in excipulas sub plagis suspensas confluit, & in massam densatur: colore uitreum aut candicans. Primum affertur ad nos frequentius: utrumq; saporem habet omnium feruidissimum, non tamen uestigio cum gustatur agentem: sed paulatim feruescentem, palatum, fauces si uel tantillū ex eo in ore dilutū deglutiat: naribus attractū idem præstat. In summa Tithymalli alicuius gustu qualitatē representat. Porro planta ex qua colligitur, aculeis cortice crassiusculo exētib; ceu uallo munita est, fructū parit in trifido folio, ternis utriculis coniunctū, Lathyridi similē, sed paulō minore: semina utriculū singula clauduntur, colore foris flaua, intus autē candida ac pinguiā: gustu liquorē emulantiā. Quapropter si quis accuratē hanc plantā consideret, inter Tithymalli species reponendā esse indicabit. Eligito grumos liquoris eius puros, cādidos, aut flauos & pellucidos: qui uerō plantę suę aculeis & fructibus permixtus est, reprobaueris. Affertur ad nos ex Africa syncerū, rarissimē adulteratū. Adulteratur autem Gummi, aut Sarcocolla, & Tithymallorū liquore, sed facile dignoscitur. Gummi enim dulcedine & glutinoso lentore deprehenditur: Sarcocolla friabilis est, gustuq; amara: Tithymalli uerō liquor non ita in guttas magnas concreuit, sapore tamen similis ei est.


SCAMMONIVM, quod hodie Scammongam appellant, Scammonex nominatę herbę liquor est, in excavatam eius radicem confluens, colore primum lacteus, & substantia liquidus: is aufertur, & densatus in massas confirmatur: cum exaruit colorem acquirit fuscum, aut liuidum, aut cineraceum, aut fuluum: qui fuluius aut rufus fuerit, pellucet: ceteri colores densis massis sunt, lucemq; non transmittunt. Eligito rarum, spongię instar foraminosum, pondere leue, minimeq; densum aut ponderosum, colore cum frangitur fuluum, Taurini glutinis modo translucentem, mediocriter lentum, & tamen fragile, dissolutu facile, uenis tenuissimis distinctum: gustu leniter amarescens, paululū acre tenuitate qualitatis, mediocriter saluam eliciens, & cum lingue adfricatur, in candidissimum liquorem, lacti similem superficiē se resoluens. Adulteratur Tithymallorum liquore, qui similiter ad linguam albescit, sed deprehenditur in gustu, fauces exurente & dolum prodente acrimonia. Syncerus autem fauces nequaquam scarificat, ut Tithymalli liquor, sed orisam gustatus affert, idq; non immerito: est enim Scammonia cuius liquor est Scammonium, Conuoluolo per omnia similis, quantum ad uiticulas, flores, lacteum liquorem & qualitates attinet: folia quoq; ab huius foliis parum discrepant: sunt enim ipsius foliis similia, sed pilosa, triangularia, atq; in alatę sagittę figuram redacta.

Scammonium.



DE ALOE. CAP. CX.

ALOE eiusdem nominis herbæ densatus succus est, quem Indi pellibus infu-
sum ad nos mittunt; eius tres hodie cognoscuntur differentie, ex eadem tamē
planta expressæ. Optima Succotrîna appellatur, omnium purissima, quæ dum frigi-
da est, malleo percussa, in splendida nitidâq; fragmenta diffilit. Colore fulva, aut
ruffa & pellucida, inter tractandum mollescens, in sole diffuens, atque foris nitido
fuscoq; , aut nigro colore bonitatem suam intus latentem, abscondens & dissimu-
lans. Sapoem habet amarum, adstringentem, aromaticum, aliquantulum tenuem
& oris halitum cōmendantem. Odorem autem aromaticū, & tamē gravem. Secun-
da Hepatica cognominatur, prædicto densior, aridior, iocininoris modo concreta.
Colore in citrino subruffa, & Succotrîna minus pellucida. Odore & sapore Succo-
trînam æmulatur, gravius tamen olet, pauloq; amarior existit, magisq; adstringit.
Tertia Caballina vocatur, ueterinariis relinquenda, omnium ponderosissima, ari-
dissima, densissimaq;. Colore nigra, & minime translucens, terra arenisq; plena, &
maius quàm prædicta uirus olens. Gustu amarissima & ualde adstringens, & non
sine horribili qualitate aliqua palatum & stomachum afficiens. Eligito in quouis ge-
nere pinguisimā, purissimā, hyeme friabilē, æstate molliusculā, & in manibus len-



tescentem, calculis, arenis ac terra carentem, tam gustu quam olfactu aromaticam, maritudinem respicientem, somnum odore conciliantem, & dissolutu facillimam. Afferatur ad nos ex India atque Arabia, per Syriam & Aegyptum. Herbam autem eius ex Hispania allatam, plauti, omnibus quibus a Dioscoride describitur notis respondentem, hyeme tamē obgelu eruenda est, & in tepido quodam loco suspendenda, nam in aëre quoque suspensa uiuit ac incrementum capit, cuius rei causa etiam amphibion appellatur: non enim in Arabia, Indiaque tantummodo prouenit, uerum etiam maritimis Apuliae & Hispaniae partibus, sed faciendo succo inutilis.


DE SACHARO. CAP. CXI.

SACHARVM quod hodie Zuccharum appellatur, melleae dulcedinis succus est, è singulari harundinis genere expressus, ad iustam consistentiam coctus, & in turbinatas metas densatus, colore & splendore niueus, aut in candido rubescens, cum aqua dissoluitur & rursus ad crassitudinē coquitur, mellis instar pinguis, & in longum ductilis, dulcedinis gratia & suauitate ipsum mel superans, cuius prima diuisio duplex est, natium enim alterum & facticium alterum. Natium liquor est, sponte ex harundinis suae oculis in geniculis germinantibus erumpens, principio liquidus, deinde cum sole excoquitur, pisco, fabae, aut auellanae aequalibus grumulis, in salis friabilem naturam ac densitatem conerescens, colore interdum candidum, interdum etiam fuluum, & pellucidum: hoc antiquis medicis tantum Sachari atque salis Indi nomine cognitum fuit. Hodie uero non amplius affertur, sed eius in locum substitutum est, quod Candum aut candidum cognominatur, cuius mox fiet mentio. Facticium diuiditur in Pyramidale, Candum, Penidium. Pyramidale rursus in species plures, uidelicet Thomaeum, Melissuum, Cannarium & Finale. Thomaeum à quodam Occidentalis Indiae loco, cui Sancti Thomae nomen est, cognominatur, ubi plurimum fit: hoc omnium pinguisimum est, colore candidum aut in flauum uergens, frequenter etiam in mediis metis rufum, praesertim in summitate: quod in eo candidum est, praesertim foris, friatur facile: rufum uero propter lentam

I
Natium.

II
Thomaeum.

Sacharum.



tam pinguedinis densitatem frianti resistit, cū resolutur rufescit, & in despumando plurimū spumæ excernit, cum rursus ad spissitudinem coquitur, densitatem diu seruire nequit, sed propter pinguitudinem melli cognatam semper humescit. Saporem habet cum odore aliquo pingui, cæteris quidem dulciorem, magisq; viscosum, sed minus suauē. Adulteratur spuma sua, intus pyramidibus admixta: dolum fusco rubore detegitur. Eligito tactu facile, pingue, densum, candidius, & quod non adeo lentum & contumax fractu est, cū malleo percutitur. Melisium similiter ut Thomæum ab India occidentalis quodam loco cognominatur, mediamq; habet inter Thomæum & Cannarium substantiam, colorem & naturam: purius enim, nitidius, candidiusq; Thomæo existit, idem facile friatur, manibus mediocriter propter pinguitudinem aliquam adheret friatī farina. Probatur tam intus quā foris candidissimum: quod autem foris tantū candicat, intus uerò subruffum est improbatum, nam adulteratur hoc quoq; spuma sua Pyramidibus intus commixta. Cannarium nominatur ab Insula Cannaria, inter Aphricam, Spagnollam & Americam sita, ubi copiosissimum coquitur: est hoc prædictis duobus generibus solidius, multo candidius, splendidius, ac purius. Saporem habet ualde dulcem & suauissimum. Eligito undiq; niuis instar candidissimum, aridissimum, minime lentum aut pingue, sed malleo percussum, in solidas partes dissiliens, dum dentibus atteritur, cum strepitu quodam cre-

III
MelisiumIII
Cannarium

pans, atq; si resoluatur ac despumetur, aqueam claritatem habens. Finale, siue Zuccharum Finis aut Fini à mercatoribus appellatum, nomen inuenit ab extrema & finem consecuta bonitate. Fit hoc è Cannario cū optimè despumatur & depuratur: decoquitur deinde lento igne ad debitam consistentiam, postremò in dodrantales Pyramides cœrulea charta inuolutas fingitur. Optimū quod candore, ariditate & splendore etiam optimum Cannariū superauerit. Adulteratur Cannario in paruas metas, seu Pyramides formato, sola metarū paruitate & chartæ colore: Finale mentiente dolum detegunt fragmenta, à Cannario nihil differentia. Candum ex quouis supradictorum genere fit, è Thomæo difficile tamen: uerū è præstantiore, præstantius & pulchrius. Resoluitur eorum quoddam, ac denuò ad iustam consistentiam, certum modum non excedentem, tum ollis infunditur è rariore luto factis, intus prius ligneis tenuibusq; hastulis, per transversum inuicem crucis modo crebro dispositis, repletis, ita tamen uncia aut duorum digitorum intervallo, ab inuicē ligna illa distēto. Fiunt hæc è recto fissiliq; ligno quale est Abietis aut Piceastri. Reponitur deinde feruens adhuc in calefacto æstuario, donec circa insertas hastulas densatum, cuborum aut cocti Calchanti modo concreuerit, tum eximitur & in partes ueluti longos racemos diuiditur. Saporem habet Cannario similem, ori inditum sensim liquefcit, dentibus autem comminutum, crepitu uehementiore quā Cannarium obstrepat, quoniam omnium durissimam substantiam possidet. Probatur quod in fuluo colore stauescit & pellucet, quodq; in maiores cubos exaquantis

V
FinaleVI
Candum

Z iij

VII
Melicalas
mus.VIII
Penidiam.

splendidisq; lateribus, densatum fuerit. Laudatur atq; excellentissimum censetur omne Zaccharum, quod recens fuerit, atq; minimum spumae ac sordium in despumando remiserit. Affertur quod iam descripsimus Zaccharum Pyramidale oclarissimum inferioris Germaniae emporium: ubi demum interpolatur, ac Finale coquitur, atq; maxima Candi appellati copia. Affertur etiam a Venetiis terrestri per alpes itinere, non tantum Finale, uerum etiam aliae eius differentiae. Haec sunt in Germania cognoscuntur. Alii autem natum ueluti in Creta, Cypro aut aliis regionibus, quibus differentiis dignoscatur, inquirendum. Nouisse autem oportet has generum differentias non plantae diuersitate fieri, sed terrae ac locorum, in quibus nascitur, diuersa natura ac situ oriri: eadem enim est herba quae hunc liquorem fundit, quantum ad figuram, attinet, qualis autem haec sit iam trademus. Herba est harundinei generis, ab uno radicis cespite plures ac proceras harundines, quas Canpollice multo crassiores: ac interdum manum complentes, figura teretes, colore flauis, crebris geniculis ueluti Zozis, sextantis, quadrantis, aut trientis interuallo distantibus praecinctas. Folia e geniculis exeunt sursum erecta, figura harundinea, bicubitalia, ac frequenter etiam longiora, duobus digitis latiora, atq; palustri Tiphæ tam figura quam positu similia: ipsae harundines fungosa intus medulla plene sunt, & melleae dulcedinis succo turgent. Radicibus nititur crassis, geniculatis, obliquis, atq; per transuersum se propagantibus, intus non minus quam Cannae fungosae, dulci, succosaeq; medulla grauidis, a quibus oculi aut germina ad consuetudinem auferuntur. Flores & semen eius quales sint mihi uidere nondum licuit, quapropter silentio ea praeteribimus, donec aliquando utrunq; concedente Christo, oculata fide cognouero. Penidium uero Zaccharum ex Pyramidali fit, in micis confraeto, per noctem in sufficienti aqua, donec resoluitur macerato, tum ad iustam & diligenter considerandam consistentiam lentis prunis, absq; despumatione coquendum, ut ne frigida aqua instillatum omnino densetur atq; indurecat, nec in ea inter instillandum dissoluatur: deinde super marmoream tabulam aut mensam optimè exaequatam, oleo quodam pinguisimo superunctam, dum adhuc seruet effundendū, eiusq; diffuentes ora & extremitates continuè in medium referendae: cum autem propemodum Larignae resinae crassitudinem acquisierit, in unco parieti affixū, suspendendum, defluensq; sine intermissione ad uncum referendum, atq; celerrimè diducendum distrahendūq; est, donec candorem acquirat, tum ueluti in tenues funes torquendum & exiccandum: agenda haec sunt in calido aestuario, manusq; Amylo conspergendae. Eligito candidissimum, rarissimum, at leuissimum.

DE DROSOMELITE, id est, Manna. CAP. CXII.

DRΟΣΟΜΕΛΙ, quod etiam Aëromeli à Græcis, ab Arabibus uero, Men, Siracost & Tereniabin, à Medicis autem recentioribus Manna appellatur: roscidum siue aëreum mel est, ut ipsa etiam Græca eius nomina indicant. Pandecta rursus tamen Tereniabin diuersum esse à Manna tradit, sed improprie, siquidem generenihil differunt, utrumq; enim aërei mellis species existit. Est autem omne aëreum mel qualecunq; id fuerit succosus, optimusq; terrae uapor: aëstate cum plures serenissimi dies fuerint, calore eleuatus, in aërem attractus, & ibidem in dulcem liquorem excoctus, qui postremo nocturno frigore coactus, ante diluculum, uice rosis super arborum & fruticum folia decedit. Colorem & consistentiam eandem minime habens in omnibus regionibus: quod enim in calidioribus locis, ueluti Arabia ac Syria gignitur, in paruas, friabiles, candidasq; micas densatur: quod uero apud nos in Germania decedit, (decidit enim aëstate serena sepius) liquidum, flauumq; est, foliisq; ceu superinfusus aliquis Sirupus insidet, liquidum permanens, donec ab

ab apibus & eius generis insectis absorptum auferatur. Gignitur etiam in Calabria, nostri siccus, propter cœli temperaturam, nostri aëris temperamentum calore uincens. Hoc ab incolis colligitur, & ad medicinæ usum seruatur, diu tamen durare nequit: corrumpitur enim ac diffluit quauis humida aëris constitutione, ideoq; calido siccq; loco repositum seruari debet. Eius duæ à pharmacopolis constituntur differentiæ, Masticina & Granata, ab argumento cognominatæ. Granata manna minoribus granis aut grumulis constat. Masticina autem maioribus atque Mastichæ guttis propemodum æqualibus. Saporem habet ubicunq; genita, dulcissimum, aliquantulum Penidii instar lubricum & uiscosum, Eligito recentem, candidam, & anno minimè uetustiore, ultra id tempus inueteratâ rufescit & fusca fit, atq; medicinæ inutilis redditur. Adulteratur quàm facillimè Zacharo penidio, graminis aliarumq; herbarum foliis circumuoluto, & in paruas micæ formato, ut de cœlo cadentes, ac circa foliola densatas guttas, habitu suo mentiens, pro natiuo ueri di possit, indicat fraudem durationis tempus: huiusmodi enim in annos plures seruatur. Nouisse etiam oportet facticæ esse quæcunq; Senæ folia grumulis suis amplectitur, nulla enim ex Arabia & Aegypto ad nos affertur Manna, nedum quæ super Senæ frondes in Aegypto prouenientis ceciderit: nam Sena in Europa nascens satiuæ est, & Manna super satiuas herbas parcius cadit, cum parua earû sit copia: in syluestres uerò frequentius se dimittit, quoniam latos campos occupent, recipiendo huic liquori capaciores.

DE CHINAE RADICE. CAP. CXIII.


CHINAE radix quam aliqui Chinam appellant, & Schinam pronunciant, à China occidentalis Indiæ regione nomē accepit, in qua copiosè nascitur. est autem tuberosa, inæqualis, media inter Tuber & Rhodiam radicem figura, magnitudine incerta, raro tamen triente breuior: foris in cineraceo pallida, simulq; fusca, intus uerò candida, nigrisq; filis per longitudinem transeuntibus distincta: substantia tenera, fungosa, leuis & arida ueluti Galanga aut Rhodia radix: ea digitis confricata & auribus admota Pumicis aut Melsæ terræ instar, strepitum emittit. Saporem habet tenuem, subdulcem, & aliquantulum suauem. Odorè similiter tenuem, non iniucundum, & halitum inter mastigandum commendantem. Vtuntur indigenæ ea aduersus morbum Gallicum, decoctum ipsius propinantes. Affertur Antuerpian.

FINIS LIBRI QVARTI ET VLTIMI

Aa

Folium ad cap. 52. lib. 4.

Elaeagnus Cordl.



Caspari Collino Pharmacopoeo

peritissimo Seduni apud Vallesios, Conradus Gesnerus S. D.

ACCIDIT errore quodam, ut pictor dum stirpes aliquot è meo pictarum stirpium thesau-
ro pro his Cordi libris depingeret, has etiam numero quinq; ad Cordi libros nō pertinentes,
in formis ligneis expresserit. quod ne frustra factum esset (nostrum enim stirpibus quod meditamur
uolumen, an cum eiusmodi aut aliter factis iconibus, olim Deo largiente edituri simus, nondum con-
stitimus.) Cordi libris hic eas subiungere, & ad tuam humanitatem, optime & charissime mi Col-
line, mittere uolui. tu enim inter Pharmacopoeos eruditione excellis, & meum in stirpibus inue-
stigandis studium benigne uuas, communicandis subinde ijs quae in patria tua herbarum feracissi-
ma, non uulgaria tibi se offerunt. His igitur frutere interim, donè tandem nostrum etiam De Fonti-
tibus Helueticæ & Germaniæ medicatis, iam dudum in tuam gratiam inchoatū, & propter alias oc-
cupationes intermissum librum absoluerō. Vale. Tiguri decimo Calend. Ianuarij, instantis anni
M. D. LX.

DE TULIPA TURCARVM.



HOC Anno
à natiuitate
Domini M. D.
LIX. initio Apri-
lis, Augusta, in
horto magnifici ui-
ri Ioannis Heinri-
chi Heruuarti ui-
di herbam hīc ex-
hibitam, ortam è
semine quod By-
zantio (uel ut alijs,
è Cappadocia) ala-
tū erat. Flore-
bat tū temporis,
flore uno pulcher-
rimè rubente, ma-
gno, instar lilij ru-
bri, octonis condi-
to folijs: quorum
quatuor foris sūt,
& totidem intus,
odore suauissimo,
leni, & subtili, qui
breui euahescit.
Color interior pal-
lidus est aut sub-
flauus: & stamina
tanquam croci, in
medio intercepta
ceu geniculo, ipsa
quoq; octona, ex
Aa ij

quibus itidem alia exterius paulò sunt, alia interiorius. Calix nullus. Caulis est circiter
pedem altus. Folia in eo quaterna albicant, crassiuscula, solida, duos palmos (id est
digitos octo) longa, Orchæon ferè foliorum figura, modicè recuruato margine,
(non adeo quidem ut pictura præ se fert, quam antea expressam amicus quidam

Tulipa.

ad nos misit.) ex his tria inferiora masculula sunt: summum, paruulum, Macula nulla dumerant, quas in adultioribus foliis apparere aiunt. Radicem non uidi: sed aiunt esse bulbosam instar hermodactyli ferè, uel porri forma & magnitudine. tertio anno florem producere. propagari de radice, bulbulo puto adnascente, semen nullum proferre, siue natura, siue nostri coeli culpa. Turcio uocabulo Tulipam uocant aliqui. Sed aliam herbam in Italia eruditi Turcio Tulipæ nomine demonstrant, cuius picturam Ioan. Kentmannus nobis communicauit: ternis foliis, flore ceu lilii parui, luteo, bulbo ruffo, simili cepe, cuius semina olim Guilandinus Borusius ad me misit, lata, ruffa, similia seminibus lilii syluestris quod Martagon Itali uocant. ipse Satyrium triphyllum esse coniciebat. & fortè nostra etiam hæc Tulipa, Satyrii species est, præsertim erythri uel erythraici, cum flore rubeat. Quòd autem semina non fert, uel regionis ui accidere potest, uel quia species diuersa est. nam & Iridis species alia semine fecunda est, alia sterilis. Sunt ex Turcis (inquit Kentmannus) qui Tulipam dicunt nomen habere à flore, qui formam refert pileoli Damatici.

DE CHAMÆCERASO MONTANA.



FRVTEX in alpidibus Claronæ, circa Fabarias thermas, alibiq; & apud nos etiam in Albio monte nascitur, cubitalis plerumq; aut parum supra. qui cerasa pulchra & rubra fert, ueris simillima, paulò minora, pediculo etiam simili: succo plena aquoso, subamaro, croceo per maturitatē, hoc est, in fine Septembris, locis frigidioribus: apud nos Augusto. prodeit ea ex alarum cauis. semina insunt alba, lata, in singulis fructibus ferè sex septemue, aut plura, circa pediculum inter se coniuncta, amara. Fructus quidem gemelli uiuntur. Aspectus sanè cerasa uera mentitur, sed gustus ingratus sileo prodit. Hoc etiam peculiare habent, quòd punctis binis nigricantibus singuli hi fructus, tanquam ocellis aut pupillis notantur. Folia quoq; cerasi, (uel arbuti, sed non crenata) oblonga, in mucronē exeuntia, marginibus non serratis: sapore non certo quidem, sed ingrato: bina. Stipitis cortex albicat, ut fruticis illius quem *Beinhülzen* Germani uocant, (Dodoneus, ni fallor, *Periclymeni* speciem: nos *Periclymenum* rectum uel marem appellabimus:) cui sanè cognatus uideri potest, foliis & fructibus tanto maior, quanto stipitate & ramis minor est, succo & sapore eodē, nescio an etiam seminibus. Florem quoq; nondū uidi. Medulla ligni alba est. Quòd si, ut suspicor, cognatus illi fuerit, Chamæpericlymenum appellabimus. Sed hoc aliàs certius indagabitur: interea (si placet) Chamæcerasum nuncupemus: nam & montium nostrorum incolæ *Bergtrefse* appellant, hoc est, Cerasa montana. In literis quidem, quod sciam, nulla hætenus eius memoria extitit: neq; usum eius ullum esse

Chamæcerasus.

liàs certius indagabitur: interea (si placet) Chamæcerasum nuncupemus: nam & montium nostrorum incolæ *Bergtrefse* appellant, hoc est, Cerasa montana. In literis quidem, quod sciam, nulla hætenus eius memoria extitit: neq; usum eius ullum esse

esse puto, audiui quidem quatuor aut quinque cerasa deuorata, uomitum eiere: al-
quando etiam aluum. Chamæcerasus alia est cuius meminit Dioscorides ille,
aut quisquis est, confarcinator libri Græci De morbis curandis per simplicium me-
dica. a capite ad pedes, &c. capite, cxxiii his uerbis: Chamæcerasus, herba (πρω) exi-
gua, circa filices nascens: eo tempore quo & arboris (nimirum cerasi) fructus ma-
turefcit, duos aut tres fructus cerasi fructibus per similes profert, ualde odoratos in-
star moschi. huius fasciculus cum radicibus, foliis & fructu, in uino decoctus ad ter-
tias, certissimum est remedium ad sclerias, id est, duos tumores emolliendos. Sic il-
le. Quænam autem sit herba ista, fateor mihi non constare, dubitavi aliquando an
hæc esset quæ fraga fert: quoniam & parua est herba, & fructu non dissimili cerasi,
& locis quidem montanis (illuc enim & circa filices quoque præcipue nascitur) non
ante cerasa maturefcit: & fructus odore est suauissimo, præsertim altioribus locis: &
ad remedia uaria herba simul & fructus radicumque usus esse solet, & aliud eius Græ-
cum nomen hæcenus nemo dixit, & ipsa quoque arbutus à Bithynis uidetur Chamæ-
cerasus dicta, ut inferius patebit. An uero duos tumores mollire aut discutere pos-
sit, affirmare non habeo. est quidem ei uis astrictoria, qua partes corroborat intus
forisque, sed aperienti quoque uim habet, (& per omnia fere eandem quam pentaphyl-
lum;) qua iecoris ac lienis obstructionibus summopere prodest: & urinum strenue
ducit, sicut & renum calculos. Fructus quidem non proprie Moschum olere mihi
uidetur: & arbuto quàm ceraso similior: quare Chamæcomarum potius quàm Cha-
mæcerasum appellarem. nam & Plinius: Aliud (inquit) corpus est terrestris
bus fragis: aliud congeneri eorum unedoni, &c. xv. xxiiii. A Nicolao Myrepso
mentio fit huius herba corrupto nomine φράδα, in Martiati inagni compositio-
ne: ubi Fragulam quidam Latine nominant. Ab eodem χαμονέρασις (sic eni-
m habet manuscriptor codex quo Fuchsius usus est, ut noster iam citatus Diosco-
ridis codex χαμονέρασις,) radix nominatur, in Drosato lxxxii. ad iocinerosos, lino-
sos, &c. inscripto: ut proxime præcedente (ad iocinerosos) radix eius simpliciter.
Fuchsius simpliciter cerasum humilem ab eo sic nominari putat, nec aliud addit. Re-
centior quidam Græcus innominatus, (cuius interpretationem super nomenclaturæ
simplicium medicamentorum, barbarè quidem prorsus & ineptè scripam ha-
beo) Cistum aliis nominibus Citharum, Oribithrum, & Chamæcessarum (sic enim
scribit, χαμαικέραιον, non χαμαικέραιον) uocat: nos apud Dioscoridem Cistum aliter
Citharum, aut Cissarum, dici legimus. Sed Cistus (opinor) nec fructum nec aliud
ceraso simile habet. Dalechampius doctissimus Lugduni medicus Chamæce-
rasum nominat arbutulam, quæ Arabicè Mahaleb dicatur. Aduerhitur (inquit) ex Mahaleb;
Syria, quamuis ubique per sepes istie (circa Lugdunum) nascatur, sed arbore humi-
liore, fructu minus habito, nucleo & semine tenuiore ac graciliore. Folia rotundius-
cula sunt: flos albus, ceraso similis. primus omnium uere prodit. fructus sigillatim
pediculo suo adnexus, niger ubi maturuit, rotundus, ex amaro subdulcis. Sic ille: a
quo etiam ramulum unum cum fructu suo accepi: quem depictum inter alias Cordi
descriptionibus plantarum adiectas icones reperies. In Gallia passim nasci Bel-
lonius mihi retulit, & inuenisse se etiam in monte illo Rhetorum, qui inter Curiam
& Clauennam interiacet. Seminibus eius quæ odorata sunt uti Lugduni illos,
qui Chirothecas odoribus imbuunt. Nascitur, si bene memini, inuenta aliquando
mihi, copiose in monte proximo Vuesæ oppido (quod ad Riuarium lacum apud
nos est) exeunti Curiam uersus ad sinistram, locis lapidosis. Et, ni fallor, in Valle-
sia quoque: ut conicio ex epistola tua, doctissime Colline, qua superiore Augusto ad
me scribebas, inuenisse te fruticem satis altum, foliis fere cerasi, cui etiam fructu (quam
uis immaturo adhuc tibi uiso) respondere uideretur: & pediculis oblongis. Huius
ramulum, & fructus, quanquam aridos, ut quamprimum unum cum aliis quas mihi
promissisti rebus ad me mitas, cupio: Mahaleb (uel Mahalub, inquit Auicenna)
eligendus est albi coloris, & purus. Calefacit in primo ordine, & modice siccari
abstergit, attenuat, resoluit, & mitigat dolores, præsertim ilium ac dorsum, cum aqua

Aa ij

Phillyrea.

multa habetur utiliter in syncope. Prodest etiam aduersus coli morbum, & calculos renum ac uesicæ. Mahaleb (inquit Bellunenſis) eſt granum fructus, ſimile oſſi ceratorum, notum in Syria, & commendatum contra calculos renum. Serapio Phillyream, Arabicè Mahaleb nominat quam etiam Matthiolus pluchrè pictam exhibet: ſed fruticem à noſtro iam dicto ſiue Mahaleb (ut Datechampiùs & Bellonius mihi nominarunt) ſiue Chamacerato diuerſum. Plinius lib. xv. cap. xxv. cum ceratorum diuerſa genera memoraffet, ſubdit: Sunt & Macedonica parua arboris, raroq; tria cubita excedentis, & minore etiàminum frutice Chamacerati. Tales & tantas (id eſt, urbanas quidem & propter fructum expetitas cerasos, ſed nanas ac pumilas) hodie etià aliqui in hortis alunt, ut Torgæ apud Miſenos Kreichius, ualde humilem & fruticem potius quam arborem. Zwergtrieſe uocare licet Germanicè, ſicut & Malum nanam, Zwergöpfel appellant. Aſclepiades Myſæanus (ut refert Athenæus lib. ij. Chamaceratum dictam, pumilam eſſe tradit, in Biſthynio agro frequentem, cuius radix non magna ſit, ut neque ipſa arbor, ſed par roſarum arbori, (ut uertit Natalis de Comitibus: Græcus codex noſter impreſſus habet, ἐμὰ τῆς ῥόδου: Natalis legit nimirum ἐμὰ τῆς ῥόδου uel ῥόδου τῆς ῥόδου.) Bacca eius cætera omnia cerasi cōſimiles ſunt: ſed copioſè ueſcentibus caput uini modo grauatur, & dolores cient. Hæc quidem Athenæus de Mimæcyliſ, id eſt, unedone uel arbuti fructu intelligit, quorum & arbor huiusmodi ſit: & qui fructus plures ſeptenis ingeſſerit, capite grauatur. Apparet itaq; Chamaceratos eſſe & dici diuerſas: quas diſtinguendi graua, à nobis exhibitam, ſi libet, montanam cognominemus: eam cuius grana à Syriſ petuntur, Syriacam: quæ in hortis propter fructum edulem collitur, urbanam, Arbutum autem & herbam quæ fraga fert, uſitatis ſuis, non Chamacerati, nominibus, ad uitandam homonymiam, uſurpemus.

DE CHAMAEMESPILO.

CHAMAEMESPILVN nomino hunc fruticem, quod & ualde humilis, & fructum ferens meſpilaceum, proueniat. Frutex eſt lignoſus, cubitalis, foliis ſerè ocimi, ſubrotundis penè, parte ſupina in canis uel albicantibus & modicè lanuginofiſ, ſerè inſipidiſ. Bacca in eo ſingula aut binæ dependent, elegantes aſpectu, cocci colore, magnitudine qua fructus polygonati: umbilico in quinque partes diſſecto, ut in generis Meſpilacei fructibus cum cæteris, tum Spinæ appendicis ſiue oxyacanthæ, cuius etiam ſaporem refert, hoc eſt, inſipidū. Caro intus ſiccior, colore ſubluteo: grana terna, parua ceu uinacea. Maturescunt initio lulii, decimo enim huius menſis die maturas decerpi. Ramuli cortice ſubruffo ueſtiuntur: & minores ex eis uiminum inſtar lenti ſunt. Naſcitur in montibus & collibus cum alibi non paſſim tamen, tum iuxta Badam noſtram in Legerio mōte, & alicubi in Albio noſtro. In Bernenſi agro Wälpi uideant, ut audio: licebit etiam Zwergneſplen (id eſt, Meſpilum terreſtre uel nanam appellare. Itali, ni fallor, Pyrum ceruinam (uulgo Pero ceruino) nominant: ut ex ramulo quem doctiſſimus Aldrouandus ad me miſit, faciliè cōiicio: foliis ſub rotundis, ocimi, infernè albicantibus, mandenti ſub glutinoſis: cortice ſubruffo: eſi Bellonius cum apud me Chamaeſpilum hanc uideret, ſimilem potius pyro ceruinæ, quam eandem exiſtimabat. Naſcitur & Itælorum Pyrus ceruina in alpiſ; ramulo quem habeo cum foliis, nihil differt: fructus non uidi. Bellonius Chamaepyrum nominabat: mihi rectiùs Meſpiliſ adnumeranda uidetur. Idem alicubi in obſeruationibus ſuis Galliciſ hunc fruticem Gallicè Malancier appellat. Chamaepyri nomen non laudo ex Græco & Latino compoſitum. Chamaepion potius dixerim, quanquam & Apioſ uocatur herba, cuius radix ἐπιόν, id eſt, Pyri ſimilitudinem habet.

CHA-



DE CHAMAENERIO.

CHAMAENERION uoco hanc plantā, quod Nerion siue Rhododaphnē aliquo modo amuletur, foliis, floribus quod ad sitū, & semine in siliquis lanuginoso, &c. & natalibus, iuxta aquas. Veneni quidem, ut Nerion, nihil habere puto. Sed quoniam aliæ etiam species huic similes sunt, de omnibus aliquid afferamus: merentur enim omnes sub genus unum referri, unoq; nomine cōmuni appellari, differentiis à magnitudine aut aliunde adiectis. Ruellius unam tantū eius speciem describit, quam Delphinium esse putat. Herbarii quidam (inquit) putant esse, quam Filium ante patrem supra diximus appellari, (atqui supra lib. 2. cap. 125. in Bellio flore al- Filius ante-
terius herbe quam alij, Itali præsertim, eodem nomine Filium ante patrem, uel Antipatrem uocant, meminit, hic cō- te patrem,
fundit,) quod siliquam & intus semen ante floris exitum ostendat, rectius si Partus ante conceptum ab eis appellaretur. Iam audio aptius à teretis siliquulæ per extremū in expansum florem exeunte, Buccinariam quadam similitudine dici, (Dioscorides etiam Delphinium suum à Romanis Buccinum uocari tradit.) Surculis à radi-
ce una pedibus funditur, foliis paruis, tenuibus, intersectis, incuruis, longiuscu-
la Delphinis effigie: flore uiolæ matronalis, subpurpureo: semine in ualvulis teretibus exiguo, milio (mihi non uidetur) non dissimili. Inuenitur frequens in asperis, & locis totius diei solem accipientibus. Hæc ille. Mihi magis inclinat animus Delphinium esse consolidam regalem uulgò dictam, &c. Vide-
tur autem Ruellius primam & uulgarem huius generis speciem tantū obseruasset

Buccinaria

Antoniana

Chamenerion.



Epilobium.

spide ferrea. Iam dictæ herbæ species altera reperitur, solo floris colore, quicquid
didus est, differens: rarior inuentu. Vtræque iam dicta foliis & caule laevis est. Tertia
species aliquantulo maior, & leniter hirsutis foliis reperitur, infrequentior prima.
Quarta maiori frutice nascitur, eoque suavis odoris, sed leuissimi, cum relique omnes
odore uacent: sed huius etiam forsan odor ille tenuis, non omni tempore sentitur,
mihi quidem uehementer gratus. Siliquæ quadrangulæ sunt, non teretes: flos pur-
pureus: caulis rotundus & ex parte puniceus, ut & anguli siliquarum. Radix qua-
drangula, tenuibus per interualla fibris capillata, dura et ferè lignosa. Sed ex his no-
tis aliquæ forsan etiam aliis speciebus conueniunt. Calidam esse iudico in medio
cum dulcedine quadam suauis ac simul modicè abstergit, leui quadam ferè nituosa
facultate, ut diuersis eam constare partibus ac uiribus appareat. Inferiores quidam
Germani (Frisii præcipuè puto) hanc priuatim *Schülmon* appellant, nescio qua
etymologia, nisi fortè quasi *Schelmund*/ ut superiores Germani dicerent, quod
ad crustas & ulcera oris, quibus os excoriari (*Schelen* dicunt nostri) uidetur,
præcipuam uim habeat, in illo præsertim morbo & stomacacæ, quam accolæ qui-
dam Oceani regionibus illis peculiarem, *Schorbock* appellant. Contra quod ma-
lum olim iidem in regionibus Britannica utebantur, hodie non satis cognita. Eas-
dem uires prædictis etiam speciebus esse coniunctio: sed minus efficaces. Poculis im-
ponere

quæ à quibusdam, ut dictum est, Filius autem
te patrem uocatur: ab aliis (in Germania
inferiori præsertim) Antoniana, uel sancti
Antonii herba: ab eo nimirum quod
Erysipelatis, quæ uulgò sancti Antonii
ignem nominat, medeatur. At Romæ her-
bam aliam sic nominari audio, quæ erudi-
tis Plumbago Plinii uidetur, causticâ, &
ignis instar urentem, non extinguentem.
Nostri *Schoßtraut* appellant, quoniam
dolores eorumque impetus in dentes, abi-
gat, collo suspensa, ut creditur: aut fumo
eius dum uritur ore excepto. Dodonæ-
us inter *Lysimachia* describens, & species
eius tres distinguens, Germanicè uocat
Braun oder rot Weiderich/ non usita-
to, (ni fallor) sed propter aliquam cum *Ly-*
simachio similitudinem à se confecto no-
mine. *Lysimachium* quidem genere to-
to diuersum dixerim: & Dodonæus etiâ,
Lysimachium illud solum ex quatuor à se
propositis iconibus, quod luteos flores
habet, uerum esse, & quæ de eo tradunt au-
thores præstare posse putat. Mihi ubi ue-
tera nomina non inuenio, aut dubito, no-
ua potius excogitare certa ratione, quam
illis temerè abuti, placet. Appellatur igitur
si libet *Epilobium*, *ἐπιλόβιον*, uocabur-
lo ex tribus composito: quoniam ion (id
est, uiola seu flos eius, quæ *Leucoio* simi-
lem habet) *ἐπιλόβιον*, id est, super siliqua na-
scitur, ei que insidet, ita ut siliqua suo flore
ceum præpiletur, sicut hasta uel hastile cur-

ponere solent, qui stomachacem timent aut patiuntur. Hanc Lucas Ghinus Italus *Lychnis*,
Lychnidem existimabat. Hactenus memoratę huius generis species, singulis cau-
 libus exiliunt. At quinta species, quam priuatim *Chamaenerion* nuncupare libet, *Chamaenerion*.
 propter maiorem cum Nerio similitudinem, pluribus surgit caulibus: omnium maxi-
 ma, nisi aquę inopia incrementum prohibeat, eius ramulum unum depictum exhi-
 bui. Vidi iuxta riuos & lectiore solo sæpe quatuor aut quinque cubitorum altam: circa
 sylvas & montes nascitur, foliis ferę Nerii. Aliqui apud nos priuatim *Feintraut*
 appellant, id est, Ignariam: quod circa sylvas illic potissimum nascatur, ubi arę uas-
 cula ab igne quondam illic excitato relicta fuerint. In hortos translata diu uiuit,
 & æstate ferme tota a solstitio usque in autumnum particulatim floret. Calidior
 quam prædicta uidetur, & minus aut nihil astrictiōis habere. Quare non assen-
 tor illis qui *Lyfimachii* speciem hanc esse suspicantur. Sexta & ultima species
 nihil a quinta differt, nisi quod undiquaque minor est, foliis angustioribus: rarior
 inuentu apud nos, aut fortę nulla. Non procul Verbano multa. Omnes loca aquo-
 sa amant: & aquam uel indicant præsentem, uel subesse pollicentur. Siliqua o-
 mnium in hoc genere a maturitate dehiscens, in quatuor partes distorquetur, &
 lanuginem quandam albam splendidamque ostendit. Hactenus sex *Epilo-*
bii, si ita mecum nominare libet, differentias descripsi, ex quibus an ulla sit *Vin-*
cetoxicum a Syluatico dictum, æstimandum est: sicut enim ille. *Vincetoxicum* *Vincetoxi-*
 (inquit) foliis e Persici, stipite subtili, qui tendit ad uolaceum colorem: idemque *cum*.
Antipharmacum dicitur. Caulis e longus unum aut alterum palmum, uires
 contra toxicum habet, & miscetur theriacę diatessaron in Antidotario Galeni.
 Scio quidem etiam alias herbas aliis *Vincetoxici* nomine uenire. Nascitur in
 alpihus frutex quidam cubitalis, aut paulo altior, odoratus, roseo flore, *Alp. rosen*,
 foliis *Oleæ*, inferiori parte rufi coloris cum fusco mixti, pinguis, &c. Hun cui
 quidam eruditus in Italia cęu *Chamaenerion* quoddam, *Nerion* *Alpinum* uoci-
 tat. Sed quanquam folia Nerio ferę similia habet, reliqua tamen forma naturaq; to-
 ta discrepat.

DE CONYZOIDE cœrulea.

CONYZoides a nobis appellatur hæc herba, donec uel antiquum ipsius
 nomen reuocetur, uel nouum aliquod commodius imponatur. Cognata ui-
 detur Asteri Attico Fuchsi, quem Itali quidam uiri docti Amellum Vergili
 interpretantur, nescio quam rectę. Conyzis aliquo modo similis est foliis, flore
 & pappis. Ab Hier. Trago describitur libro primo, capite quadragesimo nono,
 cum Astore Attico Fuchsi, & aliis duabus herbis, nomine Tinctoriū floris impo-
 sito, quoniam tinctores alicubi unus ex quatuor istis floribus utantur. Fuchsius
 hoc nomine Genistę speciem quandam apellauit, nos incertis uagis & homony-
 mis uocabulis abstinēbimus. Ex iis quas Tragus describit, duę tantum aut tres
 priores, cognatę inuicem uidentur herbę, & *Konvzoides* uocari posse: adiecta
 singulis aliqua a colore aut aliunde differentia: nos hic exhibitam cœruleam co-
 gnominamus, a colore floris subcœruleo. Germanicę alicubi *Schartentraut*
 appellatur, sicut & alię duę Trago descriptę species: quod foliorum margines
 (in ea præsertim specie opinor, quę flores luteos fert) figura & acie falcem quo-
 dammodo referant: alicubi etiam herbis aliis communi nomine *Heidisch Wund-*
traut. Omnes calidi & sicci temperamenti sunt, lutea minus calida, cœrulea mar-
 gis, Fuchsi Aster inter utrąque: ita ut hanc in secundo gradu calefacere, luteam
 in fine primi, cœruleam in principio tertiū dixerim: quantum nunc meminisse
 possum ex eo quod sæpius singulas gustando iudicauī. Siccandi quidem
 gradus non tam facillē est gustu discernere: neque enim tam citō tamque euī-
 denter siccandi uis in linguam agit ut calefaciendi. Omnes tamen gradu secundo
 siccare mihi uidentur. Ergo Conyzoides cœrulea caule exilit singulari, rotun-
 do, striato, inferius rubicundo, hirsuto, pedali plerumque. Folia *Oleæ* ferę sunt, cir-

Dentelaria quibusdam.



ea radicem latiora, duodecim aut plu-
ra, quæ caule etiam prognato durant,
(quod in plerisque aliis herbis non fit,
quo non obseruato icones Matthioli
aliquoties non probè expressæ sunt.)
Eadem hirsuta sunt, oblonga, angu-
sta, acris, sapore nonnihil ad pyretrū
accedente. Cauli sine petiolis hærent
per interualla, alternis singula ab
imò ad summum. Supra dimidium
caulem ramuli ex initis foliorū ceu
alarum cauis exoriuntur breues: &
flores sustinent, singulos, binos aut
ternos, subcœruleos, multis minutis
staminibus constantes, in medio se-
rè cauos, sed lanugine pallida pappo-
rum instar refertos. Flos totus mox
in pappos soluitur, citius opinor quā
ullus alius, *ἀπὸ πυρετρᾶ* dixeris, nam
alius est *ἀπὸ πυρετρᾶ*. Floret Iulio mense,
asperis, siccis & apricis locis, ut circa
syluas, & in muris urbis nostræ, ad
tollam ceruis dicatam.

FINIS.

SYLVA

SYLVA OBSERVA- tionum uariarum Valerij Cordi, QVÆS INTER PEREGRINAN- dum breuissimè notauit, primùm de rebus fossilibus, ut lapidibus, metallis, &c. deinde etiam plantis.

CL. V. IOANNI PLACOTOMO DOCTORI MEDICO, ERV-
ditione & artis usu præstantissimo, Conradus Gesne-
rus Medicus. S. D.



GRATIAE ALIQVIS FRUCTVS, GRATITVDINIS
argumentum, ad eum à quo exiuit primùm, ut reuertatur, par est. id quod elegantia
studio antiquitas tribus gratiarum simulacris scitè propostis, ita ut una daret auer-
sa: ex reliquis duabus inter se aduersis, una acciperet, altera redderet, quancquā nō ex
pectati & auerse, nobis insinuauit. Hoc mihi mecum animo uolenti, uir ornatissime,
omnes ferè Valerij Cordi, quæ hoc uolumine cōprehenduntur lucubrationes, in tu-
um unius nomen inscribi, & ad te unum redire, postulare uidebantur. Quoniam tu
& in Dioscoridis libros annotationes, & quatuor illos quibus omne genus stirpes
describuntur ipsius Cordi manu perscriptos: & hæc obseruationes rerum natu-
re uariarum, pro summo & benignissimo candore tuo, mittere ad me non dedigna-
tus es, & ut publice utilitatis ergo euulgarentur, hortatus. Rursus cum in optimis & doctissimis quibusq; uiris (quor-
um uel præcipuis te adnumero) non singulas uirtutes, sed arcto complures inter se iunctas uinculo esse considero: ui-
rum te ut eruditum, candidum, & humanum, ita liberalem quoq; & non uicini esse, hoc est, promptum ad communi-
candum, non res modò, sed etiam honorem & gloriam & à uana ambitione alienum, facile mihi persuadeo. Erudi-
tionem tuam libelli abs te editi loquuntur, quorum aliquos magna cum uoluptate, & non sine fructu perlegi: ac in-
dies magno iudicio, summaq; diligentia conditam à te Pharmacopœiam expecto: cuius lectione frui si mihi licuerit, eo
quidem nomine felicior me arbitror. Candorem tuum, quod in uariis & arcto, hi libri tam promptè mecum commu-
nicati ostendunt. Itaq; indicabam te in laudis ex horum librorum editione participationem, facile quosuis bonos &
eruditos uiros, illos præsertim, qui & ipsi aliqua Cordi scripta, uel tecum, ut Ralla honorandus ille senex Pharma-
copola Lypsiæ: uel mecum, ut nobilis ille Noribergæ medicus Hieronymus Heroldus, impertiti fuissent. Quamob-
rem & illis & alijs quibusdam egregijs uiris diuersos huius uoluminis libros nuncupauit, alijs alios: Heroldo autem
quatuor illos, quibus uariæ plantæ describuntur: quos ab eodem primò acceperam. Rallæ, in Dioscoridem annota-
tiones, quod ab illo primùm eas ad te peruenisse existimarem. Merebatur quidem C. V. Ge. Aemylus, Theologus in-
signis, & affinitate tibi coniunctus, ut aliqua huius uoluminis pars in ipsius nomen inscriberetur: quoniam tibi hæc
editur, quæcumq; à Cordo olim acceperat, emendata, & breuissimis scholijs illustrata permisit. Sed reuerentia tanti
uiri, sacrarum & humanarum literarum cognitione præstantis, qui in maiora & grauiora studia nunc totus incum-
bit (quorum comparatione rerum naturalium notitia omnis puerile quiddam est) id audendi animum mihi excusa-
uit.

Accipe igitur doctissime & charissime mi Placotome partem aliquam debiti mei, aut si maius depoli-
ti reddendi, Syluam hanc Obseruationum uariarum Cordi tui, hilari & serena fronte: in qua & authoris memoriam
colas, & Gesneri erga te obseruantiam, gratitudinem, ac tui amorem agnoscas. Non autem dubito, quin optimum et
huius & omnium Cordi librorum patronum te sis declaraturus, qui ipsius amicitia olim familiariter usus es, et Dio-
scoridis libros ipsum enarrantem audisti. Seruabis autem hoc ueluti pignus debiti maioris, quo præstantia tuæ, tum
propter enumeratas iam causas, tum alia quædam non uulgaria in me beneficia tua, obligatum me profiteor. Est e-
nim etiamnum inter nostras res meas, eritq; dum uiuam, series illa Succini Prutenici globulorum, quorum aliquot ani-
malculis infectis (quæ liquidum adhuc nimirum inuoluerat uiua) rari & spectabiles sunt, eoque chariores mihi,
quod etiam Plinius Succini hoc nomine naturam sit admiratus. Sunt & Succini orientalis globuli duo, carissima mu-
nora tua, candore & perspicuitate crystalli: Quod tantæ authoritatis est, sicuti scribis, ut reginæ Portugalliæ dotem
impleat, & pro suauissimo preciosq; suffitu Vlysiabone uratur: cuius in literis nulla hæcenus, quod sciam, memo-
ria fuit. Sunt deniq; lapides metallici, qui circa Islebiam erunt, admirando nature artificio, quamosis piscium for-
mis, ereo penè colore, insignes: è quibus es etiam constari audio. Pro his omnibus ut perpetuò memorem gratumq;
animum tibi seruabo, ita quamquam in remotissima Germaniæ ora, Dantisci (quæ clarissima Prussie ciuitas & nobis
le emporium est) degentem, nunquam non amare & uenerari pergans. Vale. Tiguri Heluetiorum, idibus Decem-
bris. Anno salutis.

M. D. LIX.

B b ij

VENA siue terra aluminosa est ad Brambecum pagum in ripa Albis dextra, quinque fere infra Vuittembergam miliaribus. habet etiam aliquid de Misy ac Calchantho.

Pyrites ibidem in eadem uena est, friabilis ac impurus.

Aluminosa terra candida lubricaque est in cuniculis Davidis Hatzkerodi ad Hercyniam Saxoniam.

Pyrites multiplex ibidem est, uidelicet solidus & friabilis.

Aerugo ibidem in cuniculis fit destillante per solidum pyritem aqua. friabilis uero Pyrites minimum aut nihil aeruginis gignit, sed plus Calchanthi ac Aluminis.

Bituminosa terra leuis, arida, & quæ nunquam lutum fit, etiam imbris maximis, & quæ accensa ardet carbonum modo, donec in cinerem soluatur tota, odore dum ardet Bituminis sulphuri mixti, Halæ Saxoniam est, sub ipsa urbe, maxime autem in fossa uersus meridiem.

Bituminacci carbones sunt propè Cunhardem, ubi etiam bituminosa æris & argenti uena est.

Salsa terra est circa Seburgum undiq; ad salsum lacum: lacum alioquin dulcem inficiens.

Salsus ille lacus omni septennio turbatur: in medio enim eius abyssus est, emittens ceu usti bituminis & sulphuris foetorem, quo totus inficitur lacus, adeo ut pisces in eo moriantur, quotiescunq; turbatus fuerit.

Salsa terra salisq; campi sunt circa Langebeugen lacum, cuius aqua è salso fluit lacus item Salzemunda, id est, ad Salsam Mundam pagum ad sextum ab Halæ Saxoniam lapidem.

Bitumen subdum effoditur in agro Brunswicensi, campestri loco.

Bitumen liquidum olei modo fluidum ibidem confluit in excavatas foueas, quo rustici utuntur ad lucernarum lumina, & ungendos currum axes.

Cerulei uenæ propè Bituminis huius scaturigines sunt.

Dactyli Idæi subflaut ac pellucidi ibidem effodiuntur è glareoso solo, quos rustici uocant *Aluestein*.

Fons qui Hildesheimii sulphureum limum emittit, ante sedecim annos primum fluere coepit, post bellum, quod contra Hildesheimianos gessit princeps Henricus Brunswicensis dux, nunc exul.

Terra candida, lubrica, & splendens effoditur ex montanis Hercyniam campis: qua dealbant rustici parietes circa Haselnfelde oppidum ac Breytensteinum pagum. Agyræ eam pro Bolo uendunt albo, fortè non malè.

Aes purissimum, quod suum est, reperitur circa Vuimelrodum pagum ad tertium à Mansfelda lapidem: admodum ductile est.

Ceruleum ibidem pulcherrimum, æris uenæ adnatum inuenitur.

Chrysocolle etiam pulcherrimè uiuens eidem inest uenæ.

Gypsi excellentissimi uariæ sunt species inter Northusium & Stolbergum.

Salsus tractus est circa Atram oppidum non longè à Franckenhufio.

Sal fit Scheningii in ducatu Brunswicensi ad uigelimum quartum à Brunswico lapidem.

Sal fit in Salzdalheim pago ad quartum à Brunswico lapidem, uersus meridiem.

Sal fit in Solta pago prope Bodenburgum pagum, ad quartum ab Hildesheimia lapidem.

Lapis Alabastriti similis sub arce Vuolfenbuttel inuenitur.

Lapis specularis inter Brunswicum & Vuolfenbuttel circa Stederburgum cœnobium effoditur.

Omnia

218

OMNIA QUAE SEQUUNTUR VIDI ET COGNOVI PRIMUM
in peregrinatione Anni M. D. XLII. post natum Christum, (Sunt autem
Observationes primium de rebus varijs fossilibus, lapidibus, me-
tallis, &c. deinde etiam de plantis.)

LASPIDIS viridis fragmentum, cuius uena per saxum ferebatur non longe à
Rochlicio oppido Misniae uersus septentrionem.

Chalcedoniam appellatam gemmā uersicoloribus lineis sinuosam ibidem, pau-
lò tamen plus ad septentrionem, iuxta Betulletum.

Marmor planum, menfarium, subcinericeum, fuscis maculis, ueluti cornicum ue-
stigijs distinctum, Rochlicii in radice montis inuenitur, uena dilatata.

Iaspis spadicus inuenitur copiose in agro Aldēburgensi in Misnia, quo rudi ad
huc publicae uiae sternuntur.

Iasponyx gemma constat spadiceo Iaspide & candicante Chalcedonia seu ony-
che, inuenitur Aldenburgi in Misnia.

Onyx simplex & uulgaris reperitur ibidem humano ungui colore similis.

Sarda, id est, Corneola, siue Carneola, eadem est fortassis quae Sarcites apud Plin-
nium, reperitur Aldeburgi in Misnia.

Sardonix quae constat Sarda carneola, & Chalcedonia uulgari, inuenitur in Al-
denburgensi agro.

Turchoides gemmae uirides inueniuntur in Silesia Goltbergi, & Strigae,
&c.

Zinstein/ueluti plumbarius lapis per quarzum, id est, Silicē metallicum disper-
sus, Marienbergi.

Hematites fissilis, uena amplissima inuenitur Marienbergi: ut xx aut x minarū
ponderelapides decutiantur.

Zinstein/klein wie Kömer von Rübſamen/lauantur in Theodoro oppido
propè Vallem D. Iochimi, appellaturq; Seyffenzin.

Vena Stanni, hoc est, Bisemuti pura & impura eruitur copiose circa uallem Di-
ui Iochimi.

Stannum purissimum, id est, quod iam suum est, effoditur ibidem in ualle Diui
Iochimi.

Haematites niger turritus, stalacticus & erinaeci modo aculeatus, effoditur circa
uallē Diui Iochimi.

Lignum carbonis modo nigrum, aridum ac leue effoditur in iisdem montibus
quadraginta orgyiarum profunditate.

Lapides oblongi, candicantes, fissiles, ossea substantia, atq; etiam aspectu ossibus
simili, ibidem ē montibus eruantur.

Magnes lapis ualenter ferrum attrahens effoditur inter Snebergum & Annæ-
bergum in ualle diui Iochimi & Irberstorff.

Magnes ueluti squamatim in tessellas fissilis, uisus mihi est Nurenbergae apud
D. D. H. S. colore cœruleus.

Magnes ultramarinus in cœruleo fuscus, uisus est mihi Nurenbergae apud Ol-
lingerum.

Lutum seu Creta sigulina in solidissimas in terra usta testas, effoditur inter Ther-
mas Caroli quarti & Schlackenuerdam oppidum propè Lessauium pagum, quo ar-
gumento apparet quondam eum tractum arsisse sponte propter latens in terra sul-
phur, aut bitumen, aut utrumq; nam terra & agri circumiacentes similitudinem ha-
bent luti ē fornace fracta sumpti.

Ferrarii lapides grādes eodē loco effodiuntur, colore nigri, fuligine obfusi, et ueluti

Bb in

ustit: qui etiam incendii naturalis uestigium atq; argumentum existunt.

Rubrica ruffa in assulas fissilis, ualde pinguis ac floridi coloris effoditur inter eundem pagum & Caroli quarti Thermas.

Rubrica uersicolor, uarii coloris, uidelicet candidi, flauī, lutei, cinerei, puniceīq; effoditur ex eodem loco in torrente quodam.

Saxa dura ualdē & lineis cinericeis conuoluta effodiuntur propē Suuartzbergum oppidum inter Snebergum & uallem diui loachimi.

Ferrariæ sunt inter idem Suuartzbergum atq; uallem diui loachimi: ibidem globi ferrei hac ætate fiunt.

Saxum durum magnas rupes faciens, est circa Thermas Caroli quarti & propē Elnbogen oppidum, candidis ueluti tessellis immixtis uarium.

Acidula est propē Thermas Caroli quarti, sapida quidem, sed aliquo modo diluta.

Acidulæ aquæ sunt inter Culmam, Acutum & Aegeram, austeri uini sapore.

Acidula semper turbida & in altum multis locis ebulliens, nō tamen effluens, tantu frigida, haustu aues enecans, est in prato inter Acidulas & Culmam propē pagum quendam solo lutofo & cauernoso: eadem strepit feruentis modo: appellatur Germanis, *Das dolle wasser*; id est, stolidæ aqua.

Acidulæ aliæ non procul sunt ab hac stulta aqua ad duo uel tria millia passuum uersus occasum hybernū, in loco uliginoso, muscoso ac palustri: eæ similiter feruentis modo grandes ueluti globos euomunt, nusquam tamen ē fontis uel lacunæ labro effluit. Strepitus & mugitus earum auditur ad quingentesimum passum aut longius tranquillo tempore, haustu fertur non tantū iumenta, feras, pecudes & aues, uerū etiam homines enecare, gustari tamen sine periculo potest. Appellatur autem hæc aqua ab indigenis *Das wütende wasser*.

Acidulæ aliæ non procul sunt ab arce & uico Kunigspurgo in eodem tractu locis pluribus.

Acidulæ dilutæ sunt ad suburbium septentrionale Aegeræ.

Acidulæ aliæ sunt Bulemeuti iuxta ferrarias fodinas, quæ celebres ibi sunt.

Acidulæ saluberrimæ sunt in Sueuiæ Vuirtenbergenfis finibus orientalibus, ad quas hominum egrorum turbæ confluunt, in calefactis, ueluti Thermis felici successu lauantes.

Acidulæ sapidissimæ sunt propē Frideburgū in finibus Hessiæ & Vuederauię, in prato quodam.

Acidularum aciditatis saporis causa est ferrarius lapis, qui rubiginosa qualitate fontes uicinos & contiguos sua medicata ut inficit: nam ubicunq; eæ sunt, iuxta latent aut apparent ferrariæ uenæ, lapides & saxa: quod ne obliuiscaris, uide.

Ferrariæ celebres sunt circa Bulementum & uicino tractu.

Ferrariæ aliæ sunt nobiles non procul ab oppido quod uocatur *Kemmet* & uicinis locis.

Ferrarię diuites sunt circa Blechum pagum, ad quintum à Nurenberga lapidem.

Ferrariarum omnium largissimæ & ditissimæ sunt Ambergi in Bauarica, in iis hæmatites niger pulcherrimus ferrum optimum fundit.

Ochra itidem rubiginosa, quam uocant *Leber erz*; copiose ibidem effoditur, quæ optimum remittit ferrum.

Rubrica dura, hæmatitis modo ferri splendorem præ se ferens, nascitur inferrariis Ambergi.

Fons quidam largus tanto impetu eructans aquas, ut etiam iniecta grandia saxa respuat, est propē Kunigsteinum arcem & oppidum, non longē ab Albi fluuiio, in Misniæ finibus.

Thermæ Caroli quarti sitæ sunt duobus à ualle loachimica Germanicis miliaribus, uno à Schlaccenuuerda, uno à Schlaccenuualde, & uno ab Elnbogio. *Sic autem*

autem in ualle ad Dopelam amnem, in medio fluuio atq; utraq; eius ripa magnò cum sonitu eructantes. Vbi effluunt aut oriuntur lixiuui modo ruffum colorem habent propter lapides. Sunt autē lixiuui propemodum diluti atq; uring, à nitro nimis rum; sapore, neq; salem, neq; sulphur, neq; bitumen, neq; alumen, quæ quidem ullo sensu aut ratione percipi queant, habentes.

Lapides & saxa Thermae ex intra terram faciunt diuersos: alius candidissimus est: alius roseo conspersus est rubore, alius rosei habet ruborē lacteo colori permixtum, flauet alius. Omnes duri sunt mediocriter, Zonis præcincti, & Calcarii, & calx quæ ex candidioribus solidisq; coquitur, melius in aëre & humidis locis durat.

Lapides cum prædictis nascuntur porosi, fauacei, lutei aut pallidi & friabiles in puluerem, ex quibus calx coquitur quæ melius igni resistit. Hac extruuntur camini, fornaces, &c.

Lapides alii gignuntur iis locis quibus Thermae defluunt, aspectu racemosi, tuberosi & tunicis constantes, colore partim flauo, partim ruffi: partim etiam in stirias diuersi coloris concresecunt, in Thermis uero quæ sub aree sunt, stiria & lapides candidissimi coloris gignuntur.

Saxum aliud ex Thermis ibi genitum est cinericeum in fusco, durum atq; marmorosum infra oppidum uersus sinistram, ad ipsum amnem.

Saxum ibidem est eminens in cinereo candidum, multis tenuibus tunicis constans, hoc si diutius cremetur ac deinde teratur, atq; tritum uitro aqua repleto iniiciatur, adeo incallescit, & tanto feruore aquam accendit, ut teneri manibus uix queat: redacta aquam gustu acerrimam, causticam & corrodentem, si cuti imponatur.

Aphronitrum è cauernoso saxo ibidem in specu nascitur, quouis alio acrius & tenuius: gigniturq; intra oppidum sub arce, ubi prædicti calcarii erunt lapides.

Thermae istae calidae ualde lauantium corpora non exulcerant, etiā si multis diebus lauent: contra frigidiore aut tepide altera aut tertia aut etiā prima die exulcerat.

Eadem, amnis Dopelæ uadum in oppido totum lapide obduxerunt.

Lichen nascitur in istis Thermis ad lapides è Thermarum undis natos, gustu ferè Thermarum: quæ præsens est aduersus impetigines remedium: acrior enim est quam ea quæ dulcium aquarum aspergine in saxis prouenit.

Thermae Mattiacae, hoc est, *Wißbaden* / sitae sunt in Mattiacis pratenfi loco, uero miliari Germanico uersus septentrionem & occasum æstiuum à Moguntia co urbe, Carolinarum modo largae: eiusdem saporis, magis tamen salsa, citius Carolinis lauantium uires resoluentes.

Lapidem hæ faciunt quæ fluunt, quemadmodum Carolinæ, eiusdē coloris, sed non ita copiosum: non enim usq; adeo terrestrem consistentiam habent.

Sal in plateis quibus fluunt serenis diebus terra nascitur, circa marginē fluentis unde gignitur, consistentia tenuis, colore candidus, gustu salis ueri, sed paulò tenuiori.

Lapis Calcarius etiam undiq; est circa has Thermas in montibus & circa oppidum undiq; qui constat totus ueluti minutis oblongis conchis.

Thermae Vuirtembergenses quas uocant *das Wildbad* / sitae sunt in Sueuia Vuirtembergensi ad tertium à Tubinga, ad secundum ab Herrenbergo, ad primum à Kalba miliari, natura Carolinis similes.

Lapis Calcarius etiam hoc loco inuenitur.

Thermae factitiae sunt propè Tubingam, circiter mille passus ab urbe uersus meridie, in *Steinmacher tal* ad sinistram Steinmachiam torrentem ascenden do: ea nulla qualitate uidentur mihi à uulgari quapiam fontana aqua differre: nam diligenter gustauimus & considerauimus, sed superstitiosa fide his se credunt infirmi. Appellantur autem *Das Bläsi bad*.

Thermae in eadem Sueuia Vuirtembergensi sunt similiter igne calefaciendæ propè Aro oppidum quod distat à Tubinga uersus ortum tribus miliaribus Sueuicis, & uno à Nuringa oppido, uidentur & hæ nihil, aut tantillum, à fontana unda uulgari dulci differre. Appellantur autem *das Serbad*.

L I C V S non exiguus amnis Vindelitiæ, Augustam Vindelicorum præterfluens, semper est turbidus, & ueluti in cinericeo candidus, eius rei causa est quod

cum impetu perlutosū ac albicans solū fertur p̄cept, et quod in alpibus supra Cam podunū semper sint niues, quę liquecentes limum candicantē deterūt: serenīs autē diebus brumalibus & frigidissimo gelu concretę sunt, nec liquecunt, nec cum limo defertur niues: inuectus antea in aluēum limus eluitur, & cum nullus in eluti uicē delabitur, contigit Lycum clarissimum fieri: nam iste alpes etiam mediā æstate niue alben̄t plerisq; locis.

Lynum ostrę arboris, *Dagenbüch*/ id est, *Daynbüchen* mutatum est in durissimam siliceamq; cotem iuxta Francofortum ad Mœnum amnem, & in Vuirtenbergenli Sueuia.

Lapis Aëtites Plinii, dilatatus quadrangulārī figurā, obtusis angulis, è fabulo lutoq; ferrugineis concretus, Francoforti ad Mœnum in Pharmacopolio loannis Metlingeri. Hic fortasse est ea Aëtitis species, quam Plinius Aethiopicum uocat.

Aëtites lapis globosus, grandis, pilę minoris magnitudine, absolutę rotunditatis, foris candidus æqualisq; superficiē: substantia intus, cum frangitur, omnino silicea, ad ictum ignē elidente, in mediō habet cavitatem rotundam, proportionē toti lapidi respondentem, in qua globus est candidissimus: friabili & ualde siccatus, aridissimoq; constante, qui intus ut plurimū uacillat, si lapis integer concutiat. Attulit hunc Anshelmus rhizotomus è Gargano Apulię monte: hic aliquando foris cinereus est.

Aëtites huic similis aspectu colore, materia & luto, sed concretionē geminus: ex eodem monte ab Anshelmo rhizotomo Nurembergam allatus.

Aëtites grandis, globosus, superficie inæquali, cauernis & anfractibus peruius, harena fabuloq; in cauernis resonantibus, intus etiam lutum impurū harenosumq; continens, allatus est ex eodem monte ab Anshelmo rhizotomo.

Lapides conchoides calcarii diuersę figurę, inueniuntur non longē à Tumpachi oppido, qua itur uersus Aupachium oppidum.

Lapis rufus minui ac hæmatitis colore, est copiosus magnusq; inter Tumpachium & Aupachium oppida: est autem substantię hæmatitię & ferrugineę.

Lapis ferrugineus, imō saxum, in maxima qualitate est ibidem, colore rufius, nec ita floridi coloris.

Lapis Ostracites, ostracis, ad unco ueluti rostro, colore cinericeus, tunicis compactus ueluti Ostrea in Vuirtenbergenli Sueuia inter Hechingam oppidum & montes orientales in radice montium.

Dactyli Idæi lapides in eodem inueniuntur Sueuię loco, ubi ostracis.

Ochra lapidosa & crustacea inuenitur iisdem in Sueuię locis, quibus ostracis & Dactyli Idæi lapides.

Gypsum copiosum candidumq; effoditur in Vuirtenbergenli Sueuię, iuxta Tumbingam & Herrenbergum oppida.

Lapis Armenus uel eius uenę reperiuntur in finibus Vuirtembergensis Sueuię uersus meridiem & occasum hyemalem in montibus.

Cœruleum pulchrum Armeno lapidi & Chrysocollę uenis permixtum, reperitur in iisdem Armeni lapidis uenis in Sueuię.

Marmor mensarium candidum, quo in Germania mensę fiunt, uenam habet dilatam in montibus, ita ut in latissimas mensas duum digitorum crassitudine suis commissuris diuidantur marmorea saxa.

Marmoris eiusdem alia species in paruas ueluti regulas fissilis, quibus etiam pro regulis utuntur in Bauaria Kelheimi, Ratishonę & alibi: cæditur utrunq; genus inter Ratishonam & Kelheimum paulo infra Kelheimum ipsum.

Marmor purpureum maculosum in spadiceo, est in montibus circa Salisburgum: quantilibet cædendis molibus sufficiunt lapidicinę. Ex hoc defunctorum monumenta & columnę fiunt Augustę & alibi.

Marmor

Marmor Salisburgense aliud omnium ferè colorum mirabili aspectus gratia Augustæ uidetur in quibusdam structuris: aliaq; multa eius genera in templis.

Marmor aliud pulcherrimum, *ist anzusehen wie ein hübsche gemalte landschaft*/conspicitur Augustæ Vindelicorum in sacello Fuccherorum.

Marmor candidum ueluti siliceum reperitur in montanis circa Egeram urbem, ex quo sepulchrorum lapides.

Marmorosum saxum, coloris liuidi, *gestalt wie groſſe vngeschlachte holzspalten*/circa Egeram in montibus, ex quo ponticuli & lithostrota.

Marmorosum saxum prædicto materia & aspectu simile, colore in flauo candidum & spadiceum, in montibus inter Egeram & Kemmetam urbes.

Marmor calcarium in candido liuidum aut cinereum, eruitur circa Rebicum oppidum inter Egeram & Kemmetam.

Lateres Augustæ & Nurenbergæ fiunt ex luto & abiegni ligni scobe, simul in lateres ductis & coctis. exustæ scobes relinquunt cauernulas, ideoq; pumicibus raritate & leuitate similes sunt hi lateres: ex quibus camini & intestini parietes extruuntur.

Lapis (aut Saxum) Calcarius latitudine fissili, mensario marmoris similis, inuenitur in montibus Fichtelbergi: materia est talcū, hoc est, amiantus crustaceus, breuibus squamis: ideoq; in igne non exuritur, cum factæ ex eo mensæ poliuntur, superficies maculis ueluti argenteis ac plumbeis nitet. Vidi Nurenbergæ apud Leonhardum pharmacopolam confractam mensam.

Lutum citrinum floridi coloris, tenerimum, pinguiſſimum, in metallis Annæbergi inuētum, appellatur à metallicis *Ein gelber Seyffengang*: quoniam saponi simile est.

Lutum eiusdem substantiæ subfuscum eodem loco effossum, uocatur *ein schwarzer Seyffengang*/à metallicis.

Creta nigra minimis pyritidis mixta atomis, gustu salis & Chalcanthi, effoditur supra Saluedam Turingiæ urbem, qua utuntur tingendis ædificiorum trabibus.

Creta nigra iam dictæ colore gustuq; similis, asperior tamen duriorq; effoditur Hildesheimi inter urbem & Marienburgum castellum, iuxta pumilionum antrū in profundo.

Creta nigra, optima, lenis, facile lineas remittens, gustu subacris, effoditur in inferiori Germania, in agro Aquisgranensi, qua architecti & pictores utuntur. affertur uenalis Francofortum ad Nundinas.

Pumex cædidus, leuis & rarus, Siculoq; aut Melino aut Aphricano similis, effoditur in montibus nō longè à Cōfluentia urbe, in Rheni & Mosellæ cōfluentibus sita.

Minium grandibus cæditur ē uena glebis colore penè purpureum, merum nihilq; aliud continens: confractum argenti uiui guttas ostendit. uidi Nurenbergæ apud D. D. Hyeronimum Schallerum.

Glimmer res est metallica, plumbeo ferè colore, sed splendidissima, effoditur in montibus Fichtelbergi.

Rubrica lapidis Hæmatitis modo splendens in liuido cum madescit, Nurenbergæ.

Aes quod iam suum est purissimum inuenitur in Morauia sinibus, in metallis quibus præest Wolff Schelle/frater Doctoris.

Lapis molochites uocatus, colore est uiridissimus, substantia & materia Chrysocollæ, cum frangitur, dissilit, ferè ad modum uitreæ massæ, aspectu etiam [†] uiridæ smathæ similis est. inuenitur in alpibus, non longè ab Oeniponte.

Vena quædam gemmea, dilatata ab una parte, amethysti, ceu politis cubis & angulosis turbinibus constans: ab altera parte autem est Arabici lapidis peculiare quoddam genus, durum, candidum, in poliendo ebur splendore & candore superas: inuenitur & hæc in Athesina regione in alpibus quemadmodum molochites.

Ce

†
Viridi
Smaltæ.

Chalcanti uena in candido pallida, duo habens, uidelicet alumen & Chalcantum uiride in cœruleo: Schemnicii.

Alumen scillile candidum, lene, subpingue tactu, in capillamēta amianti instar diuisibile: gustu uehementissimē adstringens, affertur à Schemnicio.

Sulphur quod duriusculum Sandarachæ colore in guttas oblongas concretum, elicitur è uena quadam metallica. Nurenbergæ uidi.

Sulphur quod suum est, citrini coloris, syncerissimum, propemodum pellucidū, inuenitur in quibusdam Germaniæ metallis ad Bohemiā.

Bitumen nigrum durum, simile carbonibus bituminosis, hoc est, fossilibus, inuenitur in alpihus Helueticorum.

Bitumen nigrum durum inuenitur in tractu qui est inter Egeram, Kulmam altam Falkenauium & Elenbogium: copiosissimum autem non longè à Falkenauio in colle quodam qua iur à Falkenauio ad Sattelam pagum: optimum uero circa Sattelam & in ipso pago, aspectu crustaceum, leue, accensum flagrat & copiosum remittit uaporem.

Tractus qui est inter Culmam altam seu acutam, & Elenbogium olim arsisse uidetur: quia in utraq; ripa Egeræ adusta est terra, & facta similis terræ fornacum adustæ: præterea terra ipsa partim in lateres cremata est propter spontanei incendii uehementiam, huiusmodi autem lateres reperiuntur inter Falkenauium & Culmam altam.

Bitumnis ueluti exusti cineres inueniuntur inter Elenbogen, & Falkenauium, Culmam & Egeram urbem.

Radices arborum in ipsa terra in carbones crematæ & redactæ, eruantur inter Falkenauium & Sattelam pagum.

Terra purpurea cum aliquo Indici colore, inuenitur imbribus detecta magnis inter Elenbogium & Sattelam pagum, quæ & ipsa incendii uestigium est.

Bitumen illud quod circa Falkenauium & Sattelam eruitur partim pyritosum est, partim synceri pyritis ærei frustra continet, partim etiam eo caret.

Ea loca pastorum ignibus accenduntur non contemnendo uicinarum periculo.

Ciuitas Iuhonum, ut Cornelius Tacitus refert, grauiter afflicta & propemodum deleta est huiusmodi incendio, & igne sponte è terra edito. Fuit autem ciuitas Iuhonum fortassis hoc loco: aut, quod potius credo, in eo tractu ubi Zuwickauia (quam Cygneam uocant aliqui) sita est: nam quantum ex Tacito colligi potest, Hermundorum ea fuit ciuitas. Tractus autem Zuwickauianus non rarò sponte exardescit, adeo ut saxa liquefacta riuorum instar liqui uitri defluant, quale fuit hoc incendium quod ante quadraginta annos, pagos, uillas, non satis tuta etiam urbe uastauit.

Achates sanguineis uenis in se conuolutus & flauis: lineis maculisq; uariis, Nurenbergæ apud Gemmarios.

Gammehu oyychis placodis species est: inuenitur in Vuesterichia.

Achates alius cinereis ac liuidis in cœruleo uenis conuolutus, Nurenbergæ.

Achates uulgaris fabæ magnitudine è Gallia allatus.

Achates mineaceis maculis, lacteo & luteo corpori immixtis, Nurenbergæ.

Onyx pulcherrima, grandis, & lata, ouata figura, colore cœruleo, lacteo, & spaldiceo nigroq; crustatis uaria, imaginem speculi instar reddens.

Halmyrax niri species est, qua canescunt siccata: camporum conualles, ut Plinius ait, in Media. Gignitur etiam apud nos circa Berneburgum, & Stasphurtum ac propè Vuarmisdorffium.

Terra nitrosa est Berneburgi, etiam ad tres cubitos effossis scrobibus.

Terra falsa est Stasfurti, ideoq; sale canescunt siccitatibus fossarum margines.

Lacus falsi sunt ibidem: in quibus nascitur anthyllis. quidam ad eò salsam habent

habent muriam ut nihil gignant.

Frutex parvus, Erice similis, minor tamen, nascitur inter Caroli quarti Thermas, Elenbogen & Falkenauum.

Fruticulus exiguus, humi prostratus, iunceis uiridibusq; uirgulis: foliis myrtinis, duris, acuminatis, perennibusq; floribus papilionaceis ferè, diuerso colore, uidelicet albo, flauo & rubente: extimum quidem albet, proximum flauet, intimum rucet. Nascitur in syluis montanis circa Egeram, in Bauaria & Vindelicia.

Orifella Musci quoddam genus est, incauum, ramosum, quod ex Italia affertur.

Muscus quidam, Crispè lactuce similis, minor, & per ambitus leniter aculeatus, ce spite latiusculo diffusus, nascitur in Tædacea sylua, inter Suetachium & Lauffam.

Fungus grandis, pylè instar rotundus, foris pallenti cortice, intus candida, succo sa dulciq; carne constans, non in puluerem transiens, sed hyemis iniuria, Peponum exemplo, putrescens: nascitur uerè in eadem sylua ex meris arenis.

Ramulus ueluti è lentisco decerptus, foliis utrinq; ex intervallo dispositis, crebro geminatis, in exortu sibi inuicem respondentibus. Nurenbergæ apud D. D. Schaller.

Absinthium Seriphium, exilibus ramulis, colore in spadiceo nigricantibus, semine tenui, paleaceo, ac totis furculis adnascente, leniter amaro, cum tenuitate euidentibus, ibidem, apud eundem.

Herba foliis Pyrethri, caule cubitali, flore, folliculo & semine Scrophulariæ: in horto Ollingeri, ea uenenata est, & ex Austria allata.

Crethamum † marinum, foliis portulacæ syluestris, oblongioribus similiter pin- [†] *Cribmus.* guibus in horto eiusdem.

Cyclaminus orbiculata radice: foliis inter Cucumim & Bechion mediis, non tamen hirsutis, rubentibus & albicantibus maculis. Autumno floret: æstatis initio paucis spectatur foliis. Nurenbergæ in horto eiusdem.

Cyclaminus globosus, id est, globosa radice, foliis prædicti, similiterq; maculosis, rotundioribus tamen flore inter puniceum & purpureum medio, autumno exunte. Nurenbergæ in horto D. D. Schalleri.

Calaminthe tenuifolia, ualdè odorata, perennis, tenuibus foliis: ibidem.

Coton herba lanigera, caule duro, tereti, alis brachiato rubenti, subhirsuto: foliis utrigineis, Althææ modo breui lanugine hirtis: floribus luteis, rosea figura, intus lanuginosis & purpureis partim folliculi Cotonæ amplitudine, triplici aut quadruplici commissura dehiscens: & semina habens ciceris quantitate, intus Cinereis sparsa punctis, candida multaq; lana inuoluta: ibidem.

Genista iunceis uirgis, nescio non angulosis, sed teretibus: ibidem descripti.

Trifolia arbor, flore in singulis pediculis numeroso, siliquis longis, semine fœnogræci. Francolurti in horto cuius cuiusdam.

Lepidium maius sponte nascitur Spire ad uetusta monumenta, in rudibus Templi B. Germani extra urbem.

Rubea syluestris uera nascitur sponte ibidem in sepibus, satiuæ per omnia similis, multò tamen maiore radice.

Hyacinthus diphyllus Fuchsi, floribus candidis, nascitur Tubingæ in syluulis iuxta diphyllum purpureum.

Calaminthe † quedam, Ocimi ferè foliis, hirsutis, caulibus cubitalibus, semine ex [†] *Clinopodium quorundam scilicet.* intervallo in raris & semicirculum equantibus uerticillis: nascitur inter Tubingam & Nuringam.

Tilia grandis ueris medio, aut paulò antè, iulos ferens longos colore flauos: nascitur propè Nuringam oppidum in pago.

Herba hederaceis aut cucumeraceis foliis, hirsutis: caule cubitum excedente: radice multifida, lenta, perenni, sapore raphani aliquo. Nascitur in montibus Sueuiæ ^{Lunaria Græca foris.} supra Auo oppidum. ^{le.}

Cc ii

Ruta quædam sylvestris foliis Rutæ minoribus, coluteæ modo geminatis colliculis, cum erumpunt tenuibus, multis, rubentibus, colore in corymbis dependentibus; luteo semine in corniculis, oblonga radice, crassa, rimosa, flaua, perenni, firma, &c. Saporem folia Rutæ habent. Nascitur in alpinis Vuirtembergensis Sueviæ.

Hyacinthus minor globosis, concauis, purpureis, deorsum nutantibus & gibbosam comam constituentibus floribus, in caule dodrante breviori: foliis Porro multo minoribus, radice bulbosa: floret post ueris initium. Nascitur copiosissime in alpinis Suevicarum planis pratis, in Hestia & Vuederauia.

Hyacinthus minor, candidus, proximo similis, maior paulo. Nascitur iisdem locis, sed parcius.

Herba foliis Narcissi, caule dodrantali, flore in lateralibus pediculis candido, stellato aut cruciformi, odorato: radice bulbosa. Nurenbergæ in horto Ollingeri.

Lilium sylvestre, quod aliqui falso Asphodelum uocant, uidi flore candido, cum aliis rubescat, in horto Ollingeri.

Cucumis recto caule, fructu Melonis aut Peponis parui, Nurenbergæ in horto eius, &c.

Herba caule cubitali, foliis spinosis, capitulis acanaceis, floribus Scabiosis: in montibus Sueviæ Vuirtembergensis.

Thlaspi quoddam minutum multis ab una radice ramulis, flore candido, numero: ibidem in montibus altissimis.

Helleborus candidus, plantaginis foliis, ruscus uenosis & liris: in montibus alpinis inter Sueuiam & Constantiam, *auff der Hart vnd Bar*, non longe à Danubii exortu.

Lycostonum aconitum purpureo flore: ibidem sponte nascitur in opacis syluis.

Lycostonum cœruleis floribus: ibidem nascitur, utrumque aliis in hortis colitur.

Mentastrum ualde odoratum ut Hedyosmus, in montibus *auff der Bar* iuxta pagos, ibidem.

Mentastrum uulgaris simile, sed pulchrius odoratiusque multo, non longe ab Ulma urbe prope fossas humidas * in pratis.

Hippion, id est, Viola equina, Leucoio æquales flores habet in quadrantalico-liculo, cœruleos, pulcherrimos, profundo colore. Nascitur in pratis inter Ulmam & Augustam.

Maiele, coronarii puniceique sunt flores, in dodrantalis teretisque caulis summo, folia ad perennem radicem fert oblonga, inferius candicantia. Nascitur opacis campis in Vindelicia.

Thymelæa minor, tenuibus foliis, floribus in corymbo puniceis. Nascitur in Vindelicia circa Augustam, &c. descripsi eam partim.

Herba foliis latiusculis, acuminatis, stellatim in terra alternatimque stratis: radice fibrata, coliculo quincunciali, tenero, unico; in summo flore purpureo, Violaceo, apicem acutum habente. Nascitur in Vindelicia inter Augustam et Licum amnem in campis.

Ophioglosson, quam alibi descripsi, copiose nascitur in montanis Suevicis campis.

Lunaria copiose etiam prouenit in montibus, non ita herbosis, collibus & tumulis, folio uno pingui, quadrantalit aut sextantalit ab uno coliculo exeunte, Polypodij diuisura. In summitate racemosum quiddam est radice diuisa, tenui, fibrata, perenni, &c.

Draco herba acetaria, saporis feruidi tenuisque, caulibus cubito procerioribus ramosis, foliis oblongis, Lino aut Hysso majoribus, semine floreque minuto, radice crassiuscula, multifida, intorta, perenni, & multa emittente germina. Colitur in hortis Augustæ Vindelicorum, & Nurenbergæ expetitur lautioribus hominibus ad acetaria, &c.

Iris Illyrica nostrati est simillima: differt tantum odore, sapore et floris colore, quem candidissimum habet & non purpureum. Colitur Nurenbergæ in hortis.

Herba Irinis foliis, longioribus multo, radice fibrata, Ollingero ex Italia pro L. dellyrica missa.

Xyris

Xyris minor, seu spatula foetida minor, maiori similis est: differt quantitate minore, radice scabriore & fuscior, atq; semine durior. Nascitur in campis & secus fossas inter Oppenheim & Moguntiacum ad Rhenum fluvium.

Herba cicutæ foliis & odore: radice crassa, nigra, perenni, semine in umbellis [†] caro crassiore, quo in quibusdā Galliæ & Italiae locis malè pro Ligustico utuntur, [†] quam Carui, [†] vel Carui, ibidem provenit ubi Xyris minor.

Caryophylli Indici minores, caule statim à terra ramosissimo à uerè florent usque ad hyemem, foliis multò minoribus, ibidem.

Piper Aphricanum longis, angustis, multisq; foliis, & folliculis, colore rutilum. Nurembergæ, in horto D. D. Schalleri.

Piper Aphricanum huic simillimum, colore tantum in fusco purpureo ibidem, &c.

Melon Indicus citrinus, propemodum globosus, semine lato candidoq;.

Melon Indicus citrinus, oblongus, angulis aliquot inequalibus, crassa & uix tria cubitali uicula.

Melon Indicus citrinus, oblongo similis, fructus tantum figura differens, què uerò ticillo similem profert, in latitudinem aliquam compressum.

Alcea species, * conca minoribus foliis (affertur ex Italia) magisq; incis: caule mollibus aculeis hispido, flore ex quinque candidis foliis roseo: mane se aperiente, meridie unam horam hiant, postea se contrahente, foris partim purpurascente, quemadmodum etiam intus in profundo capitulo hirsuto ex luteis apicibus, in medio quinque purpureis apiculis uariante, semine in globoso, hirsuto, membranaceo pericarpio, deinde in nigro aperiente se, subrotundo, nigroq; radice semestri.

Bechion sylvestre, foliis minoribus rotundioribusq; multò, coliculo dodrantali, floribus in summo multis, densis, in purpura candicantibus, ueluti Petasitis, radice fibrata & perenni. Nascitur altissimis uliginosissimisq; montibus, inter uallem D. Ioachimi, & Bisentalum, metallica oppida.

Herba carduaceis foliis, acanaceisq; capitulis: ibidem in montanis pratis.

Herba trientalis, foliis oblongis, ueluti Neradii minoris, flore candido stellatoq; nascitur ibidem in montibus non ita herbosis, solo neq; nimis madido, neq; nimis arido, nec syluoso.

Herba Lycoctoni, maioris uel Geranii foliis, caule tereti, tenero, floribus foliaceis, ranunculaceis, candidisq; radice perenni fibrata, candida, cum arescit leuiter radicem Phu odore æmulante. Nascitur in sylua inter Bisentalum & Annaber-gum.

Fruticulus tenuibus & cubitalibus uirgultis: foliis polygoni masculi: semine rotundo, nigro, luniperinis bacis simili, gustu acri: allatus est mihi ex horto Episcopi Cenomannensis à Gallia à Petro Bellonio.

Herba umbellifera, foliis inter Anisi, Apii & Coriandri foliorum figuram medii, semine acri, odoratoq;. Ex eodem horto allatum.

Herba radice nucis auellanae figura & quantitate, què seminis modo sata aut defixa germinat: foliis gramineis durisq;, gustu dulcis. Vide an sit Xiphion Theophrasti aut Ornithogalon, aut Moly siue Myle: ex eodem horto.

Fruticulus Sicilianæ foliis, sed angustioribus multò, satis carnosus: umbella latiuscula. Semine Cymino simili, nigro: fortè Tragis Cretici est species: nā ex Creta affertur, & lachrymam fundit lacteam què postea spissatur, Ex eodē horto per Petrum Bellonium mihi allatus.

Foeniculus longo semine, prima qua seritur æstate caulem semenq; fundens, ut uulgaris: missus mihi est pro Hippomarathro.

Cepæ similes fissilibus, multò tamē minores, breuiioresq; coma cōcauat: cepa com muni tenuiore, Vere maturescit et cū primis aut etiā anti euellitur, Germani uocāt

Cc iij

Äschlauch: alii *Äbschlag*. Fortè sunt *Afcaloniae*: nam sic ab *Italis* & *Gallis* appellantur. Vide etiam quid ab his differat *Gethyum*.

Cotyledon uerus radice *Ari* est, & uillosa: coliculo dodrantali, semine circumdato: foliis pinguibus, rotundis, crassiusculis, leniter cōcauis, &c. Allatus mihi est cum aliis quæ ex horto *Episcopi Cenomannensis* & *Gallia Petrus Bellonius* ferebat.

Rhus fruticem uidit aridum, foliis oblongis, figura *Ulmis*, & tamen *Laurinis* ramulis, alternatim geminatis, flore in *Corymbis* candidis: ex *Italia* allatus est.

Cistus frutex folio est oblongo, & tamen subrotundo, *Saluæ* aliquo modo similis, maiori, hirsuto cauoq; semine in pericarpis minuto *Papaueri* simili, &c. gustu adstringit, &c. Allatus mihi est ex *Cenomannensis Episcopi* horto.

Frutex tenuibus multis acutisq; aculeis spinosus: uirgis & furculis tenuissimis, foliis paruis, oblongis, candidis, hirsutis, pro *Paliuro* missus mihi est ex *Gallia*: sed uidetur potius *Rhamnus* esse.

Rhamni nigri fructus niger est, *Verticilli* figura, orbiculatus, in medio elatus, ex eiusdem *Episcopi* horto.

Rhamni candidi fructus, prædicto similis est figura, sed colore candidus. Allatus est mihi ex eodem.

Tragus sylvestris uulgaris minor est, foliis in latitudinem aliquam compressis: floribus in candido puniceis, *Centaurii* minoris figura. Nascitur in cultis locis ac campis inter *Egeram* & *Filsecum* oppida.

Phleon palustris herba, aculeata sub foliorum exortu: foliis harundineis ab uno principio in uentilabri figuram explicitis. Afferitur ex *Italia* cum sarcinis aliarum rerum, idq; casu.

Cicuta sylvestris maioribus quam uulgaris foliis, hirsutisq; in syluis inter *Pferin* gen & *Ehingen*.

Herba *Cicutæ* foliis, maioribus: radice pedali, crassa, foris nigra, intus candida: gustu acris, feruida, tenuis, & aromaticum quiddam præ se ferens: prouenit inter *Ebingam* & *Sueiningam* in montibus.

Aizoom sylvestre siue ferratum minus, non longè ab *Ebinga* oppido scaturit in scopulis.

Asparagus quidam fruticosior, multò maioribus quam reliquis baccis. *Nurensbergæ* in hortis *D.D. Schalleri* ac *Ollingeri*.

Semen herba cuiusdam *Vmbelliferae*, *Brassicæ* æ quale rotundumq; colore nigrum, quod pro *Smyrniō* ex *Italia* *Nurensbergam* ferebatur.

Semen herba cuiusdam *Vmbelliferae*, colore & figura *Cari*, sed minus: & *Amios* magnitudinem paululum excedens. *Frankforti*.

Ricinus quidam uulgaris per omnia similis, triplo tamen maiori semine. *Nurensbergæ* in horto *D.D. Schalleri*.

Agaricus in *Picea sylvestri*, *Tæda*, *Abiete* & *Larice*: sed omnium optimus est *Larignus*: hic enim solus in usu est medicis.

Viscum in *Populo nigra*, *Sorbo lanata*, *Sorbo*, *Spina alba*, id est, *Pyracanta*, seu *Sorbo Terminali* aculeata: in *Sueuiæ* alpibus.

Anthyllis maior caulem habet dodrantalem aut maiorem, inferius digiti crassitudine & ferè singularem: superius ramosum: foliis angustis, oblongis crassiusculis, gustu salis. Flore *Anthemidis* aut *Asteris Attici*, figura & magnitudine quidem illius: colore uerò huius. Nascitur salis locis, nō procul à lacu *Salsiusculo* *Stasfurti*.

Anthyllis minor prædictæ similis est, sed multò minor: caule tenuiori. ibidem exit.

Anthyllis prædicta breuior, angustis foliis: exiguo foliatōque & purpureo flore. ibidem.

Anthyllis tenuis, gracili coliculo, foliis ualdè angustis, salis: semine & flosculis secus folia tantillis. ibidem.

Anthyllis constans primū ueluti tritici granis, cacumine sibi infertis. ibidem.

Antylæ

Anthyllis humi sparsa, minori Aizoo similis, falsa, ibidem.
 Anthyllis latiusculis oblongisq; foliis, falso gustu, ibidē. forte Telephium falsum.
 Larix arbor resinifera, conos fert Tæda, sed minores. Augustæ à quibusdam in
 deliciis habetur, sponte nascitur in Alpibus, descripsi eam.
 Trifolia arbor nascitur Oeniponte & Francoforti ad Mœnum, utrobique tamen
 culta: in montibus uerò quibusdam sponte, descripsi eam.
 Lycostaphylos mascula uisa mihi est Augustæ Vindelicorum & Nurenbergæ.
 descripta est.

Oleastrum peculiare genus nascitur in Vindeliâ ad Licum amnem & ad Danu-
 bium inter Donauerdum & Kelheimium oppida, descripta est.

Tamariscus foemina nascitur iisdem locis, glareoso solo, nec non ad Vertachum
 amnem prope Augustam Vindelicorum, descripta est.

Cotonea malus sylvestris sponte prouenit in collibus & sepibus circa Kelhey-
 mium & Ratisponam, in utraq; Danubii ripa, descripta est.

Pseudocrania arbor prouenit iisdem locis & natalibus, descripta est.

Telycrania, id est Cornus foemina, nascitur inter Augustam et Donauerdum ut
 bes campestri solo planoque, descripsi eam.

Cytisus sylvestris, quem paulò ante descripsi, nascitur in montibus Bauariæ co-
 piolus, præsertim Ratisponæ in Casteino monte rupibus pleno.

Orchocarpus peculiare genus rimoso & fisso ac dependente cortice in montibus
 inter Ehingen & Pferingen in syluis.

Styrax arbor è nuce enata foliis Cotoneæ similibus, Nurenbergæ in horto D. D.
 Schalleri.

Iuniperus parua duplex est: una floret minimos flauosque iulos conii figura fe-
 rendo, qui in puluerem abeunt, hæc fructum non fert.

Altera Iuniperus non floret, sed baccas immediatè profert, decidentibus primi
 anni fructibus, cum tertii anni enasci incipiunt, tum peruenerunt ad iustam magni-
 tudinem secundi anni baccae, sed uirides adhuc sunt.

Tæda arbor cono suo similes sed flauos uere producit iulos, qui in puluerem re-
 soluuntur toti, nihil producentes: conii uerò immediatè enascuntur.

Atriplicis sylvestris genus gustu salsum, nascitur Stasphurti cum Anthyllidibus
 ad lacus falsos.

Melon Indus Verticillo similis, fructu uerrucis undique tuberosus.

† Grafe Polei herba est, Polygoni masculæ foliis, non humi prostrata sed erecta, ^{forte Grafe}
 Nascitur aliquantulum * uliginosis locis: copiosa autem Stasphurti. ^{sc.}

Coronopus sylvestris satiuæ est similis, foliis tamē minus fuscis, alioquin eadem
 est. Nascitur Stasphurti in campis secus uias.

Pseudocyperus lignosus rotundaq; & ueluti ossea radice, ex Gallia allatus mihi,
 Melisophyllon sylvestre foliis floribusque maioribus: candidis floribus labro
 inferiori rubentibus. Fuchsius uerum esse credit, sed falsò.

Nux quædam Pineæ nuci similis, sed maior, crassiori cortice, uenosa quadam car-
 ne operta, nucleo duro. Affertur ex India: Francoforti.

Nucleus quidam Indicus, trium fere digitorum latitudine, planus, compressus,
 orbiculatusque: colore in spadiceo niger. Nurenbergæ.

Lupinus quidam Indicus trium fere digitorum latitudine, planus, compressus,
 orbiculatusque: colore in spadiceo niger. Nurenbergæ.

Fructus quidam globosus modicè, acuminatus, ossæ foris soliditatis, colore cl-
 neraceus: linea quadam à basi usque ad apicem spiræ modo circumuolutus. Nu-
 renbergæ.

Smilaces Indicæ unciali longitudine, aliæ purpureæ, aliæ rosæ, aliæ candidæ, a-
 liæ in purpura cœruleæ. Nurenbergæ.

Cardamomum quoddam pinguius, acrius, odoratius scabriusq; ueluti incultius
 quiddam. Francoforti ad Mœnum in nundinis.

Folium Querno simile, sed minus, oblongius, ac pulchrioribus incisuris concin-
nuius: quod Otingerus aiebat esse Styracis, sed falso; nam tale erat, quale Loto tri-
buitur arbori.

Spinæ Indicæ, id est, Acaciæ maioris, materia Augustæ & Nurenbergæ à quib-
busdam pro Ebena uenditur.

Ebenus uera nigerrima, ostensa est mihi à Conrado Rellingero patritio Augu-
stano Augustæ, qui magnos Cylindros habebat.

Materia arboris cuiusdam peregrinæ, colore inter Sandalum rubeum & Resi-
lium medio: ex qua faciunt capulos cultrorum Nurenbergæ.

Sandali rubræ peculiaris species, colore in candido ruffo, paulatim nigram pur-
puram induens, à superficie incipiendo, donec successu temporis totum eum colo-
rem acquirat. Nurenbergæ apud cultuarios fabros.

Resina quædam uitrea, quæ cum manibus tractaretur liquecebat: frigidâque, si
cum impetu percutiebatur, dissiliebat in paruas micæ, fortè erat Terebinthina uer-
ra, nam pro ea afferebatur Francofortum in nundinis.

Radix speciei Cardopaciæ maioris, cubito longior, figura Centaurii maioris,
Francoforti in nundinis.

Centaurium maius Germanicum nascitur in Heluetiorum alpihus, Cardopaci
nostratis modo filia & gracili radice.

Cyperella herba quædam Cypero multò minor, fibratis tenuibusque radicum
capitulis, allata est Francofortum ex Heluetiis.

Petroselinum Indicum, latè diffusis foliis, semina in umbellis oblonga, ceu caron-
gustu aromatico, etiam odore. Nurenbergæ apud D. D. Schallerum.

Lentiscides, id est Lentisci arboris bacca, parua rotunda quæ sunt, Ligustri bacis
siue acinis æquales, sed colore uirides. Vnde etiam à quibusdam dicitur Lentiscus
arbor granis uiridis. Francoforti.

Pulmo marinus spongiæ est similis, substantia inter Cartilaginem & membra-
nam media: siccata contrahitur, humida distenditur.

Myrrhæ quædam species, minutis constans grumis, colore ruffis. Francoforti in
nundinis.

Fortè pur-
purea mi-
nus. Casia fistula Cinamomo similis, purpurea tamen, gustu lubrica &c.
Casia solo gustu à Cinamomo Characio distans, qui est uocato Calamo atq; Ga-
langæ non dissimilis, tenuior tamen.

Alcea quædam tenuissimis foliis in sylua Hercynia supra Stollbergū oppidum
ad montem Aurbergum, qua itur ad Mansfeldium & Sangerhausen.

Seriphium, id est, Ablinthium marinum ad lacum salsum prope Seburgum.

Sanguis
Draconis
uulgò. Rumicis species, cuius folia rubentibus sunt distincta uenis: in uenis est succus
purpureus, primo anno non caulem fert.

Lyfimachia minor indiuiduo caule. Vuittembergæ.

Monoclonio Artemisiæ non dissimilis herba, Strasphurti.

PISCIS uolitans pede longior, figura Barbonis, alis membranaceis geminis
tantum continuis quæ uiuit ultra Gades. Hispanis dicitur Pescuolar, Latinis
fortè Miluus, aut Hirundo marina.

Dentata, quæ & ossea lingua, cubito longior, utrinque serræ modo eminentibus
dentibus. fortè est Serra marina cuius Plinius meminit. Francofordiæ.

Conchæ Indicæ grandes, in spiram conuolutæ conuexæ: tam foris quam intus
splendidissimæ. Francoforti.

Lacerræ Indicæ, ut uocabant, cubitales aut maiores, Crocodilo similes, minoribus
tamen squamis. Francoforti ad Moenum.

Capricorni cornua longa sunt, falcata & tuberosa longitudine trium pedum. Fran-
coforti.

Cornua

Cornua Ibicum minora, pauloq; crassiora sunt, falcata & superficie æquali, & ualde ponderosa. Francoforti.

Cornua Dambocci ramossissima maximaque, & ita intricata, ut nullum uideantur animali præstare utilitatem. Lochaurii in arce electoris Saxonie.

Cornua ceruorum caprearumq; ualde intorta, manca & monstrosa, ibidem.

Simia Porcaria cui barba ab auribus usque sub mentum. Francoforti, uulgo *ein Pauian*.

Subulones Plinio cerui sunt simplicibus & indiuiduis cornibus, a subule mucrone dicti: uulgo ab acumine cornuum *Spisbirsche* uocantur.

Cuniculis similia animalia in campis & agris latibula excauant: uide an sint *Dasy-podes* Leporum genus. reperiuntur autem in Pannonia iuxta Budam urbem, & uicinis regionibus: alii tamen Cuniculum *Dasy-poda* uocant.

Cytis piscis cuiusdam marini, aspera, & scobinæ modo scabra, qua capuli & manubria Hispanicorum gladiorum obducuntur. Vidi huiusmodi gladios ex Antuerpia allatos, uidetur mihi ex *Squatina* esse pisce.

Orphus siue *Vrphus* piscis qui Germanicè *ein Drff* uocatur: lapidissimus est, media inter *Carpionem*, *Plozam* & *Bresmam* figura & magnitudine. Vide ergo an sit apud Plinium *Orphus*.

Goldtsorren similes sunt reliquis forris, sed squamas habent deauratas. Augustæ *Vindelicorum* habentur.

Kotforren reliquis similes quidem sunt, sed carnem habent rubentem & ualde lapidam.

Grundtsorren eandem habet figuram, sed frequentius fundum amnium sequuntur: unde nomen eis apud Germanos.

Pisciculi in fusco pallidi, aliquantulum maculosi, longitudine digitali, Augustæ sunt quibus pascunt foras suas in piscinis diuites.

Sengelè minutissimi sunt pisciculi, gregatim tranquillioribus amnium partibus apicandi gratia innatantes. Augustæ in deliciis sunt.

Testudinum magna est copia *Spiræ* ad *Rhenū*, in campis ac riuiulis uiuentium: Cum ibi sunt comitia, rustici eas cancrorum modo uenantur & uenales portant. Hispanis in comitiis ibi agentibus, lautissimum faciunt cibum, cum non temerè ab aliquo Germanorum expetantur.

Steynraben, corui sunt in rupium & petrarum cauernis uiuentes, uita illis ad Danubium in utraq; ripa ubicunq; saxa & rupes attolluntur: ut non procul à *Passaui* et supra *Kelheimium* in petraeis faucibus. expetuntur regum uenationibus & mensis.

Steyndolenz, monedule sunt in petrarum cauernis agentes: reliquis monedulis multo minores: frequentes autem sunt supra *Kelheimium* in petraeis faucibus, utraq; que *Danubii* ripa.

Piscis planus *Soleæ* aut *Passeri* marino similis, carnosior tamen, * atq; aculeata nigra & coelum spectante parte, in mari uiuit.

Chlorion auis uidetur mihi esse quæ Germanis uocatur *ein Worgangel*. colorem habet in uiridi luteum, quemadmodum etiam eius carnes. Vide etiam *Hemmerlinge*.

Spermatis Ceti genus, seuo simile, multis tenuibusq; ceu neruis plenum, inuenitur in nostro mari.

Motacillæ auis species altera *Ictero*, id est, *Hemmerlingo* colore similis, cætera *Motacillæ* uulgaris.

FINIS.

Dd

Vulpecula
marina for-
te.

Trutta

Pyrgocora
rax item
Brilaci de
pud sancta
Mariam de
lapide pro
pe Basileas

LOCA MEDICAMINVM FERACIA IN GERMANIA

sunt præcipua hec sequentia.

MONTANI hercinia sylva tractus circa Bohemiam totam: & in finibus Saxonum ac Thuringorum, iuxta Goslarium, Osteradam, Halberstadum, Quedlingburgum, Oscharolebium, & Stolbergum urbes.

Item Alpes totæ, præsertim Heluetiorum & Noricorum.

Montes Transylvania.

Deysterus in Brunsvicensi Saxonia.

Vuinbergus, Gleysbergus, aliq; Sala fluuio imminentes iuxta Ienam urbem.

Mons S. Petri iuxta Halam Saxoniam, omnesq; montes Thuringiam circumdantes, præsertim iuxta Vualtershusium.

Vogelbergus, Arnestusq; montes, & sylua Reynhardina in Hefsia.

Rheno imminentes montes: Brisgoie item, Pomeraniae q; partes priuatim quædam excellentiora in suo genere ferunt.

Palustria quoq; Chauchorum quædam copiose ferunt.

Sylua quoq; nigra, quæ Hercynia pars est: & Alpium cornua in Sueuia, quæ Almen incolæ appellant, plurimis optimisq; nec ubiq; inuentus facilibus scatent.

V.A.L.

235

VAL. CORDI DE AR- tificiofis extractionibus Liber: cu-

ius tres sunt partes.

- I. De extractione efficaciorum partium e medicamentis purgantibus, simplicibus & compositis.
- II. De Destillatione oleorum.
- III. De Destillatione olei e Chalcantho duplicis, eorumq; uiribus.

CL. V. PHILIPPO BECHIO BASILIENSI DOCTORI MEDICO, artis scientia & usu celeberrimo, Con. Gesnerus Medicus. S. D.



ΑΡΙΤΑΣ ΔΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΟΥ, ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΕ, Gratiū
antiquissimo Menandri senario celebrata sententia, non gentium modo, sed naturali
nis laus.

ure animis hominum inscripta, iustitiam plus quam civilem constituit. Leges enim
civiles eatantum dare aut reddere queng; iubent, quæ ex boni civilis officio facere de-
bet: ac nisi faceret, iure cogeretur. at qui beneficium ultro et gratis confert, is ut plus
quam civiliter iustus est, & ueluti melioris ciuitatis cælestisq; reipub. ciuis, inq; ea
summi reuera dū rōnē p̄tēro, & Dei O. M. imitator, ac sicut in prouerbio est, Homo ho-
mini deus: ita ingenuē, candidē, libere, liberaliter, et sine remunerationis spē, quæ po-
nes se sunt communicat, largitur, commodat, gratificatur aut donat alijs hominibus,
diuina quadam animi magnitudine præditus. Huic uero proximus est, is qui grato
sinceroq; animo, non minus benignē, libenter atq; liberaliter, quam ille dedit, acceperit: & uerbis, si opus sit, memo-
rem gratumq; se exhibuerit: & si nihil impediāt, re ipsa dū rōnē p̄tēro, ueluti p̄tēro, beneficium retulerit. nā
hic quoq; homine ciuilitate iusto, ut mihi uidetur, iustior est: ad referendam enim gratiam legibus non adigitur, sed
sponte facit. Quemadmodum autem sine ciuili iure res publica esse aut durare prorsus non potest, ita si beneficentiæ
& gratitudinis officia accedant mutua, melior eadem, incunātor atq; felicior fuerit, duraueritq; diutius. Hic præci-
pius amicitie, perfectissime uirtutis: hic potissimum sacro sancti illius & uniuersalis præcepti: Quod tibi fieri nolis,
ne feceris alteri, usus atq; fructus est. Quamobrem erga benē merentes gratitudinem, ita propemodum laudandam
iudico, ut erga Deum pietatem laudamus: ingratitudinem uero ueluti impietatem quandam detestari oportere. Sic
igitur affectus ego in omni uita beneficiorum quorumuis mihi authoribus, gratum memoremq; animum saltem, si
rebus fortē assequi nequeam, declarandum mihi imperaui. Itaq; in his etiam Cordi libris ad editionem promouen-
dis, hoc primum spectauit, ut publico artis medicæ studioforum nomine, conditori eorum, aut eius memoria saltem,
quo possem modo præberem me gratum: idq; merito, cum ipse uita sue periculo, in eoq; tandem amissione, medicis,
imō mortalibus omnibus, prodesse uoluerit. Deinde priuatim ijs, qui mihi scripta eius conquirenti, quæ habebant
exemplaria obtulere, (ut & mihi gratificarentur, & ex peculiari bono publicum facerent,) gratitudinis aliquod spe-
cimen depromere conatus, oblatos ab eis libros, ut profecta ab ipsis gratia ad ipsos quodammodo rediret, in ipsorum
nomina inscripsi, uidelicet Ralla, Heroldi, Placotomi. Ceterum huic instituto meo, doctissime & ornatissime
Bechi, nisi hunc De extractione subtiliorum partium ex medicamentis purgantibus, & oleorum destillatione libel-
lum tuæ humanitati dedicarem, non satisfacerem. Eius enim tu primus mihi copiam fecisti, quamquam illius tantum
partis, quæ oleum Chalcanthi destillat: quam postea unā cum prioribus duobus partibus Ioannes Crato etiam (uir
doctrina & uirtute præstans, Cæsareæ maiestatis medicus) Vratislauri ad me misit. Sed nolui idcirco destinatam no-
mini tuo tam antē nuncupationem mutare. Collatis quidem ijs quæ ambo communicasti eadem, libellum integro
rem do. Hunc ipsum autem non minus benigno liberaliq; animo nunc recepturum te, quam prius dedisti, nā dū rōnē p̄tēro, ab in-
illa tua, quam uultu, sermone, moribus, totaq; uita præ te fers (ut nihil iam de eruditionis tuæ præstantia dicam,) &
spem indubiam mihi facit. Quod si fortē inuidus aliquis secum stomachetur, & artificiosos illos adeoq; subtiles
& secretos medicamentorum apparatus (quos paucissimi hactenus, soli fortē principum medici, non multis ante hoc
tempus annis, aut qui magna pecunia redemissent, callebant) in uulgus edi ac ueluti mysteria profanari indigne se-
rat: illi equidem in præsentia nihil respondebo, ut magis etiam indignando ipse sibi inuidie sue poenam det. Ego (ut
aliquid saltem dicam) bona omnia communissima esse cupio: neq; ab hoc proposito abutentium imperitia aut malitia
me deterrebit. istos enim coërcere, & a medicæ professione prohibere, magistratuum interest, qui si alicubi offi-
cio suo hæc in parte non satisfaciunt, ut sit, præsertim in populari reipub. statu: nos tamen quæ optima excellentissimæ

Ed 4

VALERII CORDI DE ARTIFICIOSIS

maq; remedia nouimus, nihilominus & publice & priuatim uir is bonis ac eruditis (quorum, Deigratia, magnus
ubique numerus est) communicare non desinemus. Vale uir clarissime, & me ama. Tiguri decimo Kal. Ianuarij,
instantis anni à uirgineo partu. M. D. LX.

VALERII CORDI DE EXTRACTIONE, VT

uocant, Purgantium medicamentorum: & Oleorum destillatione: in genere
primum: deinde priuatim De oleo è Chalcantio duplici, uno auste
ro (uel acido) altero dulci, Libellus tripartitus.

PARS. I.

DE EXTRACTIONE. CAP. I.

EXTRAhitur ex medicamentis solutiuis ipsa qualitas purgans æquè ac
Olea, sed diuersa ratione. Olea propter aëream substantiam ascendunt in
destillatione. Solutiua uerò facultas, quoniam terrestri corpori inseparabiliter
inheret, non ascendit, sed in fundo relinquitur: excepto uno atque altero, flore uis
delicet Pruni syluestris & Perlici, quorum aquæ destillatæ altum subducunt: &
hoc, quia flores hanc uim obtinent. Nam hi melius à sole excoquantur, & subti
liores uires, quæ faciliè resoluuntur in uaporem, acquirunt. Sed quæ propriè solu
tiua uocantur: aut sunt radices, aut radicum liquores, aut succi, aut cortices, aut ses
mina, quibus omnibus inest tenaciter inhærens & uiscosa qualitas. Ideo quæ eo
rum solutiua uis non potest ascendere in destillatione, sed manet in substantia de
coctionis, ex ea evaporante quicquid est aqueum. Excogitata autem hæc est ex
tractio pro delicatis & nauseabundis, ut qui magnam solutiui *dosim* nō ferunt.

ELLEBORI nigri extractio. CAP. II.

RECIPE Rad. Ellebori nigri recentes, libras iiii. lauentur dum sunt succo pre
ditæ: deinde incide minutim, ac superinfunde sequentis decoctionis Colaturam. Re. succi Buglossæ, Borag. lib. ii. Succi depurentur, & colentur diligen
tissimè, ut auri claritatem acquirant, & reponantur ad tempus conueniens.

Item deinde Rad. Fœniculi, Cicoreæ, Asparagi, Petroseliniana unc. iiii. Fruct. Ju
ubarum. Sebesten añ drach. ii. Seminum Melonum, Cucumeris, Cucurbitæ, Cla
trulli: decoquantur secundum artem in aqua lib. xii. Colaturæ infunde præ
dictas lib. iiii. succorum: deinde sine ebullire paululum ad ignem. Postea incisas
& contusas radices Ellebori iniice, & coque lento igne paulatim, usque dum radice
ces emineant: deinde exprime rursum per filtrum. Colaturam coque ad mellis cras
situdinem, clementi igne, adhibita assidua cura ne aduratur. Postea repone, & utere
faciendo periculum in dosi à scrup. s. usque ad unum.

EXTRACTIO RHABARBARI. CAP. III.

RHABARB. electi lib. i. minutim incidatur, & grosso modo teratur, po
stea adfunde succi depurati Borriginis, Buglossæ lib. ij. maceretur per horas
xxiiii. deinde coque ad lentissimum ignem, usque quo extra emineat Rhabarba
rum. Exprime postea fortiter, & expressam decoctionem per laneum colatorium
transmitte & exprime, ut substantia in colatorio maneat: colaturam coque ad mel
lis spissitudinem, adiectis Zuccari uncis ij. Quidam in balneo Mariæ ad spissitu
dinem coquunt, ne aduratur, quod melius est, quemadmodum etiam in duplici
uase. Purgando deglutendum cum gutta olei Cinnamomi, aut Anisi mixtum &
azymo inuolutum, faciendo in dosi periculum, à scrup. i. usque ad scrup. ii. Qui
dam quia Rhabarbara per se non ualde purgat, acuiunt totam extractionem cum
modico Diagridii optimi quod nihil nocet.

DE Extractione è Massis Catapotiorum. CAP. IIIL.

CVM uirtutem solutiua ex massis pilularum extracturus es, necesse est,
ut

ut prius diligenter dispensata sit massa, sumpta aloë purissima, & aliis medicamentis electis. Deinde recipe quamcunq; uolueris massam, & concidas in minutas partes, ac macera per octiduum in aqua pluuiali, succorum Borriginis, fœniculi, ana q. f. Coque deinde in uitreo duplici uase, per integrum diem, deinde exprime per laneum pannum mundissimum, qui nullos pilos emittat, & iterum in balneo [†] in duplici uase ad iustam spissitudinem diligenter coquito, & forma pilulas minutas, da scrup. ii, aut circiter i. Hoc modo extracta massa est purissima, tenera, & facile in manu liquefcit. Porro reliquorum purgantium medicamentorum uires similiter exprimi possunt. Sed animaduertendum quod semper sint admiscenda in decoctione lenientes & lubrici succi, quales prædicti sunt, & melius multò est, ut omnia in duplici uase coquantur.

ALOE quomodo optimè lauetur.

CAP. V.

ALOEN optimam, fuluam, pellucidã, facile in manu liquefcientem confringe in partes minutas, & pone in patinam uitream, mundam: & infunde desuper sufficientem quantitatem aque pluuialis. dissolue in duplici uase omnino, & permittite denuò refrigerari: postea aufer innatantes si qui sunt pilos: & sensim quod est liquidissimum ad spissitudinem in duplici uase coque. Quod uerò in fundo uasis est crassiusculum in alios usus seruetur.

PARS II.

DE DESTILLATIONE Oleorum.

CAP. I.

QVONIAM Aromata quædam, & omnium umbelliferarum herbarum semina ferè constant magna ex parte, calida, tenui & aërea substantia: ideo necesse est, ut aliquid de oleaginosa substantia habeant. Nam talem habet mixturam propemodum omne oleum. At cū oleum & pinguedo quæ in simplicibus medicamentis continentur duplex sit, quædam monenda sunt. Nature periti duplex inuenerunt oleum: in simplicibus medicamentis unum terrestre, crassum & uiscosum, & totaliter suo corpori in quo est commixtū: quale est oleum Nucū, Amygdalarum, Baccarū lauri, Seminū lini, Hyoscyami, Sinapi, Papaueris: & omnia similia quæ in fructuum aut seminum nucleis continentur. Hæc autem omnia propter totalem cū substantia cui insunt commixtionem inseparabilia sunt, nec ullo modo per distillationem elici possunt: quare ui exprimenda sunt è substantia. Alterū tenue aëreumq; est, & separabiliter suo corpori inhaeret: & hoc est segregabile. Ascendit enim facile in distillatione, nec difficultat à suo cui inest corpori decedit. Tale autem est quod cōtinetur in aromatibus, Carpobalsamo, Cardamomo, Pipere nigro, Cubebis, Cinnamonomo, Caryophyllis, Macere, nuce Muscata, ligno Aloës. Item quod cōtinetur in seminibus umbelliferarum herbarum: Quales sunt Ligusticum, Angelica, Angelica minor, Libanotis nigra, Magistrantia, Pastinacæ, Caros, Cymīnū, Ammi quod appellant Amomum: item Apium, Petroselinum, Gingidiū, Pimpinella, Anisum, Fœniculum, Anethum, &c. Eliciuntur autem hæc olea per distillationem in arena, ita ut tusa aromata aut semina iniiciantur in cucurbitam uitream luto intectam optimè: una autē uice ad unc. iiii. iniciantur, & sint trita secundum capacitatem cucurbitæ, infundatur deinde ad vi. lib. aquæ clarissimæ, ac misceto diligenter. Pone deinde cucurbitam in capellam aptam fornaci, & arena imple, & non attingat fundum, sed intersit arena. Cucurbitæ impone alembicum uitreum, cuius rostrum desinat in stanneam uel ferream fistulam [†] intus & foris illitam. ea fistula transeat in obliquo [†] quum per uas quod habet in se aquam frigidam, ut inter destillandum egrediens cum oleo [†] liquorum refrigeretur, claude iuncturas accuratè, madefacta papyro uel linteo, & suppone exceptorium. Postea accende ignem lentum, & uide ne nimium fureat & ebulliat in alembicum, quod in cucurbita continetur. Semina enim quædam ut anisum propter raritatem substantiæ suæ, simulq; uiscosum quod habent largiter ebulliunt, ideo non statim alembicū imponere debemus: sed posteaquam bullas excitari uideris, & uaporem sursum ferri: Quod cum fiet depone alembicum,

D d iiii

VALERII CORDI DE ARTIFICIOSIS

& immisso bacillo agita, ita resoluetur in uaporē spuma, quæ postea mediocriter igne moderari, compesci & excitari potest. Quo facto impone rursus amlebicum, & circumlutato satis, ac destillari sine cessatione, donec conieceris nullum amplius intus contineri oleum: quod uisu & gustu statim percipies: nam cum gustu destillantes guttæ non amplius respicient iniectionis aromatis saporem, destillandum est. nea roma fundo cucurbitæ inhæreat, & exuratur. Deinde segrega contentum in destillata aqua oleum optimum, quo potes artificio. Porro notandum est, quædam ex his oleis aquæ innatare, quædam fundum petere. Innatant piperis nigri, & recentis Cardamomi, & Anisi Fundum petunt, Cinnamomi, Macis & Cariophyllorum, &c. ut uidetur. Aqua Cinnamomi & Anisi cum destillantur, lacteum habent colorem, & lacteum hoc paulatim in oleum conueritur. Referuanda autem Cinnamomi est aqua, præsertim quæ primò exierit.

NATURA & vires Oleorum. CAP. II.

FOENICULI & Anisi olea, naturam mirabilem habent, nam in hyeme uerumque concrefcit instar butyri, ita ut aspectu imitetur sperma ceti, præsertim Anisi. Nam hoc æstate media concrefcit aspectu niueum: reliqua omnia liquida permanent. Reponuntur optimè in loco frigido & puro, præsertim Cardamomi & piperis. Ea enim omnium tenuissimam substantiam habent, adeo ut neglecta omnino euanescent. Vires autem habent earum rerum, è quibus extracta sunt, sed multò efficaciores. Nam efficacia quæ uni libræ inest in paucas drachmas contrahitur. Cariophylli enim uncia xvi, contrahuntur in unciam unam semis, aut duas, Cinnamomi in drachmas duas semis aut duas: piperis in Dra. ij. aut tres una semis: Miscentur autem in confectione† ad guttæ x uel xv aut xx, libræ Zuccari pro de-
 † ad forte abundat.

PARS III.

DE OLEO uitrioli faciundo. CAP. I.

OLEUM uitrioli quod à quibusdam oleum uitæ appellatur, aut melancholia artificialis, nihil aliud est, quam aluminosa qualitas, & substantia ex uitriolo per artem extracta, modicoque sulphuri mixta. Nam ipsum uitriolum, è quo fit, triplici constat mixtura, uidelicet multo alumine, modico æruginè, & paucò sulphure: Aluminosa enim aqua in metallis per æris uenas & Marchalitam destillans, æruginosam qualitatem acquirit, & sulphuri quod Marchasitæ inest, mixta paulatim con-
 crescit, aut industria ad spissitudinem coquitur: in destillando autem aluminosus & sulphureus uapor tantum ascendunt, æruginosa qualitate in fundo retortæ relicta, quo fit ut hoc oleum aluminis, & non æruginis saporem habeat. Est autem duplex hoc oleum, nempe austerum & dulce. Austerum duplici constat mixtura, scilicet alumine multo, & modico sulphure. Dulce uero simpliciter sulphure constat. Nihil enim aliud est, quam liquidum sulphur ex austero oleo extractum. Quapropter gustu nequaquam alumen, sed sulphur æmulatur. Faciendum est autem utrunque maxima cura & diligentia, adhibitis aptis fornace, retorta, & receptaculo: siquidem aptitudo instrumentorum, ut aiunt Chemistæ, magistrum parit. Quapropter sequentes Canones diligenter obseruentur.

ELECTIO VITRIOLI. CAP. II.

CVM plurimæ sint uitrioli species, operæ precium est indicare, quæ nam species eius huic operi potissimum conducatur. Et quamuis omne uitriolum hoc oleum reddat, nullum tamen est ex omnibus præstantius cœruleo aut uiridi: quoniam plurimum fugitiui sulphuris obtinet, quo adiuuatur ut facilius oleum ascendant. Notandum etiam melius esse factitio natium uitriolum, & maxime Vngaricum: aut si huius copia non sit Goslariense. Eligendum præterea est quod magnis racemis

racemis constet, & maioribus cubis concretum sit. Quod autem [†] fractum, minutū
& puluerulentū est, ueluti inutile non est recipiendum, quemadmodū etiam quod
solis [†] uel aeris iniuria candorem & puluerulentam canitiem contraxit.

COCTIO VITRIOLI. CAP. III.

AT quia uitriolum multum in se habet aquei & excrementitii humoris, qui o-
leum diluit, & non nisi longo tempore & magnis molestiis per distillationem
ab oleo separari potest, compendiarie est inuenta uia, qua breui temporis interuallo
id absumi queat, ne longa mora artificii fastidium pariat. Recipe igitur prædicti ui-
trioli lib. xii. conice eas in ollam magnam, nouam & optimè crematam. ollam im-
pone fornaci profundæ, supra arduentes prunas: cum liquefieri & bullire cœperit,
spatula agitur, ut integrū liquefacto misceatur donec & ipsum liquefiat. Bullire
demum finito usquequo nullā prorsus bullam amplius excitet, & donec totū den-
setur. Deinde exemptam ē fornacem cum uitriolo ollam refrigerari permittito, loco
neq; humido neq; uentofo, sed siccō & tepido, postquam refrigeratum fuerit, ex ol-
la eximito, & considera an superficies eius undiq; rubescat. Nam si rubescit bonum
est signum, & facilius calcinatur, ut iam dicemus.

CALCINATIO Vitrioli. CAP. IIII.


EXEMPTVM olla uitriolum in minutas partes confringe, & in mortā-
rio subtilissimè tere, deinde tertiam aut quartam eius partem in recentem [†] ac
combustam ollam conice, ac rursus in profundam fornacē, si ut ante, dimitte & ali
quandiu urito, donec rufus fiat color. Mox ollam ab igne deponere et moue eā, ut

uideas notā, an satis calcinātū sit Vitriolum. Nam si in olla fluctuat argenti uiui aut liquefa-
cti plumbi modo & exilientes bullas eiacula-
tur, satis uisū esse intellige, tunc effunde in ma-
gnam & recentē ollam prius calefactam, & ef-
fluet quasi sit liquidū, aut ad modū argenti ui-
ui. Quod autē reliquum est Vitrioli, similiter
sigillatim, ut calcinetur [†] uras. Cū uisū fue-
rit, cōmisce rursus optimè in mortario, mode-
stè agitās ne puluerē excites nares & fauces of-
fensurū. Cū hæc omnia executus fueris, uitrio-
lum in balancē ponito, & animaduerte pōdus
ipsius. Nā si sex lib. id est, medietas superfue-
rit, benè omnia facta sunt, sed hæc sufficiant.

DE FORNACE faciunda. CAP. V.

Materia, quæ destillanda est, quo modo
preparanda sit, iā indicauimus. Nunc
autē dicere de fornace res & ordo postulat: nā
si hæc inepta fuerit, [†] frustra omnia fiēt. Extru-
enda igitur est fornax ex lateribus in planum
positis, quod crassioribus parietibus ignis faci-
lius & diutius contineatur: fiet etiā quadrata
& æqualiter crassā, intusq; habeat propemo-
dum duarū spithamarum latitudinem, nō ra-
men omnino, sed dempta tertia parte spitha-
mæ. Extruatur autē hoc modo. Prima & infi-
ma cavitās habeat altitudinem semipedis, cui
per transuersum imponantur ferraamenta satis
crassa, ut ignitis carbonibus non inflectantur:
secunda cavitās quæ est constituta supra fer-
ream cratem, (id est, vber den rosti) habeat du-
um pedum altitudinem, & ex anteriori parie

Da iij



foramen, per quod carbonēs iniiciantur. Hoc incipiat lateris transuersi crassitudine super cratem. Per mediam deinde cauitatem, in ipso medio inspicienti fornacem, per transuersum infigatur ferreus axis, quadrangularis, crassitudine pollicis, qui impositam retortam sustineat. In latere deinde sinistro fornacis, relinquatur meatus, per quem retortae collum exeratur.

DESTILLATIO VITRIOLI. CAP. VI.

POSTquam fornacem extruxeris, eligo retortam capacē aptamq̃ ante omnia, ex uitro Venetiano aut saltem Hesiaco factam, prius undiq̃ luto obductā. in eam conuicito totum Vitriolum, ita ut aliqua pars retortę relinquatur uacua, quō facilius a† Vitriolo spiritus ascendere queant. Mox transuersam & ferream trabem in fornace optimē luto obducto, eiq̃ in medio superposito perlutatum testā fragmentum, super id collocabis retortam, ne a candente ferro immediatē dissecetur, ita tamen ut in medio fornacis retorta constituta sit, eiusq̃ rostrum extorsum modicē prouum promineat, & meatus per quem collum suum ē fornace exerit, diligentissimē luto farciatur atq̃ obstruatur. Postea accipe quinq̃ regulas, & fac ex iis testum supra fornacem sub quo lateat retorta ad eum modū quē depinxi, testum luto undiq̃ obducatur, quatuor pro fumo foraminibus relictis, in singulis angulis singulo, ea amplitudine ut crassissimus pollex liberē intronitti et exeri queat. Fac etiā quatuor conos ex luto, quibus foramina obstruantur, quo facto, applica retorta orificio receptaculum grande ex uitro Venetiano aut Hesiaco, quō enim maius id ipsum fuerit, eō liberius spiritus recipiet; si uerō paruum fuerit, periculum est ne spirituum copia distentum rumpatur, infunde etiam in retortam aquā clarissimā: unc. xviii. aqua enim citō spiritus ad se rapit, & prohibet ne confringatur receptaculum. ita applicatum optimo luto diligentissimē obstruatur, magna adhibita cura ne quicquam in receptaculum incidat, tingitur enim inde in ruffum colorem oleum. Cum omnia hec feceris dimitte per integram noctem lutum exiccari: ac si quę fatiscunt, rimā luto illinantur, mane deinde† perlucidum accende ignem, ex puris & magnis carbonibus, aperto uno superius foramine, per quod fumus exeat, augeaturq̃ successiue ignis usq̃ ad uesperam: quo tempore aperiendum est secundum foramen, & attende diligenter† an appareant spiritus, qui ē retorta egrediuntur, ueluti si quis candidum efflaret fumum. nocte sequente uigilia cura cauendum, ne ignis remissior fiat, sed acrior, paulatim tamen, ita deinde auctum ignem in uigiliis re teneas, ac altera die tertium aperi foramen, augendo sigillatim ignem, usq̃ quō etiam retortae collum candescat. Sequenti secunda nocte auge ignem, & post mediā noctem aperi quartum foramē. Cum ita in summo uigore ignis fuerit constitutus, uidebis spiritus egredi, ueluti conglomeratas nubes, qui cū cessare uoluerint, aperiri omnes fornacis aditus, & sine intermissione carbonēsingere, usq̃ quō etiam receptaculum excandescat, studiōse cauendo ne quicquam frigidum aut humidum super retortam aut receptaculum iniuria aut casu decidat. Agenda hæc sunt in loco clauso, quo neq̃ imber neq̃ uentus ingrediatur: seruandus autem ignis est, donec nulli prorsus spiritus in† Vitriolo relinq̃atur, quod uisū faciliē percipi potest. Cum autem nulli amplius egredientur, sine ut per se extinguatur ignis, ac totum opus integrum cum nocte diem quiescere ac refrigerari finito, postea aufer cum contento humore receptaculum, & repone donec oleum ab aqua segrebabis, tum fractam retortam inspicere, & uide an caput mortuum nigrum sit, hoc enim signum est perfecti operis. Est autem caput mortuum exustum in retorta Vitriolum.

SEGREGATIO INFUSAE AQVAE. CAP. VII.

QVONIAM in receptaculo continetur unā cum Vitrioli oleo aqua, segreganda hæc est, ut Vitrioli liquor syncerus reponatur: segregatur autē per destillationem in balneo aut cinere subtili, tutius tamen in balneo, quapropter totum humorem.

humorem qui est in receptaculo, in cucurbitam uitream Venetianā aut Hessianā
infunde, superponendo Alembicum ē simili uitro factum, quā benē luto circum-
linatur. sub balneo deinde accenso igne paulatim sine aqua donec habeas unc.
xviii. illas quas infudisti. Si Vitriolum non benē calcinatū fuerit, plus egredietur,
quare uide ut prædicta xviii. uncia sint bonæ mensuræ. Cū hoc feceris refrige-
rari balneum finito, et aquam quæ destillauit abiicito, quod uerò in balneo cucurbi-
tæ in fundo reliquum fuerit, purum est Vitrioli oleum: habet tamen plerumq; ru-
fum colorem, ideo secundum sequentem modum rectificandum est, ut clarum fiet.

† extir.

RECTIFICATIO OLEI VITRIOLI CAP. VIII.

ACCIPE retortam Venetianam aut saltem Hessianā, antea luteo optimo
uestitam, in eam funde quod in cucurbita continetur oleum, retortam pone
in minorem fornacem in capellam quæ pura & lota arena repleatur. Et quemad-
modum antea in balneo, ita nunc in arena destilla, paulatim ignem acuendo, ut
figillatim ex intervallo delabantur guttæ. Retortæ orificio applica receptacu-
lum ex eodem uitro factum, ac comissuram optimē luto claude, ne quicquam expia-
ret. cū deinde totum ē retorta destillauerit, refrigerari finito, ac postea aufer & in
funde sensim in purum uitrum Venetianum, quod habeat angustum orificium, ac
repone, cui præsens in multis morbis remedium: hoc est austerum Vitrioli oleum,
cuius uires & naturam nunc indicabimus, quas excellentes & efficaces habet.

VIRES EIVS. CAP. IX.

MERV M ac non dilutum, neque debet neq; potest intra corpus sumi: nam
propter nimiam acrimoniam ignis modo interanea, & quicquid attingit a-
durit: omnia. n. corrodit præter uitrū & pinguiā, ueluti ceram, picem, seuū & liqui-
dorum etiam oleorum colorem immutat, præsertim olei Macis, cui si misceatur, san-
guineum reddit colorem. Si etiam in duobus uasculis contineatur quantum uis fri-
gidum, & repente sibi ipsi misceatur, adeo incalcescit sua sponte ut manibus uix
tangi queat. In terram effusum bullit, quemadmodum etiam pura melancholia.
quare etiam melancholia artificialis appellatur. Quemadmodum enim melanco-
lia, ita etiam hoc oleum uentriculum confortat, & ad cibi appetentiam inuitat ac sti-
mulat, frigidum uentriculum calefacit, phlegma consumit, crassos & uiscosos hu-
mores incidit, colicæ ac dysentericæ opitulatur, sitim ac feruorem interaneorum
in febribus extinguit: singultum prohibet confestim & nauseam ac cibi abomina-
tionem auertit, sed temperandum est cum aliis quibusdam. Quare exemplū unum
atq; alterum ponemus.

Aduersus Calculum.

Recipe Olei macis,
Terebinthinæ clariss. ana guttas xii.

Aquarum Anisi,
Fœniculi, ana unc. ii.

Syr. liquiritiæ. unc. i.

Olei Vitrioli tres aut quatuor guttas.

Misce omnia optimē, et gusta: si habet acetositatem, quæ dentes non in stuporē
trahat, benē est: si non est acetosa potio, instilla adhuc unam aut alteram gut-
tam, & consule palatum, ac propina securē.

Ad uentriculum debilem.

Recipe Syr. de Mentha unciam i.
Aquæ Cinnamomi unc. iiii.

Ee

Olei Cinamomi guttas ii.
Olei Vitrioli guttas iii.
Da securè.

AD CALOREM ET SITIM *in febribus.*

Recipe Syrup: ex succo aut infusione uiolarum unc. i.
 Aquarum Cinamomi unc. i.
 Hordei. unc. iiii.
 Olei Vitrioli guttas iiii. aut iiii.

Misce, & contrahet puniceum colorem, & saporem uini austeri Cinamomo aromatizati.

EX AVSTERO quomodo Dulce fiat. CAP. X.


ANTE A dictum est austerum Vitrioli oleum, duplici constare mixtura, videlicet multo alumine, & paucio sulphure. Quare cum ex austero oleo dulce extrahitur, nihil aliud fit, quam quod sulphur ab alumine segregetur. Est itaque dulce Vitrioli oleum nihil aliud, quam oleum sulphuris aut ipsum sulphur in liquidam substantiam redactum; & hoc proprie oleum dici potest. est enim pingue unctuosumque, quemadmodum ipsum sulphur quod in oleo, & non in aqua liquefit, sequitur autem modus segregationis.

MODVS SEGREGATIONIS. CAP. XI.

RECIPE vini ardentis acerrimi & ter sublimati unc. vi. olei Vitrioli austeri tantundem, misce in Veneto uitro, & pone in Cucurbitam paruam, angusto orificio, & optimè luto orificium claudè, dimitte ita per integrum mensem aut duos. Deinde effunde in Cucurbitam, cui sit immediatè & annexum alembicum, (hoc est, ein *Toll mit einem angeschmolzenen helm*) cuius figuram subiiciemus. pone deinde in paruum fornacem, ac dimidiam partem eius cinere obrue. postea applica recipientem, & luto iuncturam claudè diligenter, & extrahe unc. vi. vini ardentis quas infudisti: ut uerò tutius hoc fiat, pone in balneum Mariæ, sic solum uini & oleo ascendet. Cum extraxeris autem per Balneum infusas vi. unc. uini ardentis: pone id quod residuum est in fornacem, ut arena mediam Cucurbitæ partem attingat, ac nouo & uacuo recipiente, coq̃ non magno applicato, luto iuncturam diligenter claudè. Accende deinde lentum ignem, & sensim extrahe omnem humiditatē, quæ relicta est in Cucurbita, donec nihil humidius amplius in fundo appareat: adhibita semper maxima & cura & diligentia, ut ignē ita modereris, ne ebulliat usq̃ ad alembici caulem. Nam si hunc ebullitio attigerit, sedari non potest nec prohiberi, quin in receptaculum egrediatur: ac totum oleum corrumpat, solet enim facillimè ebullire. Cum autem sensim extraxeris, aufer statim recipientem cum suo humore, tum uidebis duo contineri in eo, uidelicet aqueum humorem & oleum ac pinguem. Segregabis autem unum ab altero statim, ita ut nihil aqueum in oleo relinquatur; Nam aqua illa perdit oleum. Solet autem oleum ipsum plerumq̃ aquæ innatare, maxime si infusum prius uinum omnino per balneum extractum fuerit, sed statim poteris tactu discernere oleum ab aqua. Oleum enim pingue est, aqua minimè. See

Ein Kolb mit einem angeschmelzten helm muß man etlich auff der Glashütten bestellen zu machen / auß zerbrochnem Venedischem glasz / oder auß Hesischem glasz.

Vires

VIRES EIVS QVOD *fegregatum est.*

CAP. XII.

VIRES habet quascunq; & sulphur, sed omnia efficacius præstat, quia propter liquiditatem facilius penetrat & ad actiones ^T proprias, quod sulphur nō potest, quia impeditur à soliditate & spissitudine sua, quo minus penetret. Illud uero amplius potest sulphure hoc oleum, quod ualeat potenter, ad omnes in corpore putrefactiones, & præcipue ad pestem, ad educendum è pulmone in pleuritide, & peripneumonia, & difficili tussi, pus, & crassos uiscososq; humores: tuto enim absq; omni periculo intra corpus sumitur. Calculum neq; in renibus neq; uelica coalescere sinit, exulceratam uelicam sanat. Dosis eius est una aut altera guttula, aut tres, in uino modico temperatæ. miscetur etiam rotulis & morfellis è saccharo factis. Diligenter autem referuandum est. Nam modicum fit ex lib. i. austeri olei Vitrioli, & facile propter tenuitatem partium euanescit.

FINIS.

Ec ñ

VAL.CORDI COMPO- sitiones medicinales aliquot, non uulgares.

CLARISSIMO VIRO SEBALDO HAVVENREVERTERO
illustris Reipub. Argentinensis medico præstantissimo, Con. Gesnerus
medicus S. P. D.



LIBERALITATIS PVLCHERRIMAE VIRTUTIS LAVS ET
decus, nō in magnis solum donandis, sed parvis etiam eodē animo accipiendis, consi-
stere mihi uidetur. Itaq; cum te uirum bonum & liberalem esse, doctissime Sebalde,
nōrim atque expertus sim, pauculas istas Valerij Cordi medicamentorum composi-
tiones, tantillum munusculum offerre excellentiæ tuæ ausus sum. In quibus (ut spe-
ro, ac mihi polliceor) oblectabit te primum animus, & deinde, qui exiguo potius
quam nullo, obligatum se beneficijs tuis profiteri uoluit argumento. Deinde ipsius
Cordi memoria, tertio res ipsa, uidelicet compositiones Medicinales non omnibus uul-
gares. Librum quidem huius authoris De pharmacorum compositione Ioan. Peireius
Norinbergæ iam dudum paulō post ipsius mortem edidit, sed in eo ueteres tantum &
aliorum compositiones describuntur, ac scholijs ipsius illustrantur: propria uerō nulla continentur, præter Alefane-
gina eius catapotia, et eclegma Diamoron. Ego hic alias quasdam ad te mitto, perpaucas, sed egregias: inter quas præ-
cipua est Succino trochisci, quos à Ioh. Cratone etiam Caesaris medico præstantissimo, in ipsius ad me epistola huius
uoluntati præfixa laudatos reperi. Ad tuam autem potissimum præstantiam dare hæc uolui, ut amicitie nostræ
argumentum hoc publicum extaret, & ut tuam quoque super his sententiam audirem. Tu enim si quis alius, & plus
ad artem nostram faciunt omnibus rectissime potes. Vale. Tiguri pridie natalis Domini, ineunte anno ab eius na-
tuitate sexagesimo supra sesquimillesimum, quem tibi tuusq; faustum ac felicem cum alijs deinceps innumeris ab
eodem Domino nostro, æterno Dei Opt. Max. filio unigenito secundari ex animo opto.

DIAMORON VALERII CORDE: (NAM ALIVD EXTAT

Nicolai Myrepsi:) contra depascentia oris ulcera, ad dentium affectus

& gingivarum noxas, atq; ad omnia oris uitia collutione

& gargarismo proficiens,

Recipe Succi mororum rubi,
Succi mororum rubi Idæi,
Succi mororum de arbore,
Succi fragorum, ana lib. ii.
Mellis despumati optimi lib. iiii.

Coquantur lento igne secundum artem.

MORORVM omnium succus exprimendus est, antequam perueniant ad maturitatem. Porro Morarubi Idæi
& fraga citius maturescunt quam alia: quare oportet horum succum colligi, & cum Saccharo decoctum reponi, do-
nec alij maturescant. sit autem Sacchari ad succos proportio dupla. Rubi Idæi nomine intelligo illum quem uocamus
Humpen & fructum Humber.

PILVLAE Alefagine Valerij Cordi.

Recipe Myrobal. quinque generum ana unc. i.
Acori ueri, Galangæ,
Zedoariæ, Doronici Rom.
Radic. asari, Radic. dictamninostratis.
Absinthii, Rosarum, ana dra. iiii.

Continua

MEDICINALES ALIQVOT.

Contundantur omnia crassiusculè: & Myrobalani per se macerentur prius in aqua clarissimæ fontanæ libris quatuor, per horas xxiii, deinde coquantur donec ferè tertia pars aquæ sit in uaporem resoluta. postea coque etiam radices & aromata lento igne in duplici uase cum aquæ clarissimæ lib. vi. & affunde his antea coctas Myrobalanos cum suo iusculo. Vltimò rosas adiciendo coquantur usq; ad tertias. Coletur postea ualidè exprimendo. Tum in colatura dissolue Aloës optimæ & lotæ ac rursus exiccata lib. iiii.

Ponantur omnia in uitrea patina ad solem, aut in stufam, & agitentur sa pissimè, ut concrefcens in margine Aloë, liquido commisceatur. Cùm uerò mellis spissitudinem fuerint consecuta, tunc adde sequentium specierum puluerem minutissimè tritum.

Recipe

Galangæ,	Cyperî,
Zedoaria,	Doronici,
Ligni aloës,	Cinnamomi,
Schœnanthi,	Nardi Celticę radicularum,
Nucis moschatæ,	Macis,
Cubebæ,	Cardamomi,
Caryophyllorum,	ana dra. iiii.
Mastiches,	Succini, id est, Carabæ, ana dra. vi.
Myrrhæ,	Crociana dra. iiii.

Agitentur optimè cum Aloë species, & fiat massa cum diligentia.

MYROBALANI omnes hoc pondus debent habere exemptis nucleis siue lignis.

PILVLÆ istæ Alefanginæ sunt efficaces, immò efficaciores prioribus, (à Mæ sue scilicet prescriptis) relinquitur tamen unicuiq; liberum arbitrium, alterutras uel utraq; componendi.

HOC loco non debet poni Dictamnus Creticus, sed radices Diptami dictæ, quæ uulgò in usu sunt, & propriè cortex radicum eius. Germanicè uocatur Alschwurtz, propterea quòd folia eius sint similia fraxino arbori, & hæc est uera fraxinella (uulgò ab Italis dicta.)

ALOE quomodo ritè lauari debeat, in postrema huius libri parte (inquit) quæ est de preparatione quorundam simplicium medic. docebimus.

COMPOSITIONES quæ sequuntur, in impressis Val. Cordi De Pharmacorum compositione codicibus non reperiuntur. Ego à Laurentio Huel medico doctissimo accepi.

SYRVPVS De piris Valerij Cordi.

Recipe

Succipirorum Moschatellinorum,
Succipirorum Palatinorum,
Sacchari clarificati, ana lib. ii.

Coquantur secundum artem. Et quoniam pira Moschatellina citius maturefcunt, expressum eorum succum clarificatum cum saccharo decoctum repones, donec etiam Palatina maturefcant; demùm miscebis.

SYRVPVS de Cichorio Val. Cordi.

Recipe

Radiciu scœniculi,	Cichorii, ana unc. iiii.
Linguae ceruinæ,	Scolopendrii,
Capillorum Veneris,	Trichomanis, ana M. i.
Aquæ cichorii,	Succi eiusdem, ana lib. iiii.

Coquantur omnia secundum artem. Colaturæ adde Sacchari clarificati lib. iiii, & species sequentes petiæ illigatas suspende in syrupo.

Recipe

Rhabarbari unc. ii.
Radic. spicæ Rom. scrup. i. fiat syrupus.

SYRVPVS refectiuus Val. Cordi.

Recipe

Dactylorum enucleatorum,

Ee iij

VALERII CORDI COMPOSITIONES

Ficuum siccarum pinguium,
Xylocerationum enucleatorum,
Vuarum cibearum passarum,
Vuarum passerum uulgarium maiorum & minorum,
Tamarindorum enucleatorum, ana unc. iiii.
Musti generosi recentis,
Succi Cydoniorum, ana lib. vi.

Incidantur fructus in partes. Passulæ uerò minores & Xyloceratiæ modicè contundantur, unumquodq; per se: deinde misceantur omnia; & in fictili denso affundatur eis succus et mustum; macerenturq; horis xxiiii. Postea coquantur lento igne ad consumptionem tertiæ partis aut amplius. Colaturæ affunde lactis Amygd. cum aqua rosea lib. ii. ex una libra Amygdalarum dulcium tritarum expressi. Clarificetur deinde cum albuminibus ouorum xii. Huic decocto clarificato adde sacchari despumati libras iii. Coquatur ad perfectionem. & cum reponis, tum surspende in syrupo sequentes species crassiusculè tritas, & in sindone ligatas.

Recipe Cinnamomi interioris optimi, Macis, Nucis moschatæ, Cardamomi, Zinziberis, Galangæ, Zedoariæ, Caryophyllorū, ana dra. ii. Ligni aloës, dra. iii. Huiusmodi dilutum, uel decoctum fructuum horum, uel alicuius eorum, uocant Arabes Nabuth, quo utuntur pro uino & melle in calidis regionibus. Hunc syrupum composui diuitibus quibusdam in chronicis morbis, omnem cibum & potum auersantibus, & comperi mirum in modum uires reficere, alere, & iam desperatos refocillatis uiribus sanitati restituere.

TROCHISCI DE LACCA Valerij Cordi.

Recipe Lacce electæ unc. iiii.

Ligni Guaiaci scobina in minimam scobem seu rasuram detriti lib. i.

Coquatur lignum Guaiacum in libris iiii. aquæ celestis ad consumptionem ferè dimidiæ partis. In colatura deinde coquito rad. Rubear tinctorum unc. iiii. donec remaneat lib. i. s.

Dein iterum colato, & colaturæ iniice prædictas unc. iiii. Lacce; & ad ignem coquito donec Lacca dissoluatur. postea colato, & exprimito, & abice superfluitates Lacce. colaturam dein ad spissitudinem aliquam coquito, & insperge sequentes pulueres.

Recipe Aristolochiæ longæ,
Radicis concauæ,
Rhabbarbari,
Costi ueri, ana dra. ii.
Zedoariæ,
Galangæ,
Asari radicem,
Curcumæ,
Cinnamomi,
Ligni aloës,
Nucis moschatæ,
Schœnanthi, ana dra. i.
Camphoræ scrup. i.

Misceantur omnia optimè & formentur trochisci dra. i. pondere.

Radix concaua, *Bolwurz* / quæ falso appellatur Aristolochia rotunda.
Hos trochiscos composui aliquibus obstructione splenis hepatisq; laborantibus: et præsentis auxilio id malum curauerunt.

TROCHI.

Recipe Ambrae excellentiss.
Succini albis ana unc. i.
Succini Phaleri,
Succini cerci ana dra. iiii.
Succini nigri,
Camphora,
Margar. non perforatarum,
Margar. perforatarum, ana dra. ii.
Onychis,
Dentaliorum,
Entalorum,
Vmbilici marini,
Lapidum cancerorum,
Synodontum,
Ligni aloës,
Cinamomi,
Schœnanthi,
Nucis muscatæ,
Cubebæ,
Cardamomi,
Croci,
Cyperi rotundi,
Zedoariæ,
Doronici, ana dra. i.

Conterantur omnia minutis. & conficiantur trochisci cum mucilagine traga-
canthæ albissimæ in aqua maioranæ dissolutæ.

Ambra est Succinum orient.

Succinum est quod Arabibus uocatur Carabe, Germanis Agstein/ siue Bernstein : Sudanijs Gentar: Gallis
ambra. Est enim Succinum nil aliud quam ambra Germanica.

Phalerum, id est, flauum & clarissimum & omnino pellucidum.

Cereum, id est, quod ceræ colorem habet, non adeo pellucidum est.

Nigrum succinum alio nomine uocatur Gagates lapis, Germanicè Schwarzer Agstein/ oder schwar-
zer Bernstein.

Inter emendum album succinum uitare oportet Scobem et ramenta. Nam hæc solent pro albo Carabe uendi.
Cum enim cereum aut phalerum succinum tornatur candida ramenta remittit. Ideoq; integras glebas candidi succi-
ni emere oportet. Est enim ualde præciosum.

Onychis, id est, blattæ byzantiæ.

Vmbilici marini Germanicè Meerbonen.

Lapis cancerorum, id est, quos uocant oculos cancerorum:

Synodontes lapides sunt in capite Synodontis piscis inuenti: qui si haberi non possunt, quoniam piscis marinus
est: pro ijs accipiantur lapilli, qui bini inueniuntur in capitibus piscium fluuiatiliū, quos Kaulperßten Germa-
nicè uocant.

Hi Trochisci faciunt ad calculum, ad tumentem uentriculum, uertiginem, epilepsiam, apoplexiam, tremorem &
imbecillitatem cordis. Ad paralyfin si dantur in aquis appropriatis, cum Betonicæ floribus, aut lauendulæ, aut tilis.
Et ad suffocationes & strangulationes uteri valent.

OPOBALSAMI Succedaneum præciosum D. Euricii Cordi, qui Valerij pater fuit.

Recipe Iridis Illyricæ,
Zarnabi longi, id est, Zedoariæ,
Zarnabi rotundi, id est, Zurumbet,
Cubebæ,

Ee iiii

VALERII CORDI COMPOSITIONES

Cardamomi maioris & minoris,

Agallochi,

Olei Benzoi, ana dra. iiii.

Caryophyllorum,

Nucis moschatae,

Macis,

Arceutidum, i. gra. luniperinost.

Cassiae,

Cinnamomi,

Sandali citrini,

Benzoi, ana dra. ii:

Croci,

Asari,

Maioranae,

Schoenanthi,

Nardi Celticae radic.

Rosarum rub.

Cyperii longi & rotundi, ana dra. ii

Camphorae scrup. ii.

Moschi scrup. i.

Hec omnia trita macerentur in uino Rhenano ter sublimato, diebus viii. Postea diligentissime destillentur in balneo. Destillata deinde aquae quae primo exiit, rit, cape unc. vi. in quibus dissolue optima, candidiss. electa q myrrhae unc. ii. Sic tenuissima & praestantiss. pars myrrhae aquae uitae miscetur: crassior uero instar fecis subidet quae nequaquam est separanda aut excolanda, quoniam in fundo distilla ipsum Opobalsamum aliquot annis conseruabit incorruptum.

FINIS.

STOCC

STOCC-HORNII ET Nessi in Bernatium Heluetio-

rum ditione montium, & nascentium in eis stirpium brevis descriptio, à Be-
nedicto Aretio Græcæ & Hebraicæ linguarum in schola Bernensi pro-
fessore clarissimo dictata.

CHRISTOPHORO PIPERINO VERBI MINISTRO
in Sigriswilla pago Bernatium, doctissimo fidelissimoq; Con-
Gegnerus. S. D.



MITTO AD TE HYMANISSIME ET HONORANDE MI PI-
perine montium tibi uiciorum Descriptiones. miraris? non meas illas, sed ab Aretio
nostro communi amico, in meam præcipue gratiam, cum ante biennium rusticari et
lituisset, & montes illos ascendere, non accurate quidem conscriptas: sed quantum
recens memoria suppeditabat, ut primum redijt domum, puero dictatas. Eas quoniam
ipse pro sua modestia, ceu opus imperfectum, nemini nuncupauit, meoq; arbitrio per-
misit, ne solus in hoc uolumine liber hic ueluti acephalus, si nullius nomen patroni su-
biret, relinqueretur, tuæ humanitati dicare uolui, quamuis alienam operam. sed cum
amicorum omnia sint communia, non rectè aliena hæc appello. quin potius quoniam
Aretius utrique nostrum charissimus est, (id quod meretur, uir sanè doctrina, pietate
& omni uirtutum genere singularis,) quæ illius sunt tanquam mea, tibi etiam tanquam tua, pro amicitie iure, ceu è
communi quodam penore, offero & communico. Hoc ut facerem, argumentum quoque me inuitabat, montium in-
quam descriptio, quos tu ut quotidie altissimos, tecto tuo (ni fallor) imminentes prospicis: ita ipsorum admiratio, et
nascentium in eis rerum cognitio, iucunda tibi atque familiaris est. Hæc quidem serè sunt causæ, propter quas hunc li-
bellum in tuo nomine apparere uolui: & insuper alia maior, benignitas illa tua, qua me de facie ignotum iam aliquo-
ties tibi deuinxisti, misisti aliquot plantis montanis, radicibus ac seminibus: ut meos in uniuersa Stirpium historia scri-
ptis picturisq; illustranda conatus, quos iam diu conor & uerso, omni ope tua iuuares, ac promoueres. Quod ut
porro etiam facere pergas, & me, ut cecepisti, ames, uehementer te oro et obsecro: ego uicissim nulla sinceri amici offi-
cia erga te prætermisero sciens. Vale Tiguri XI. Cal. Ianuarij, instantis anni à salutifero partu. M. D. LX.

STOCC-HORNII ET NESSI MONTIVM IN
ditione Bernensium Heluetiorum, & nascentium in eis stirpium
brevis Descriptio, per Benedictum Aretium
Bernensem.

EGREDIENTIBUS Bernam, ad Meridiem & ortum hybernium, primo con-
spectu montes occurrunt uasti, et in immensum alti, —Capita inter nubila con-
dunt. Hinc excurrunt ad Meridiem per Galliam ad mare Ligusticum: inde in
ortum per Pannoniam, Macedoniam, Thraciam, ad Pontum Euxinum extendun-
tur, rigore perpetuo niuium & inuicta glacie indurati, ita ut mediis etiam ardori-
bus æstiuis aciem contuentium candore suo hebetent. Ab his summis Alpibus
excurrunt in nostrum Bernatem agrum: montes humiliores, colles herbidi, & syl-
uæ opacæ, quibus ualles amoenissimæ continentur. Quemadmodum enim
in mari sinus ampliores & promontoria describuntur, ad quæ ex mari feruido tan-
quam ad loca tutiora nauis sese recipiunt: ita omnino montium anfractu ualles re-
conditæ efficiuntur. Paradisos Cyri dixeris, in quibus homines in summa rerum
affluentia uiuunt. Hyeme etiam, quod incredibile uidetur, cœli temperies mon-
tium undiq; obiectu mitior eis existit.

Ff

STOCC—HORNII ET NESSI

A meridie, Simeï prominent montes à fluuioto Sima, à quo & uallis nomen habet, de qua infrà suo loco.

In hac, loca celebriora sunt Storc—hornias, Nouenaria rupes, (uulgò *Tünistli*) Nellsus geminus. & paulò superius mons & sylua Gallinaria, *Hannenmoß* dicta. Inde ad ortum Cinerei montes, ad lacum Thunensem desinunt: quo transmissos. Beati montana plurimos recessus exhibent, in tonfos colles & loca compascua. Celebriores in primis autem sunt Recoctauillani, tum loci amenitate, uini copia, bonitate casei & lactis; tum aeris etiam salubritate. Rupes etiam hic tractus nobis cõspiciendas exhibet plurimas, celeberrimus tamen locus est ob recoctæ nobilitatem *Justenstal* & *Gemenalp*. Inde leni ascensu *Seuelfeden* / *Schaffberg* & *Furca*, ad summam altitudinem subducit, quæ immenit Emmæ fluuiio. Ultra quem in extremo ortu, quantũ uisus montanus hos tractus consequi potest, mons reliquos omnes supereminet *die Schiben* dictus, omni herbarum genere, & fertilitate, antro præterea horiendo, notus.

Hic tractus est & ea series montium à meridie ortum usq; Aequinoctiũ: & hæc delicia nostræ, nostriq; amores quibus oculi ex locis editioribus ciuitatis nostræ pascuntur, & animus uasta cacumina præruptas casurasq; in momento petras admiratur. Hic ortus & occasus interualla notamus: signa quoq; tempestatum & serenitatis inde petimus, cæterũ non tantũ oculos & mentem inde pascimus: sed etiam uentrem, qui tam oculis quàm auribus carere dicitur. Cũ enim herbidi existant isti montes, ac ubiq; dispersas habeant casas, tantam butyri copiam, casei & recoctæ exhibent, ut non tantũ montanos homines et uallium incolas, quorum est ualidissima multitudo alant, sed etiam urbem populosissimam, & agrũ amplissimum istis deliciis perfundant, id ita intelligemus. Omnes uallium recessus habitabiles sunt, præterea colles undiq; hinc inde frequẽtes, tanquam in nauiragio disiectas domos habent. incolæ nullo alio occupantur labore, quàm æstiuo tempore operibus lactariis, quæ ita copiose efficiunt, ut caseo, butyro profusè alantur. Inde etiam reconducunt, quod per totam satis sit hyemem: deniq; superest adhuc ea copia, ut ad mercatus transmittant in nostræ ditionis oppida & pagos. Taceo eam copiam quæ sine numero ad exterarum transportatur nationes. Ipsi his uendendis collecta pecunia, frumentum & uina (quoniam & ea multis in locis habeant) cõmunt: pannos item, & alia quæ ad cultum corporis & ornatum pertinent.

Si uictum inspicias, simplicem dicas & naturæ conuenientissimum: si uoluptatẽ, non defunt præstantia uina, tenerioresq; panes: si sermonem, affabiles, & plus quàm Atticos dixeris, si mores, antiquam & integritati conformẽ simplicitatem reperies, ueri iustiq; tenacissimã si deniq; cultũ, non neglectũ, sed liberalem, & qui ingenuos deceat, nec defunt qui nobilium habitum eque ueste serica, uilosa, purpura subserico, imò quouis genere panni præstantissimi. Pelles etiam hyeme non defunt, uulpinæ, lupinæ, ex urforũ catulis, Lynce, muremontano, & aliis alpinis animantibus.

Ergo huiusmodi loca quis nõ admiretur, amet, libenter inuisat, perlustrat & scãdat: certè fungos, stupidos, insulos, pisces, lentosq; Chelonas dixerim, qui talibus non afficiantur. Ego sanè nescio qua dulcedine & naturali quodam amore erga montes afficior, ut nullibi libentius uerser, quàm in montium iugis, nullè sint suauiores mihi peregrinationes quàm montanæ, etenim si res nouas quæras, exhibebunt eas facile tibi montes: nempe omne genus herbarum, admirandũ & mira uarietate coluclens, feras aues, quæ nisi in montibus non reperiuntur. adde umbrosas ualles, suas furros dulces aquarum, prospectum per longè lateq; patentes campos, lacus, flumina, urbes ac arces, deniq; salubrẽ aërẽ quẽ omnia nouitate quadam illos qui his spectaculis & uoluptatibus assueti non sunt, oblectare possunt. Si uetera desideras, habes monimẽta istius uetustatis antiquissimè, præcipitia, rupes, pendẽtes in aërẽ scopulos hiatus profundos, & terrę stupenda chasmata, speluncas reconditas: induram glaciẽ, medius etiam ardoribus. quid multa: Istic theatrum Domini est, uetus itatis monumenta quæ uis, & admirandẽ sapientiæ nouitatisq; delicias cõplectens. Quapropter hoc tractus, quatenus à nobis quidẽ perlustrati sunt, & quid in signo habeant, paucis perstringemus, iterum à meridie exorssi.

Storc.

Stoce — hornij igitur iugum in iis montibus, qui Simeam uallem à Septentrione ne cingunt, altissimū est, ac quanquam montes quibus istud insidet omni propè ex parte peruii sint, tamen ipsum cornu à meridionali plaga tantū superari potest. A Septentrione, qua parte arduus surgit, Stoce — hornius à pago *Stocken* aditum habet difficilem, qui primū per sylvas densas ducit: inde per pascua *ambach* & *Strüßly* ad occasum euntibus cornu ipsum occurrit.

Ab occasu alius ascensus est non minus difficilis, arduus ac præceps, per *Bläsmenstein*/ qui pagus ab urbe est quinque horarum itinere distans, ad radices montium proximè politus. Inde statim per aspera loca montis iter exiguum, sinuosum serpentis modo huc atq; istuc per montis flexum & reflexum sensim ad cacumina subducit, unde arbitror ab incolis nomen ei inditum esse *uber die Not*. Verū & istud iter ad Meridiem procurrit. A Meridie lato, & sensim subleuante sese dorso herbido ad præceps ipsum cornu producit, quod à Septentrione ita præceps est, ut ne feris quidem ullis, etiam rupicapris, peruium sit.

Loci admiranda est amoenitas: subiecti ab Arcto campi & prata, dissectæ quoque uillarum domus infra uisuntur.

Verū ea est altitudo, ut uix talparum tumulos adæquare uideantur. A meridie duo lacus adiacent Stoce — hornio: Prior occiduus circularis & admodū profundus est: aqua ipsa nigricat dira & Strygia facie. Nam à meridie tenues quidam scopuli sylua densa coniecti surgunt, ita ut latus in medio efficiatur quodammodo à natura sic comparata fossa, ut undique ex montibus defluentes aque contineantur ad aquandam pecus, nulli enim perennes torrentes hosce lacus ingrediuntur, ut uerisimile sit, aut occultis fontium meatibus cōseruari has aquas, aut pluuia undique collecta in subiectam hanc fossam recipi, Et ut Homerus dicit:

Ὡς δ' ὅτε χειμαῖροι ποταμοὶ παρ' ὀρεσφί ρέοντες
 ἔς μιν ἄγαν σὺν βέλετορ δὲ βέρορ ὄρωσιν
 Κρονώρεϊ ἐκ μεγάλῃ κοίτῃ ἐκτὸς ἔχουσιν.

Absorbetur autem hic occiduus lacus ad occasum æstiuum ingenti murmure, unde perpetuas aquas etiam uenis latentibus habere necessum est.

Alter ad orientem magis spectat cordis figura: surgit enim petra in medio ferè lacus, quam aqua undique ambit, excepto Aquilonari latere, qua parte monti cohaeret scopulus, ut ad amussim aqua circumfusa cor referat. Habet & is recessum occultum: absorbetur enim per cauernas montis ad meridiem, ut *Erlbach* limpida sive effundatur eius aqua. Vtriusque eadem aquarum facies dira & abominabilis: quod sit uel propter profunditatem: aut etiam quia immobilis aqua stat, ac montanis flatibus horridior efficitur. Non alunt pisces, nec aliud uiuens, præter lacertas aquaticas & salamandras. Item ranarum soboles magno capite, cauda longa, quatuor pedibus, quos Græci *gyrinos* uocant: ranæ tamen omnino nullæ istic comparant. Insident hæ bestiolarum ripam ad solem sese apricantes.

Herbarum etiam multiplex & elegans uarietas toto monte reperitur: quia tamē nihil peculiare habet, quod in *Nesso* monte non occurrat, herbas hic commemorare differemus, donec transgressi uallem in *Nessum*, de ipso loquamur. In præsentia autem quædam de ualle *Simea* addemus propter tabulas alpinas in quibus loca quædam transposita sunt.

Vallis *Simea* à montano torrente nomē habet. Nominatur autem is *Simment* inde uallis *Simmenthal*/ ita enim omnino erat pronunciandum: nec desunt ex incolis qui sic appellant: nostri tamē M. in B. conuerso *Sibenthal* uocant. Tractus uallis obliquus est, & lunam quam Græci *αὐγινυτρον* uocant exprimit. Nam à summis montibus *Vallesianis* ab oriente progreditur, *von der Lenck*/ sensim occasum petit. Inde recurrit in orientem uersus lacum *Thunensem*, imam uallem irrigat fluuiolus *Simma*, qui oritur in remotissima ualle apud *Lenkios* supra pagum *am obrenriedt*: monticulus nominatur *der Ratzlisberg*. Emergit autem septenis fontibus intra lapidis iactum, ac statim collectus in unum alueum, nominatur *Sima*

Ff ii

maior, die grössere *Simmen*, & ab incolis *Das landwasser* usq; ad *Dissimium*, qui pagus est elegans & populosus in media propè ualle: ita dictus propterea quòd infra ipsum duo torrentes *Simma* concurrant.

Itaq; maior *Simma* ab orientali latere *Lenckiorum* affluit, cui infra iam dictum pagum minor miscetur. Descendit autè hic minor ex meridionali latere qua itur *Sa* nam uersus, *von der Desch sitten*. Ac uno alteo uterq; riuus hinc per imam uallem perpetuò defertur, aqua perennis & limpida est: æstiuus quidem ardoribus & Favonii pluuiis mirifice exundat. Vallem egressus miscetur *Arula* nostræ. Ea facies est, & is tractus uallis: unde facile patet non errare eos qui à fluuio habere nomen dicant, non autem à Septenario numero, nam *Septem* ex ordine in hoc tractu nominare ualles difficile esset. Fluiuiolum autem à septenario dici certum est. Quamdoquidem septenis fontibus scaturit. Deinde satis patet ad hanc uallem non spectare fluuium *Randel* (uel *Rander*) quo loco tabula alpina eum reposuerunt: sed fluuiolus *Randel* ex altera ualle *Cinerea* effluit, *Durch das Frutigerthal*, ubi tabula nullum habent fluminis nomen, & *Simma* fluuii nomen prius ignorat.

Deinde *Erlenbach* non in *Cinerea* ualle est, sed in hac nostra, & quidem cis fluuium *Simmam* in radicibus montium septentrionalium.

Præterea *Vuimnis* non in medio uallis, sed in faucibus, qua fluuius *Simma* uallem egreditur, positum est. Est autem uilla cum castro imposito ad radices montis *Nessi* trans fluuium *Simmam*. Et ut apparet nomen habet à uentorum flatibus quasi dicas *Windmiz*, nam ab occasu per uallem perpetuò spirant *Zephyri*, ab *Aquilone* *Boreas*, & à lacu orientales uenti, ac quia angustæ fauces sunt in ingressu uallis, perpetuò istic cōstictantur uenti acerrimè: inde nomen loco inditum est. Hec de his locis & ualle, quæ descenditibus à iugo *Stocc—hornii* *Erlenbachium* elegantissimè ante oculos posita sunt, ac multis quidem locis descensus patet, mitiore nunc monte hac parte quàm sit à Septentrione, compendiosior tamen est descensus, quanquam et difficilior, *vber das Chunne*, quo & nos usi sumus: ac ea quidem nocte *Erlenbachii* quiescimus.

Sequenti die *Nessum* conscendimus: supererat autem multum laboris tum etiam itineris: eius enim diei uespera apud *Recortauillanos* conuenturi ad cenam, prius *S. Beati* *Solitudines* eramus ingressuri. Cæterum satis itineris superesse uidebatur, uel per imam uallem, præsertim defessis: & hesterni diei laboribus exhaustis, montis tamen tam uicini celebritas & amœnitas mouebat animos ut putarem non esse negligendam occasionem uicinitatis. proinde summa aurora comite tantum puero, quò minus esset impediementi & moræ, (quod fieri plerumq; solet cum plures sunt in *edwopia*;) ita ad meridiem demum ad summum cacumen euasimus, tantum ad casulam pastoritiam exiguum morati. Ab *Erlenbachio* autem tempore ille *Simma* transeundus est ponte, ubi magno sonitu per scopulos decurrit, inde prata ad imam syluam sensim perducunt. Mons ipse ad medium ferme densissimis uestitur consuetis arboribus, *Picea* *stro* *Fago*, *Acere* duorum generum, nec alias conspexi. Inde egressis syluam læta occurrunt pascua. Nam usq; ad uerticem tonsus est, & ab omnibus arboribus nudus mons, propter eximiam utatur hinc altitudinem.

Qui proximè montem habitant nominant eum *Den Stallden*, præsertim latius occiduum quo ab *Erlenbachio* scanditur. Alii quibus remotius cognitus est *Den Tiesen*, ab *Ellebori* alibi, cuius magna est in eo copia, nomine. Non desunt tamen, qui putent nominandū *den Jesen*, & inde articulo cum nomine coalescente, pro *Jesen*, *Tiesen* dici ceptum.

Est autem duplex eius nominis Mons, superior & inferior. Superior plus ad meridiem alto uertice surgit: inferior longè est amœnissimus eorum montium, qui ex *Vallesianis* summis decurrunt, extremum promontorium decurrit in æquabilem planiciem ad *Lacum*.

Hic

Hic montium tractus uallem Simmeam habet ab occasu, quæ semicirculū refert, ut supra ostendi.

Ab oriente **den Adelboden**/uallem satis ex nomine cognitam, quasi fundū A- quile aut nobilem dicas. hæc uallis & ipsa recurua est, ut cum Simmea ualle circum exprimat, cuius diametrum refert hic montium tractus medius, utraq; dirimens. Sed non de toto eo tractu scribemus: operosius enim istud foret quam pro instituti ratione.

Nesius, procul contemplantibus triquater surgit, uel trigonus. unus angulus orientem spectat, alter nobis Bernæ obuertitur, tertius in occasum dirigit. Hi omnes summo uertice obtuso concurrunt. Cæterum qui eum ex alto contemplantur, facile animaduertunt quartū latus in meridie decurrere: lapidosum ac minus frugiferū.

Multis locis superari potest longis decurrentibus lateribus in subiectam planiciem, occiduum tamen latus leuem ascensum præbet, ualle quadam interiecta, intercisum. Vertex summus ferini Andreæ nomen habet, **Jūm wilden Andres**/quo loco inter scopulos & saxa requiescere solent, qui animi gratia ascendunt, id testantur tituli, rythmi & prouerbia Saxi in scripta unā cum imaginibus & nominibus authorum. Inter alia cuiusdam docti & montium amœnitate capti obseruare licebat illud ὁ τῶν ὀρέων ἑσπέρης ἀγῆς.

Non puto autem facile reperiri montem amœnitate huic parem, tum propter conspectum, qui longè lateq; patet: tum ob herbarum uarietatem, quæ sanè multiplex eo monte habetur. Nam ad ferinum Andream in scopulo sedentibus ad triginta Parochiæ, hoc est, uillæ uel urbes quæ proprio parocho & templo utuntur occurrunt. Adde his ueteres arces complures, prædicia & lacus, præterea flumina, quarum rerum omnium uno intuitu conspectus est longè amœnissimus. Ego ipse ex eo loco numeravi expressè ut ne loco quidem pedem moterem: Primum **Oberwil**/secundo **Jūm Closter**/iij. **Erlenbach**/iiij. **Diemptingen**/v. **Wimmis**/vj. **Adū tigen**/vij. **Zeinigen**/viij. **Spiez**/ix. **Aeschi**/x. **Kichenbach**/xi. **Frutigen**/xii. **Adelboden**/xiii. **Undersewen**/xiv. **Lüssigen**/xv. **Sigriswil**/xvi. **Hilterfingen**/xvii. **Thun**/xviii. **Stäffisburg**/xix. **Wichdoiff**/xx. **Kyssen**/xxi. **Hoffstätten**/xxii. **Anseltingen**/xxiii. **Turnen**/xxiiii. **Kügisberg**/xxv. **Münsigen**/xxvi. **Thierachen**/xxvii. **Seffingen**/xxviii. **Kilchdoiff**/xxix. **Sergensee**/xxx. **Hinderlappen**/xxxi. **Bern**. Ea loca omnia sereno cœlo facillimum est numerare. Ex his ciuitates sunt Berna, **Spiez**/Undersewen/Thun. Valles præterea per circuitum plures amœnissima se aperiunt, & quasi ex alto uisui patent. Primum post Simmeam uallem à latere orientali proximè occurrit uallis **der Adelboden**/Deinde magis uersus ortum **das Frutiger thal**. Hinc **das Krerithal**/Inde Cinerea uallis **Aeschi**/Inde **Luternimmen**. Ac post hæc **Gründelwald**. Demum **Nasly**. Flumina etiam decurrunt plura, primum **Arula**, extractu ultimo **Nasly**. Deinde **Kander** ex ualle Frutigen, demum **Simma** ex sui nominis ualle, quæ cum **Kandel** fluuio uno alueo recipitur, **Jūm Rapff**, à quo loco breui tractu fluit donec **Arula** misceatur super pagum **Thieracher**. Lacus itidē spectantur **Brienersee**/Thuner see/Moretanus lacus, & Neocomensis. Hæc rerum uarietas incredibiliter spectantium oculos reficit, etenim res usque adeo naturæ discrepantes uno contuitu quasi in tabula profert, idq; uel sedentibus. Verum de his forsitan plus satis nec montis propria. Nūc igitur quid mons Herbarū habeat inspiciamus.

Elleborus albus à quo mons nomen habet copiosus in eo est, **Germere** nō minant. Est & alia species Ellebori albi illic, & ut arbitror notha: superiori per omnia respondens, nisi quod foliis minoribus sit prædita, acutè Plantagini similibus: & quod flores lutei caulem circumdant, singuli propriis insidentes pediculis aut in-
instar.

Gentiana, triplex: Maior, uulgata. Minor itidem omnibus nota, ignitis floribus, tintinabuli instar. Et tertia huic similis luteis floribus, per omnia minori respondens,

Ff iij

Alisma for-
te hæc est,
aut cognata.

tantum colore florum differens. His quartæ accedit minima **Bitterwurz**, Prior res duæ species mediæ erunt.

Anemone alpina, **Rüchschell**, flores sunt cœrulei, quibus cadentibus canities & lanugo prolixior subsequitur. Primo uere hi flores statim emergunt niuib. disfluentibus: pallidior tamen flos est & maior quam qui eodem nomine ex Gallia adfertur. Nonnulli uocant **Des wilden mans Kraut**.

Bigwurz, duorum est generum: prior cœruleos habet flores Campanulæ figura, folius Aciæpiadem refert, caulis rubescit. Radix ei subest bifida, lutea, satis longa, amara, semen compressum, & hæc uideri potest Gentianæ species. In aliis locis nominatur **Schelman Kraut**, utuntur ea pastores ad ubera uaccarum, si à muribus araneis aut aliis bestiolis uenenatis lædantur. Altera species **Bigwurz** radice nigra est, flore albo, quo cadente calix lanugine & canitie horrescit. Folium Ranunculi modo diuisum est, pilosum, albicans. Hæc species Ranunculus aliquis montanus aut Anemones species erit.

Aster Atticus qualem Fuchsius depingit, flore puniceo.

Sedum montanum maius, folio serrato, oblongo caule, erecto, gracili: floribus albis. Sedi minimi uariæ species reperiuntur, Luteum Igneum, Maculatum.

Wülblumen, flos odoratus est, folio Pilosellæ, circa supernum cauliculum folia multa imparia, candicantia, lanuginosa. medio orbe quinque uel sex flores: inter quos medius plerumq. aridus. ex lingulis lutei apices emicant, radix arida, parua, summo cespite hærens. Fomenti speciem arbitror.

Satyrii species multæ: inter omnes una præstantissima & odorata præ cæteris, **Bündlin**.

Himmelfengel, pusilla herbula est: flores habet cœruleos, radículas amaras, ut Gentiana minima.

Reiberschis palmum altitudine æquat: flores cœrulei sunt, pallidiores tamen quam in superiori. uno caule plurimos fert flores, denos interdum, cœp. plures: herba tota amara est, superiori congener.

Bistorta minima, in medio caule uno foliolo.

Jegerkraut, herbacaulistica, flore albo, pusilla. Ranunculus montanus.

Balmenstrichen, frutex est æquæ, nec enim florere, nec fructum ferre dicitur, inter saxa serpit, semper uirescens: etiam hyeme folia retinet, ramos intortos, fractu contumaces, folio Buxi.

Saxifraga hircina.

Mutrina, huius radix minima digiticrassitiem quandoq. æquat, ut plurimum tamen minor, umbellam gerit, qualis est in Pimpinella rubescente, haccafeos nonnullos, præcipue recocta, condunt.

Wolffswurz, specie triplex, luteum, cœruleum, qualia sunt Aconita apud Bockium, sed tertium quoq. reperi purpureum, inuentu rarum.

Stüblumen, uariis coloribus: flore luteo, pallido, purpurascente, rubescente sanguinis modo, cinereo, nec defunt qui atro colore reperiri dicant, priores colores omnes uidi. Cum his emergit alia species Arthritica, quæ plurimos flores ex una radice profert, quemlibet autem suo proprio pediculo.

Basthartelee, quasi adulterinum trifolium dicas.

Schaffsuppen septenis constat ut plurimum foliis, uno pediculo. Heptaphyllum dici potest montanum.

Groß Eberwurz, cubitum interdum ferè æquat caulis horridus. & ex uno sinu prodeunt infinita capita.

Waldt glislin, auriculæ muris (uulgò dictæ) puto speciem esse. Florem globosam, purpuream fert.

Bitterwurz, flores habet luteos, grandes, Doronico similes. Folia Plantaginem amulantur, Radices subdulces, longæ ut in Plantagine.

Groß

Groß Spicant/Polypodio similis, Lönchitis altera.

Hirzwurz weiß vnd schwarz. Et sub eodem nomine alia herbulā pusilla, folio Chamædryn referens, flos ei albus est, qui evanescit in lanuginem, supernè folium uiret, subtus autem albicat, Chamædrys alpina.

Dönj & Drolblümen/flores lutei sunt, utinabuli modo rotundi, Ranunculus montanus, causticus si benè memini.

Gemschenwurz/radicem habet dulcem, nodosam: folium rotundum, flores luteos quales sunt in Doronico domestico. Doronicum Germanicum.

Sigwurz/Albium redolet, **Sibenhemleren & Nünhemleren**/ab inuolucris quibus tanquam reticulo inuoluitur radix, Victoralis longa.

Gäle violen/per omnia Violę martiæ respondet, solo colore luteo ab ea differt: Viola lutea.

Bergrosen/alibi **Bärenbläst**/nonnullis **Hünerlaub**: frutex folio Oleg: floribus odoris, purpureis.

Keyserlin/herba pusilla, albicans bellidis minimè forma, oblongioribus foliis: Cauliculus tenuis, in summo plurimos confertos flores purpureos habet, tota herba candicat, & attrita manu puluerem exuit, aspectu elegans, Cęsar inter herbas aut regulus.

Anckenballen/cubitum fermè æquat, folio Plantaginis aut Ellebóri albi ternā aut quaternā per caulem folia habet, ex quibus erumpit ut in perforata, in summo unus flos, raro duos, luteus est, oblongus, luteum oui exprimens, concavus: quem ambiunt apices, seu folia potius, ignita, rutilantia morionum habitus procul contentibus refert, aut Dæmonum laruas. cadente flore semen in spica (siliqua) continetur. Damasonii aliqua species. *Aliqui Lönchitin primam faciunt.

Christoffels kraut/aliis **Wolffswurzen**/fructus racematim uuarum modo cohaeret, flores albi sunt, folium incisum, radix nigra. Aconitum racemosum, uel Christophoriana. *Nullum quidem ei uenenum inesse arbitror.

Göldin kraut/herba gracilis folio Hyssopi, subtus albescente, Polium uidetur montanum, aut eius species.

Bergmünz/Calamintha montana, & (ut arbitror) uera. Nam quæ ex semine Mompeliensi mihi prouenit, ab hac nihil differt.

Waldeschiben/herba tota folio & floribus Saxifragam albam exprimit, radicem tantum ab ea differt, quæ in hac nigra est & pilosa.

Glübirlin/arbutum est primo uere floret, folio Piri per orbem tenuiter inciso, fructus nigros fert, plures confertim, paruos, quale est Sorbum torminale. Pira-ster.

Garlobstuden/folio Buxi, parum à rosa montana frutice (hoc est Bergrosen) differens.

Eldbistel/carduus, inter carduos speciosiss. folia habet mollia, ab una radice, per caulem rara, quæ referunt folia herbæ, quam **Wolffblümen** nominamus: altitu- Eryngium
alpinum
dine cubiti in altum assurgit caulis. Capita in summo sunt singula, interdum bina, cœrulea, quandoq; alba, interdum purpurea, color collucet mixtus uiridi, tum in capitibus, tum in supremis foliolis. Mollis est tota, & etiam spinis, quas æmulatur, nam non pungūt. Radix nigra subest, longa & bifida. Antehac mihi nunquam uisa herba.

Hütreiff/Crocii syluestris seu montani species est. flores quidam cœrulei, aliis candidi, nonnulli utroq; mixti. tenuis radix, bulbacea, subdulcis, grata suibus, rubescente lana inuoluta. Herbaceum capillamentum quod foliorum loco habet, in lura monte præsertim supremo iugo Gesslerero **Leisrat** nominatur.

Wilder senff/herba eius nominis duarū specierū reperitur. Prior uno pediculo septena habet folia, supremo caule multi flores purpurei, & partim albi: post quos

Ff iiii

STOCC—HORNII ET NESSI MONT. DESCRIP.

cornicula subnascuntur semen continentia minutum, compressum. radix subest alba, alabastrum modo splendens, squamea. Alte: a quinque folia habet uno pediculo, aliis superiori non dissimilis, tota substantia utriusque acris est, Sinapi æmulans, aut Raphanum. Ad cubiti altitudinem crescunt; umbrosa loca amant, & latices, primo uere statim emergunt. * Aliqui Pulmonariam hanc uocant.

Hec in eo monte quantum temporis ratio permittebat obseruavi. Non deerant alia multa, sed partim notiora quam ut huc referri debeant; partim uero ita ignota, ut ne pastoribus quidem nomina constarent. Quod si ociosi diligentius omnia in his scrutarentur, dubium non est, quin hisce multo plura reperiri possent. Habet inter ceteras quoque Sambucum montanā uua rubescente, Benedictam montanam odoratissimam, &c.

FINIS.

GALANDAE MONTIS LONGE ALTISSIMI, QUI DITIONIS EST

Rhetorum inter Helueticos, Strepium enumeratio, ex literis clarissimi & doctissimi uiri Ioannis Fabricij, Ecclesie ministri Curie ad Conradum Gesnerum, datis Curia anno M. D. LIX. Iunij die 26.

SUPERIORibus diebus montem Galandam nomine conscendimus: in comitatu fuerunt Belinus medicus, & Pontifella Ludi literarii rector, uiri doctrina & morum suauitate eximii: & alii quidam, &c. Non sine summa difficultate ad uerticem montis peruenimus. Vtinam Gesnere uel unam aut alteram horam nobiscum fuisset: id certe optauimus omnes. Nihil hoc monte est herbarum feracius.

In medio montis nascebantur hæc ferè.

1. Gentianæ genera diuersa: ea præcipue quam rubram cognominant.
2. Ranunculus quidam cubitalis, foliis quibus flos Trollius uulgò apud uos dictus, cui etiam cognatus uidetur: floribus albis, mediocriter odoratis. Sed & flos ille Trollius ualde est in locis illis odoratus.
3. Ranunculus quidam paruus, flore albo. Jägertraut.
4. Wüsterwurz: à quibusdam dicta: ueluti Plantago quædam alpina: foliis Planaginis, leniter hirsutis: flore Doronici, radice aromatica.
5. Lunaria illa nobilis, quam olim ad te misit Belinus, in pratis illic exilit.
6. Lunaria Græca, quam quidam Glitteren appellant, floribus admodum odoratis, ad latus montis in præcipitio (nostri tibi uocant) quodam.
7. Centaurium maius, Rhaponticum uulgò dictum, non procul à iam dicto loco.
8. Phylliris tam copiosa, ut uel plauastro onerando satis esset.
9. Sanicula alpina guttata, ubique obuia.
10. Viola alpina quædam, nunc primum florens.
11. Aconitum luteum & cæruleum.
12. Elleborus albus.
13. Lilium purpureum radice lutea: quo pro Asphodelo quidam abutuntur.
14. Conyzis, ut uidetur, cognata herba procera, flore Doronici ferè.
15. Medice species, ut quidam putant, eadem, ni fallor, uel cognata illi, de qua Dodo næus Iconum Tomo ii. pag. xxxii. Anonymus est (inquit) nec ad cuiusmodi genus referri debeat, certo statui potest uidetur nonnullis esse Glaux, aliis Onobrychis. legitur in hortis ab herbarie rei studiosis.
16. Sedi genera quinque, à uulgaribus diuersa.
17. Christophoriana, quæ quò in loco nascitur editiore, tantò est exilior & pressior: ut & reliquæ pleræque omnes herbe.
18. Caryophyllata montana: & aliæ quædam.

In summo uertice montis.

19. Doronicum: & fruticum genera uaria nobis incognita. Hec ego obiter tibi Gesnere uolui consignare. Sed quot tu putas conspectum nostrum effugisse, qui inter eundem in hæc incidimus?

FINIS.

HORTI GERMANIAE, authore Conrado Gesnero.

LIBER NVNC PRIMVM EDITVS, IN QVO STIRPIVM QVAS
diligentissimi quique rei herbarie per Germaniam studiosi suis in hortis educant, tum
nomina literarum ordine percensentur; tum natales plerumque, duratio, & ad cultum
aliquid, aut alia quaedam explicantur.

Ad Lectorem.

Mensibus hybernis poteris decerpere flores,
Fructusq; hinc uarios, Lector amice, Vale.

CLARISSIMO VIRO STEPHANO LAVRAEO

Amoratorio medico Cesareo, doctina & experientia
summo, Conr. Gesnerus medicus. S. D.



IS MENSIBVS HYBERNIS, CLARISSIME LAVRAEE, DE
leai roris & horicrum natura negante, ut aliquid genio meo indulgerem, non sine
aliqua spe oblectationis, etiam & utilitatis ab harum rerum studiosis qui legere huc
uoluerint, percipiendae: omnes quas meminisse poteram habere me in hortulo meo,
aut olim habuisse stirpes, aut quae in amicorum hortis provenirent, (quorum aliqui
propter missos ad me catalogos à principio libri à me nominantur,) uno volumine
iuxta literarum ordinem complexus sum. Non tamen solum nomenclaturae posui nu-
das, ut ab illis acceperam: sed plerumque aliquid, quod vel ad nominarum imponen-
da, vel natales cultumue faceret, adiunxi: ut qui hortum instruere cogitaret, non qui-
dem vulgarem, sed omni stirpium genere ornatum, exemplum hic & inquirendi oc-
casione haberet: ac olim, quoniam in Germania stirpes nostro seculo cognite in hortis plantatae fuissent, quaeque
durare in eis possint & quantum, intelligeret posteritas: denique Galli & Itali Germanorum in tam frigido caelo stu-
dium in his colendis, proveniuntque, & nominum ex antiquitate repetitorum cognitionem, admirarentur. Hunc
librum: quamquam imperfectum (nam specierum insularum numerus propemodum infinitus mihi videtur) argu-
menti tamen haecenus ab alio nemine inchoati, praestantiae tuae nuncupandum destinaui: primum ut amicitiam mu-
tuam feliciter superioribus annis Augustae Vindelicorum, cum ad mensam illustri viri Ioan. Iacobi Fuggeri conue-
nissemus, inceptam, hoc ceu vinculo inter nos obstringerem: deinde ut in hoc argumento, circa vetera praecipue stir-
pium nomina imponenda, tam difficili & periculoso, ac multorum hodie animadversionibus, censuris, contraver-
sibus, emulationi, certaminibus, & calumniis etiam exposito, patronum mihi deligerem, qui his de rebus & recte iu-
dicare posset: & ueras aut uerisimiles opiniones meas sincere contra ambitiosos quosdam defendere, in his uero ubi
errarem candidè & amice monere dignaretur. Accipe igitur uir praestantissime hoc mea erga te benevolentiae obser-
uantiaeque (ut uirtus & doctrina tua meretur: ac propter multa maximaque quibus me obligasti beneficia, gratitudi-
nis ratio postulat) pignus & monumentum, quantumuis exiguum: idque tam bilari animo, quam ego & liberrime
offero, & longe maiora me debere libentissime agnosco. eo enim in te amore & ueneratione ducor, ut si beneficiis
aequare te, nedum uincere, conarer, amplitudini tuae iniuriam aliquam fieri putarem. Quod si etiam in Caesaris
hortis, aut aliorum principum, quibuscum subinde uersaris uiuorum, quicquam in hoc libro nostro uel praeteritum,
uel melius exprimendum, tibi occurreret, circa stirpes imprimis raras & peregrinas, quas homines priuati non facile
habere possunt, eius ut me certiorum facias iterum atque iterum peto. Noui clementissimum Caesarem Ferdinandum,
in cuius conspectu quotidie uersaris, harum quoque rerum, ut reliquarum naturalium omnium cognitione tum oble-
ctari, tum eruditissimos quosque de rerum naturis disserendo excellere: nec dubito in hortis maiestatis eius, rara quae-
dam & peregrina naturae spectacula uisi: & eiusdem doctrinae exemplo incitatos proceres ac magnificos uiros in
hortis etiam exornandis magnificentiā praeseferre. Itaque si celebriorum quorundam in Austria aut uicinis regio-
nibus hororum rariore aliquas stirpes mihi nominaris, hoc est, alicui studioso harum rerum iuueni ut id perficiat im-
posueris, de pristino tuo in me amore nihil dum remisisse te intelligam. Vale Tiguri. Ianuarij die XXV. Anno
Domini M. D. LX.

Gg

1. DE HVIVS LIBRI RATIONE.

2. De hortis in uniuersum, eorumq; laudibus.

3. Singuli quidam hortorum cultores præstantiores nominantur.

4. Regule quædam ferendi, colendiq; hortos.

QVAnam occasione & ratione ad hunc librum describendum accesserim, in epistola nuncupatoria satis explicui: hic pauca adiiciam. Nomino igitur hoc in libro plantas hortenses propriè dictas seu satiuas, & Germanis quidē notas in primis. Deinde & peregrinas per multas, quæ uel olim, uel nostra memoria, ut pleræq; in hortis feri coeperunt, tertio syluestrium etiam quænam in hortis uiuere, quomodo & quandiu possint, quæ non, singillatim expono. Non tamen de singulis istis tribus generibus seorsim agere, sed omnia in unum literarum ordinem redigere uolui, ut quæque inuentu quàm facillima essent. Denique cultus ratio ali- quæ in plerisque exprimitur, quo modo scilicet feri colue debeant, quo tempore & loco; & hyeme quænam ex eis reponi intra domos, aut in horto saltem contra frigoris iniuriam muniri. Hæc omnia persequi institutum quidem mihi fuit: sed quàm exiguum propositi mei partem sim consecutus facile animaduerto. Omnia certè complecti infinitum & supra humanam conditionem est: & uoluit fortè Deus Opt. Max. dum rerum naturalium in tantillo mundi centro species nobis innu- meras proponit, per hanc ueluti infinitam naturæ uim, qualis quantusque ipse sit, omnis naturæ elementaris atque cœlestis dominus insinuare. Putabam ego iu- uenire adhuc per paucas superesse stirpes quæ meam notitiam subterfugerent: nunc senex peragratis ab eo tempore aliquot regionibus, & per multis quæ in meis & amicorum hortis satæ excreuerunt cognitis plantis, & maximo ab amicis nume- ro rariorum misso, & perlectis omnium quos habere potui ad hoc tempus huius argumenti libris, Græcè, Latine, Italicè, Gallicè, Germanicè, Anglicè, His- panicèque editis, ea quæ noui per exiguam sane partem ignotorum mihi esse ui- deo. Itaque libenter cedo naturæ: quæ, ut uideo, æqualem sibi creati in co- rum ipsa parens est. Sed hæc contemplari non est hominis *πρὸς φύσιν καὶ νόον ἐχούοντι*. Potuissim tamen multò plures enumerare stirpes in hoc libro: imò omnibus quas noui, aut quæ ab aliis describuntur nominatis, ab instituto meo non discessissem. quoniam omnes aut aluntur in hortis, aut alii possunt: aut si non possint, id quoque breuissime indicare licuisset, tum ueluti condimenti, tum ad- monendi gratia ne quis frustra in accersendis quibusdam aut plantandis labo- rer: tum obiter nomina quorundam explicandi gratia: neque enim ita multa defunt, quò minus stirpium serè omnium nomenclatio hic contineatur. Sed aliis rebus occupatus, satis existimaui in præsentia librum hunc inchoare: quem aliquando diligentiores perficiant. Id autem feci partim lubens, & ut gratificarer harum rerum studiosis: ac eorum qui hortorum suorum catalogos ad me miserunt, nomina celebrarem ut par est. commune enim quoddam hoc bonum est, in patriam stirpes peregrinas inuehere. partim in gratiam Typogra- phi, qui Cordi operibus ante annos serè xviii. scriptis aliquid recentius accede- re cupiebat: & mihi quoque iucundissimum erat hac saltem ratione Cordo meo, quoniam aliter fata non permisere coniungi. Neque uerò est quòd hanc aliquis absolute tanquam curiosam & inutilem cognitionem damnet. talis e- nim est illis qui diuersum propositum sequuntur: & quanquam medici o- mnium maxime diligentissimèque hanc naturæ partem excolant, non tamen eis necessarium est tam multa nouisse, cum intra pauca, certa melioraque reme- dia tutius se contineant. At Philosophus physicus nullis huiusmodi terminis coër- cetur, neque utilitatem aut lucrum quærit: nec ulla in eo rerum naturæ etiam minutissimæ

minutissimarum cognitio curiosa existimari debet. Huius ego hortum liberalis & multificii uiri, instruere proposui: non olitoris, non Adonidis aut Epicuri, non medicici aut pharmacopolæ. Hortenses quidem, urbanae aut sativæ plantæ propriæ sunt & dicuntur, quæ cibi condimentive causa in hortis à plerisque feri & educari solent: deinde quæ propter uoluptatem aliquam coluntur, ut quæ uel odore delectant, uel colore, aliæque specie oculos iuuant, sicut pleræque coronarii generis: tertio quæ ad medicinam faciunt, quæ omnia tum magis propriè hortensia dicuntur, si syluestria & suæ spontis uel omnino non reperiuntur, quod nobis constet: uel non in nostris regionibus: uel reperiuntur quidem, sed specie diuersa. Magno certè liber hic utcumque imperfectus, nec adeo magnus, labore mihi constitit. Multitudine & uarietate rerum obrutus, quam plurima aliis post me dicenda reliqui. Hominem unum nomenclaturas tam multas proferre, & proueniendi modum in tam multis obseruasse, multum est, nimium quidem ad alia utiliora & grauiora festinanti. Itaque ut os Momis & blateronibus ineptis obstruam, non quod multa omiserim, quod non accuratius quædam obseruarem, neque diutius librum hunc premere & expolire uoluerim, ueniam ab illis petam, quibus hac in re nihil debeo: sed potius doctiores uiros & maioris iudicii, quod tam prolixè, ne dicam ambitiosè, in hoc argumento uersatus sim, ut ignoscant, rogabo. trahit sua quæque uoluptas: cui nimium quis non indulget. Prolixitatem hanc tamen excusat ordo, sicut & in plerisque scriptis nostris, ita institutus, ut quod quis nosse uelit, statim inueniat, cæteris omissis. Breuitatis certè studio multa simpliciter protuli, nec inquisiui in opiniones quorundam quæ mihi parum probantur: facturus id aliàs in maiori uolumine, quod de Stirpium historia, si Deus uitam & reliquas commoditates largiatur, aliquando edam. Interim hoc ceu progymnasmatè præcludere, atque hoc specimine aliarum etiam gentium homines eruditos ad suarum regionum hortos describendos excitare uolui.

Quoniam uerò quot homines tot sententiæ, & aliquibus fortè hæc minime prolixa, sed breuiora quam uellent uidebuntur, cum aliàs, tum circa colendi rationem, qua præcipue accurata in nostris regionibus frigidis opus est, ut stirpes peregrinæ & callidioribus locis allatæ conseruentur: illos ad aliorum hæc de re libros, aut librorum partes, ueterum atque recentiorum remiserim. Theophrastus in suis libris De stirpibus, præcipue quidem etiologicis, plurima huius argumenti diligentissime docuit: ex quo permulta transtulit Plinius. Multa apud rei rusticæ scriptores eiusmodi leguntur, Columellam, Palladium, Varronem, Catonem, & illum qui Geoponica græca composuit. Ex recentioribus Petrus Crescentienis pleræque ex ueteribus repetiit, & insuper suarum obseruationum non pauca ad cultum, plantationem, & curam omnem arboribus aliisque plantis accommodandam pertinentia adiecit: Aristotelis de stirpibus extant quidem libri duo, sed corruptissimi, ut nihil fere utilis sitatis inde rei hortensis studiosi homines referant: nonnihil uerò è doctissimis Scaligeri in eos libros commentationibus. Problematum quidem Aristotelis sectione xxxvi. leguntur quædam ad hanc rem non inutilia. Circumfertur & Caroli Stephanii typographi regii Lutetiæ eruditissimus liber, hoc titulo: Prædium rusticum: in quo cuiusuis soli uel culti, uel inculti plantarum uocabula ac descriptiones, earumque conserendarum atque excolendarum instrumenta suo ordine describuntur. Eius partes sunt octo: Hortus, Seminarium, Vinetum, Ager, Pratum, Lacus, Arundinetum, Sylua, Frutetum, Collis. Liber est sane utilissimus ad rerum simul ac uerborum huius argumenti cognitionem, magna parte ex Ioan. Ruellii Commentariis desumptus. Bartholomæus Maranta Venusinus medicus certè elegantissimus methodi cognoscendorum Simplicium med. libros tres nuper edidit, ex quibus secundi libri cap. xi. totum satis copiose de cultu stirpium pertractat. Vidimus et Gallicum librum Petri Bellonii totius naturæ scientissimi uiri, quem de colendis arboribus syluestribus edidit. Hieronymus Cardanus summus philosophus, Operis de uarietate rerum lib. vi. cap. xxiii. de plantarum cura inscripsit, &c. Ex his & aliis fortè olim aliquis Rei hortensis uolumen perfectum nobis concin-

Gg ij

De re hortensia scriptores.

Natales stir-
pium.

nabit: mihi interim si principii ratione quantulumcunque cultura stirpium studiosi homines debere se fateantur, Germani præsertim mei, quibus hæc præcipue scripsi, (utnam uero etiam aliis profint,) satis magnam laboris mei mercedem retulisse mihi uidebor. Alius quidem nostro seculo re hortensem nemo ex professo descripsit: Carolum Stephanum excipio, qui tamē nomina et descriptiones stirpium magis, quam cultum earum docuit. Ego plerumque aliquid ad cultum utile in singulis addidi: & si nihil aliud, saltem natale solum cuique syluestrium peculiare indicaui ut plurimum, ut in hortis plantaturi locum singulis commodiorem eligant. Interim animaduertendum natales locos plantis non semper eosdem, sed ut plurimum conuenire: in quibus uidelicet plures ac latiores eiusdem generis plantæ prouenire solent, quod si in diuersis aliquando reperiuntur, cogitandum est uel cœli, uel aliam esse causam: rapiuntur enim sæpe à uentis semina, & ab aquis deferuntur. Loca olim humida & rigua, paulatim, aut etiam breui exsiccantur, in quibus fortè stirpes humidis locis proprie remanēt. et quæ nasci in aquosis solent, possunt plerumque etiam in umbrosis. Quædam tam ualida constant natura, ut ubique fere uiuere queant. nā & extra terram sunt quæ aliquandiu uigeant, ut in Bulbaceo genere, et Seda, & Anacamperos, et Aloë. Multæ quidem in nostra regione hortenses tantum stirpes sunt, alibi syluestres & suæ spontis, & aliquæ nobis montanæ: quæ alibi, ad septentrionem præsertim, fallente sensim terrarum altitudine, in planicie nascuntur. Hæc de stirpium natalibus dixerim: in quibus etsi in uniuersa fere natura, quod ad ortum ac generationem rerum impri-
mis, nihil necessarium, nihil perpetuum est, nos tamen iis quæ frequentius, & ut plurimum eueniunt, acquiescere par est. Quantum ad G. nominis mei notam, sunt quæ non in meis quidem hortis (quos hoc tempore duos colo) sed amicorum uiuunt stirpes, quas illic demonstrare possum. Quædam alias in hortulo habui, nunc careo, inter tot occupationes & tanta soli angustia, prouentum & naturam quorundam semel aut aliquones obseruasse contentus, ut locus ac tempus etiam aliis suppetere. Herbarum ex editis montium atque alpium in hortos translata, quædam forte ne apprehendantur qui dem: aut caules, flores ac semina non fundunt in hortis nostris, ego Gentianam, Eleborum album, & alia quædam multis annis in horto habui, quæ nunquam caules ediderunt, quædam perfecerunt quidem semina, sed annis aliquot interiectis, ex mor-
tibus etiam ipsis semina habere nobis difficile est: quoniam eo tempore quo sperare maturitatem eorum poteramus, niues plerumque iam ingruerunt, & incolis (qui per pauci, lactarii & rudes quidam homines sunt) sub id tempus ad ualles se recipi-
entibus destituuntur. Hæc ideo scribo, ut si qui uel hæc transeuntes, non omnia quæ scripsi apud me reperiunt, aut semina in alias regiones ad se mitti petentes frustrantur, quod non raro contingit, non mirentur. Nominaui etiam aliqua, in alienis præcipue hortis, quæ fortè prima tantum à satu æstate apparuerunt, non duratura per hyemem: aut non nisi summa diligentia ad aliquod tempus conseruanda.

NOMINA QUORUNDAM REI HORTENSIS STUDIOSORVM
hominum, in Germania primum, deinde Gallia, Italiaque, &c.

Et primum de differentiis hortorum in genere.

Horti uti-
les.

Medicina-
les.

Varij.

Elegantes.

HORTORVM alij uulgares sunt, utilitatis tantum gratia consiti: in quibus olera, legumina, uites, fructus qui edendo sint, & gramen, usum hominibus aut pecori præbent. Alii medicinales, ut Medicorum & Pharmacopolarum: in quibus non hortenses tantum stirpes, sed etiam syluestres omnis generis, & peregrinæ quoque coluntur, propter remedia quæ ex ipsis earumue partibus homini sunt. Alii similes istis, sed magis uarij, in quibus non solum plantæ remediis nobiles, sed alia etiam quæ uis rariore præsertim coluntur, propter admirationem & contemplationem naturæ. In aliis nulla utilitas ad cibum aut remedia, neque naturæ uis spectatur, sed ornatus tantum & elegantia: quales sunt matronarum & opulentiorum hominum, præcipue quidem monachorum: qui floribus diuersis conserantur,

suntur, aliisq; herbis & fruticibus, quorum aliqua in ipsa forma, aut colore odore
 ut gratia est, aut adserta & coronas usus: & pergulis, scenis attingitue, aut laby-
 rinthis apti frutices & arbuta ad inumbrandum, & quaecumq; anno toto uireant,
 nec frondes amittant: ac omne topiarium genus quod ita necti flectiq; potest, ut
 certam aliquam figuram præ se ferat: & herbae fruticesq; tonfiles propter eandem
 causam, ut Buxi, Myrthi, Hyssopi, & alia. & arbores quarum pulchriores sunt
 fructus: aut quarum folia latiora, ut Platani, Tiliae: aut aptae, ut earum brachia
 quaqua uersus distendantur, sicut in Quercu, Tilia & Malo diximus. Alii de-
 nique magnificentia spectabiles sunt, ut quorundam diuitiis affluentium, & prin-
 cipum uirorum, aut rerum publicarum: quorum & aedificia magnifica sunt, & a-
 quarum spectacula iucunda in stagnis ac fontibus: & colles forte in eis excitati, &
 nemora adiuncta, & exercitiorum areae: & arbores quaedam peregrinae, a huius-
 modi quæ magno sumptu indigent. Simples hae differentiae sunt: quarum duae
 interdum aut plures coniunguntur. Ex his quas dixi differentiis, (vulgaribus
 tantum exceptis,) paucos aliquot mihi cognitos, celebriores tantum commemo-
 rabo. Quod si copiosos aut nobiles aliquos præteriero, excusabit me ignoran-
 tia. Optarim enim quam plurimos nominari à me posse. Quoniam autem gene-
 re, ut indicatum est, differunt, comparari inuicem rectè non possunt: & in suo quicq;
 genere excellere. quamobrem nemo mirabitur, quod non magnificos tantum,
 & elegantiores, sed priuatos etiam angustosq; quorundam hortulos hinc præ-
 dico. Magnificentia arte & hominum opere constat: cui nos uim & uarietatem
 naturæ antepone non dubitamus. potest illa etiam extra hortos ostentari, sicut
 & elegantia: at hortorum laus ab eo præcipue est, unde & appellantur, si multa
 uariaq; in eis oriuntur & terra eduntur. Dicam igitur primum de hortis Ger-
 maniae quæ circa Rhenum est, à capite eius exorsus: deinde illius quæ longius ab
 est Septentrionem uersus.

RHENI fontes duo paulò supra Curiam Rhætorum sunt utrinq;. Curia
 oppidum celebre alpibus proximum est, ubi si quis hortum institueret, stirpiam
 generatam plurima commodè haberet, cum aliarum, tum alpinarum & trans al-
 pes nascentium in uallibus Rhætiæ foederis, & ex Italia uicina. Est illic Ioannes Fa-
 bricius Montanus, ecclesiae pastor, uir omni literarum genere doctissimus, sicut &
 Ioannes Pontifella Ludi magister pereruditus, ac medici præstantissimi Hierony-
 mus Brixius & Zacharias Belinus: omnes rei herbariae non uulgariter periti, quos
 honoris gratia nominare huc uolui, inuitante Rhæni principio, & simul eorum in
 me beneficentia, Fabricii mei in primis, qui per multas ad me stirpes ac semina quot
 annis mittere solet ut hortulum meum locupletet.

Infra Rhætiam Rhenus in lacum Brigantinum diffunditur ad sinistram eius
 latus cum impetu se immittens: è regione dextro latere Lindauia amœnissimum
 oppidum in peninsula situm est: cuius ciuis Matthiae Curtii mercatoris, hortum
 egregium stirpibus rarioribus non paucis consitum olim spectauimus. Aiunt &
 fratrem eius uirum nobilem non procul Lindauia habitare, & arborum præci-
 pue genera quamplurima colere. Ad lacum illum maximum oppidum est Con-
 stantia, in quo horti aliquot elegantes & ampli non desunt: in quibus tamen hoc
 tempore nihil rari aut peregrini esse audio.

E Brigantino lacu & altero minore infra Constantiam (Veneto, ut ueteres uo-
 cant, nostri à Cella oppido) postquam emerit Rhenus, minora quaedam oppi-
 dula cum alia præterlabitur, tum Eglisouiam Tigurinorum ditionis: à qua Tigu-
 rum patria mea quatuor horarum fere itinere distat. Fuit autem hortorum apud
 nos hæcenus uulgaris tantum cura. Primus ego peregrina semina inuexi, &
 syluestres montanasq; stirpes alere coepi. Est & Petri Figuli Chirurgi ac litho-
 tomæ egregii, hortus uarietate stirpium commendabilis: & apud Iacobum
 Funcium prætorem, optimum Citri ac Lauri in uasis: & in publico urbis loco.

Gg iij

ad limagum fluuium editiore Tiliarum nemus, in quo etiam Larices duræ uisuntur & proximè infra urbem ad eundem fluuium Tiliæ duæ, brachiis & ramis in atterias supra truncum elegantissimè digestis: quales, aut elegantiores quoque Scaphusæ etiam (quod liberum & Helueticum ad Rhenum oppidum est) conformatae sunt. Incommodum illud regioni nostræ commune, quod ferè de Asca conqueritur Hesiodus: ἄσκη χαμαὶ κακὴ, θέραι ἀργαλέη, οὐδὲ πόντος ἰσθλός. Propter alpium enim uicinorum iuga, perpetuis operta niuib, hyemes nobis longissime, æstates uerò breues sunt, & quæ tepere debebant austri, nobis plerumque frigent, frigore ab eisdem, quas pertranseunt, niuib contracto. Quamobrem & plantæ peregrinæ uix educari aut durare apud nos possunt: & uina nostra acerbiora sunt, non solum uicinis illis quæ propius meridiem nascuntur, sed etiam aliis, quæ locis ad Septentrionem paulò remotioribus proueniunt ultima. Longius enim si procedas, nullæ amplius uinæ occurrent: ita ut diei ferè iter ultra Rhenum uineta omnia terminet. Ergo, si montes non impendant, & uina generosiora semper, locis ad meridiem propioribus fiunt, & alii etiam quidam fructus uel noui, uel iidem sed melius feliciusque crescent, quò magis ad meridiem progredimur: ita ut in Narbonensi tandem Gallia, alibi quæ ad mediterranei maris in Europa limites, uineta & oliueta, & alia quædam, omnium optima habeantur. Itaque frigoris, tempestatum, solique ratione peregrina multa uel non proueniunt nobis, uel certè ad maturitatem non perueniunt. Aliquid est tamen, quædam ita prouenire, ut à medicis & pharmacopolis cognosci possint. Basileæ, quod infimum Helueticorum oppidum Rhenus interluit, Cælius secundus Curius uir doctissimus & Latina eloquentia summus, hortum peregrinis aliquot plantis instructum habet, sicut & Conradus Lycosthenes in eadem urbe ecclesiæ minister uaria eruditione clarus: cuius priuignus Theodorus Zuingerus nuper ex Italia reuersus, iuuenis egregius, medicus & philosophus pereruditus, optimi patris hortum seminibus italicis, quæ secum attulit, parte etiam mihi communicata, ornare & nobilitare pergit. In suburbio S. Ioannis, Ioan. Iacobus Loss uir magnificus hortum se dignum colit: in quo Citrorum arborum generis differentias aliquas uidi, ut Arantias, & Limones adultas: & Prunos Ungaricas: & Libanotidis coronariæ plantas pulchrè digestas: & acetosam Gallicam, &c. De Quercu in area seu nemore D. Petri leges Q. litera.

Argentina ciuitas propè Rhenum magna, & multis nominibus excellens, hortos etiam quàm plurimos & amplissimos habet: quorum præcipuus est, quod ad uarias & peregrinas stirpes Didymi Obrecht medici hortus: deinde Hieronymi Massarii medicinæ professoris. Magnificentia quidem & elegantia primas tenet Israelis Mankelii fodinarum metallicarum quarundam domini hortus in suburbio, quod uocant *Steinstras*: cui hortulanum Gallum præfecit, qui topiario tonsilique artificio herbas & frutices uarios distinguit: et areas herbis floribusque non uulgariibus in literarum aut animalium aliisque figuris graphicè digestis, Cepographiam dixeris, pulcherrimè depingit. Arearum margines, densis ex hyssopo aut saluaceu sepimentis tonsilibus, aditu per interualla relicto, ad pedis aut cubiti altitudinem cingit. Cælum certè Argentinæ multò mitius nostro est, & plantis peregrinis educandis aptius.

Infra Argentinam cum alia oppida nobilia Rheno alluuntur, tum præcipuè Spira, Vuormacia, & Moguntia: è cuius regione Mœnus fluuius Rheno se miscet: & ad iter ferè diei, Francfordia celebre emporium abest: ubi medici quidam & pharmacopolæ hortos uariis & rarissimis plantis instructos colunt: è quibus præcipuè mihi noti ac de me benè meriti sunt, Iacobus Oppenheimius pharmacopola, & Io. Rurpodius Chirurgus.

Reliquorum deinceps ad Rhenum oppidorum horti mihi prorsus incogniti sunt: non dubito tamen quin & alibi & in primis Colonia Agrippinæ egregiè instructi reperiantur. Antuerpia non procul Oceano distans, emporium longè nobilissimum copiosissimumque ad Scaldim flumen, ab altero Rheni ostio inferiore, ut extra bulis

bulis apparet, unius aut alterius diei itinere abest: in ea urbe cuius Petrus Condensbergius pharmacopœus percelebris ad insigne Campanæ veteris, omnium simplicium medicamentorum diligentissimus inquisitor, hortum uariis & raris stirpibus suo studio refertum excolere & augere pergit.

AT IN IIS QVAE LONGIVS A RHENO DISTANT

Germaniae regionibus.

IN Helvetiis quidem Bernæ Benedictus Aretius bonarum literarum professor Ieximius, & in Bernensium agro Sigrisfuilla, Christophorus Piperinus ecclesiastes doctissimus, hortos plantarum uarietate instructos habent.

Augustæ Vindelicorum magnifici horti sunt Fuggerorum, & in eorum plerisque etiam stirpes quædam peregrine: sicut & aliorum quorundam ciuium opulentiorum. In eadem urbe clarissimus medicus Adolus Occo præcipue peregrinas quasdam & raras stirpes alit.

In Bavaria Monachi hortus illustrissimi ducis à magnificentia, & peregrinarum quarundam arborum spectaculo laudatur.

Schorndorffii quod oppidum est illustris, ducis Vuirtenbergenfis, ciuis & mercator egregius Ioannes Schmidlappius hortum copia ac raritate stirpium insignem possidet. Ibidem hortum arci adiunctum magnificum, & plantis raris, inter alias etiam piperis, spectabilem esse audio.

Eßlinga ciuitas est Imperialis, quanquam in Vuirtenbergenfis ducis regione sita: cuius ciuis Ioan. Volmanus pharmacopœus, diligentissimus simplicium medicamentorum indagator, hortum egregie colit.

Norimbergæ celeberrimus est Ge. Ollingeri felicitis memoriæ hortus.

Vratislauiæ in Silesia clarissimi ciuis Vuosseli, qui præstantissimi medici Sigismundi pater est, hortus copia, uarietate, elegantia & raritate stirpium omnis generis summe commendatur.

Apud Miseno Lipsiæ Ioan. Rallæ pharmacopolæ hortus est copiosissimus.

Torgæ uero Ioachim Kreichii pharmacopolæ longe refertissimus stirpium uario genere, ordine etiam & structura elegantissimus: cuius picturam hic addidisse, quam ipse ad me mittere dignatus est, nisi pars eius in itinere, nescio quorum negligentia aut improbitate, perisset. Ibidem Ioan. Kentmannus medicus artis usu et eruditione summus, raras & peregrinas stirpes non paucas educat: sicut & Misenæ (quod oppidum regioni homonymum est) excellentissimus medicus Christophorus Leuschnerus.

Stolbergæ in Hercynia sylua Ge. Aemylius ecclesiæ pastor & uicinarum inspector, theologus omni literarum genere doctissimus, hortum quam plurimis & raris etiam stirpibus ornatum possidet.

DE HORTIS GALLIÆ.

GALLIÆ horti mihi incogniti sunt, paucis quos homines eruditi suis literis celebrarunt exceptis.

Celeberrimus est hortus S. Mauri prope Luteciam, Bellonio teste.

Hortus Renati Bellai Cenomanensis episcopi, nunquam satis in herbarum & arborum rariorum cultura laudati, nobilissimus est omnium qui hodie tum apud Germanos, tum etiam Italos uisuntur, ut nihil addi possit ad absolutam horti bene exculti, & innumeris uariarum plantarum diuitiis refertissimi curam ac diligentiam, ut scribit Carolus Stephanus in horto & in Seminario. Puto autem hortum illum Luteciæ esse: in qua urbe laudatur etiam hortus ædi diuæ Mariæ adiunctus, propter peregrinas quasdam stirpes: & pharmacopolæ cuiusdam à Car. Stephano celebrati, cuius nomen iam non occurrit. A Cardano de rerum uarietate libro 13, capite. 66, describitur hortus magnificus Ioannis Baptistæ mercatoris Florentini Luteciæ:

Petrus Bellonius Cenomanus medicus, ex longinquis peregrinis

Gg iiii

tionibus semina uaria congescit, omnis stirpium generis, ex quibus Lutecie satis, uaria ei stirpes prouenerunt: non solum uero paucas singulorum generum, presertim arborum, quae Lutecie nasci ante hac non solebant, educare contentus est, sed etiam syluas quarundam, quod ei felix faustumque sit, meditatur.

DE HORTIS ITALIAE.

ITALIAE horti plures instructioresque procul dubio sunt, quam ullius alterius regionis hoc tempore. nam & solum eius fertilissimum est, & aer temperatus: & diuitis affluentibus, uoluptatumque studiosi homines: & magnus rei medicae usus. Ergo paucos aliquot nominabo.

Caspar a Gabrielis uir inter nobiles Patavinos longe nobilissimus, omnibus animi atque ingenii dotibus excellit. Cui praeter omnium bonarum ac liberalium artium perfectam cognitionem, hoc etiam laudis & gloriae accessit, quod omnes facultates suas (quibus inter ceteros contentissimus uiuit, nihil ut amplius expetat praeter id quod habet) in hortuli sui diligentissima cura insumat, &c. Carolus Stephanus in Horro. Ibidem Priulanus hortus magnificus, plantis uariis & raris e Syria etiam accersitis admirationi est. Omnes uero omnium, ni fallor, hortorum magnificentia simul, & stirpium in eo uariarum omnis generis, e Creta etiam & aliunde peregrinarum, numero laudes facile uincit publicus ille Patavi in medicorum gratiam incliti Senatus Veneti liberalitate institutus hortus, cui hoc tempore Aloisius Anguillara Romanus, uir in stirpium historia nostro seculo exercitatus atque peritissimus omnium, magna cum laude praestit.

Venetis Murrhani nobilissimus est hortus senatoris Hieronymi Cornelii, uiri illustris, qui Cypri insulae praefecturam gessit: ex qua, ut etiam Creta, Alexandria, aliisque regionibus, multa pulcherrima rarissimaque Venetias sibi adferri curauit. In eadem ciuitate praedicatur etiam summopere Maphei de Mapheis medicis hortus: & Pasqualini, & Petri Antonii Michaelis Patricii in uico S. Georgii: & coenobitarum quorundam, praecipue Franciscanorum, ni fallor.

Illustrissimi ducis Florentini hortus magnificentia structurae, & stirpium peregrinitate excellit.

Arimini uisendus est Iunii Moderati pharmacepolae hortus excultissimus. Romae in coenobio quod Aram celi uocant, hortus est plurimis & egregiis plantis confitus, praecipue ab Angelo Palea & Bartolomaeo ab Vrbeueterum coenobitis, qui de medicamentorum compositione librum Mesuari interpretati sunt. In eadem urbe ciuis Scipio ad S. Apostolum hortum nobilem possidet, ut in Rhabarbarici mentione indicauimus. Ioan. Vincetius Pinellus uir genere & doctrina clarissimus, cui Bartolomaeus Maranta Venusinus medicus eruditissime scripta numero per cognoscendorum Simplicium medic. Methodum nuncupauit, Neapoli (ni fallor) in suis hortis quam plurimas plantas ex uariis remotisque regionibus, magno impendio aduectas (ut ipse Maranta scribit) perpulchre alit.

TVRCAS hodie rei hortensis per quam studiosos esse refert Bellonius Singularium 2. 51. ubi raras etiam aliquot stirpes quae coli ab eis solent, recenset.

DE HORTIS QVIBVS DAM APVD VETERES nobilibus.

DE Hesperidum, Adonidis, Alcinoi, Epicuri & aliorum quorundam hortis factam a ueteribus mentionem, ne sim longior, praetereo.

Horti pensiles Babylonii describuntur a Q. Curtio lib. v. In Syria fuisse duos paradisos in quibus solis Balsamum coletetur, idque nusquam agrestenasci, Theophrastus tradit historiae 9. 6. & eiusdem libri cap. 4. Arborea (inquit) thuris ac myrrhae, aliae in monte quodam Arabiae editissimo sponte nascuntur:

seuntur: alia cultu adhibito *οἱ τοὺς ἰδιώτας γεωργίας ὑπό τινος ὑποτάσσονται.*
De Theophrasti horto, & Ant. Castoris quem Plinius uidit, in sequentibus dicemus.

De hortorum laude & utilitate.

C V R A cultusq; hortorum, non modò honestam secum uoluptatem, sed etiam utilitatem, cum ad opsonia, condimenta, cibos, tum ad sanitatis tutelam & morborum depulsiōem, adfert. Seruntur enim, aluntur, & seruantur in hortis uaria fruticum, sistruticū, arborum, herbarumq; genera, quarum alia per se sunt edendo, alia acetariis aut condimentis idonea, alia remediis tantum adhibentur. Est sanè hortus, in quo stirpes eiusmodi oriuntur, ueluti penus quoddam: è quo ad usum nostrum quoties libet depromimus radices, olera, semina, fructus, herbas & huiusmodi: quæ cum in promptu ex hortis suppetant, nō opus est longius è rure, agris, montibus aut syluis petere, nec emere aliunde, quod non modò sumptuosum est, sed etià sepe inutile aut noxū, cum falsa pro ueris, & uenena interdum pro remediis, inuenerata quidem pro recentibus sepe numero ueneant. Horti (inquit Plinius) maximè placebant priscis; quia non egerent igni, parcerentq; ligno, expedita res & parata semper; unde & acetaria appellantur, *(ab accipiendo nimirum, quod ex ipsis hortis herbae semper in usum nostrum accipi possunt.)* facilia concoqui, nec oneratura sensum cibo, & quæ minimè accendant desiderium panis. Quamobrem sit aliquis & his honos, nèue autoritatē rebus utilitas adimat, cum præsertim etiam cognomina procerum inde nata uideamus: Lactici nosq; in Valeria familia nō puduisse appellari. Antiquitas nihil prius mirata est quàm Hesperidum hortos, ac regum Adonidis & Alcinoi itemq; pensiles, siue illos Semiramis, siue Assyriæ rex Cyrus fecit. Romani quidem reges ipsi coluere. Iam quidam hortorum nomine in ipsa urbe delicias, agros uillasq; possident. Primus hoc instituit Athenis Epicurus, hortorū magister. Vsq; ad eum moris nō fuerat in oppidis haberi rura. Romæ quidē per se hortus ager pauperis erat. Ex horto plebei macellū, quanto innocentiore uictur. Hæc Plinius. Epicurū quidē Athenis primum ad uoluptatē & delectationē hortos intra moenia instituisse, meminit etià Cicero in libris De natura deorū, Cyrus minor ex hortis, quos purpuratus ipse et gemmis ornatus, sua manu cōseuisset, gloriam magnā cum apud omnes Græcos, tū apud Lylandrum Lacedæmonitū cum is in Lydiam ad eum uenisset, adeptus est, ut Xenophon & Aelianus tradunt. Theophrasti Eresii qui Aristotele audiuit, hortum fuisse amplissimum ex testamento eius constat, in quo sic ferè legimus. Hortum & circumiectam ambulationem, & omnes ei adiectas domos, do & relinquo amicorū in hoc testamento nominatorū illis, quibus eunq; in eo uersari, simulq; philosophari libuerit, ita ut cōmuni studio colendū & custodiendū curent, neq; uel alienare, uel uendicare sibi illum quisquam possit, &c. In hoc nimirum prædio ille multa ac diuersa stirpium genera tum uernacula tum peregrina coli curauerat, ut eruditos illos & accuratos, qui etiam nūc doctorum manibus teruntur, Plantarū historiarū causasq; libros conscriberet. Antonii Castoris hortū Plinius celebrat in quo plurimas herbas uiderit. Huic (inquit) summa autoritas erat in ea arte (cognitione herbarū) nostro quo, uisendo hortulo eius in quo plurimas alebat, ceterisq; gratis annū excedēs, nullū corporis malū expertus, ac ne etate quidē, memoria aut uigore concussus. Columella autor est cultū hortorū insigniter neglectū fuisse ueteribus agricolis, suo autē tempore quā celeberrimū. Ego apud Græcos semper quā Latinos celebriorē fuisse puto, quā diu libera fuit Græcia. quā plurimos enim scriptores Georgica & Cypurica (hoc est, De rustica, deq; horrensi re) libros condidisse constat: & rerum, præsertim stirpium nomina, quorū maximam partem à Græcis mutuati sunt Latini, idē fatentur. Post Græcos uero Latinis præcipuū fuit hortorū culturę studium.

Hh

Germanis omnium minimè: partim quæ armis semper magis dediti fuerint: partim quæ soli natura durior, et cœli temperies inclementior, in locis Septentrioni expositis, hortorum cultui non parum incommodet. Quod magis institutum illorum laudandum est, qui in nostris regionibus nulla rei difficultate territi, hortos instruunt: idque non tam ad uoluptatē priuatā, quam ad utilitatē publicā faciunt, ut & remedia in promptu habeantur, sicut dixi: & multa hæcenus ipsis etiā summis medicis ignota certius cognoscantur: & optimi quicquæ ueterum libri, cum fructu simul et uoluptate legantur atque intelligantur.

OBSERVATIONES QUÆDAM ET REGULÆ AD
hortorum cultum in Germania utiles. Primum quæ consideranda sint ante plantationem aut sationem: deinde quæ in ipsa plantatione: demum, quæ postea.

PARS I.

Locorum
differentiæ
et natales.

Sin horto sint plures differentiæ locorum, (ut collis, saxa, riuus, stagnum, arena, &c.) multa crescere & durare poterunt, suis plantata locis: quæ aliter aut non crescant, aut non durant.

Quod singulæ plantæ terram propriam, cœlique accommodatam temperiem quærant, eo sane manifestum est: quod quædam in quibusdam locis proueniunt: in quibus alia quædam nec sponte nec sata facili exsunt, et quanquam apprehenderint, fructum nullatenus pariunt, (ut de Palma & Moro Aegyptia, aliisque quibusdam retulimus): & neque augentur, neque fructificant, sed uiciata (maligne) omnino proueniunt, Theophrast. hist. 4.1.

Ut aquaticæ & humido riguoque solo assuetæ plantæ non facili in hortis siccioribus uiuant, nec diu durant: nisi in umbroso loco, qui humido similis est: quem tamen uentis expositum esse uelim, & sæpius rigari: humidus enim locus si non perficitur, putredini & bestiarum generationi obnoxius est. Sic & montanæ stirpes, humiliori ac pingui solo, locis umbrosis, & uento minus perflatis, uix nascuntur: aut certe fructum non perficiunt. Sic & maritimæ ut Soldanella, Ben rubrum, in hortulo meo facili quidem natæ sunt, sed flores & semina nunquam protulerunt.

In diuersis plantis plurimum referunt sol aut umbra: locus altus, aut humilis: siccus aut aquosus, pinguis aut macer, perflatus aut non perflatus.

Solis calor augetur reflexione radiorum eius ad parietem. sic Ficus apud nos melius accitius maturefcunt.

Ad parietes quædam plantare prodest, uel propter soli reflexionē, uel ut loco saxoso sint, uel ut innitantur: ut Ficum, Ribes uulgo dictū fruticē, & Iasminū. Ficus quidē uel circa Cracouiam maturefcere audio, tali nimirum situ plantatis arboribus.

Plantæ uicinæ sæpe impediunt, cum uel inumbrant, uel aërem auferunt: uel prestant, aut se circumuoluunt, siue superficie, siue radicibus reptando: aut succum ac alimentum terræ præripiendo.

Carbonum puluis & partes minutiores à fabris ferrariis, terræ siccae & duræ nimium misceantur in hortis.

Solum uere obferendum, præparari prius autumno debet, fodi scilicet, arari aut pastinari & stercoreari. sin. conferendum est autumno, præparetur uere.

Vasa.

Semina peregrina pleraque uasis committenda sunt: in quibus etsi omnia nascuntur minora, certius tamē proueniunt, et melius tutiusque seruantur, ne conculantur, uel aliter ledantur: tempestatibus etiam subtrahi possunt, et uel sub tectū inferri, uel offerri pro commoditate, & uel ad umbram, uel solē transferri ut doliū Diogenis. Minus etiam ab animalculis infestantur, ut pulicibus, pediculis, cochleis & erucis: quæ germina & folia teneriora erodunt. Cochleg quidē etiam Februarii initio apud nos aliquando germina, cymas, et rudimēta aut spem florū subito uorant. Sphondylos cum aliis noxiis radicibus, tū Augusto mense præcipue animaduerti: cum enim subito egregiæ quædam plantæ mihi perirent, nec ulla esset manifesta causa, solo modicè effosso, latrunculos illos circa radices deprehendi. Nocēt etiā mures quidam rizopha gi, tum uoracitate sua, tum cauis excitatis, per quæ uel nimius calor penetrans, aut humor aut frigus radices lædit: quo nomine etiam talpæ noxiæ sunt, quæ non radices

radices sed lumbricos sectantur: & ipsi similiter lumbrici, dum terram circa paruas ac teneriores plantas multipliciter perforant. Hæc omnia ferè in uasis uitantur.

In uasis sata quædam, ubi adoleuerint, uere aut æstate transferentur in aream, idèq; con fractis uasis, si aliter curari non possit, ne terra à radicibus discedat: uel unâ cum uase in terram imponentur, præsertim sub magnos æstus, per fracto fundo, aut in eo foramine dilatato, ut subeunte humore uaporeq; terræ, radices humectari & refrigerari quæant.

Plantæ omnes quæ ab hominibus coluntur, alicubi sua sponte oriri uidentur: nâ & hordeum in Scotia sponte nasci aiunt. Quæ in frigidis regionibus coluntur: ea in calidioribus ferè syluestria sunt: & contra.

Ad plantationem uel sationem pertinentia quædam.

Ex peregrinis seminibus plurimis uariisq;, plerumq; uix perpauca nobis proueniunt: nisi & cœlum faueat, & cultoris studium singulare sit. Aestate superiori: quæ solito calidior sicciorq; fuit, amicus quidam (Francfordiæ ad Mœnum ciuis) è seminum generibus ducentis ac uiginti duobus, uix uiginti genera sibi prouenisse mihi conquestus est: sicut & alii alias, quamuis non in simili siccitate. Mihi etiam non raro è decem generibus satis uix unum prouenit: & eorum quæ prouenerunt multa breui, uel eodem, uel anno sequente interierunt.

Semina omnia crescente Luna repidisq; diebus sunt serenda, Cardano teste, alii qui è uulgò, Luna ascendente, ea putant serenda, quorum superficiem, (ut caulem, folia, fructus,) maiorem optauerint: contra, descendente, quorum radices auctiores.

A satû quædam citius, ut intra tres aut quatuor dies, germinant: alia tardius. Batiss ferè post quadragesimum diem apparet: alia fortè post menses aliquot, aut etiam annum. Ex præduris & corneis quædam nasci possunt, ut Asparagi & Xyridis semina: quædam non possunt, ut Polygonati erecti, (& fortè alterius quoq;) & Lilii conuallium, & alia quædam fortè: quorum radices natura uiuaces sunt & sese propagant. Lithospermi utriusq;, & Lachrymæ lobi semina, & si lapidea crusta tegantur, facillè prouenire puto.

Semina quædam, præsertim quæ pingui, calido & humido solo gaudent, ut Cucurbitarum, committenda sunt terræ, cui multum stercus bubulum substratum sit, ut uapore pingui subeunte uegetentur: idèq; primo ueris initio, ut postquam parum excreuerint, in hortû deponantur. Sed de Cucurbitarum & Batidis satione, plura & accuratius scripta leges in ferius ex epistola Massarii.

Quanam radice feri & transplantari possint, quæ non, leges apud Theophrastum De causis plantarum. 1. 4. Ea quidem maximè radicibus commodè seruntur, quorû radices carnosæ sunt, ut bulbacea imprimis: uel geniculatæ, uel nodosæ, quæ etiam diutius durant: uel pluribus ceu ab uno principio fibris suisq; neruosis potius quam mollibus, nam quarum singulares aut simpliciore sunt radices, aut lignosæ potius quam carnosæ, non facillè apprehendunt. Mei, quod urfinam radicem uocant non firri, radicum etiam capita rescissa si plantes, facillè nascuntur: sicut & Cymæ radicum quarundam separatæ, ut Inulæ & Raphani maioris.

Quæ coliculis geniculatis repunt, ut Pulegium, Nummularia, Fragaria, Pentaphyllum, ubicunq; terram contingunt, articulis suis radican- tur. Quæ non facillè apprehendunt, cum cespite suo terra hærente eruenda sunt. Ficus Indica è folio radices emittit: sed folium in ea caulis quoq; ramiq; & surculi uim habet confusam.

Surculis quibusdam plantatis, ut Betonicæ altis, aliqui grana auenæ addunt, Apiis (inquit Theophrastus de causis 3. 6.) cachrylium iungunt: quia calidum densumq; est, & ad alimentum trahendum iuuat.

Cum radix plantatur, aut surculus taleæue pangitur, terra circum quæq; ab imaradice paulatim ad summam, & demum etiam superficies terræ, diligenter condensatur, ut minimè laxa solutæue sit: lapidibus etiam eam ob causam proximè impressis, sic apprehendet citius, minus a uentis mouebitur, minus ab animalculis infestæ

H h ij

bitur et pluvia minus subsistit, quam subire non prodest, donec apprehenderint nisi aquatica aliqua planta sit: ad cuius radicem nihilominus stipanda est terra, aqua uero per caua bacillis infixis & extractis excitata, admitti potest.

Folia omnia à terra liberentur, quasi obruas, ea putrescunt, & uitium forte ad germen serpit, & paululum prominentes radices ab initio relinquuntur: post aliquot dies terra aggeratur quantum satis est.

Semina effigantur matura, plena, & potius è caule quam ramis aut furculis nata. In Cucurbitarum genere, quæ de collo sumuntur, fructus longiores producere putant: quæ de uentre, maiores & crassiores.

Florum multiplicium semina non omnia (sed pleniora tantum puto) eandem naturam retinent.

Florum multiplicium alii semina producant: alii non, omni succo natali in florum folia insumpto.

Semina quæ maiuscula sunt, & partem alteram magis mucronatam habent, ea ipsa pars in terra sursum tendat.

Semina quædam ante sationem lacte aut aqua præmaceranda sunt, ut citius in germen erumpant: quorum scilicet durior est cortex, ut Cucurbitarum, Cucumerum, & huiusmodi. Amygdalarum ossa octo diebus in aqua præmacerari iubet. Nonnulla in dulciore succo aut liquore præmacerata, fructus dulciores producunt, ut Cucumerum genera. Quæ lignis uel ossibus duris continentur semina, integra cum illis ferantur: nam ossibus suis aut crustis nudata, uix prouenient.

Argentina (ubi longè maxima hortulanorum tribus est) in eo dè agro anno uno tria seminum genera ferunt, quorum tertium sequente demum anno maturefcit: ita ut intra biennium quinque genera deinceps sata perficiantur. primò forte ceparum radices pangunt, *serg—zibel*, circa Cal. Februarii: deinde olera, uel Cannabim aut rapa: tertio triticum, aut hordeum hyemale. uel primò radices ceparum aliis cepis interserunt, circa Cal. Ianuarii. & simul Anisum ferunt, Brassicam capitaram, Petroselinum uulgo dictum, Spinaciam. deinde Rapa, aut Cannabim, aut Hordeum album, denique triticum. Aliquando Rapa aut Raphanos primò ferunt, *frü Xüben* habent enim Raphanos quatuor generum, breues, longos, orbiculatos & quos præcoces appellant, item Pisorum genera quatuor, alba, ruffa, fusca: & quæ *Deiraterbs* uel *Zylterbs* uocant, Fabarum genera tria. Linum aliud æstiuum, aliud hyemale: & Cannabim similiter. Est quando primò pangunt radicem Raphani maioris Cymas, uel Betam ferunt: & Chnicum aut Papauer interserunt. Serunt & Pastinacas, tum ceteras, tum maiores: & Fœniculum, Anethum. Cortandrum, Fœnogræcum, Cicer, *Mören Korn*, etc. quæ omnia uidentur ad secundam sationem pertinere: Fœniculum fortè ad tertiam, quoniam altero demum anno commune nostrum Fœniculum semina fert, dulce primò. Hæc etsi ad agendum ierè magis quam horis pertineant: proponere tamè ut olim accepi, uolui, quanius non satis diffinitè forsitan.

Semina ad duos aut tres annos, ut plurimum bona sunt, quarto inutilia. Rapæ ueteris in Brassicam transire, & contra, Plinius author est.

Serentur quædam felicius quam eruta transferantur, translata enim aliqua uix aut malignè crescunt.

Rapis infixi furculi arborum inferendi, commodè ad alienas regiones transferuntur, ut Plinius alicubi tradit, si benè memini, aliqui in argillam immittunt partem sectam: uel in arundinem magnam cum argilla, &c.

Terra pro uasis quibus semina mandentur, pinguis & pura sit à uermibus, lapidibus & omni aliena materia purgata: aliqui à talpis effossam probant, pinguis est, nec urit tamen, quæ à solo haris subiecto demitur.

Postquam prognate sint uel apprehenderint stirpes, earum cura & duratio.

Herbæ quidem peregrinæ complures apud nos proficiunt: frutices & arbores, quæ maiori calore ad perfectionem indigent, non item: quanquam diligenti cura adhibita in uasis educari quæ dā possint ad quatuor cubitos aut quinque ad summum, quod ego hætenus uiderim, ita ut florem proferant: sicuti genera Ciri & Laurus, in qua magnitudine postea consistunt per annos aliquot, uel donec pereant.

Cu-

Cucumeres & cucurbitas si quis paruos absconderit, plurimum augentur: quod ita nulla pars alimenti à sole detrahatur, nec flatibus resiccet. His illi quoque respondent, qui in ferula uel tubo fictili (*ut racemi apud nos aliquando phialis uirens*) includuntur, crescunt uero in longitudinem, & quia nutrimentum facilius recto tramite fluit, & quia nihil est quod auocet aduerseturque. Ratio similis facit ut uirides quoque ualeant perdurare, si quis apud puteum serat; cunctique tempestiui iam sunt, demissos in puteum bene operiat. Quod si quis postquam fructificauerunt germina decidat, & radices terrae bene operiat atque conculcet, rursus ex eisdem radicibus cucumeres depromentur, & multo maturius quam qui semine ueniant. Argumentum hoc quoque euidentissimum, quod si quis hyberno tempore semina cucumeris serat in calathis, rigetque aqua tepida, & soli exponat, & igni admoveat: ac postea cum tempus seminandi fuerit, totos cophinos demittat in terra, praecoques admodum faciet. Hec Theophrastus, ex cuius libris multa alia huiusmodi harum rerum aliquis studiosus colliget.

Si quae interisse prima fronte uidentur, non statim eruenda uel abicienda sunt. Reuerefcunt enim quaedam aliquanto post, praesertim in lignoso genere, in quibus forsitan radix adhuc uegeta est, etsi superficies omnis perierit.

Quae ex arboribus autumnis in uasa transplantantur, non statim sub tectum referantur: sed transplantata maturius, aliquam diu adhuc sub dio detineantur, donec urgeat hyems.

Hyeme cellis in quibus plantae sunt, aer tepidior aliquando admittendus est: & aliquando niuis aliquid adponendum, quae paulatim liquecente rigentur radices, hoc enim faciunt aliquando in uasis Libanotidae coronariam continentibus. Citrorum arbores bis fere per mensem hyeme rigantur aqua. Ea quarum folia succo abundant copioso, ut Sedum maius uerum, Aloë & Ficus Indicam, rigatione per hyemem perire aiunt. Mihi dum haec scribo circa octauum Februarii die folia Indicæ ficus meae, quaecumque estate superiore prognata fuerant, deciderunt: quod & superiori anno contigit, causam esse puto siccitatem quae foliorum iuncturis accidit, & magis quidem recentiorum. Haec hyeme nunquam rigantur: superiori semel modice. Fortè & concussio in causa est, uas enim locatum est prope ianuam, quae non sine concussione aliqua claudi potest.

Principes & praedivites quidam arboribus aliisque peregrinis stirpibus hyeme conservandis zetas construunt: in ipso horto extractis aliquot pro eius magnitudine fornacibus, qualibus in digitis suis seu hypocaustis uulgo dictis Germani utuntur: & tabulatis parietibus circumiectis, &c. Talem Augustae uidi.

Quaedam si per hyemes terra obruantur, ut ficus minores adhuc, & rursus medio uere eruantur, ne frigore pereant, cauetur: idque felicius, quam paleis aut alia materia circum aggesta. Herbae etiam quaedam, uel totae, uel parte circa radicem, commodè terra, aut umaceis, aut coriorum ramentis proteguntur. Cinis & lixiuium quibusdam appositus prodesse uidetur, ut absinthio: & sal fortassis circumpositus nonnullis, ut audio: sed nondum satis mihi constat, animalcula forte is repulerit, aut maritimis quibusdam plantis profuerit. Ficus Indicæ foliis terrae proximis, arenam ad palmi altitudinem aggerendam quidam putabat, quamuis in uase intra cellam tepidam. Lauri & calidioribus extra Germaniam locis etiam citri, ramis uno aut altero funibus circulo uersus truncum adductis, hyemem superare poterunt uel dolio super eas inuerso.

Annuae herbae, aliae semestres sunt, quae uere feruntur aut sponte crescunt & ante hyemem eiusdem anni pereunt: *Sommerkreutter*. Aliae in fine estatis uel autumnis feruntur aut sponte nascuntur: & per hyemem durant, ita ut anno sequente demum floreat, idque citius, & perficiantur, &c. *Winterkreutter*.

Herbae quaedam in calidioribus regionibus nasci solite sua sponte, eodem anno perficiuntur, & floribus seminibusque editis, emoriuntur. apud nos uero plerumque (nisi & bene aprico loco, & mature, & anno calidior solito ferantur) cum ante hyemem perfici nequeant, hyberno frigore pereunt in hortis. At si in uasis ferantur, quauis Aprilis aut Maii demum id fiat, & in fine autumnis, in locum subterraneum, aut cellam contra frigus munitam condantur: sequentis anni (siue in areas translata, siue in uasis relicta) àestate optime perficiuntur, et semina mature edunt: quod ego circa cucumerem syluestrem & alia quae

Hh iij

dam obseruavi. Forſan & circa Cal. Septembris quædam recte ſerentur, in uas præſertim, aut etiam in areis hortorum, ſi terra bona & locus aprius fuerit.

Eſt quando eorum quæ ſecundo anno florere debebant, quædam præueniunt, & florent primò, ſemine nullo ſere aut inutili.

Hyeme aliquando cum cœlo tepidiore terra regelatur, eleuatis radicibus herbe ſuſpenduntur: & facile pereunt. quàm obrem retruſæ operiendæ ſunt terra, uel alia materia.

Aloë in Cypro ſub hyemem eruunt, (ut noſtri Cepas, & tertio quoq; anno Croci bulbos,) ac ſuſpendunt, uere iterum plantant.

Sylueſtria quædam in hortos translata facillimè creſcunt, & cultu gaudent, fruſcificant, durant, alia uerò breui intereunt. Sunt quæ cultum omnem aſpernentur: ut Gentiana minima, quæ in alpium iugis creſcit. Alia creſcunt quidem, ſed foliis tantùm, cum neq; caules, nec flores edant, ut Ben rubrum maritimum. Quædam cauſeſcunt quidem, ſed abſq; flore, alia florent, ſed abſque ſemine. Ruſcus iam plurimis annis in hortulo meo uirens, flores aliquoties, & germina noua quotannis, ſemina nunquam oſtendit. Sunt quæ proſus degenerent. Roſa ſylueſtris minor, cuius fruſtex totus ſtraiſſimè olet, odorem cultu amittit: ſed forte tum ſolùm, cum humidior re umbroſioreq; et parum perſtrato loco plantatur, ut mihi contigit.

Rigari conuenit ueſperi potius quàm mane aut in Sole: & quædam guttatim, ſere rorantibus guttis, itaque faſciolum panni in uas aqua plenum imponunt, ut aqua parte panni prominente paulatim extulſet. Talis rigatio Cucurbitis maxime conuenit. Vide intra in epiſtola Maſſarii.

Rigatio ſæpius fiat, ſed modice, cum clepſydra aut aſpergillo: non rarò & copioſius: nullo impetu è uaſe aut manu fundendæ aquæ, ne eius iſtibus plantæ teneriores lædantur: aut terræ ſuperficies nimis denſetur. Hei bæ aut aliæ ſtirpes cum plantantur, ſcrobe excitata, primum aquam inſundunt, aliqui et auenam ſubiiciunt: deinde plantæ immiſſæ terram aggerunt, & rurus aquam aſfundunt ut terra diſtribuat & unâ cum aqua ad radicem partes & fibras conſuat: demum complanant & comprimunt ſuperficiem ſoli.

Satis quibuſdam contra iniuriã animalculorum inſpergitur fuligo camini, aut potius circumquaq; nos ſale circumſperſo à cochleis interdum uindicauiſus planetas.

Vrina arborum radicibus aſfuſa utilis eſt.

Fimus bubulus urit plantas: ſuillus non item.

Sylueſtrium quæ locis aquoſis proueniunt, quædam in ſiccis etiam hortis, meoſi diocriter umbroſis, plurimum durant, ut Eupatorium Auicennæ dictum: & Lilium flauum: alia breui pereunt, ut Grauiola, & ipſa nimirum duratura, ſi loco aquoſo plantaretur.

Hyeme quædam omninò intereunt, ut herbe annuæ, ex quibus & umbellifera quædam ſunt. Nam umbellifera quædam generis ſerulacei ſunt: quibus caules tantum hyeme pereunt, herba uerò & folia circa ſolum ſeu radicem manent, ut Fœniculo, Fabæ inuerſæ, & aliis quibuſdam.

Sphondyli ſubterranei uermes, *Jinger* uel *Enger* à Germanis quaſi *ÿyſſei* dicti, quos anno ſequentem ſemper in ſcarabeos Maii, ut uocāt, mutari aiunt, rhizophagi ſunt, & radices quaſlibet, etiam fruticum & arbuſcularum arrodunt pernicioſiſſime: ita ut ſubito herbe totæ, aut folia ſaltem flacceſcant: quod cum apparet, terra circa radices eruenta eſt, ut extrahantur. Aprili menſe & Maio plurimum nobis nocent: ſed Iulio & Auguſto reperiuntur.

Florum folia arte cultuq; multiplicantur, nimirum ſi primis annis florere prohibeas, duobus aut tribus. Dodonæus ſcribit Ocimoides noſtrum (Lychnidem ſylueſtrem ipſe uocat) ſi frequenter plantetur, folia multiplicare.

De

SEMINA Balsaminæ, ac Crithmi, seu Batidis, quam primum acceperis, terræ committas, non quidem in horto, sed in uase aliquo, in quo pingue sit solum: diligenterq; animaduertas ne gelu corripiantur, & uas quam maxime poteris soli per diem exponito: nec per noctem extra tectum manere patiaris, nisi dū hyems omnino præterierit, facillime enim à gelu corrumpuntur hæc semina. Per diem præterea poteris aliquando leuiter uas ipsum aqua perfundere, ne solum nimis arefcat, de his te admonui, scio enim quanta cum difficultate, etiam Italiæ multæ partes huiusmodi plantas alant: et in Italia è terra non apparent nisi post 40 diem. Hinc cōiectari licet, huiusmodi semina tardiorē habitura ortum in frigidioribus regionibus. Cucurbitarum autem semina optimo solo ac admodum pingui committito, donec germen proferant & ex terra cum duobus foliis appareant, & dum sex uel septem dies sic steterint, robusteq; aliquantulum factæ fuerint: singulas plantas ex loco illo unā cum terra quæ radicibus annexa est educito: & fossulas in loco aliquo spatiofo conficito, quæ ad unius palmi mensuram profundæ sint, & tantundem laræ: has fossulas terra pingui impleto, optima illa est terra qua ouis simus cōmixta est, & optime trita et cōminuta. In singulis fossulis singulas plantas collocabis. si in loco qui soli expositus mediocriter sit collocaueris, bonum erit: in harum plantarum custodia duo hæc curabis, si pulchros fructus habere optas: primum ut plantæ in terra defigantur usq; ad folia ipsa, unāq; curabis ut semper terra folia ipsa ferè attingat: secundum ut terra ipsa perpetuò madefacta sit. Referam tibi modum quo nos in Italia utimur in huiusmodi cucurbitis irrigandis: Cum plantas ipsas in suis fossulis collocauimus iuxta plantas ipsas uasculū aliquod ponimus, quod perpetuò aqua plenus seruamus, accipimus præterea ligulam unā ex panno laneo quæ ex ipsius panni transuerso concisa sit, hanc longā ad mensuram unius palmi cū dimidio accipimus, eiusdemq; caput unū in uase locamus, alterū uerò ipsi plantæ circumuoluimus, ita ut & plantam & terram attingat: hac enim ratione fit ut semper terra madida sit. Cum uerò fructus aliquantulum grandes erunt, tunc singulis diebus, manibus plantas optimè irrigare conuenit, quod si tum auferatur uas illud, quod eas panni auxilio irrigabat, nihil refert, sicq; certò scias te optimas cucurbitas habiturum, (si tamen aqua optimus cibus dici potest,) ac notabilis magnitudinis, sicut & nos anno præterito habuimus, ita ut omnes mirati sint.

FINIS.

HORTI GERMANIAE.

HOC EST STIRPIVM HORTENSIVM, QVAE IN HOR-

tis quibusdam Germania reperiuntur, Enumeratio

iuxta ordinem literarum.

NOMINA illorum, qui in Germania Hortos Stirpibus raris excultos habent, (quorum catalogos accepimus,) literis initialibus plerumq; tantum à nobis designantur: quod idcirco fecimus, ut et laude dignum hoc eorum studiū prædicetur: et ubi, uel apud quos Stirpes quæq; hoc tempore inueniantur, non sit obscurum. Sunt autem hæc.

A. Benedictus Aretius Bernensis Gymnasii professor.

AE. Georgius AEmylus doctor Theologiae, Ecclesiae Stolbergensis pastor, & uicinarum inspector.

C. Petrus Condenbergius pharmacopœus Antuerpianus, ad insigne Campana ueteris. Is in Catalogo suo, ut omnia mihi clariora essent, Dodonæi nomenclaturas & sententias de plantis singulis sequi uoluit.

Hh iii

D. Didymus Obrecht Argentinenſis medicinae doctor.

F. Franciſcus Follietus Sabaudus pharmacopola: quanquam is non in Germania, ſed uicino Heluetis Germanis Sabaudie oppido Viueaco ad lacum Lemmanum degit: niſi iam inde in patriam Cluſium migrarit, ut audio.

G. Con. Geſnerus: cuius hortulus quidem perangultus eſt, ſed uariis plantis reſertus: & omnia ei cum amicis acciubus ſuis, Petro Figulo chirurgus & lithoromo, & Io. Iacobo Clauſero pharmacopola (quorum maiores ſunt horti) communia. Clauſerus noſter haec dum conderem, uitam hanc mortalem magno pioq; animo reliquit.

K. Ioaſchimus Kreichius Torgenſis pharmacopola.

O Ge. Ollingerus pie memoria, Norimbergenſis Simplicium medicamentorum mercator: qui & ipſe multo tempore magnoq; ſtudio hortum coluit, & iconibus ſtirpium uariarum elegantiffime pictis, uolumen ſibi confeſcit, & filios (ut audio) eruditos reliquit: qui pulcherrimum hoc optimi parentis propoſitum doctrina ſua peregrinationibus confirmata, Deo ſauente, illuſtrabunt.

R. Io. Ralla Lipſenſis pharmacopola.

Vu. Vuoyſſelus Sileſius: cuius Vratiſlauiæ: cuius filius Sigifmundus, dum haec ſcriberem, Bononiae publico & illuſtri teſtimonio artis medicae inſignia perhonorifice accepit.

Haec nomina quia ſapiffime repetuntur, literis notaui: alia nonnulla quæ rariſus occurrunt, integra ſcripſimus: ut Rurpodii nomen, qui Frandfordia ad Moenum nunc habitat medicus, chirurgus inſignis: & cum Iacobo Oppenheimio pharmacopola præclaro hortum autem in eo ſtirpes aliquot rariffimas communes habet: & Chriſtophori Piperini Sigriſullæ in agro Bernenſium Heluetiorum eccleſiaſticae doctiſſimi: denique Chriſtophori Leuſchneri medici Miſenæ pederuditi: & aliorum forte paucorum.

IN Catalogis quibuſdam inuenta ſtirpium nomina reliquimus: eſſi in aliquibus an recte poſita ſint, dubitari poſſit: eſt ubi cenſuram noſtram breuiſſime addidimus. Singula quidem exanimare nec otium ſupperebat, nec inſtituti huius erat. Plantis quibuſdam minus raris non omnium qui alerent nomina addidimus: ſed unum aut alterum, admonendi tantum gratia qui hortum inſtructurus eſſet.

A.

ABIES, G. Hac arbore paſſim pleriq; omnes Heluetiorum montes ſylueq; ſcatent. Facile autem nouellæ Abietes plantarum creſcunt: quamuis Theophrastus Hiſtor. l. 5. cultu deteriore reddi ſcribit, ſicut & Pinaſtrum.

Abrotonum (uel ut Grammatici ſubtiliores ſcribunt, Habrotonum) mas, G. R. Fœmina, R. G. Vtrumq; auulſis aut fractis ramulis pangitur, & facillime comprehendit. Neutrum hactenus ſue ſpœtis inueni. Mas pleriq; hortis communior eſt. Nuper in Sueuiæ parte ad Hercyniam ſyluam non procul Roteuilla, maris ſpeciem alteram inueni, per omnia ſimilem uulgari noſtro, ſed candidiorem, foliis latiſculis, minus effacem: unde ueram fœminam eſſe exiſtimo. eam in hortu noſtro plantari. Fœmina à Cordo exiſtimata (Abſinthii genus potius, odore Chamæcypariſi) in noſtris regionibus hactenus ſere ignota fuit: quam tamen in aliis Germaniæ regionibus ſylueſtrem inueniri audio. Radiculis ſerpit & ſe propægat. Abrotonum radice aut auulſione potius quam ſemine germinat. ſemine enim diſſiculter exit: & hoc teſtis primùm commiſſo, Theophrastus.

Abſinthium commune. Hoc etiam ſponte naſcitur (quod ad remedia utilius eſt) locis aliquot Heluetiæ arenosis, ut circa Rhenum ſuperiorem: & ſaxosis montibus Bernenſium, ſed multo minus frigore aut alimenti inopia, ita ut ſpecies diuerſa uideri poſſit: ſicut & alia multæ herbae in montibus altis natae, iis quæ humilioribus naſcuntur, minores ſolidioresq; & craſſiſculis foliis ſunt, ut Violæ nigre, Bechii, &c.

Abſin-

Absinthium alpinum, de quo iam dixi, non ultra palmi altitudinem, in hortulo meo iam per aliquot menses, non satis bene, uiret potius quam crescit.

Absinthium Meliæ, R.

Absinthium Romanum, & alia *Absinthii* genera, Patauii in horto medicorum femina producere negant, siue quòd à tyronibus rei medicæ subinde carpantur, siue aliam ob causam.

Absinthium Seriphium, R. K.

Absinthii genus quod in *Vallesia* (Heluetiorum regione, inter *Rhodani* ortum & *Lemannum* lacum) in collibus apricis circa *Sedunum* (herbæ albæ nomine uulgari notum) nascitur, caphuræ quodam odore. Id ex semine hoc anno facile & pulchre mihi peruenit. Floret eodem anno, sed serò: nempe autumnò, si uere seratur, unde herbam annuam esse suspicatus sum: sed hæc dum scriberem in Iunii mensis fine anno superioris uere satæ plantæ nondum florebant: ut illas quæ primo autumnò floruerunt, præcoces & præproperos flores edidisse existimem. Sata in fine ueris, ad florem non peruenit. *Absinthium seriphium* fœminam hoc appellârim, uel mediterraneum: nam color albus, & uis aliquantò minor quàm maritimi, aliqui similis odore saporeque, fœminam mihi designare uidentur. Huius quod sciam hæcenus mentionem nemo fecit. multis quidem modis in re medica felicem eius usum esse posse experiundo didici. Hyemes nostras quamuis asperas bene fert in hortis.

Absinthium Romanum, & genus aliud *supinum*, C. Is in epistola ad me *Absinthii* Romani (inquit) ramulum, dedioli Guil. Turnero: qui Anglico suo herbario eius imaginem inseruit: sed periit in hitum planta absque semine, Hyemis iniuria, nec id deinceps quauis diligentia licuit recuperare. Forma tota cum uulgo *Absinthio* conueniebat, foliis tantum paulò minoribus. Roma semen acceperam. Verùm aliud genus in horto meo uiret hodie, hyemis quoque impatiens, nec in rectum assurgens, sed in obliquum super terram sese extendens: ab eo quòd Romanum officinis dicitur, diuersum. Hoc enim *supinum* summo cespite radices spargit: illud Romanum minimè. Estque aromaticum admodum, amaritudinis moderatæ: cuius ramulum mitto. Vidi præterea (inquit idem Coudenbergius) aliquando in alieno horto *Absinthium*, uulgo tota facie ac colore adeò simile undique ut ouum ouo, planè tamen insipidum. At uerum illud *Absinthium* Ponticum ueterum, ægrotis tam salutarem herbam, hæcenus desidero. Sunt qui pro eo uulgare nostrum horridæ amaritudinis, & astrictionis manifestæ nullius, accipiunt: alii uerò Romanum. Hæc C. Ego diligentiorẽ *Absinthii* generum considerationem in aliud tempus differo. *Supinum* quidem illud minutis foliis, & flore *Chamæmalis* ferè, si benè memini, *Basileæ* etiam in horto Ioan. Baubini medici & chirurgi præstantissimi uidi.

Ac

Acanthus sativus, id est, Brancha ursina uulgò dicta O. C. Idem in nostro hortulo aliquoties satas prouenit, in caulem tamen nunquam excreuit & quamuis duos aut tres annos duraret, æstatis tamen bona parte occultatus sub terra, autumnò fere redibat. Sic & *Cyclaminus*, *Mandragoras*, *Centaureum maius*, & *Asphodelus*, postquam aliquandiu foliis & superficie tota amissis, (ut periisse uideantur) latuere, rursus exilire in hortulo nostro obseruauimus: quod an omnibus istis secundum naturam ita accadat, quærendum est. *Cyclamino* quidem naturale id esse constat. Norimbergæ in hortis *Acanthum* & *Asphodelum* bene prouenire, & flores fructusq; maturare accepi. *Leuschnerus* medicus superiore anno sæcundissimum habuit *Misene*. hoc etiam anno *Bernæ* *Aretio* floruit.

Aceris species tres apud nos inueniuntur in syluis ac montibus. inter eas etiam *Zygia* à Theophrasto nominatur: *Carpinum* *Gaza* uertit nescio quàm re-

Ac. Bellonius Luteiæ inter alias arbores Zygiam montanam sibi prouenisse ait.

Aceris species duæ, maior & minor, quam Opulum & Rumpotini appello, G. Expecto & tertiam speciem acutioribus foliis & Clarona mittendam. Ruellius Acer montanum quoddam pro Sychomoro descripsit.

Achillea alba, R.

Aconitum primum siue Pardalianches, G. sic autem uoco non illud quod Leonardus Fuchsius pinxit, neque Doronicum, ut quidam, neque depictam à Matthiolo herbam: de qua dubitamus, etiamnum an in rerum natura extet: & si extat, an rectè ab eo pingatur, nullis penitus in radice fibris: quod ego in nullam plantam cadere dico. ipse uerò & qui eius sententiam tuentur, in suis ad me epistolis radices eiusmodi aliquas inueniri aiunt, sed non ostendunt, ut nec Aconitum suum. Quod si & extare, & quale pingitur conuicerit (hoc est, ostenderit) Matthiolus, restabit et adhuc probandum ueneni uim eandem ei esse quam ueteres Aconito primo tribuerunt. Ego Aconitum primum Toram uulgò dictam à Valdensibus, ut semper & quidem primum existimaui: ita magis ac magis in ea sententia confirmor: idque primo quoque ocio multis ac ualidis argumentis astruam. Scio & alias quasdam herbas diuersis in locis Toræ nomine uocari, ut in Italia alicubi Napellum. Ego de Tora siue Toxico Valdensium loquor, quo circa Taurinum & alibi utuntur: quam in nostro De Lunariis libello depinximus, folio circinato ferè, & aspero, non hirsuto, ut Plinius malè transtulit, &c. Nascitur sponte in montibus quibusdam Sabaudia, & Vallesia nostra. unde nuper Caspar Collinus eruditus & diligens pharmacopœus Seduni plantas eius aliquot recentes (una cum aliis quibusdam) ad me misit: quæ per hyemem benè durarunt, amissis tamen foliis: & nuper principio æstatis flores Ranunculo similes: deinde etiam semina protulerunt: radiculis cum recentes sunt, omnium candidissimis, Scorpionum specie, præsertim caudæ, in quibusdam manifesta. Folium aliis plantis singulare est, aliis bina, terna, quaterna, aut etiam quina ab una radice, ut nunc quotidie in hortulo meo uidere est. Non enim uerum est quod scribit Matthiolus folium ei semper singulare esse, &c. Habeo & folium & Generoso monte Infusbræ, magnitudine & figura ferè Cucumeris folii. Genera duo sunt maius & minus.

Aconiti secundum uel Lycostoni duæ species, utraq; cubitos quatuor alta, G. tres, O. C. Nostri Lupi radicem uocant speciem illam cui flores lutei sunt, ceu effraciorem. Alteram cui cœruleus flos est, *Rappenblumen*/quidam *Eysenbütle*: Itali quidam Toram, alii Napellum. hæc etiam purpureo flore inuenitur. Sueui aliq; Germani speciem utramq; *Wolffwurz*/ id est, Lupi radicem nominant. Matthiolus Aconitis adnumerat eam quoque herbam, quæ propter elegantes florum luteorum globos à nostris colitur in hortis, *Trollblumen* nomine: nam *Troll* leti nobis est in orbem uoluere. Ea sponte nascitur abundè in montibus nostris, cum alibi tum circa Eremum Diuæ uirginis à pecore non attingitur: uenenatam tamen esse non puto. Viuacissima est, flore in altis montibus suaue olenti. Vide inter Anemonas.

Aconitum cœruleum aliud, luteo illi quod nostri priuatim Lupariam uocant, cognatum, in montibus quibusdam Bernensium ditionis *Grosse bergritter* spocem. A. In nostro etiam hortulo nunc floret circa medium lunii. Radix ei amara est sicut Antitoræ, & uiribus, uti conicio, eiusdem, non ita uenenosa ut cætera Aconita.

Aconitum salutiferum, quod Antoram uel Antitoram uocant, radice semper gemina, amara &c. in montibus non procul Geneua nascitur: unde ab amicis recens mittendum expecto. Vide infra in Antora.

Aconitum secundum, flore albo. Napellus albus in orto ciuis cuiusdam nostri.

Aconito

Aconito cognata uidetur etiā herba, quā in montibus Heluetii alicubi *Schneeblumen* appellant, flore albo Ranunculi, radice ut in Lycostono dissecta: cuius hoc anno à me plantata radix interit.

Acorus falsa, G. id est Liliū aquaticum, flore luteo. Diutissimè in hortis durat, quamuis non humido loco, quòd radix ei solida & geniculata sit.

Ad

Adiantum nigrum, ut aliqui putant: G. Ruta parietum uulgò dicta: quòd in muris, parietibus & saxis ubiq; apud nos proueniat.

Ac

Aegilops O. intelligit autem, ni fallor, graminis genus, quod floribus & fructu suo subinde tremulum mouetur: unde & *Sydem* à Germanis quibusdam uocatur. Hanc enim Aegyloper Plinii & Diosc. Tragus appellauit. Nos Matthiolo assensimur Aegyloper ueram esse, quā ipse depingit ac describit, Italis alicubi Squalam uulgò dictam, frequentè inter Hordeum et Zeam. Fit enim Hordei uitio, sicut Lolium Tritici, nimia uligine, aristis longis & capillaceis: Dodonæus Aegilopem aliam facit, similem tamen, ut ex pictura uidetur herbam, aristis breuissimis, & ferè nullis: *Dort* Germanicè dictam: quam libro 2. imaginum pro Lolio pingit: circa finem uerò eius libri, emendans, Aegilopem nuncupat, & pestè fecalis esse dicit hanc herbam, sicut Lolium Tritici pestis est. Eandem herbam Tragus tertio inter Lolia (sic enim appellat omnia frugum uitia, & Germanicè *Dort*) loco describit, & Germanicè *Quecken* nominat, spica multiplici multifariāque diuisa, & ueram Galeni Aegilopem esse putat, ac simul etiam Lolium uerum uel priuatim dictum: eiusq; picturam primo inter alia quæ Lolia uocat loco, exhibet. Ad remedia forte, præsertim extra corpus, Aegilopè pro Lolio ponas, an contra, parum interest. Videtur enim ex æquo fere calefacere utrunq;. Lolium uerum Matthiolum pingit, &c.

Aethiopsis O. R. Ac. C. G. Rurpodius. Dodonæus eandem depingit quam & Matthiolum, nec alibi quàm in hortis apud inferiores Germanos reperiri tradit. Semen è Creta in Italiam allatum audio.

Ag

Ageratum, (uulgò Italis herba lulia, à mense quo florere incipit,) K. C. Ac. G. Hanc aliqui Eupatorium Mesuræ faciunt: alii aliud. Facile crescit, & bene fert hyemem. Anno secundo (ni fallor) caulem & flores fundit, in Germania nusquam sua sponte nata, quod sciam, inuenitur. Omnino cognata est Costo hortenfi siue Mentæ Græcæ uulgò dictæ, odore, sapore, tota specie, sed minor.

Agnum castum, ut uulgò uocant: id est, Viticem, peregrinam Germaniæ arborem, ex semine natum iam biennio fere in horto habet: longitudine supra cubitum, caule quadrangulo, recto, rubente: foliis est quinis, tanquam in digitos digestis ab uno pediculo: qualia fere sunt in Trifolio ceruino aquatico, quod Fuchsius Eupatorium adulterinum uocat. Hyeme in locum hypogæon cum uase deponit. Hoc anno 1559 flores in eā se uisurum sperabat. Idem prouenit Ac. C.

Al

Albutilon Auicennæ O. G. K. C. Theophrasti Althæa uidetur, flore melino: facillime nascitur & mature eadem æstate fructum perficit. Peregrina Germanis, nec nisi in hortis quorundam querenda.

Alcæa G. prouenit ea quidem passim ruri, locis siccis & apricis.

Alcæa peregrina uocari potest, quam pro Hypecoo Matthiolum non rectè pinxit, herba æstiuā est. Aliqui Alcæam seu Maluam Venetam nominant: G. placet florum suorum specie & colore, quodque eos in meridie tantum aperit. Semen tempestiue maturat.

Alcali maritima planta, pinguis, foliis oblongis, carnosiss, teretibus, Hieronymus Massarius, medicus Argentinae in horto alit, aliud quàm Matthiolum

pinxit ac descripsit in Atriplice. Est autem Kali Arabicę lingvę vocabulum, et cum articulo Alcal. Aliqui Anthyllidem secundam Dioscoridis esse putant: quibus con- tradicit Matthiolus. Nascitur Kali etiam in horto K. & sponte ē semine quotan- nis ei propagatur. Vide Anthyllis. Mihi etiam hac ætate prodiit, seminibus ā Mallario communicatis, foliis tres digitos aut quatuor longis, teretibus, n. li ob- staret canaliculus, qui medium folium carinat, albidus & translucidus, sapore Berg- ferē, &c.

Alcali minus, AE.

Alisma (seu Damasonium) bifolium, Ophrys Fuchsi uno alterōve anno in hor- tis durat: sicut & Testiculorum genera quibus cognatum uidetur. Sponte crescit in syluolis, pinguibus & opacis locis. G.

Alismatis species, ut quidam putant, Calceolus diuę uirginis uulgō dictus, ā flo- ris forma, quę ouī testam aliqua ex parte apertam refert, ut de arbuti flore Theo- phrastus scribit. G. AE. diu durat. nititur enim radix multis fibris. Aliqui hanc Lō- chitin primā putant. Nascitur locis montanis apud nos, solo opaco & pingui, ut in Albio monte nostro.

Alismatis pulchra species, flore ferrugineo, (forte luteo,) uulgō *Fravēschüh/K.*

Alisma C. uidetur autem de Alismate Dodonæi sentire: qui Saponariam uulgō dictam, sic nominat. Vide in Saponaria.

Alisma alpinum fortē nominari meretur, herba ā prædictis omnibus diuersa, fo- liis plantaginis, flore Doronici, sternutamenta mouēte, &c. G. *Müerwurk.*

Alliastrum uel Alliaris recentiorum O. G. Exilit sponte locis umbrosis & circa sæpes, foliis uiolę nigrę ferē, &c.

Allium satiuum in hortis olitoriis nullis non halat.

Allium syluestre foliis angustis, floribus puniceis, G.

Allium montanum, Petroscorodon dixeris, G. radice oblonga, &c. in saxis col- lūm circa Badam nostram nascitur, in hortum translatum prouenit mihi quidem, sed non durauit, nec floruit.

Allium syluestre bifolium, quod locis umbrosis & circa sæpes, apud nos copio- sum reperitur. G. *Ramseren* uulgō uocant. Viuax in hortis, ut & alia pleraq; syl- uestria quę bulbos propriē dictos habent. De Scorodopraso leges infra.

Allium alpinum uoco, foliis ferē Ellebori albi, radice lōga, pulcherrimē reticula- ta, &c. Christoph. Piperinus & G. Vulgō *Sigwurz*/id est, Victorię radicem sir- perstitutione quadam nominant. Hoc quanquam non nisi in altissimis alpium iugis inueniatur, facillimē tamen in hortis crescit, & plurimis annis durat: sed raro floret. Mihi quidem toto septennio bis floruit, & semen maturauit. Vide in Gladiolo.

Allium Hispanicum R.

Allium porcinum R.

Allium Vlpicum Lausannæ in horto habui.

Allium ursinum hodie nonnullis dictum (hoc est, Arctoscorodon,) K. *Ram- seren*/quod locis umbrosis circa syluas & sæpes nascitur.

Aloë (Indica herba) C. & O. stirpes tres. Facile crescere audio: (neq; mirum, cum extra terram etiam nuda plurimis annis eduret uiridis & succulenta:) caulem emu- tere tanquam Asphodeli, flores luteos: pangendam esse radicē, uel potius herbam cum radice. Franciscus Follietus etiam Viueaci ad lacum Lemannum, in horto a- lit aut aluit Aloën. Hyeme rigari non debet. In Cypro sub hyemem eruunt eam, & suspendunt: uere iterum plantant. Eadem Venetiis in horto Maphæi floruit.

Alfine, morsus gallinæ uulgō, in omnibus ferē hortis: & passim locis cultis nasci- tur. Differentiæ eius plures sunt: læuem & candidiorem dixerim sceminam: hirsu- tam & nigriorem, marem, &c.

Althæa, bifida, in plerisq; hortis uiuacissima est: magnæ enim eius & glutinosa humore plenæ sunt radices.

Althæa Theoprastrī, Vide Albutilon.

Althæa

Althæa crispa & maior Q. uidetur autē Maluam crispam hortensem intelligere. Alyssos C. intelligit autem puto eam herbam, quæ à Dodonæo Alysson Dioscoridis uocatur: quā aliqui Lunariæ maioris speciem faciunt, propter siliquas fere similes, minores, asperas, &c. quæ in meo etiam hortulo nascitur (uide inter Lunarias) si cut & alia quædam herbula, Alyssos à quibusdam putata, & Rubia syluatica illa, quam Dodonæus Alysson Plinii uocat: & aliis nominibus Asperulam cordialem, Spergulam odoratam, Hepaticam: nostri Waldmeister.

Am

Amara dulcis. Quære inter genera Solani.

Amaracus, ueteribus Græcis tum Sampfuchum, id est, Maio ranam: tum Parthenium significat: utrunque in omnibus ferè hortis frequens. Tonderigaudet Sampfuchum, & faciliè regerminat, etiam ter æstate una. Seritur surculo & semine, præsertim è Gallia Italiæ missò.

Amaracus syluestris, Sampfuchum syluestre, G. Ae. etsi apud nos syluestris non est hæc herba, sed hortensis tantum, maior & ignauior Amaraco simpliciter dicto, cuius ceu nobilioris comparatione syluestris cognominatur à nostris mulierculis. Videtur autem Origano cognata herba. Wilder Waieron.

Amarantus Plinii maior & minor, G. O. R. Köhle/Samat blümen, Gelsiam Galli uocant, Cardanus Italus Galefam.

Amaranti species alia, maxima, oblongis florum paniculis, semine albo. Hæc forte est Pennachia Italica dicta, G. K. Ae. arborecentem aliqui cognominant. Huic simile est Blitum maculosum, foliis, eorumque colore: flore dissimile.

Ambrosia Dioscoridis uera, A. Alia, à quibusdam Ambrosia dicta, Artemisia forsitan species, aliquibus Conyza Hippocratis, K. G. Recentiores aliqui Ambrosiam uocant eam herbam, quam nos Scordium maius Plinii: quæ & ipsa in hortulo nostro uiuet.

Ammi maioribus & serratis foliis, semine Apii, G. perfacile nascitur, & restibilib fecunditate in hortis seipsum propagat.

Ammi uerum, cuius semen aromaticum est, & acre, K.

Ammi Fuchsi, Vu. Ammi Venetiis habent ex Alexandria, nomine Amomi, Aniso simile, Amatus Lusitanus. Prouenit & Patau, ut audio, Ammi uerum ex Aegypto allatum.

Ammeos genera tria, O.

Ammi paruum. Vide Sison.

Amomum, Vu. suspicor autem pro Amomo eum habere genus quoddam Solani, cubitale (aut maius:) quod in Italia quidam Amomum Plinii nominant, mihi quoque hoc anno è semine natum, acinis (ut audio: meum enim nondum adoleuit) rubentibus, Cerasorum instar, flosculis albis, paruis: foliis oblongis: odore & sapore fere & acinis, quos siccos uidi, ac semine Solanorum. Vide inter Solana.

Amomum falsum, Pseudamomum, G. aliqui Piper nominant, (Ruellius etiam pro Pipere deseribit: folio Ribes fruticis.) Nascitur apud nos circa margines fossarum quarundam aquas continentium.

Ampeloprasum, G. non diu durat. Nascitur in uniuerfa Hetruria (inquit Matthiolus) non solum in uinetis, sed etiam frequens admodum in agrorum marginibus, & in amœnis collium locis. Rura nostra ipsum uulgo appellant Porrandello. estur à rusticis in acetariis crudum, recentis Allii uice: quanquam mansu durius, & gustu acrius.

Amygdalus ciuibus quibusdam nostris fructum maturat. Eadem in hortis K. & Lindauæ Matthiæ Curtii egregii mercatoris uiuit, & Vratislauæ Vu. Circa Argentinam complures sunt.

Amygdalus nuces rotundas ferens: & alia Persico insita, Lindauæ in horto Matthiæ Curtii.

Anacampseros, uulgò Faba inuersa, Telephiū quibusdam, G. Bellonio species umbilici Veneris. Sponte etiam locis quibusdam saxosis, circa uites & lacum, non deest nobis.

Anagallis utraq, G.

Anagyris, quæ & Anagyrus & Onogyrus, G. C. AE. Mea hoc anno primū ē semine prognata pedem æquat, amico cuidam meo per annos duos durauit: hyemā me peritū superficiem, quæ uere repullulauit, Basileæ cuidam ciui ad mediocrem proceritatem peruenit, & siliquas maturauit. Eadē uiget in hortis, Rurpodii, A. K. Anno 1552. (inquit Aretius in epistola ad me) cum Valesiam peragrarem, redibam inde domum per montem *Sanctsch*/is Sanenses separatā Valesiis, in eo primū reperi plures eius arbores, partim scapo adhuc pendulo, partim siliquis, nec non (opinor prioris anni) maturo semine. Inde in horto meo alo, sed admodū tardē semen enatum est, nam ante triennium primū apparuit: & iam duos ferē cubitos æquat. Primū iudicabam Laburnum esse: sed rusticiū illi esse purgatorium aebant, uomitum minuscū concitare, & per aluum purgare certo experimento.

Laburnū.

Ligno materies est æterna: nam inde palos, & quicquid diuturnum cupiunt, conficiunt. Cetera etiam quæ de Anagyrī a Dioscoride & Plinio traduntur, cōueniunt: Sicille. Sed Laburnum etiam Anagyris species uidetur esse minor, & eadem ferē omnia præstare. Natales certē in alpibus, materia durissima & palis conueniens, natura apibus inimica, quæ tria nemo Anagyro, quod sciam, Laburno autē attribuit Plinius, hodieq, de hac arbore a rusticis & montium incolis prædicantur, Laburnū hāc arborem esse testantur: quā & Anagyrin alpinam rectē uocari posse, crediderim. Laburnum igitur hanc esse ut primus olim scripsi, ita in sententia persisto, & facili suo loco cuiusdam contra me partim argumenta, partim calumnias dissoluam. Trifolia arbor (inquit Val. Cordus) sentit autem de Laburno nostro, transferretur a quibusdam, propter florum decoram speciem in hortos, præsertim Oeniponti, & Francoforti ad Mœnum fluium sitū.

Anagyris prope Arelaten locis paludosis gignitur, Matthiolo ignota, ut qui pro ea Laburnum duplex ostenderit, ubiuis in montibus nostris frequens. Iac. Dalechampsius in epistola ad me. Ego Anagyrin in hortulo alo, folio foetido & mādenti uscolo: & aliam eius speciem, quam Laburnum existimo, folio non foetente, nec ingrato sapore, sed trifolii pratensis ferē.

Anchusa K. in Gallia Narbonensi & circa Monspelium sponte exeunt Anchusæ quædam, in Germania uix puto.

Androsæmon, ut quidam putant, & Matthiolus pingit, herba Hyperico similis & cognata, passim crescit, at Bellonius Sicilianā uel Cecilianam, Italis uulgò dictā, Androsæmum interpretatur: sponte natum in Ponto sibi uisam scribens. In Italia memini in hortis uidere.

Anemone R. Anemones apud Italos multæ sunt differentiæ: omnes a florum figura & colore laudantur, non ab odore: medicis nullo in usu. Commune autem aliquid uidentur habere pleræq, cum barrachiis hortensibus, florum scilicet speciem. Cum stamina in medio lutea, aut apices saltem, folia latiuscula ambiant: & seminum congeries aspera relinquatur. folia etiam herbæ ferē similia uidentur, in plerisq, speciebus. Flores colore differūt, & quod alii simplices, alii multiplices sint: aliqui bene magni, radix in plerisq, crassa & tuberosa. Hæc ad picturas quas Kentmannus misit in Italia depictas notauit: nam ipsas uiuas nondum uidi. Putārim autem facile in nostro etiam cœlo provenire ac durare posse. Audio & saporem plerisq, acrem esse ut Ranunculis.

Anemones genera semina non proferre (forit in horto Patauino) amicus quidam Patavio ad me scripsit.

Anemonis adnumerāndus uidetur Ranunculus ille phragmites, hoc est, qui passim inter fæpes crescit, radice transuersa, paruus, flore albo, uel roseo: audio & luteo inueniri, Dodonæus quartum hoc Ranunculi generis facit, G. Kentmannus inter

Anem.

Anemonas genus unum flore rubro phragmitis istis, simillimum, depictum nobis communicauit.

Anemone quædam uideri potest etiam illa herba, quam Itali uulgò Pulsatillum nominant; Germani **Ruchenschell**, Matthiolus diuersi omnino generis facit. Donæus Ranunculum secundum, uel herbam Sardoam, C. Christoph. Piperinus, G. nascitur sponte in collibus siccis & apricis: ut ultra Schaphusiam in Rando monte. Heluetii quidam **Bizwurz**/ id est radicem contra morsus uenenatos utilē appellant: & similes ei plantas, quæ in montibus altioribus Valesiæ, alibiq; nascuntur, propter globos cana lanugine insignes, quibus semen subest, **Grawe Bergz mannle**: Græce *ἀνέμων* dixeris: horum alii albo, alii luteo colore inueniuntur.

Anemone montana quædam forsitan & illa fuerit, luteo & in globum collecto flore, quam Aconitis à quibusdam annumerari (immeritò nimirum) suprà diximus, &c. Carer huius flos calyce, ut in plerisq; aliis Anemonis, ni fallor.

Anemone quædam, aut uerius Chamæmalum rubrum. Vide Chamæmalum Eranthemum.

Anemone limonia Theophrasti, Narcissis uulgò dictis cognata uidetur: ea nimirum aut similis, quam nostri Lilia diuæ Virginis uocant: **Unser Frauen Gilgen**. G. Spontenatam inueniri puto in pratis quibusdam montanis. Olim etiā Leontopetalum, aliqui Anemonem uocabant: uide infra.

Anethum G.

Angelica uulgò apud Germanos dicta: Laser Gallicum quibusdam, Silphio ueterum cognata planta. R. G. In hortis diuersis Germaniæ colitur: sed nusquam copiosius & felicius quàm in hortis monachorum quorundam Friburgi. Sponte nascitur in Pomerania, ut audio, & aliis quibusdam oris, Germaniæ aut Scandiæ, non procul Oceano. Seritur hoc modo: Semen per noctem in aqua pura præmaceratum, bono & nigro solo cõmittatur, ita ut digiti crassamento terra occultatur, idq; circa sancti Martini diem, sic satum uerno tempore emicabit apii fatiui similitudine, has plantas in nouilunio Maii mensis euulsas ordine panges, ita ut distent undique pedē aut sesquipedem, sub annum quartum, id est exacto triennio (nā quartum anni æstate caulem, flores & semina producit, & postea lignescit) radicem exemplam lauato aqua pura, & in hypocausto diligenter siccat: secus enim faciliē situm trahit, utpote crassa: & loco siccò reponet: sic diu seruetur.

Angelica aquatica ferulacea herba, hortenli similis, G. circa riuos sponte crescit, & restitibili fecunditate durat.

Anguria uera, O. Cardanus Melopeponem interpretatur. Vide in M.

Anisum G. R.

Anthyllis pulchra & rara, lanuginoso folio, K. Vide Alkali.

Anthirini species quædam, G. floribus aliæ luteis, aliæ albis, rubris, roseis, O. K. AE. Maius & minus, utrumq; flore purpureo. Vu. Quædam istarum apud nos sponte proueniunt.

Anthirinum minus, Germanis **Drant**/O. sed aliud est **Drant** Hieronymi Tragi.

Antoniana, uel S. Antonii herba: aliqui filios ante patrem uocant, alii **Lychnides**. G. Species sunt tres aut quatuor, quarum minor à nostris **Schoßkraut** uocatur: quoniam impetus dolorū, præsertim dentium, sedare creditur, alia maior est, hirsuta herba, alba, & inuentu rarior & rursus alia maior, læuis ut etiam reliquæ, leuiter odorata. His similis est maxima, non omnino tamen eiusdem generis, foliis Rododaphnen referens, &c. Omnes apud nos ad riuorum aut fossarum aquas continentium, margines crescunt, omnes etiam in hortis faciliē: sed cæteræ breuius, maxima diutissimè durat, & longo quotannis tempore perpulchrè floret. G.

Antora, uel herba trinitatis, AE. Lege inter Violas. Italianam trinitatis herbam uocant, quam alii Hepaticam nobilem, à folio trifido. Antora etiam,

uel potius Antitōra, uera, diuersa est herba, quæ in alpibus Sabaudia Italiaeque fodiunt Aconitis cognata, radicibus bulbosis, aut exiguum Naporum specie, amaris: flore Aconiti Lycoctoni specie & figura, colore etiam luteo, foliis minoribus & minutius sectis. pingit eam Matthiolus Antore & Napelli Moyfi nomine. Vide superius inter Aconita.

Ap.

Aphaca, quare in Vicia.

Apios uera, folio rutæ, AE.

Apium commune, uel mas. Plinii, ut quidam conficiunt, quod uulgo non recte Petroselinum uocant, uix ulli usquam horto deest.

Apium etiam communis uitium, quod a nitore Glyssen appellant nostri, uulgarius est areis hortorum, quam olitores uellent: cum & inutilis herba, & foetida sit, & forte non sine ueneno, quo ad Cicutam, accedere uidetur.

Apium palustre, circa paludes maritimas Monspelii alibi que frequens: pharmaco potius hactenus simpliciter pro Apio in usu fuit: eo que in hortos translatum nusquam deest, & restibili fecunditate seipsum multiplicat. Hoc aliqui apium foeminam Plinii esse putant.

Apium montanum, id est, Oreoselinum, petroselino uulgari persimile specie faporeque, nascitur in colle primo iuxta Rhenum, horæ ferè supra Basileam itinere ad sinistram, superficie simillimum illi quam uocant Ceruariam radicem nigram Germani: (quam, si libet, Oreoselinum nigrum uocemus, donec antiquum eius nomen reuocetur) sed hæc lacte caret, Oreoselinum lacteo liquore manat. Nascitur inter collem quem dixi, & Rhenum, in radice collis ad uiam. Reperi & alibi locis asperis, lapidosis, montanis, apricis: non multis tamen. Hoc nondum in hortum transiit.

Apium montani genus aliud amarum, ex Legerio monte ad Badam nostram, G. A. Radix una multis annis durat, Ad remedia quidem, & pro Oreoselino ueterum, prædicto uti malim.

Oreoselina duo priora, enopa, quod liquore resinoso imbuta sint: hoc anopum, quod eodem careat, si libet, nuncupemus: sicut ἐγχυλον & ἀγχυλον Græci dicunt: et si ἐννοπον & ἀννοπον in usu non sunt.

Apocynum, K. Vide in Asclepiade.

Apocynum Itali Lupinum caninum uocant, & Hispani similiter sua lingua, ut scribit Amatus Lusitanus: sed uir quidam eruditus Apocyni semina in Italia non reperiri ad me scripsit.

Aq.

Aquifolium R. Illic aquifoliae genus intelligo, quod nostri Palmam aculeatam uocant, *Stechender palmen*. Ea passim nobis in syluis nascitur, fruticosa plerumque, aliquando arborecens, margine folii spinoso. Est & alia species læui folio, extremitate solum acuminata: procerior, siue natura, siue cultu, aut temporis diuturnitate. Hanc in cœnobiiis aliquot uidi: Lutecia ad D. Genouefam: & Basileæ in suburbio D. Ioannis, &c. iuxta arboris magnitudine. Extat etiam Curia in cœnobio quod fuit Dominicanorum, pedes alta circiter triginta: trunco ad medium arboris uel ultra, tereti, enodi, planeque læui: crassamento trium dodrantum. Hoc etiam genus syluestre non procul Lucerna apud nos reperiri audio.

Aquileia uulgo dicta, fortè quasi Aquilina, a floribus in mucrones aduncos, quales aquilini ungues sunt exeuntibus. Sponte hæc nascitur in collibus apricis, flore cœruleo, & species alia spadiceo colore. Inde in hortos translata, multiplici flore passim a mulierculis aluntur: & insuper tertia flore albo, quam syluestrem nondum uidimus. In montibus altis memini speciem unam flore duplo maiore reperisse. G. Vu. De hac sensi se Columellam suspicor in Horto, — & hiantes seua leonis Ora. feri Græcè Leontostomium dixeris. In Italia, ni fallor, alicubi hodieque quadam cum hiantem Leonis rictu similitudine denominant.

Arachis,

Ar.

Arachus. Vide in Vicia.

Aralda. Quare Digitalis.

Arbor ludæ, C.K. Galli Gueynier appellant, uel Geinier. Pingitur hæc a Dodonæo. Videtur autem (inquit is) uel Laburnum, uel eius species. Sunt qui sentiant Theophrasti Colyteam esse. sic ille. Ego quanquam siliquata hæc arbor est, Laburno tamen Colytea plurimum differre censeo, an uero sit Cercis Theophrasti, considerandū. Sponte provenit, ut audio, in Gallia Narbonensi, & circa Montepeliū, siliqua punicea, folio ferè Populi. Mihi etiā hoc anno è semine prognata est. Eadem est fortè de qua Ruellius scribit his uerbis: Ostenditur apud nos in cortibus arbor Sycomori (ut aiunt) nomine, frondosa, Moro nō dissimilis, conspectu, folio, magnitudine, sed neq; germinibus, neq; ramis quicquā provenire deprehendimus: nili quippiam ineunte uere cum parturit, ueluti nucamentum prælongum. Fructum foliacea siliqua, inflexu ferè falcato, gerit. Sed scalpitu uulnerata nihil remittit lactis, cum uera Sycomorus estate multa lactea scateat salua, Sic ille. Sed hæc fortè, ut quidam putant, Aceris species est, Arbor ludæ, ni fallor, plerumq; siliquas rectas fert, non falcatas: nec nucamentum, sed, ut Dodonæus pingit, florem quasi leguminis, uel ut Anagyris, quam obrem accuratius hæc perpendent, qui arbores istas Lutecia uiderint. Carolus Stephanus in Seminario suo: Visa est (inquit) nobis Sycomorus Parisiis in horto Gotofredi cuiusdam pharmacopolæ, diligentissimi herbarum & arborum, quæ apud nos rariores sunt, indagatoris & cultoris. Sed forsan hic etiam non de uera (quæ Hierosolymis uulgò ficus Pharaonis appellatur) sed uulgò illie dicta Sycomoro loquitur. Aliam Itali uulgò Sycomorum uocant: de qua dicemus infra in Azadaracht. Arbor ludæ, Cucuruaia in Observationibus Bellonii. Ceratia sylvestris quibusdam hodie. Gaynera (Gainier uel Guainier) Gallis, à similitudine uaginae. Carobaria Italis, quanquam idem nomen puto Ceratoniis magis propriè tribuunt. Nascitur circa Bononiam copiosè: floribus rubris, ut audio, pulcherrimis. Semina eius uix maturescunt. Videtur autem Cercis Theophrasti esse. Arbuscula sylvestris Cerasi foliis, fructu uirgæ sanguineæ ferè: floribus multis, oblongo ceu racemo dependentibus, foliis ferè Persici foliorum sapor est. G. nomine ne Germanico quidem nota uulgò, quanquam non procul urbe nostra iuxta Silura torrentem & ad sæpes aliquas proveniat, sui omnino generis. Arborem uitæ à quibusdam uocari, Lutecia reuertens nuper amicus quidam mihi retulit: cuius ramulū ostendebat, ex America translata dicens: & in horto quodam Lutecia à Petro Bellonio sibi demonstratam, quatuor cubitorum longitudine. Sabinæ genus, quā quidā Bruton esse uolunt, simillima Cupresso: sed hæc fert dissimilem, odoratam tamen ac nigriorem, folia saluam olent, &c. Meminit Cardanus lib. 6. de uarietate.

Arbutus C. frutex qui fructus fragis simillimos producit, sylvestris in Germania nullus: syluis Gallia Narbonensis & Italiae familiaris.

Argemone altera, uulgò Potentilla, *Genferich*/G. Sponte passim obuia est.

Argentaria petraea, è saxis uel locis saxosis montium nostrorum in hortu translata, quouis loco facillimè diutissimeq; uiuet. Videtur autem species herbe Stellæ à quibusdam dictæ ob radiatam foliorum speciem, *Bergsinnaw*/Steinsinnaw/color foliorum argenteus est, corymbi flosculorum lutei. G.

Arisari duæ species, K. Hocaliqui Aron minus uocant.

Aristolochia diuersæ sunt. Rotunda, A. Longa & rotunda, K. R.C. Vu. & Leuschnerus. Pistolochia C.D. Nascuntur tres istæ species in Gallia Narbonensi incultæ: Germanis omnes, ni fallor, peregrinae. ego omnium semina aliquoties frustra seui. Clematiti tantum in hortis nostris uisitur: quæ & sua sponte, ut audio, nascitur in uineis Alsatiæ: ubi longa etiam an reperiatur inquirendum est.

Kk

Aristolochia rotundæ vulgaris, (quam uulgò radicem cauam nuncupant, *Hol-
vurg*: quamuis & altera eius species solida reperitur) genus unum flore purpu-
reo alterum albo, G. Faciunt hanc aliqui *Capnium*, id est *Fumariam phragmiten*
Aetii: & alteram quoque eius speciem ostendunt radice oblonga, quæ *Capnus* uel
Pedes gallinacei Plinii sit.

Aron uel *Arum*, G. R. nascitur passim locis umbrosis & pinguibus, ut circa fæ-
pes. Maius & minus, O. Vide *Arisarum*.

Aron palustre, C. est autem opinor, *Diacunculus* Plinii tertius à *Fuchio* exhibi-
tus.

Aron Aegyptium eruditiores quidam, ut *Guilandinus* & *Maranta*, esse doc-
cent; quod aliqui nuper pro *Colocalia* habuerunt. Hæc in *Aegypto*, nec non in
Sicilia (ut audio, inquit *Maranta*) perfectissimè crescit. in Italia uerò neq; semen, ne-
que florem, neq; etiam caulem unquam (quamuis diuersis locis consita à multis sit)
uel certè rarò proferre est uisa. est autem omnino species *Ari*, quòd ex foliis constat,
& (magis) flore: qui præter magnitudinem, nullam ab *Ari* flore dissimilitudinem
habet. Hæc ille. *Dioscorides* *Aron*, à *Cypriis* *Colocation* dici tradit. Hanc
plantam *Augustæ* dum hæc conderemus, amplissimus uir *Valericus Fuggerus* in
magnifico horto suo *Augustæ* habebat. Facile quidem è semine prouenire aiunt.
Matthiolus, qui hanc sabam *Aegyptiam* existimauit, facile (inquit) in quibusdam
hortis *Venetis* & *Neapoli* crescit, quamuis non in aqua.

Artemisia G. Species eius duæ, F. Passim apud nos in agris (in aquosis, in-
cultis asperisque locis, ut *Fuchius* scribit) *Artemisia* nascitur, frutice una candido:
altera rubicundo, quæ à medicis præfertur. Vide supra in *Ambrosia*, & infra in
Erigeronte foetido. His diebus uidi matronam quandam carbones circa radicem
Artemisiae legere, pridie festi diui *Ioannis* in ipso undecimæ horæ signo, in meri-
die: prius enim & posterius nullos aut minutissimos reperiri aiebat, comitialis
morbi amuletum. Superstitio.

Artemisia Leptophyllos quædam, circa *Basileam* sponte nascens, G.

Arthritica, *Primula ueris*, herba ad *Paralyfin*, herba *Petri Nicolao Myrepto*,
Schlüsselblümle uulgò. Species eius diuersæ in horto nostri proueniunt. Vna,
quæ in fine hyemis erumpit, pallidior, minus odorata, alia uerò, magis colorata &
odoratior, quæ uerè floret. huius etiam genus *dasypodium*, seu densi folium habeo,
quod semen non fert. Vtraque in pratis humidis circa urbem nostram abundat, &
diu in hortis manet. Minor uerò illa quæ cæruleis flosculis in pratis multò humi-
dioribus reperitur, breui in hortis euanescit. *Arthriticam* aliqui *Verbasculum* o-
doratum uocant, nescio quam rectè. Genus eius odoratum flore multiplici & flo-
re uirenti C. alit. Circa *Curiam Rhetorum* nascitur species peculiaris, flore singu-
lari, non in corymbis: quæ Ioan. *Fabricius Ecclesiae* illic minister doctissimus ad
me misit cū aliis plantis multis & raris.

Arthritice præterea genus est alpinum, quod *Sabaudi* quidam *Lunariam* no-
minant: nostris à rupibus flores petreos, *Schlüsselblümle* / suauiissimi odoris, & uiuacissi-
mum in hortis, aliqui hanc *Saniculam alpinam*, alii *Auriculam ursi* nominant. Eius-
dem species alia, minor, floribus purpureis, altius in alpis nascitur: eam hoc anno
plantavi, ut quantum duret experiar. conficio autem minus duraturam, utpote al-
tiori cælo assuetam. Inueniuntur & alia florum in montibus differentia. *Arthriti-
cae* alpinae stirpes floribus diuersis, A. candidis, pallidis, rubeis, luteis, aurei co-
loris, cæruleis, diuersi coloris, guttatis, fuscis seu cinereis, *Christoph Piperinus*.
Vidi huius generis flores etiam albos (inquit *Aretius* in epistola ad me) & aequali
diluти coloris, sanguineos: in luteis magna est differentia, prout magis soli expositi
sunt, uel à niue conteguntur.

Arūdo (uel *Harūdo*) magna textoribus expetita, A. Radix una (inquit) ad me mis-
sa,

sa, diffundit se in multiplices arundines. Laufanne alibi in hortis Sabaudia co-
litur: gemmis seu tuberculis radicum auullis plantari solet.

Arundo alia in aquaticis tantum nascitur, ut Donax: sed multum praefertur quae
in siccis prouenerit, Plinius. Lege Canna.

Arundo humilis, Vide Copia.

As.

Asarum uiuacissimum est in hortis, G. Sponte prouenit in locis quibusdam opa-
cis, in collibus non procul Basilea, & supra Tigurinum lacum, non procul Limago
fluuiio, alibi. Speciem eius diuersam, maiorem (si bene memini) circa Eremum
duae Virginis in agro Suitensium reperiri aiunt quidam, nescio quam uere.

Asclepias, id est, Hirundinaria uulgo dicta, ut plerique existimant, R. G. C. Lo-
cis asperis, circa pedes montium praefertim, sponte abundat. Cognata herba apoc-
yno: hoc aliqui in Italia colunt, ex Aegypto (ubi hodieq; Amphocynon uocant) al-
latum, siliquis, & in eis lanugine, perlimile Hirundinariae, rotundioribus foliis.

Ascyroides, Androsæmon maius, G. Collibus & pratis sua sponte familiare,
siccioribus praefertim: uel, ut Dodonæus scribit, locis asperis, circa saepes & syluas.

Aspalathus, Aretio ex enatis è femine plantis duabus, una in horto relicta, hye-
me perit; altera in hypogeo seruata est, & postea floruit. In Gallia Narbonensi spō
te nascitur. Matthioli hunc fruncem pro Acacia secunda pinxit: sed uidetur po-
tius Aspalathus secundus, ut doctissimus Maranta monet. Passim (inquit) Neapoli
& Puteolis uisitur ueris initio luteum florem genistae similem proferre, siliquis pi-
lulis aurei coloris, splendentibus. & uulgo quidem Spalatrone dicitur, sicut & in
Graecia hodieq; Spalatro.

Asparagus G. R. Maior & minor, O.

Asphodelus, Hastula regia, herba Germaniae peregrina, R. Vu. G. Satus à me,
aliquot tantum folia emisit intra biennium: nunc tertio anno quamuis multa folia
habeat, caulem nondum ostendit. Occulit se aliquando, sub Cane praefertim, ut in-
terisse uideatur. Vide supra in Acantho. Asphodeli floribus diuersi: albus & lu-
teus: luteus, in horto Zuvingeri Basileae. O. K. C. Asphodelus annuus, C. As-
phodeli omnes proprie dicti Germaniae haecenus peregrini fuerunt, in Prouincia
Galliae, & Italia sua sponte abundant.

Asphodelus foemina C. Hunc esse puto quem Dodonæus pingit, radice una,
bulbosa, &c. qui forte Bulbus potius fuerit.

Asphodeli species (ni fallor) duae peregrinae, foliis diuersis, multis similiter ab
una radice: quae in una specie lutea & oblonga est, in altera breuior, fibrata inferius,
&c. G.

Asplenus, Ceterach uulgo, K. G. A. K. AE. & Rurpodius. Duobus aut tri-
bus annis in horto mihi durauit, in muri fissura plantatum. Sponte in Sabaudia na-
scens uidetur reperitur & in Vallesia non procul Seduno: & ut audio, alicubi ad Rhe-
num Germaniae flumen, in montibus & muris pagorum.

Aster Atticus uerus, flore luteo, foliis circa ipsum in aculeos exeuntibus, Vu.
Monspelii sponte natus abundat.

Aster Atticus, (Fuchsi nimirum,) AE. Nascitur passim locis siccis, asperis, &
apricis.

Astragalus duplex, AE.

Astrantia uulgo dicta, uel imperatoria, Astreng/Weisterwurz. Lasepitium
Gallicum quibusdam, G. Viuacissima in hortis: in alpium nostrorum atris & pra-
ruptis locis spontanea.

Astrantia nigra uulgo dicta, Schwarz Astreng oder Wüsterwurz. radice ni-
gra, Astracie simpliciter dictae cognata figura & liquore luteo G. Fuchsius Sanicu-
lam foem. facit, quod non laudo. In montibus sponte prouenit: in hortis bene durat.
Dodonæus hunc uerum Elleborum nigrum Dioscoridis esse putat: sed fallitur.

K k ij

Atractylis media, K. Cardui quoddam genus collibus siccis & apricis apud nos nascitur, quod multi Atractylidem putarunt. ea pingitur à Fuchfio: qui etiam Carduum benedictum uulgo nominatum, Atractylidem hirsutiorē appellat.

Atriplex alba & rubra, G.

Atriplex sylvestris exilit apud nos passim ad uías et parietes. sicut Basileæ alibiq; etiam altera species impudico uel putris gari odore insignis, Garofmen dixeris.

Auellanæ, id est, Coryli fructus. sylvestres in saporibus & syluis præsertim humidioribus locis, copiose nobis nascuntur: minores, albiore, rotundioresq;. Urbanæ oblongæ & rubicundæ sunt. Lombardicæ aliqui cognominant, G. Vu. Urbanas & rotundas etiam satis magnas in Sabaudia uidi, ut Laufannæ, in arboribus etiam proceris nascentes. Circa Lugdunum hoc genus abundat, fructu duplo ad sylvestrem. Coryli urbani atque scenis opere topiario texendis, & in altum etiam eleuandis conueniunt: tales in Gallia, Biturigibus præcipuè, construunt. Corylus Macedonica describitur à Cordo, cuius nuces in grandem racemum congerantur.

Az.

Azadaracht Auicennæ, Ae. C. Meminit arboris hoc nomine Auicenna lib. tract. .cap. 17. & rursus cap. 750. ubi Zerindaracht nominat: ab aliis arborem Myrobalanorum uocari scribit: eamque magnam esse: fructum uenenosum esse suspicatur, similem Nabach: in Syria Nabach uel Alnabac uocatur fructus magnitudine Sebesten, uel paulo minor: sapore pontico, dulci, ut tradit Bellunenſis. Hanc arborem hodie in multis Italiæ hortis, Monachi præsertim ferunt & falsò Sycomorum nominant, ut Bellunenſis docet. Porro Sedar Arabicè Lotus arbor est, apud Serapionem, Auicennam & Rasim, cuius fructum Nabach appellant, ut Monachi Mesuæi interpretes coniiciunt. adduntque sibi uideri eam arborem esse, quæ aliter Faba Græca, uel (ut Seruius habet) Syriaca dicatur, uulgo autem Romæ Pulsaraca, quasi Puls Syriaca, uel (ut Hermolaus docet) Bacca Syriaca, in Sicilia uerò Faba inuersa. Ergo si Zedar Lotus est, Azadaracht autem similem ei fructum habet, sic fortè dicta fuerit quasi Zedaracht, i. Zedarago, uel Lotaster. Loti quidē arbores diuersæ sunt, &c. Azadaracht arborem Bellonius Siciliam nominat, quod mireris, cum baccas, non siliquas ferat. Lignum in eius fructu durissimum est, sexangulum (si bene memini) ut Myrobalani Belliricæ, in eo semina aliquot continentur. Eruditi quidam Sebastum, seu Myxum albam nuncupant: alii, ut audio, Laurum Græcam Plinii. Hæc & mihi & A. è semine prodit: sed meam iam dodrantalem, Sphondylierosam radice, perdidit. Argentine in Obrechtii medici horto duos aut tres pedes longam uidi. Hyeme reponi debet sub tectum. Bellonii cura Luteciæ, aliquot huius arboris plantæ spectari nuper ceperunt Germanicè, si libet, appelletur, *ein Pater noster baum*: quoniam & multi erculæ in Italia sic nominant, eò quod ossa fructuum ad preces numerandas filo trahantur. Alia est quæ in Galliæ hortis uulgo Sycomorus dicitur: de qua diximus supra in arbore ludæ.

Ba.

Baccharis Monspeliî existimata falsò, A. Est autem Conyzis cognata herba. Primo anno (inquit A) diffunditur in folia: altero demum caulem & flores profert. inde tota planta perit, hyemem facillè fert. Folium Verbasci habet, multis adnatis et appendicibus. Caulis est cubitalis. Floribus & radice, immò undiq; odorata est.

Balsamine uulgo dicta, peregrina planta, & nuper cognita, nescio undè allata primùm: foliis oblongis, Salicis fere, simplicibus, crenatis, herbæ Noli me tangere cognata, ut suspicor. Hanc nuper Basileæ & Argentine luti initio in hortis aliquot pulchre florentem uidi. flore rubro in calcar fere desinente. Aliqui Balsaminū hanc genere neutro uocant: & foeminam cognominant, ut eam quæ sequitur, marem: quod non admodum probo, cum toto genere differant. Hoc anno mihi etiam copiose nascitur. Herba est annua, succi plena, & facillime prouenit.

Balsa-

Balsamine alia, quæ Garancia quasi Charancia, uulgò Gallis dicitur, ab aliis mirabile Pomum, Hierosolymitanum Hetruseis, Italis Viscella, Momordica, Garanza, foliis Bryoniae, pomo flauescente, amplexicaule, &c. C. G. sed difficulter nobis prouenit, & uix maturefcit. Balsamine utraq; Basileæ in horto Cælii Curionis pereleganti & benè instructo. Balsamine quomodo colenda sit, leges infra in epistola Massarii ad me. Fert poma admodum egregia & uisum oblectantia: quæ dum matura sunt, sese miraculo quodam naturæ aperiunt: ostenduntq; semina, ueluti preciosissimis quibusdam smaragdis similia. Carolus Stephanus.

Barba caprina ab Hieron. Trago dicta, G. frutex (uel potius herba fruticosa) æstiuus: hyeme enim superficiem amittit, radice magna, ualida, annis quàm plurimis durat in hortulo meo. Luxuriatur in syluis nostris passim. Vide in Christophoriana. Tragus etiam Vlmariam quorundam Barbam capræ nominat. Alia est Barba caprina minor inferioribus Germanis, nempe Saxifraga lutea aliorum. hanc enim (Christophorianam dico) Barbam cap. maiorem, & Reginam prati uocitant.

Barba hircina. Vide Tragopogon.

Barba Iouis Plinii, G. arbuscula Terebintho cognata. Sponte circa Verbanum nascitur, coriariis in usu, fortè Coccygia Theophr.

S. Barbaræ herba, Carpentaria Gallis uulgò dicta, aliquibus Scopa regia, nostris **RäbErsich**. G. Crescit quidem & sponte sua inter uineas, & locis arenosis circa aquas.

Basilicum. Lege Ocimum.

Batis quære Crithmus.

Be.

Been album O. nimirum Polemonium nostrum intelligens, quod passim apud nos nascitur. Lege Ocimoides.

Been rubrum, herba maritima, Limonio seu Bistorte cognata, G. iam quinto aut sexto anno in horto meo durant plantæ duæ è semine natae, sed neutra in caulè exiit, nec florem edidit: maris fortè afflatum desiderant. Haud scio idè ne hoc aliud Been rubrum O. in horto sibi natum intelligat. Vide Ocimoides.

Belle uidere. (Bel uedere) uulgò Italis dicta herba, quod bellè densissimeq; fructet, uireatq; per æstatem, non solum in hortis & uiridariis sata, sed etiam in fictilibus, ornandi fenestras gratia, ut scribit Matthiolus. Aliqui Scopariam uocant, (aliis herbam studioforum) & Oxyrin esse existimant: sed obstat illis multitudo foliorum: & quod amara non sit. Oxyridi enim amaritudinem tribuit Galenus, &c. G. Germani inferiores quidam Campanulam cœruleam (de qua infra) Belle uidere nuncupant.

Bellis (Consolida recentioribus, nimis communi nomine) syluestris: maior, quæ in pratis emicat: media, circa syluas, cæteris rarior: minor, in collibus & alibi passim. Eadem minor in hortis colitur floribus multipliciter densis, albis, uel rubris, uel mixti coloris, G.

Benedicta. Quære Geum.

Berberis G. R. **Erbfelen**. Passim circa syluas nostras abundat.

Betæ quatuor species, nimirum alba, nigra, seu rubra duplex & flaua: qui colores ad radices præcipue pertinent. O. G. **Roter/weißer/vnnd gälber Wansgolt/vnnd Beyercher rüble/oder rote Salatwurzgen**. Postremam hanc Seutlostaphylinum dixerim. **Rübenmangolt**. In Syriæ hortis appellatur Suandar: & ab Ebenbitar numeratur in specieraporum, &c. Eadem, sicut relatum est à fide dignis, oritur in Macedonia circa ciuitates Durachii & Alexii, in locis campestribus, &c. Bellunensis in glossis Auicennæ in Sicilia nigrae mentionem facit.

Betonica, quæ sponte circa syluas uiret, in hortis etiam benè durat. G.

Betonica Aeginetæ, secundum Guil. Turnerum. Locis ferè cultis, ut arcis hortorum, sponte prouenit, pulegio similis, sed insipida & inodora, G.

Kk ii

Betonica diuersi generis, cuius flores ab odore uulgò Cariophyllos nominant. Vetonica nomine dicitur in V.

Bl.

Blattaria cum Verbascis est.

Blitum syluestre & satium, utrumq; tum album tum rubrum.

Blitum maculosum, foliis ceu Amaranti maioris, C. G.

Blitum peregrinum Corchoro cognatum dixerim. Sunt qui Theombrotium Plinii uocent.

Bliti syluestris alia species, foliis subrotundis, in summo retusis, Corchorus forte, G. Hoc etiam sua sponte locis cultis apud nos inuenitur.

Blitum Indicum uel Topiarium. Nuper ex Indiis allata est planta, cui à similitudine foliorum Blitum Topiarium nomen imposuimus. Nullo enim nomine eam accepimus. Habet hæc folia Betæ, siue, quod idem est, Bliti, (confundunt) sed ualde rubentia, planè ut Beta rubra. Caulès emittit plures, pollicis crassitudine, teretes, cocci seu rubro colore, quindecim aut amplius cubitorum longitudine, ut in nostro Ara cœli conuentu uidimus. Semen producit in racemulis Coriandro noto simile, obnigrum, &c. Sapore & odore etiam æmulatur Blitum, Monachi Romani interpretes Mesuæi.

Bo.

Borrage floribus cœruleis nusquam deest in hortis, R. etiam albis floribus habetur; quam ego quoq; Argentina uidisse memini.

Botrys, quæ semine maturo ferè myrrham redolet, R. G. facillimè crescit, & resti bili fœcunditate seipsam profeminat.

Br.

Brassica candida, rubra, crispa, capitata, G.

Brassica marina, uulgò Soldanella, K. O. A. G. hyemem apud nos asperiores nò bene fert: duum aut trium annorum in meo horto plantę nondum floruerunt. Hyeme fere perit, nisi in uasis seruetur. Nascitur in litore maris, tum mediterranei, tum Oceani, in ora Selandiæ & Flandriæ abundè. *Deerwinde*: maritima, non marina.

Brassicarum differentię nobis notę sunt hæc: Alba, nigra, crispa, thyrsuta, & rubra, quæ non multum differt à nigra, ita ut sæpius una in alteram mutetur, quod olitores testantur. Item capitata. Et genus quod è Syria defertur, Canabit seu Canauit uulgò dictum, à Pandectario Caulis imperialis, Monachi Romani in Mesuen. Puto autem eos Thyrsutam (sic ipsi loquuntur) appellare, genus illud cuius meminit Matthiolus tanquam ueteribus ignoti, cuius caulis (inquit) rapi in morem extuberrat, manditurq; subinde medulla, pingui iure incocta, Raporum modo. Sed nec illius, inquit, uidentur meminisse ueteres quæ foliis admodum per ambitum laciniatis minutimq; intercisus assurgit. Caulorapum uidimus, hoc est Cinnum duplicis naturæ, ex caule, id est Brassica & Rapo. Sed Brassicę radix sub terra condita fuit: Rapum supra terram in stipite turgescibat, Scaliger. Brassica hortensis ubi nam sponte nascatur, nescio. ea quidem quæ à medicis dicitur syluestris, succum asperum habet & aluum purgat, ut scribit Theophrastus. Marina etiam toto genere differt, nec aliud quàm nomen commune habet.

Britannica. Vide in Cochlearia.

Bryonia. Quære Vitis alba.

Bulborach. Quære Lanaria.

Buglossus minor, uel communis: & Italica, uel Gallica, maior, R. G. Ae.

Buglossus uera, O.

Bulbine, flore cœruleo, pulchro: *Blawe Meien ryfle*/G. K. Aliqui Hyacinthis adnumerant, ut Tragus Hyacinthum uernum exiguum nominans.

Bulbocastani è Chio radicem misit ad me Patauio Melchior Guilandinus: quæ cum terræ mandata à me folia pauca, exilia & multifida ostendisset, paulò post interiiit. Vide Bunium.

Bulbus

Bulbus, F.

Bulbus sylvestris quidam, bifolius, cœruleis flosculis, Hyacinthi species, ut multiplicant, G. Alius bifolius, flosculis luteis, stellatis, radice grata & suavi, nascitur circa Kiburgum arcem agri Tigurini, G. Vterq; æstate se occultat.

Bunium Dodonæi, uerius Bulbocastanum, de quo proxime diximus, C. Crescit multis in locis Hollandiæ & Selandiæ inter segetes, & iuxta uias. Abundat etiam Anglis. Brabanti quidam in hortis colunt, Dodonæus. Mihi etiam iam per duos aut tres annos in horto floruit, incognitum, donec forte erutam radicem globosam uidi. Nunc mediâ æstate latet, tanquam interierit.

Buphthalmus uera flore ut Bellis maior, sed toto semine peramaro, G. Eiusdem altera species, flore partim candido, partim luteo, nullo alio discrimine, G. Vtri- usq; semina Monspelio accepimus, ubi sponte proueniunt. Herbae sunt annuæ. Do- donæus non recte Buphthalmum facit herbam illam, qua pro Elleboro nigro qui- dam utitur, C. G. Vide infra in Elleboro nigro, Chrysanthemum Dioscoridis ean- dem esse Buphthalmo demonstrabimus infra.

Bupleurum Dodonæi utrūque, C. Maius quod aliqui Elaphobosum faciunt, Galli uulgò Gratiam Dei uocant, & minus, magnitudine tantum (ni fallor) diffe-rens. Maius circa Basileam sponte nascitur.

Bursa pastoris, *Teschelkraut*, maior & minor, adeò ubiq; abundant & calcan- tur, ut in horto ferere nemo dignetur. Vide Thlaspi.

Buxus in plerisque lautioribus hortis alitur: tonderi ac topiario operi facilis, & perpetua uiriditate amœna, sylvestris in Sabaudia passim ad uias et sæpes occurrit, Ca.

Cachrys, K. Intelligit autem puto Libanotidis speciem, cuius semen ueteres Ca- chryn appellabant.

Calamintha montana, O. G. Hæc cæteris acrior, collibus saxosis & apricis pro- uenit. In hortulo meo iuxta murum plantata uersus meridiem commodè crescit: ad tres annos durare puto.

Calamintha Italica Pulegiodore, acris. Patauii sponte nascentem uidi, foliis subrotundis pilosis modicè & leuiter crenatis, mollibus.

Calamintha aruenis enoualibus, G.

Calamintha fluuiialis, rara, G. Circa Silum torrentem nostrum uno tantum loco inuenta.

Calaminthæ species, ut quidam putant, herba Catii uulgò dicta, Italici alicubi Ne- pera, G. Ad tria uel quatuor miliaria supra Argentinam, locis incultis crescit.

Calathianæ uiolæ autumnales, duorum aut trium generum in pratis montium: cultum detrectare mihi uidentur. Ex his quæ amaræ sunt & humidioribus pratis exeunt, ad Gentianæ genus pertinent, una profundioribus radiculis, cœrulei colo- ris saturati flore. alia minor undiquaque, flore nonnihil dilutior est: radice inutili. Tertia etiam inutili radice, calathis florum puniceis, multis confectisq; ad uias in collibus asperis exilit, subacris, &c.

Calathiana uerna dici potest uiolæ genus, quod equinum cognominant Sueui, Hippion Cordi. In pratis humidis nascitur, herba annua ut puto. In hortis non faci- le nascitur aut durat. Cum cespite plantata uere per æstatem forte durabit, G. Vide in Gentiana, potest autem Gentianula dulcis uocari.

Calendula uulgò dicta flore simplici, & alia multiplici, G. Caltha hortensis. Cir- ca Monspelium suæ spontis.

Caltha Africana. Vide flos Indicus.

Caltha palustris, ut sic appellem quæ a nostris *Wosblumen*, id est, Flos palu- stris dicitur, floribus densis, G. Palustribus quidem locis simplici flore nascitur: aliqui Ferrariam uocant, forte quòd folium ferream equi solem uideatur referre.

Caltha alpina uocatur, herba radice acris & aromatica, flore Calthæ aureo, ster- nutamenta ciente, foliis Plantaginis. Nascitur in summis montium pratis copiose. Aliqui Doronicis non recte adnumerant. *Wüsterwurz* Kk iiii

Campana Lazura Italica dicta. Vide Conuoluulus cœruleus.

Campanula cœrulea C. sic autem uocat Rapi syluestris, quod Rapunculum uulgo dicunt, speciem minorem, eamque in alias duas species subdiuidit, unam hortensem, quam aliqui Belle uidere nominant; aliam agrestem, iuxta sepes & in marginibus agrorum nascentem.

Canna Indica, Basileæ in horto Theodori Zuuinggeri medici, mihi fata non prouenit.

Capnus Plinii C. ea nimirum quam Dodonæus pingit libro 1. Iconum suarum pag. 21. mihi adhuc incognita. Vide Fumaria.

Capparis, Rurpodius.

Caprifolium. Vide Peridymenum.

Capficum. Lege Piper.

Caput monachi in Gallia dictum: quod Fuchsius & alii Solanum ueliscarium peregrinum uocant, G. mihi Solani genus non uidetur, cum acinos nullos gerat, nam Acinos ferè Solani generibus commune esse puto.

Cardamomum Arabicum. Lege Piper.

Cardopatium uulgo dictum (uel Carlina) nonnullis herbariis, genus est Cardui, qui & sponte in montibus collibusque nostris prouenit. *Eberwurz*, G. R. Eius differentia quædam sunt: à magnitudine, & floris colore, in aliis albo, aliis purpureo. Item caule, quo alia carent, alia habent. Ex his Chamæleo albus uidetur, cui flos purpureus, caulis nullus. Silybus uero cui latior albiorque spina (seu flos spinosus) est: isque rursus uel cum caule, uel sine caule. In Baldo monte Italiae flore maximo pilei instar nasci audio. Ex eodem genere esse audio Ixinen spinam, quæ maxime in radice fundat, Hispanis cognitam, *Spanische Eberwurz*. Huius floris calycem, tum recentem, tum etiam siccum, noctu claudi, ad solem uero aperiri, nuper in hortulo meo miratus sum.

Carduus Benedictus G. in plurimis apud nos hortis ad remedia colitur. Hyemè benè fert, si autumniprincipio (ni fallor) seratur: & lætior ita prouenit, quam uere fatus. Vide in Atractylide.

Carduus hortensis, Scolymus, Cactus, uel Cinara, uulgo Artischaui duplex, unus foliis spinosis, alter sine spinis, ut Tragus & Dodonæus pinxere, C. Vu. O. G. Carduos sine spinis nascituros pollicentur, si cacumina seminum confringantur. Id olim fabulosum existimabam: sed postquam Lutecia et in Scotia carduos omnes ferè sine spinis esse cernebam, non dubitavi fieri hoc posse. uerum sunt multo aculeatis insipidiore. Addunt, saporem semina in carduis ipsis quem combiberint, multum referre, Cardanus.

Carduus Mariæ uulgo dictus, foliis latis, maculis lacteis, G. nascitur autem sponte ubique, aliqui Silybum ueterum putant, à quibus ego dissentio.

Carduus pratensis Tragi, qui passim in pratis humidis nascitur, G. fortè Limonia Theophrasti 6. 2. ubi Gaza non rectè Betam syluestris uertit.

Carlina. Vide Cardopatium.

Carus, Caros, uulgo Carui, in omnibus ferè pratis apud nos copiosè crescit.

Caryophyllata. Vide Geum.

Caryophyllus Indicus uulgo dictus, flos, non aroma. Vide Flos Ind.

Cassia fistula seu nigra, Alexandrina, arbuscula quinque seminibus mihi emicuerunt in uase hoc anno 1559. sed uix ultra digitum prouectæ, interierunt, fortè quòd tardius seminârim. Initio hyemis semina in uasis domi terræ committenda putârim, &c. Est & in horto Leuschneri hæc arbor Misena, aut fuit nescio quandum aut quandiu iam. Siliqua Indica seu Cassia nostra iuxta aquas prouenit, autæquam subesse indicat, Cardanus.

Cassitas Plinii uel Theophrasti, O. Ego Cuscutam uulgo dictam, Cassitam uel Linodesmon nomino, herbam ubique uulgarè, & quæ cum radice careat, feri colligere non possit.

Castanea,

Castanea, Vu. Ea prouenit syluestris, nemoroso & saxoso solo, ut circa lacum Verbanum Italiae, & Lemanium Sabaudiae, & alibi. Apud nos perpaucæ habentur, plantatæ nimirum olim. Mihi hoc anno arbuscula maioris Castanearum generis è glande prouenit.

Catanance Dodonæi, herba mihi ignota, C.

Caucalis Dodonæi, C. uidetur autem herba quædam aruensis, & uulgaris ubique, Daucorum generis cognata, seminibus magnis & hirsutis admodum: floribus albis, & similibus Caulalidi Bellonii, nempe in ambitu maioribus.

Caucalis, G. quæ in Hellesponto hodie uulgò Græcis Cascalitra dicitur, quasi Caulalida ut Bellonius scribit, & herbam quoque pingit: cui sanè conuenit descriptio Dioscoridis, nisi quòd folia eius extrema non sunt Fœniculi modo multifida. Itali quidam corrupto nomine Cazalopra uocant. Cruda in acetariis estur. Qui hoc Seseli Creticum putant, aut Tordylium ut Dodonæus, propter semen duplex dyapeorum instar, falli putarim. Herba est annua, facillimè sata prouenit, & semen citò maturat in umbellis, margine eleganter crispo, &c.

Caules de Rapa, O. intelligens opinor Brassicæ aliquam speciem, uel ex Brassicæ & Rapi natura mixtam plantam. Vide in Brassica.

Ceanothus spina Theophrasto memorata, hoc est, Vua crispa uulgò dicta, (ut mihi quidem uidetur) passim apud nos obuia est, sepibus horum inprimis commoda: facillimè enim nascitur, dense fruticat & propagat seipsum: & spinis suis trāsitus prohibet: & acinis iucundi saporis placet. Huic cognatus est, tanquam altera eiusdem generis species, qui uulgò perperam Ribes appellatur frutex. is quia spinis caret, Ceanothus leuis dicatur, ille asper. Retulit nobis quidam Florentiæ se uisidisse Ribes uulgò dictū, acinis Auellana maioribus, acidissimi saporis: et alius quidam, se hunc fruticem tum rubris tum nigris acinis obseruasse. Ceanothum asperum nostrum Cardanus de uarietate rerum libro sexto Rocellam (malim Roncellam, ceu diminutiuum à Ronce Gallico nomine Rubum significante) uocat. Rocella (inquit) humile arbutum est, folio angusto (mihi angustum non uidetur) ac tenui quasi uitis, spinosa, baccam ferens, quæ cum maturescit, uiridis & subflaua est, rotunda admodum, magnitudine Lupini, gustu ex dulci adstringente. Huius plantam uidi Diepæ in Gallia, quæ in arbusculam euaserat, & fructum Cerasi magnitudine ferebat. hæc cum ramosa atque frondosa esset, circumdlexerant illi rete, atque ita auiculas in ea pulchro spectaculo nutriebant. Gaudet hic frutex regionibus frigidis, idè plurimus in Gallia, est que uirens, salubris et gratus uisui. Ceanothi leuis genus syluestre, proceritate sesquicubiti, circa syluas quasdam ditionis Bernensium Heluetiorum prouenit. Rustici Reozbeer uocant, quòd tulli medeantur, G.

Cedrus minor, Cedrula uel Oxycedrus, Iunipero similis, sed maioribus et rubentibus baccis, in callidis Galliae tractibus sponte nascitur, at Cedrus arbor conifera, in Libano monte Syriæ nascens, in Europam, opinor, nondum transiuit. Oxycedrum Bellonius aliter Phœniceam Cedrum nominat, eiusque speciem alteram in Gargano monte Calabriae nasci scribit: Lyciam uerò Cedrum pumilam, cui ob tusa sint folia, circa Massiliam affatim.

Centaurium maius, uulgò Rhaponticum, G. R. Et Rurpodius. Hoc duorum aut etiam plurium est generum: nam humilibus etiam locis & collibus, minores quædam eius species nascuntur, ut laceæ uulgò dictæ, in nullo ferè usu, quòd radices minores, aut potius aridiores sint, &c. Pratenfis species minor est, & simplicibus foliis: collina maior, foliis dissectis. quædam in muris & asperis locis nascitur, ut circa Basileam: Montana uerò genera, & quæ Rhapontici nomine uulgo agnoscit, duo sunt: unum maioribus foliis, Lappathi aut Inulae ferè. Hoc in montibus nostris, altioribus duntaxat, pingui solo luxuriatur, ut supra Glaronam. ubi suæ spontis est, semen maturat, quan-

quam frigidissimo cœlo, & æstate brevissima: in hortis nostris durat quidem aliquantisper, & hoc etiam tempore in hortulo meo uiret, foliis ab una radice circiter uiginti, non ab uno tamen principio, sed triplici, subamaris, hircum olentibus, parte supina candidis, margine eminentibus punctis ruffis leuissime denticulato: sed caulem non fundit, tantum abest ut flores aut semen producat aut perficiat, K. G. Alterum foliis minoribus, iuglandis ferè, binis, inuicem oppositis, quod ex Italico semine in hortulo mihi exortum, semel aut iterum occultatum rediit, & biennio (ni fallor) expleto, periit. Nasceitur in Italia montibus, ut Baldo circa Bergomum: & in Apulia, ubi in hortis etiam plantari solet, ut audio. hoc Dioscoridis descriptioni, quod ad folia magis conuenit: & radicem pingui durabiliq; succo imbutam habet: qui in nostro aquosus est, quam obrè breui siccata radix, exucca, rigida & baculi instar redditur. Nasceitur hoc etiam Basileæ nunc in horto Zuvinggeri, Centaurium si in bonam ac pinguem terram sedatur, & complatur rigeritque, qualitatem naturalem perdit, & uim suam amittit. Gaudet enim squalore, Plutarchus in libro De facie apparente in orbe Luna. uidetur autem sentire non quidem de Centaurio minore, quod locis humidis gaudet, sed maiore. Hoc enim in hortis plantare aliqui student, &c.

Centi morbia. Lege Nummularia.

Centonia, R. Santonicum Absinthii genus fortè intelligens: aut Centunculum, id est, Gnaphalium: uel potius Chamæcyparissum: quam Galli quidam, ni fallor, Centoniam uocant.

Cepæ rubræ et albæ G. Albarum semine nescio an peculiare, ex Italia quidam accersunt.

Cepa Maritica simplex à rusticis Vnio nominatur, Barbarus.

Cepæ nostris olitoribus et culinis (Colonis) quatuor speciebus distinguuntur. Optimæ habentur albissimæ & rotundæ, omnis mordacitatis expertes: mox oblongæ, cortice ruffo, uulgo Spanisch Vldh, siue Ainyt, aut Zwibel, quasi Hispanicam dicas. Acerrimæ experiuntur rubræ, rotundæ. Est & quarta, cuius radices supra terram extuberant, candidæ, magnæ, dulces, caule procero: per cuius fastigium semen in orbem colligitur, paucis hortis familiaris. Bern. Dessennius.

Cepa sterilis, fissilis, uel Ascalonia quorundam, uulgo Eschlauch, in plerisque hortis apud nos reperitur.

Cerasia communis, rubra, nigra, albicantis: magna, Italica: duracina, uiscula, laurea, G. Vngarica magna, dura, dulcia, figura cordis, Vu. Alba: & Italica, magna, Matth. Curtius Lindauia. Cerasus humilis, C. ualde humilis, frutex potius quam arbor, K. Eanimum Chamæcerasus, uel Macedonica Cerasus Plinii (15. 25.) est. Alia est Chamæcerasus montana, ueteribus indicta: quæ in montibus nostris nascitur, cubitalis: fructu Cerasi, magnitudine, figura, colore rubro, & petiolo simili: sed amariore. Hanc non semel frustra in hortulo meo ferere conatus sum. Alia etiam Chamæcerasus montis Generosi Insubria: alia deniq; quam Punice Mahaleb uocant, sponte apud Vallesios circa Sedunum crescens arbuscula.

Cerisfolium, R. G.

Ceratia agrestis. Vide arbor ludæ.

Ceratonis, id est, Siliqua arbor, S. Johans Brot/O. R. Vidi & ego hanc arborem ex semine natam apud ciuem quendam nostrum: quæ ad breuem altitudinem cum peruenisset, interiit. Longè alia est, Ceronia Theophrasti, Syriaca arbor, &c.

Cerinthæ. Vide Cynoglossus montana.

Ceterach. Vide Asplenos.

Cercis Theophrasti, Vide arbor ludæ.

Ceruaria uocari potest, (quoniam Germanice Hirgen blümle nominatur,) Chamædryas alpina à quibusdam dicta, etsi Chamædryas ueram sola foliorum similitudine refert, Chr. Piperinus. Floribus albis, semine in globo pappaceo: radice oblonga, lignosa, amara, cortice ruffo.

Chamæcyparissus suffrutex hortensis odoratus, G. flores luteos profert sed non quotannis

quotannis, agrestis ubi nascatur, nondum rescui, G. Chamæcerasus Plinii: item nostra uel montana. Vide in Ceraso.

Chamædrys, O. G. R. Loco nimis umbroso mihi confita, flore albescit. Nascitur passim apud Heluetios, locis saxosis et apricis. nusquam prope Tigurum nostrum, nisi circa lacum forte, duarum horarum itinere ab urbe.

Chamædrys falsa, insipida, flosculis cœruleis, Schafftraut. G. Aliqui Teucrion uocant, suæ spontis est ubiq; Pseudochamædrys eius etiam altera species in syluis & montibus nascitur.

Chamæleon albus, R. Vide supra Cardopatium.

Chamæleon niger, O. fortè quem Tragus pingit: aut Carlina cum caule. Sed neuter uidetur uerus Chamæleo niger: uerus ex Apulia, K.

Chamæmalum, uel Anthemis, R. G. Magna eius in aruis passim apud nos copia est, illius dico cui flos albus: quam equidem uerum Chamæmelum esse non dubito: quamuis Dodonæus, Chamæmelum sylvestre hoc uocet. hortense autem duplex facit, unum Leucanthemum, hoc est, albo flore: alterum Chrysanthemum, hoc est, luteo: utrumque odore præstantius quàm sylvestre, et ex Hispania primum allatum ad Germanos: quorum pauci in hortis duo hæc genera colunt, solo (ni fallor) floris colore differentia. Aliqui Camomillam Romanam hanc uocant, & albæ luteæque discrimen adiiciunt. De Chrysanthemo plura leges inferius suo ordine.

Chamæmelum odoratum uel nobile, ut Tragus cognominat, hortense illud de quo iam diximus, in hortis alunt, Ae. K. & Basileæ Cælius Secundus, & Argenting Massarius medicus: sed illud albo flore duntaxat puto. Suauissimè hæc herba olet, unguenti alicuius preciosi instar. Sapore autem amaro est. A radice statim (ut Massarius ad me scripsit Argentina) multos coliculos emittit, qui per terram repere uidentur, præsertim si quis eos secundo aut tertio quoque die manibus aut pedibus premat. Hyeme tota mihi uiret in horto: ab Anglis ad nos aduecta est. Semina uere seres, lato aliquo spacio, ne inter se compressæ herbæ putrescant, ut mihi aliquando contigit.

Chamæmelum eranthemum, (flore purpureo,) K. C. hanc puto aliqui hætenus non rectè Anemones generi attribuerunt. Pingitur à Trago inter Anemonas. Nascitur, inquit, inter triticeas aut speltaceas segetes, flore minii colore, interdum candido, foliis quaternis constante, &c. Aliqui Adoniū uocant, circa Monspelim etiam in aruis emicatur.

Chamæpitys species una, O. G. R. Hæc in aruis quibusdam, non procul à Rhe no fluuio ut Basileæ, & apud nos circa forum Tiberii prope Rhenum alibi que sponte nascitur: etsi Fuchsius in Germania sponte nasci ignorauit. Nunc (inquit) in hortis plantari cœpit. Plinius tertiam speciem in petris nasci tradit, nescio quàm rectè. Hanc etiam Fuchsius pingit, ex horto nimirum aliquo nactus. Vidi ego aliam quæque speciem è Monspelio allatam.

Chamæsyce, K. Hanc in Germania sponte ortam nondum memini uidere.

Chamelæa, A. C. Vu. circa Monspelim in agro nascitur. Aliqui non rectè Chamelæam uocant herbam quam Germani Zyland, Itali Piper montanum, Vide in Pipere.

Chelidonium minus, G. O. In pratis humidioribus passim primo uere exilit & floret, Maio mense rursus se occultit.

Chelidonium maius ubique ui-ret, præcipuè circa muros & sæpes hortorum.

Chondrilla, C.

Chondrilla prima, G. quæ & sponte nobis oritur in collibus alibi que, & super muris aliquando.

Christophoriana (ab Italis, ni fallor, uulgò dicta, ab aliquibus Costus niger)

frondibus ferè similis est Barbe caprine uulgò dicta, acinos nigros racematim cōditos profert Iulio mense, &c. G. Nasctur apud nos circa sylvas mōtanas, & in hortis benè diutè durat. Sed Parauit alibiq; in Italia, Christophorianā equius, utpote proceriorem multò uocari audio herbam illam, quam Hier. Tragus lib. 1. ca. 25. Barbam caprinam syluestrem nominat, **Waldgeißbart** / & pingit: eiusq; asparagos, id est, coliculos teneros elixos, in acetariis edī; uulgò Christophorianā dici, uel Barba de becco. Vide supra in Barba Caprina. Alii etiam aliam Christophorianam faciunt, (ut Ruellius meminit) quæ alio nomine Oculus consulis, & Filius ante patrem uocetur: flore luteo, ceu conyzæ, foliis rorismarini, latioribus, breuioribus.

Chrysanthemum duæ species K. ues O. uerū ex Italia G. R. A. Chrysanthemum quidem ab aureo flore cognominatur etiā species una Chamæmeli, ut paulò antè dictū est. & forsitan eadem herba fuerit. Chamæmalū enim Leucanthemū tantū Dioscorides describit: ac cætera solo colore floris differant. Chrysanthemum quidem & Buphthalmum Dioscoridis, unam eandemq; herbam esse, minimè dubito, capite utroq; collato, &c. Itaq; Galenus & Aegineta Chrysanthemum non meminerunt, sed Buphthalmi tantū: cui Galenus flores Chamæmali (nimirum Leucanthemi) sed multò maiores acrioresq; tribuit, & uim discutiendi tantam, ut sclerias etiam (id est duricias, uel steatomata, ut Dioscorides habet) discutiāt.

Ci.

Cicer satium arietinum, C. G. Cicer syluestre doctissimus Lugduni medicus Jacobus Dalechampius ad me misit.

Cichorium satium R. G. Vide Intybum. Hoc olus ut hyeme tota albis & carnis foliis suis in acetaria ueniat, sapore gratissimo, colicis debet. Circa finem Iulii feret, non admodum angustè: deinde cum ad duos palmos (seu digitos octo) excreuerit, tempestate sicca, euellens cautè, ita ut manu radicem inferius, id est, remotius à capite apprehendas: & simul corrupta folia si quæ sunt, separabis: & rursus plantabis, ita ut undiquaq; duobus palmis minimum inuicem distent: et folia etiam principio sui nonnihil in terram mergantur. Postea initio hyemis, antequam nix ingruat, rursus euulsas plantas in cella uinaria seruabis, hoc modo: Soli aliquot spatium ad duos digitos terra recenti operies: huic plantas Cichorii impones, duabus aut tribus cum suis radicibus coniunctis: donec spatium istud repleueris: tum rursus eas terra operies. & sic alternis. Aliqui in uili aliquo uase ligneo, cum terra ut dictum est alternis instrata seruant in hypogeo. Galli & Itali in hortis terra obruere & seruare solent: sed apud nos in hortis & gelatur facillè & pluuies deinde putrescit.

Cici, Ricinus, Croton, Cataputia maior uulgò, **Wunderbaum** / G. R. Planta est annua: & formæ totius raritate admirabilis: & ad remedia utilis. Circa Mediolanum agri eo conferuntur, ut oleum è seminibus exprimatur ad lucernas.

Cicuta uera, herba grauis & foetidi odoris, coloris ferè cinerei, &c. G. Sponte nascitur & abundat circa forum Tiberii alibiq; ad Rhenum, circa oppida & pagos.

Cicutaria, similis cicutæ herba, innoxia, ubiq; in pratis & hortis abunde nascitur. Imperiti eam pro Cicuta accipiunt.

Cicuta aquatica, herba uenenosa, **Bargenkraut** Saxonibus, G. Circa paludes & in paludum marginibus sponte oritur, ut ad lacum Felium agri Tigurini. plantare si quis uelit, in aqua aut loco palustri pangatur oportet.

Cicutam & forma aliqua ex parte & ueneno ferè referre uidetur herba, quam **Glyssen** nostri appellant. Vide inter Apia. Tragus Apii genus degener esse iudicat.

Cirsium Matthioli, Vu.

Cistus C. foemina AE. Mas & foemina, K. Vu. Rurpodius. Valerius Cordus etiam progeneratum sibi è semine Cistum memorat. Benedicto Aretio tertio à saturo anno floruit: sed semine non perfecto tota planta interiit.

Citrullus. Quære Cucumis.

Citr

Citri arbusculæ aliquot. Vu.

Citria & aurea mala K.

Citrei generis arbores in Germania octavo ferè anno fructificant: qui post solstitium prouenerint surculi, autumnò sub hyemem refringi debent, hyemem enim non ferunt: & arescentes fortè etiam cæteris partibus uitium adferrent. Rigari debent, non recenti & tenui aqua: sed crassa, pingui, putrida, ut è fossis, & circa fieri quilibet. Fimo equino optimè resolutò & in terram ferè conuerso gaudent. Hyeme in cubicula tepida, ut hypocaustis contigua, transferantur in uasis suis. In regionibus minus frigidis (in Germania quidem nusquam puto) relinqui possunt in hortis, si ramis fune in angustius spaciū religatis, cupa lignea obtegantur. Funccius uir illustris, prætor in urbe nostra, in hortulo pensili iam per quindecim annos Arantias & Limones aliquot alit, quinq; cubitorum nunc longitudine: proceriores fortè futuras, si locum commodiorem & magis apricum habuisset, utq; singulis annis collucaret seu disrararet, operam dedisset. Sexto à sato anno flores in eis primùm apparuisse ait. Habet eas in uasis terra repletis, cubitalis tantum altitudinis: præstaret autem triū do drantum altitudinē esse. Fructus ei ferunt, non tamen quotannis, tales tantoscq; quales quantoscq; ex Italia nobis mittuntur. Autumnò antequam pruina ulla ingruat, in cellā tepidam eas reponit: & per hyemē bis ferè per mensem, aquā non nimis frigidā radicibus affundit. Sub diò rursum exponit Aprilī medio, aut potius initio Maii. Decitorum cultu Iouinianus Pontanus libros 2. carmine condidit.

Citrum Romanum, O.

Limonum (ut uocant) arbusculæ aliquot, Vu.

Arantiorum arborum, ut uocant, arbusculæ aliquot, Vu.

Arantia poma Basilæa in uno alteròue horto numerosos fructus ferunt, Limones uerò nullos.

Citrus (inquit Nic. Monardus Hispanensis medicus in libello De Aurantiis) humilis est arbor, (uel potius arbutū,) omni tempore pomifera, semper pregnans fecundaq; ut trium annorum fructum habeat. flores emittit iucundissimos, pomum oblongum, interdum rotundum, aliquantulum rugosum, colore aureū, odore gratum. Foliū ei lauri, aculei acuti & rigidi, apud Medos & Persas imprimis frequens: deinde Palladii diligentia in Italiam translata fuit. Postea uerò in Hispania in usum deuenit, ut nemora & campos occuparet. Magna hominum cura ex acri (acido) dulcem cibum fieri docuit. Huius pomis olim non uestiebantur, sed propter odorē tantum & medicamenta erat in usu: inculta nimirum adhuc arbore peramaros & acerosos fructus proferente. Postea (ut Constantinus Cæsar tradit) hominū cura, ouillo lacte semina, priusquā ponerentur, maduerūt: & sic ad dulcedinem mutata est pars interior edulis, cortex amaritudinē suam retinuit. Infitiois etiam causa ad diuersas formas peruenit, nam in Malo Punica inserta, ut agriculatores docent, in rubrum colorem & diuersam formā abibat. Videntur enatē Aurantiæ, &c. siue ab auricolore dictæ, siue Arantia ab oppido. Sic & alia citriorum genera infitione multiplicata sunt, unde reperias tot generalimonum, & alia, quæ nec citro, nec limonibus conueniunt: quemadmodū Zamboas, Torongas, Limas, Limones, (Nebrissenis uocat Cidras, Naranias, Toronias, Limas, Limones,) quæ omnia nec prisci cognouerunt. Sic magnificato infitionis usu Aurantiarū plura sunt genera: nam aliquæ sic habent corticē dulcem, ut torē comedi possint: alię autem in uno pomo duo genera botrorum (acinorū) habent, alię uerò absq; semine sunt. quanta autem diuersitas saporum in eis degustetur, cōmuni relinquo iudicio. Citrus arbor in Aurantio inserta ad magnam proceritatem prouenit: Aurantius uerò in Citro, in tam humilem formā, ut magnitudinem unius cubiti Aurantius non excedat. Concludimus igitur Aurantias infitione ad nos deuenisse, ueteribus ignotas: nisi fortè commemorati ab Auicenna citranguli in Commentario De uirtutibus cordis, & libro primo de urinis, & libro 5. de antidotis, (sicut & à Mesue in oleo de pomis citranguli,) Aurantiæ fuerint. Hæc Monardus. Citrium in nostris regionibus

L1 in

ad pondus librarum decem quandoque peruenit, licet raro, Cardanus Mediolanensis.

Citrago. Lege Melissa.

Citrullus. Vide Cucumis.

Cl.

Clematis Flammula quibusdam, in Gallia Narbonensis Italiaeque sepibus ubique obuia, uiti syluestri caustica apud nos nascenti omnino cognata. AE. Duas eius species habet C. unam albo, alteram rubro flore.

Clematis Aegyptia, syluestris flore caeruleo passim; hortensis purpureo, G. transtuli autem purpureum est Sabaudiae circa Lausannam hortis Tigurum. Vulgo Vinca peruinca. Stryt.

Clinopodium uel Polycnemum, cognata Origano herba, floribus per uerticillos digestis, ita ut in summo etiam uerticillus unus, tanquam rotundum in lecti pede (seu fulcro) capitulum extet, G. Sponte circa sapes & fruteta nascitur, herba odorata, sed minus quam Origanum, magis uero astringens, oblongior, &c. Alii pulegii petraei speciem quandam, Clinopodium faciunt.

Clinopodium Dodonaei: quod aliqui Marum existimant, herba est Sampuchio cognata, nobis ignota: alibi etiam peregrina, & in hortis tantum uisa, uisq; per paucis.

Clymenum utrunque, G. Braunwurz oder Nachtschatt/weiß vnd Braun. Alterum nodos ceu scrophulas in radice habet, quod marem dixerim: alterum iis caret, & semper in aquosis nascitur: idque foemina uidetur. Sed alii aliud Clymenum faciunt. Vide Rhys Plinii, Clymenum siue Siciliana Plinii K.

Cn.

Cnecus uel Cnicus, uulgo Cartamus, G. R. Argentinae puto & alibi agri pleni conferuntur, propter florem tincturis aptum.

Cnecus uel Atractylis syluestris, ut quidam uocant, Carduus benedictus, in pleuris apud nos hortis colitur, propter magnum & multiplicem eius in remediis usum, ne uulgo quidem incognitum. Incultus ubi nascatur, nescio.

Co.

Coccygia, forte Barba Iouis Plinii. Vide supra in B.

Cochlearia uulgo dicta herba, Köffelkraut/ (ut scribit Dodonaeus) habet initio folia lata & spissa, modice caua instar parui cochlearis, & interdum angulosa instar rumicis minoris, quae Romanum cognominant, dura. Caules dodrantes. Floresculi albi in summis coliculis secundum longitudinem eorum nascuntur. Semen paruum, rubicundum, in siliquis paruis. radix fibrosa. Crescit in multis locis Hollandiae, Frisiae & finitimarum regionum prope sapes & in pratis. Brabantii in hortis ferunt. Videtur autem esse Britannica Plinio memorata: aliis Telephium, uires quaedam utriusque repraesentat. Calida & sicca est herba, sapore acri ut nasturtium ferè. Magnus ipsius ad stomachaceni usus est apud Hollandos & Frisios. Haec ille.

Codianum uel Codiaminum, bulbus syluester quidam, flore Codii C. id est, Campanulae, calathi uel specie, magno, luteo, cauo, oblongo, Gäl Wergenblumen. G. Martio mense in latioribus pratis splendet apud nos uulgaris.

Colchicum, Hermodactylus Arabum, quo prata humida nusquam non abundant, autumno florem croci producit nudum, & nullis omnino foliis: quae per aestatem, sicut & semen in folliculis, habuerat.

Colocasia. Vide Aron Aegyptium.

Colus Iouis, O. Apud Dioscoridem tum alteri Verbenacae, tum Polycnemo, haec nomenclatura tribuitur: nam Colus rustica, Atractylis est.

Colutea Theophrasti secundum aliquos; Sena syluestris quibusdam, non recte, arbusci genus, foliis ut Pelecinus ferè: semine in folliculis inanibus: unde Germanice quidam Verbuete Kuchle nuncupant. O. G. R. Vu. C. Facile est semine prouenit, & coelum nostrum bene fert: quatuor aut quinque cubitos alta uidi.

Conz

Con.

Confiligo, Enneaphyllon, Diapylon, Pulmonaria Vegetii, Ellebori nigri species, *Leüßkraut/Süßkraut/Teüßfelkraut/Wolffezan*. Itali quidam non recte Elleborinen uocant. O. G. K. circa Basileam & alibi sponte nascitur, locis apricis ac lapidosis. Tres aut quatuor annos stirpem unam durare puto, flores & fructus ferre secundo. Proseminat sese sponte. Matthioli de Consilagine coniectura uana est.

Consolida regalis. Vide Delphinium.

Conuoluulus maior. G. Nascitur circa sapes & frutices, ubi aqua subest.

Conuoluulus minor, Helxine cissampelus, ubique in aruis nascitur: radiculis quae longissime uagantibus sicut in litoribus Brassica marina, cui cognata uidetur.

Conuoluulum peregrinum uel coeruleum uocarim granum Nil Arabum, ut eruditi quidam uiri in Italia nuncupant, Auicennae: qui tamen Isatidem quoque Nil appellat, O. G. A. E. Itali quidam uulgo Campanulam lauram uocant, ni fallor. inuenio enim hoc nomen in Catalogo horti C. & aliud, Campanula coerulea, de qua superius diximus. Genus hoc conuoluuli peregrinum, non floris tantum colore, sed aliter etiam a nostro differre uidetur: folia enim alterius figure, & hirsuta habet: lactis nihil. semen longe uehementius sapore, tanquam cyclamini, si bene recordor. Hoc anno a me satum uarietate prouenit. In uasis plantae aliquot, cum quatuor aut quinque folia protulissent, perire, frigore ut conicio. aliae infra palmi altitudinem confiterunt, ac floruerunt tamen: aliae altius excreuerunt. Vna in area ad cubitos fere nouem perticae se circumuoluit: & semen initio autumnu maturauit. Flores ephemeri sunt: noctu enim se apperunt (unde florem noctis uulgo quidam in Italia nominant) postridie uero folis per eunt. Radix subest parua, fibrata.

Conuoluulo similis herba, sed minimo flore, semine triquetra, gustu subacido & glutinoso, G. est & suae spontis passim in agris. *Schwarz winden*, id est Conuoluulus niger uulgo a Germanis dicitur. quidam non recte Orobanchen putant.

Conyza maior locis lapidosis & in muris moenium aut fossarum urbis nostrae nobis prouenit: foetidior & inelegantior, quam ut hortis eam dignemur.

Conyzae species tertia, aquatica. G. non diu uiuit in hortis siccis.

Conyza Hippocratis, ut quidam nominant. Vide Ambrosia supra, & Cotula infra.

Conyzae alpinae species, foliis oblongis, serratis, G. *Böni/Goldblüm auff dem alpen*. uaccis intacta.

Conyzae aquaticae species, foliis oblongis, serratis, G. Stirps una iam quinto (ni fallor) anno, in horto mihi durat, loco umbroso.

Copia Elegia O. Videtur autem Copia uocabulum esse corruptum, pro quo forte legendum Canna, id est Arundo. Sic enim Plinius lib. 16. cap. 36. Est & obliqua harundo (inquit) non in excelsitate nascens, sed iuxta terram fruticis modo se spargens, suauissima in teneritate animalibus. Vocatur a quibusdam Elegia. Sicille, posset & Chamae calamus appellari, sicut Chamaebatum dicimus.

Cor.

Corchorus quibusdam, Apii genus uitiosum, radicibus repens, areas hortorum passim replet. cacofelinon quoddam (ut ita dicam) non Corchorus ueterum, quamquam & ipse Ocimi fere foliorum (sed serrato & oblongiore) inter olera nascitur: sicut & Anagallis, quam aliqui ueterum etiam Corchorum nominabant. Lege supra in Bliti syluestris mentione.

Coriandrum rusticum quaedam mulierculae apud nos ferunt, ad condimentorum usum. Argentinae agros eo plenos seminari puto. Semina maiora in calidioribus locis fert. Propter foetorem certe agros magis quam hortos decet. Syluestre reperiri Plinius negat. Amatus Lusitanus uero in aruis & campis circa Anconem sua sponte nasci colligit scribit.

Coris A. K. sponte in Italia crescit, Matthiolo teste.

Cornus mas, Vu. A. quibusdam etiam apud nos plantatur. Frequens est in dumetis inter Metensium et Treuironum urbes, at in locis ad Mosellam et Rhenum fluuios sitis, et per

C O N R I G E S N E R I

Alfatiam in hortis feritur uel semine uel furculo auulso, Tragus.

Cornus scemina. Quære Sanguinea uirga.

Coronopus uerus, qui Cornu Cerui nonnullis dicitur, O. G. Italis uulgò herba Stella, plerisq; Italiae hortis uulgaris, propter usum eius in acetariis. Huius & syluestris species reperitur, foliis multum differentibus, Serpentina quibusdam dicta, Vtranq; pingit Matthiolus. Leoniceus graminis speciem, quæ Capriola uulgò dicitur (de qua leges infra in G.) non rectè Coronopum putauit. Herba stella Matthioli in Germania inferiore passim circa uias nascitur: sicut & Coronopus Ruellii. Vterq; pingitur à Dodonæo.

Coronopus uulgaris: & alter Theophrasti, puniceo colore, semen continens in spinosis capitulis, alii hanc plantam ad secundam speciem Atractylidis referunt, K.

Coronopus quorundam, ranunculo specie similis: syluestris, alba: & alia lutea, quæ pauperibus etiam inter olera recipitur. Hortensis, flore multiplici, luteo, albo, nam simplici utraq; syluestris reperitur, ut alia etiam omnia quæ multiplici in hortis flore placent, simplici reperiuntur syluestria.

Corylus. Vide Auellana.

Costus hortensis recentiorum quorundam, uel Menta Græca (aliis Romana, Saracenicæ,) seu corymbifera. *Frauentraut/vnser Frauen Wüing/Sam Heib nisch wundkraut.* Viuacissima est in hortis. G. Alicubi circa Martiam syluam, ut non procul Lenzkilcho, in agris compascuis, syluestrem nasci aiunt.

Cotinus Plinii, AE.

Cotonea. Vide Mala Cydonia.

Cotula. Vide Parthenium.

Cotula (fortè Conyza) foetida Hippocratis, nescio in cuius horti Catalogo reperi. Ea aut cognata, Senecioni ferè similis, pinguis tactu, (Artemisiis, ut quidam cōficiunt, adnumeranda: ego potius Conyzis adscripserim,) in sylua Vuettingensi prope Badam nostram abundè nascitur.

Coryledon C.

Cr.

Crithmus uel Batis, AE. C. Vu. Non facilè nec diu nostrum cœlum fert: facillè in hortis Italiae, quanquam nobis & alpibus uicina, ut Lucarni alibiq; in multis annos durans, debet autem sub hyemem fimo equino aliòue tegi. De cultu eius plura leges in epistola Hier. Massarii ad me, huic libello præfixa. Batis hortensiana uocatur à Plinio.

Crithmus marinus, C. & Rurpodius, in uase G. non maturuit. Crescit copiosè in litoribus Hispaniæ, Galliæ & Angliæ, Dodonæo teste.

Crocus R. G. Optimus colitur apud Vallesianos nostros circa Sedunum, et uenit ad uicinis. Bulbi eius pangi debent circa diui Bartolomæi diem, trium digitorum intervallo. Tertio quoq; anno Martio mense, plantæ integrè euulsæ reponuntur usq; ad diui Bartolomæi diem, ut mediocriter siccentur: & tum rursus terræ mādentur, atq; ita deinceps. Folia per æstatem latent, hyeme apparent.

Crocus syluestris, flore candido, pulchro, prosiliente sub finem Februarii. K. Crocus montanus siue alpinus A. Floret (inquit A.) in horto meo, sed nulla unquam protulit semina, quæ ubi sponte nascitur in montibus profert. *Leffras* quidam alpium incolæ nominant. Triplex est, coloris tantum differentia: cādidus, puniceus, & ex utroq; mixtus. Viret etiam in meo horto, è montibus circa Curiam à Ioanne Fabricio uiro doctissimo hoc anno primùm ad me missus, foliis graminis, angustioribus.

Croci Zizania, bulbus quidam nuper cum croco è Vallesia ad me missus. superaficies, ut etiam croci, magnis interuallis later, & redit, G.

Cruciata R. Gentianæ puto speciem intelligens, nam & alia Galio cognata, passim communis herba, eodem nomine dicitur.

Cu.

Cucumis, G. Lege Melopepones, & Pepones.

Cucumeres albi, Vu.

Cucumis citrullus uel citreolus, Vu. Apud nos uix maturefcit: difficiliter opinor quam Cucumis.

Cucumis erraticus uel asininus, O. G. R. Facile nascitur duratque in nostro etiam coelo: & sparsis per maturitatem seminibus, quæ rupto pericarpio eiaculari solet, sese restaurat.

Cucurbita, G. Syluestris hæc species non reperitur, quod sciam: nam Colocynthis dicta, Cucurbita syluestris (nescio ubi sponte nascens, nisi in Græcia forte) est, ui & specie plurimum differens.

Cucurbita, quam Zucca marina Itali uocant, species, O. hanc esse puto quam Indicam aliqui cognominant, quæ in nostris etiam hortis pulchre prouenit. De tribus Cucurbitarum generibus, oblonga, marina & syluestri, lege Cardanum. De uarietate lib. 6. cap. 23.

Cuminum syluestre, quære in Delphinio:

Cupressus. Vide Cypressus.

Cy.

Cyanus cœruleus, puniceus, albus, (qui in aruis passim emicat, sed cœruleus tantum) G. & in plerisque regionis nostræ hortis. Annua est herba, & restibili fecunditate seipsam propagans.

Cyanus exoticus, pulcher, K. sentiens nimirum de Cyano montano nostro.

Cyanus montanus uel syluaticus G. Ae. In Albio monte nobis imminente syluestris exilit, in hortos translatus longo tempore perennat. Apud Germanos quidem inferiores solet in hortis feri.

Cyclaminus nascitur copiose montanis locis, iuxta pedes montium prope Riuarium lacum, in faxis etiam: ut circa Vuesam, Vuallestadium, Feldekircum, & locis arenosis Curiam uersus circa Rhenū, et alibi. Ea species foliis est subrotundis. In hortis plantata diutissime durat, uere & autumno florens suauissimi odoris purpureis seu colossinis floribus. Audio & albo flore circa Neocomū Sabaudie reperiri.

Cyclamini species duæ, prædicta, & alia foliis angulosis, cucumeraceis fere, F. Amicus quidam in Italia Cyclaminum folio quadrato sibi uisam nobis retulit. Radicum alia breues, & malum, id est, orbem radices, prope superficiem habent; alia oblonga malo in fine adnexo: quæ itidem species in Italia reperitur.

Cyclamini speciem habeo, radice instar capitis arietis, C.

Cydonia mala, require in M.

Cynoglossus Italica, O. & Basileg in horto Zuuinggeri. Vulgaris quidem circa urbem nostram locis fere arenosis non deest.

Cynoglossus montana à quibusdam nominatur: Telephium ab eruditissimis nonnullis existimatum: floribus oblongis, luteis, cauis, &c. Romæ frequens esse audio, à Græcis edi. Aliqui (ni fallor) pro Cerinthe ostendunt. Magna & oblonga folia habet antequam caulescat. Hanc in horto alit Chr. Piperinus meus in agro Bernensi, è montibus circa Dunum (puto) allatam. Nascitur & Romæ in monte Palatino: item in montibus inter Dresdam & Misenā. Eruditi quidā Telephium Diosc. interpretantur.

Cynorhodon lilium, Lege inter Lilia.

Cyperella Cordi, G. passim in pratis humidis & circa fossas exilit: Pseudocyperi species pumila, foliis hirsutis: flosculis luteolis. Itali quidam Luciolam hanc uocant, alii forte aliam.

Cyperus longus, O. G. Hunc sponte natū reperiri audio in pratis humidioribus circa Rapperwillam oppidum ad lacum Tigurinum nostrum. Flos Agalochū fere olet. Iam diu in hortulo meo durat. Semen nullū aut inutile habere puto. Longus et rotundus (qui rarior est, ex Italia puto allatus), O. R. K. C. Pseudocyperus uerū undiquaque æmulatur, sed odore caret, nusquam non in aquaticis apud nos obuius.

Cypressus uel Cupressus, A. Vu. C. Rurpodius. E semine mihi quoque orta, ad doctantalem longitudinem, hyeme quanquam in uase in cella uinaria reposito, inter

Mm

riit. Lutecia in hortis quibusdam, Bellonii cura, uiuit.

Cytisus suffrutex lignosus, uel Cytisus minor (nam maior in Italia nascitur) è colore prope Scaphusiam (id oppidum illustre Heluetiorum est ad Rhenum) mihi transplantatus hoc anno, pulchre uiret. Idem è semine mihi prouenit, quod Petrus Bellonius misit, & in uase per hyemem seruatus, altero iam anno durat: nostrate candidior, hirsutiorq; & (ut apparet) procerior futurus. Hyeme folia amittit.

Da.

Damasonium. Lege Alisma.

Daphnoides K.

Daphnoides Dodonæi, quæ circa Lemanium lacum sponte nascitur, foliis Lauri fere, minoribus, crassius, C.

Daucus Creticus R. F. In Italia monte Baldo sponte nasci audio.

Daucus quidam palustris, liquore lacteo resinoso turgens, radice amara, G. In pratis quibusdam palustribus suæ spontis est, ut circa lacum Felium apud nos, alibi uidere non memini.

De.

Delphinii tres species, O. sic autem eum uocare puto (sicut & Cordus primum, deinde Dodonæus, & alii quidam uocarunt) Consolidam regalem uulgo dictam, quam Cuminum syluestre alterum Dioscoridis putarim. cuius apud nos in hortis genera quatuor reperiuntur, syluestre, scilicet uulgare, quod in aruis nascitur, cæruleo flore: & alterum rarius, candido: tertium, roseo: & quartum undiquaque maius, procerum, magnis floribus, in magna & oblonga quasi spica *Xitter sporen* uulgo nominant. Aconiti etiam genus floribus cæruleis, simile alioqui *Lycotono luteo*, Bernenses nostri uocant *groß Bergritter sporen*.

Dentelaria nostra, quæ dentium dolori medetur: flores habet subcæruleos, qui illico in pappos soluuntur. herbarum sapor est acris, G. Sponte collibus siccis, saxosis & apricis emicat. Conyzoides quædam herba est, quam pinxi & descripsi inter quinque istas stirpes, Cordi Descriptionibus plantarum subnexas. Dentelaria autem *Monspeli* dicta, et alio nomine *Flammula*, à uicauteriis alia quædã est (*Flammulas* quidẽ alii alias herbas appellant) quã nõ ipsis dentibus, sed carpo admouet, ut audio. Huius coliculũ dũ hac scriberẽ, digitos octo altum uidi, aridũ, sex per interualla foliis simplicib. digitũ latis, tres longis, sapore dulci cũ acrimonia. Habeo & semen longiusculũ, tunica fusca tectũ, intus subrußũ, una parte acuminatũ, nullo eximio sapore.

Dentelaria alia, (hinc quibusdam seu *Erysimon* putatã) in Italia ut audio, sic dicta, quod siliquulas ferẽ dentibus similes toto caule emittat, modicẽ inflexas, G. Pedalis aut cubitalis est herba, annua, foliis dissectis, flosculis luteis, gustu acerrimo, sinapicognata.

Di.

Dictamnus uera feritur in Italiae hortis, seminibus è Cetera allatis.

Dictamni loco usurpata hæcenus planta, *Pseudodictamni*, *Fraxinella* Italica: hoc enim nomen magis ei quã Lilio cõuallium cõuenit. R. G. K. C. Rurpodius *Chamaemeli*am, hoc est, *Fraxinum pumilam*, Græcè dixerim. Hanc aliquoties è semine (quod rotundum, atrum, splendidumq; habet) frustra pro dituram expectaui: immaturiore forsan. hoc anno enim plantæ quatuor è semine mihi prognatæ, uiuunt. Diu & pertinaciter radix in hortis durat, etiã neglecta & nuda aliqua ex parte. Vidi Argentinæ in horto quodã ante annos quatuordecim, ubi etiam nũc durat eadem planta, & flores fructusq; fert. Nascitur in collibus quibusdam saxosis prope Scaphusiam (ubi & Cytisus) inde in hortum meum transtuli. *Weysser* diptam.

Digitalis Fuchlii, floribus luteis uel pallidis, maior & minor. Maiori quidẽ flos minor est, & magis albicans: minori, maior, magisq; luteus, G. Eadẽ purpureo flore O. G. Aralda Bononiæ uocatur, cum eulogio chi tutte piage salda, i. quæ omnes plagas consolidat. Vulgò *Spiz wundtraut*. Locis saxosis & montanis nascuntur, purpurea nobis suæ spontis deest, circa Coloniam (ut ferunt) abundat.

Diospyros dicta ab eruditis quibusdam arbuscula, locis montanis ad nos prouenit, ut in Albio è regione statim urbis nostræ: foliis ferme Rosæ, uenosis, fructu rubente, umbilicato, magnitudine & figura Cerasi, per maturitatem ad subcæruleum

ruleum primum, deinde nigrum colorem tendente: floribus albis: cubitos alta quatuor aut quinque, quamquam etiam ad octo cubitos proceram uidi, trunco non crassiore baculo. Circa Rivarium lacu Pyra S. Ioannis uocant, Bernenses *Slibiren*, quod locis saxosis gaudeat. Hanc euulsam aliquando in horto plantare frustra conatus sum. E semine aut teneriore planta forsan melius succedet. Species duae sunt, una foliis obtusis, altera acuminatis. Vtraque in hortulo nuper mihi plantata spem aliquam suae durationis facit. Vide infra in Sorbis. Videtur enim ad Sorborum aut Mespilorum genus pertinere.

Dipsacus sativus, aculeis echinorum sursum uersis, G. Huius qui lanas expolant alicubi agros plenos ferunt. Sylvestris, cuius capitulorum aculei deorsum spectant, passim obuius est: sicut & species minor paruis globosisque echinis.

Do.

Doria, si bene memini, uulgo dicta in prouincia, D. Vide *Panaces chironium*.

Doronicum, R. K. G. Ae. Hoc est summis alpibus bis aut ter in hortulum transtuli, ubi per duos aut tres annos plantatum uixit & floruit. Circa *Monspeliu* memini etiam in planicie reperire, nescio an omnino idem, an potius Romanum cognominatum.

Doronicum Romanum, F. duplex, A. praedictum scilicet, & tertium quoddam a Romano diuersum, foliis angulosis, radice ad scorpii similitudinem accedente, magis quam in aliis duabus speciebus. non tamen idcirco *Aconitum* esse potest, ut quidam putauerunt, uel haec uel alia *Doronicum* species: cum radices omnium longe dulcissimae, & homini saluberrimae sint. Alpino quidem etiam rupicaprae suauissime uescuntur: unde & nomen apud Heluetios *Gemsennurz*. Nuper speciem *Doronicum* pulcherrimam, plurimis in radice per interualla ceu scorpionibus admirabilem *Franciscus Calceolarius* totius rei herbariae longepetissimus, Veronae ad Campam auream pharmacopola, depictam ad me misit: eamque in horto se alere scripsit.

Dorycnium a quibusdam falso dictum, circa *Monspeliu* in litore nascitur, flosculis albis, suffrutex astringens, &c. G. Eius planta una duos aut tres annos in hortulo nostro durauit, & semina probe maturauit. Bene fert hyemes. Argentinae etiam in horto D. pulchre prouenit.

Dorycnium Odi falsum, Ae. Aliqui suffruticem quendam montanum (uitis Idem speciem puto) pro *Dorycnio* habent: *Cordus Halicaccabum* peregrinum a nonnullis dictum: neutrum probo.

Dr.

Draba uel *Arabis Dodonei*, *Thlaspi creticum* quibusdam, C. Lege etiam *Tarchon*.

Draco hortensis seu acetarius, Vide *Tarchon*.

Dracunculus, *Dracontium*, *Serpentaria*, O. C. G. Species duae, F. In Germania syluestrem inueniri non puto. Species altera, Venetiis in horto *Maphei* de *Mapheis* medici.

Dryopteris, *Adiantum* ferè cognata herba, G. In colle lapidoso ad *Badam* nostram sponte prouenit.

Dulcichini siue *Trasi*, K. G. L. *Leuschnerus*. Flores non ferunt, neque caule: sed folia tantum *Caricis*, seu *Calamagrostis*: radices geniculatae, & ceu paruulae quaedam nuceae (nucleo et crusta constantes molliori) ac seminum loco sunt: eaeque feruntur in Italia, ut circa *Veronam*. loco arenoso et ubi humoris aliquid subest, letius crescere putarim. Minores & suae spontis in Africa proueniunt, ubi *Hab alzelim* uocantur. Aliqui in Italia luncum auellanam uocant: quem *Amatus Lusitanus* Venetiis uendi scribit ex *Aethiopia* aduectum. Graece *Schoenocaryon* nomen finxerim, &c.

Dulcis radix communis, *Glycyrrhiza*, R. Ae. Nascitur & in nostro hortulo: in quo duobus aut tribus annis absque flore & fructu caulem edidit tricutilem ferè: quarto primum anno flosculos & siliquas ostendit. Haec cum scriberem ad cubitos quatuor excreuerat, decem aut pluribus (aliquot enim refeceram) ab una radice caulibus, sub finem Iunii mensis, neque dum tamen flores ostendebat. Prouenit autem primum plantata radice, quae inter alias a mercatoribus allatas, ceu uegetior electa

M m ii

fuerat. Folia tactu glutinosa sunt, & leuiter subolent nescio quid aromatici, Calami fere, sub noctem præsertim: quo tempore folia omnia demittuntur, interdum uerò surriguntur. Glycyrrhiza (inquit Fuchsius) multa, nec ignaua, aliquot Germaniæ nostræ locis, Pabenbergen si præsertim agro, producitur. Et hodie nusquā ferè non feritur in hortis, his quæ semel comprehenderit tam pertinaci fertilitate cohaeret, ut uix unquam possit radicitus extirpari, tam restibili fecunditate regerminat. Aua dió & Fullaci in Carinthia prouenire: & illic etiam ut in Franconia Bambergæ, in agris coli: tertio aut quarto quoque anno effodi, hoc modo: sulcus longus, nempe per totum agrum ducitur, duos ferè pedes latus: profundus tres aut quatuor drantes, sic maiores radices eximunt, relinquunt minores. Glycyrrhiza Italica, ad Dioscoridis descriptionem melius accedens, O. & C. à quo etiam aridam cū fructu echinato missam accepi. Glycyrrhiza syluestris, Ae. ea herba puto, quā Dodonæus libro 2. pagina 36. iconum suarum pro Hedyfaro pingit: quæ apud nos sive spontis reperitur herba, aliud quidem, idque uerum Hedyfarum, eiusdem libri pag. 367 exhibet.

Ec.

Echinopus, G. A. Didymus Obrecht. Sic autem appello genus Cardui, quem alii Spinam albam, alii Crocodilium uocant, ni fallor: flore cæruleo in globū collecto & echini instar rotundo aculeatoque capitulo, &c. Aliqui Germanice *Juncen* *frawen distel* appellant. Bellonius alium, ut uidetur, echinopodem, in Græcia hodie dictum, nouit.

Echium, R. Circa urbem nostram in sabulosis abunde nascitur.

Egani uel Thani arbores (ut Montanus appellat) similes ligno Guaiaco: septem uel octo in horto Vu. sentit autem forte de Laburno nostro.

El

Elaphoboscum. Vide Bupleurum.

Elleborine O. R. C. qui omnes puto Consiliginē nostrā hoc nomine intelligit, quā Dodonæus Pseudoelleborū uocat. Vide supra Consiligo. In catalogo quidem horti, K. Elleborinen aliam à Consiligine inuenio: quam & Sesamoides nuncupat.

Ellebori quatuor species, F.

Elleborus albus, R. O. G. K. Vide infra in Gentiana.

Elleborus niger, uulgaris, (in collibus & montibus nostris sponte,) O. G. Est qui circa Larium lacū in collibus nascitur, flore magno, purpureo, &c. foliis albioribus quā noster sit, ut foemina uideri possit, nam et minus uehemens est: noster uerò, masculinus cum Dioscoridis descriptione conuenientem Venetiis in horto uidisse memini. Is nimirum est Elleborus niger uerus in horto, K. At qui à Dodonæo uerus creditur Elleborus niger, de quo dixi supra Astrantiæ nigrae nomine, toto genere ab Elleboris omnibus differt.

Ellebori nigri species (ut aliquibus placet, propter radicis in figura simul & uiribus similitudinem, nam folia Abrotani sunt, flos Ranunculi, sed multo maior) ueteribus indicta: quanquam aliqui Sesamoides faciunt, G. Est qui Consiliginem esse somniet. Vide supra in Bupthhalmo. Quidam pro Sesamoide accipiunt, ne illi qui dem recte. Nos Elleborastrum nigrum appellabimus, donec aptius aut uerius nomen indicauerit alius. In hortis diutissime durat: floret Martio. Sponte nascitur in Vallelia inter S. Mauricii oppidum & Sedunum: propius quidem illud.

Elleborastrum nigrum.

Endiuria. Vide Intybum.

Ephemerum R. Colchicum nimirum, quo prata nostra humidiora abundant: nisi Lilium conuallium intelligat, de quo leges infra.

Er

Erino cognata herba, ut uidetur, uel Lactoridi, Militariue: Esula dulcis Trago, G. Reperitur circa pedes montium locis humidis: radicibus geniculatis, ideoque uiuacissimis.

Eruca, O. propriè dicta flore albo, quæ perit quotannis, & altera luteo flore, uix in hortis, angustioribus foliis, Erysimon hortense puto, G. Syluestris Eruca ab horten.

hortensi genere differre uidetur; Erysimō non itē. Crescit hoc Bernē circa urbis mu-
ros, & in ruderibus, (& Luteciae similiter,) diuersum ab Erysimō Tragi uel Do-
donaei, qui Verbenam foeminam a quibusdam non recte dictam, cum sinapis sylue
stis potius genus sit, pro Erysimō exhibent; item a Mathioli Erysimō, qui herbā
S. Barbarae uulgō dictam, pro eo pingere uidetur.

Eruca agrestis passim in nostris uitiis crescit, folio satiuæ simili, strictiore tamē
& minore, flore luteo, quæ præsertim circa Calendas Iunii erumpere uidetur ē terrarū
nam alio tempore uix reperitur: eius enim semē diutissime in terra asseruatur priu-
quam germinet, Carolus Stephanus.

Eruum. Lege Orobus.

Eryngii duo genera, R. C. quorum alterum maritum esse coniicio: alterum medi-
terraneum, hoc est, procul a mari nasci solitum, quod circa Basileam plano & aspero
solo abundat.

Eryngium Aëtii, AE.

Eryngium cœruleum O. maritum flore cœruleo, O. K. D.

Eryngium alpinum, in montibus ditionis Bernensium Helueticorum, foliis fere
rotundis, serrato ambitu, non aculeatis: flore ceu Cardui pulcherrime cœruleo.
Eidler distel. Huius ad me allatas radices aliquas plantauī in horto: quæ primo an-
no folia tantum produxere: secundo, etiam caulem cum flore, sed imperfecte. In hor-
to A. semen maturarunt. Tertio mihi perierunt.

Erysimum. Lege Eruca.

Erythrodanum. Vide Rubia.

Es.

Esula dulcis. Lege in Erino.

Esula maior R. foliis oleæ fere, maioribus, duos aut tres annos durat, G. in collu-
bus quibusdam asperis, ut circa Scaphusiam & Basileam crescit.

Eu.

Euonymus illa quæ passim in sepibus apud nos crescit, pecori tamen & capris nō
letalis ut audio, G. C. Aliam eius speciem propē Genuam nasci, quæ ad Dioscoridis
descriptionem magis accedat, Pet. Bellonius mihi retulit.

Eupatorium Dioscoridis & aliorum Græcorum, hoc est, Agrimonia uulgō dic-
ta, ut passim circa nemora nascitur, ita in hortos transfertur facile: sed nō diu durat.

Eupatorium Mesuæ. O. R. puto autem eos Gratiolam Italis dictam intelligere,
ex Val. Cordi sententia. Eam nos quoq; ē palustribus ripis expatiantis lacus nostri
in hortum transtulimus semel atq; iterum: sed parum durauit, quod aquam subef-
se delideret. Alii Eupatorium Mesuæ interpretantur herbam quandam odoratam,
Costo hortensi cognatam. Vide in Agerato.

Eupatorium Auicennæ, ut quidam cognominant, nescio quam recte: locis aquo-
sis provenit, fruticosum, idem in hortis quanquam sicco solo plantatum, aliquot an-
nis durat.

Fa.

Fabæ albæ, rubæ, R.

Faba inuersa. Vide Anacampseros.

Fabago arbor, Bellonii cura Luteciæ iam crescit, sic autem nominat Lotum forte,
quæ alio nomine Faba Syriaca dicitur.

Fagus G.

Fagus sepium a Germanis dicta, Vmo opinor quā Fago magis cognata: Carpi-
nus (ni fallor) ab Italis uulgō, nam Plinii Carpinus species est Aceris.

Fe.

Ferrum equinum, Italis uulgō, Ferro de Cavallo, C. Rurpodius. Sic Itali uocant
herbam, cuius semen seu siliqua soleam equi ferream præ se fert. Medicæ speciem ef-
se putant aliqui.

Ferula C. A. K. Semen ex Italia adfertur, ubi sponte nasci puto in montibus, præ-

M m iij

ferim Apulix. Herba similis est Libanotidi à quibusdam eruditis existimata, foliis similiter multifidis, &c. sed minor, & sapore foliorum differt: nec non odore radicis, quo Libanotis planè thus refert, ut Argentina mihi affirmavit Massarius. Plurimis annis in hortis durat. G. Argentina quidem in horto quodam ultra annu quatuordecimum nunc uiuit huius generis herba: quæ ferulæ ne sit, an Libanotis, aut eius species, inquirendum diligentius. Ego Libanotidem potius quam Ferulam esse puto, quæ Argentina & nostro in horto nascitur. Libanotidis quidem ferulaceæ species duæ à Dioscoride traduntur: nec dubito quin etiam plures sint.

Ferulago ab Italis quibusdam dicta, ex semine nuper apparere mihi cœpit.

Fi.

Ficus, G. ad quadraginta, Vu. Pereunt apud hos hyeme non raro, præsertim minores adhuc, nec quatuor aut quinque cubitis proceriores. has in fine autumnii in scrobe iuxta radicem facta, obrui terra tutius est: sic enim & contra frigus muniuntur, & plures maioresque fructus ferent. Verno tempore rursum attolluntur, initio Aprilis maxime in nostro cœlo. Sic curata ficus mea quamquam loco umbroso, multos tamen grandes & succi plenos fructus partim Augusto, partim Septembri protulit: deinde transplantata, deterius iam habet. Initio cum non obruissem terra, superficiem perdidit. Argentina in quibusdam hortis paulo post solstitium fructificare incipiunt, perguntque usque ad autumnum. audio & biferas ibidem esse interdum, ita ut & media æstatè, & rursus autumnò maturent fructus: interdum alterius duntaxat temporis fructu perficiant. Grossi uel primi fructus apud nos decidere solent: sequentes uerò maturescere. Ficus è semine nunquam aut uix oriri uidetur, Scaligero teste.

Ficus Indica, quam aliqui ridiculè Opuntiam nominant, G. K. Rurpodius. Mihi quidem è foliis tribus uno ad mediam, uel amplius, partem terræ inserto in uase, mox foliis aucta est. Vuossello Vratislauix è semine prodiit, anno secundo demum ut audio: alius è semine facile nasci mihi narrauit. Folia tria ex Italia mihi attulerat Anso Korfiam uir bonus et simplicium medicamentorum peritissimus. ex his intra mensem ferè, alia plura enata sunt, Maio mense, hæc postea uase in cellam tepidam (hypocaustum non calefieri solitum, sed calido contiguum) reposito, sub finem hyemis æruginosis quibusdam maculis notari, & putrescere (uel potius contabescere, & in aquam ceu hydropica, nullo ut putrida solent fœtore) cœperunt: fortè quia semel ac iterum aqua aspersa fuerant. Partibus autem tabidis à me recisis, reliqua remanserunt: & noua pullularunt. At hyeme altera, cum septendecim foliis constaret, deciderunt omnia, infimo tantum relicto: cuius itidè pars tabescere incipiebat: qua resecta, Maio mense demum nuper quatuor alia folia eruperunt: quæ una cum infimo, iam infirmato, ne proxima hyeme mihi pereant, metuo. Non solum quidem folia, sed etiam partes eorum terræ mandatas, comprehendere atque crescere, dimidio uno (cuius partem mediam putrescentem rescueram) plantato, didici. In Italia & calidioribus Gallix locis felicius crescit, & hyeme etiam in hortis sub dio relinquitur: sed undique stupis inuolutam induunt, et rigatione abstinere. In Gallia Cispadina non fructificat, ut audio, ne Patavii quidem aut Ferrariæ. Calidioribus uerò locis, Roma, alibi, & in Græcia, fructum perficit: quem aiunt longum esse digitos ferme octo, graui quodam odore. Mandragoræ ferè: non edi, & si edatur, urinam cruentam ducere. dulcem esse puto, & inde Ficus nomen impositum. Folio dissecto multus & tenacissimus humor emanat, instar albi liquoris oui: quem ulceribus antiquis utiliter adhiberi aiunt. Ineptè alii Carduum Indicum uocant, propter spinularum in foliis ceu penicillos. Hyeme superiorum diuersis in locis Germaniæ hanc plantam seruare aliqui conantur in cellis uinariis nimirum, omnibus (ut audio) perit. Arborefcit tandem in Italia ad quinque cubitos altam se uidisse aliqui mihi retulerunt, & folium infimum temoris ferè crassitudine. Tota enim planta foliis constat, ita ut è singulis singula binaue nascantur: idè è margine duntaxat, siue summo, siue ad latus. Retulit mihi quidam uisam sibi Monspelu hanc plantam tres cubitos

cubitos altam, cum fructu maturo, quē de foliis promat ex aliquo penicillorū meā-
tu. Septimo aut octauo anno fructum profert, qui maturefcit autumnō dodrantalis
ferē, uerrucosus ut Cucumis uel Pomum mirabile: cui etiam colore ferē similis est in
maturitate, ut scribit Carolus Clusius: qui conicit hoc esse Euphorbium quod Jo-
Leo in descriptione Africę describit: id quod cōsiderandum est diligentius. Cardas-
nus De uarietate lib. 13, cap. 67. Ficum Indicam (inquit) Mexicanī, apud quos fre-
quens est, uocant Nuchli, arborem nopāl. Indi autem insulę Hispanę arborem uo-
cant & fructum Tunas. aliqui etiam Pithaiam huius generi (ceu speciem alteram) ad-
numerant, Granorū quę fructibus illis continentur, ad sericum tingendum usus
est. Refrigerant hi fructus: succo quoq; foliorum pro aqua utuntur, &c.

Filipendula, Oenanthe. G. O. Pratis hūmidis gaudet. In hortis ad biennium du-
rare puto singulas plantas, sed sparsis seminibus restaurare se nisi in riguis non faci-
le potest. *videtur etiam a Nic. Myrepso scribitur. Specie aliam, foliis ferē Apii*
hortensis, circa Monspelium in nemore uidi.

Filix fœmina G. quę multis ā radice statim foliis (errant enim qui hanc marem
faciunt) passim in syluis abundat. Marem plantare nondum conatus sum: quę simi-
liter ubiq; syluis, & neglectis innascitur agris.

Filicis genus rarius, latiore folio, & floribus insignē, ab Hier. Trago depictum,
Argentinae in Sebaldi Hauuenreuteri medici eximii horto uidi.

Filicis genus minus & aquaticum, quod circa lacum Felium (qui ab urbe nostra
duarum ferē horarum itinere distat) palustribus pratis luxuriatur, G. Diu uiuit in
siccis etiam hortis.

Fl.

Flamma uel Flammula Iouis, seu Lychnis coronaria, ut quidam uolunt, nos flo-
rem Iouis potius uocamus ex Theophrasto. AE. O. K. *Himmelblümle*. Flammula
(Phlox uel Phlogion Theophrasti nimirum) Scaligero est flos ab odore Caryo-
phyllus dictus.

Flammulae nomen aliis aliis plantis urentibus attribuunt. pleriq; Clematidi, de
qua dictum est supra.

Flos uel Caryophyllus Indicus uulgō dictus, herba Tanacetum refert: floris ue-
rō species Caryophyllum florem altilem uulgō dictum, *Indiansch blümen/ In-
diansche nägelin*. Hunc florem primum ad nos allatū ex Africa, cum Carolus V.
Tunetum traiecisset, Remb. Dodonæus author est: unde *Thuenisbloemen* apud
inferiores Germanos uocatur. Punica lingua Pedua uocatur, si bene memini. Spe-
cies duę sunt apud nos, una minor, uix cubitalis, & in solstitio aut prius florens: alte-
ra ad iij, aut iijj. cubitos assurgit, fruticosa admodū. Augusto florere incipit, ad hye-
mis initium, quod cum primum senserit, aut pruina aliquam, interit: semine non
maturato, nisi & primo uere seratur, & ætas calida sit. Vtriusq; speciei flos tum sim-
plex, tum multiplex reperitur: sed minor multiplex, apud nos rarus est. Maior ali-
quando ad pugni magnitudinem crescit & in globum colligitur. Ex eiusdem plan-
tę semine, flores tum simplices tum multiplices oriri puto: hos, si nihil impediāt, &
semina uegetiora sint, & forē de medijs præcipue floribus, nō iis qui ad latera sunt
collecti, & solum pingue, illos, si quid impediāt. Sic ex una Cucurbita, multū referre
aiunt, ē collo an parte inferiore semen detrahatur. Herba utraq; tenera est, caloribus
flaccescit, rigatione gaudet: ita ut ubi syluestres proueniūt, humidis riguisq; locis tā-
tum nasci existimē. Flores & in ipsis plantis diutissime durant, & decerpti cū petio-
lis suis in uase aqua pleno, subinde renouāda, uidi ita ad tres aut quatuor mēses du-
rare integros. Medio autumnō uasa, in quibus sati fuerint, loco tepidiore sub lecto
reponātur, aut in cellā uinariā, ita ad brumā ferē (id est breuissimū diem) durabunt.
Sunt qui odorē huius fruticis damnet, ceu insalubrē admodū: quod mihi sapissimē
circa eū uersato, nondū est compertū. Memini etiā sepe folia sine noxa me manden-
do triuisse, nō deglurisse tamē. Rēbertus Dodonęus uim uenenosā et cicuta simile
ei tribuit: quōd in puero qui gusiārat, labia & os inflata uiderit: & felē cui flores be-
nē tritos cū caseo recenti dederat, mox ualdē inflatam esse, & paulō post mortuam.

M m iij

Viola Indica, alia purpurea, alia aurea, Vu. de his forte floribus intelligens: quorum maiores aurei seu lutei sunt: minores, foris quidem eodem colore, intus uero croceo, siue luteo rubente. Cognomen ab India non probo, cum ex Africa ora ad mediterraneum mare allati sint: quare Caltham Africanam potius appellauero. Amatus Lusitanus tradit hos flores inueniri croceos, & melleos & albos.

Fœ.

Fœniculum commune nullis ferè hortis deest, & annis aliquot durat: eadē prorsus species (ni fallor) circa Monspelium sylvestris nascitur.

Fœniculum dulce, uel Florentinum, G. hoc æstiuum est, & nusquam puto suā spontis, sed artis & cultus.

Fœniculum marinum, Myuros Aëtii aliquibus dictum, K. Myurus quidem Aëtii Alinti folia habet, ac ueluti corymbos in summo oblongos, per terram sternitur: hydropicis urinas educit.

Fœnograecum facile in celo nostro prouenit & maturat semina. Argentinae agros plenos conseri puto. Sylvestre nunquam uidi. nam Ruta capraria Italorum, quam aliqui Fœnograecum sylvestre uocant, toto genere differre mihi uidetur.

Forbelina Bononiae uulgo dicta, Conyza palustris quidam, G. Morauis & Silesiis Stupparis, Sponte nobis abundat locis aquosis.

Fr.

Fraxini circa urbem nostram frequentes sunt, in syluis & montibus frequentiores. non omnes nec ubiq; fructificant. Magna & fructifera est in horto Vu. In montibus nostris iuxta Vuallestadium plurimè sunt fructiferae. Semina earum auis linguas medici quidam uocant.

Frutex coronarius quidam, C.

Fragaria fructu, quem fragum uocant, rubenae: & alia albo, G. Vberime in collibus & montibus nostris proueniunt fragae: eò odoratiora plerumq; quò altius nascuntur. Species earum minor, partim rubra partim candida sunt, herba hispidiore, unde *Naarbeer* appellant aliqui, ut scribit Tragus. Species alia sterilis. Al

Frumenti Turcici uulgo dicti genera (quædam,) R. Discrimen forte in colore tantum fuerit. intelligo autē barbatum illud foliis magnis, arundineis, flore in summo caule inuili, cum fructus è culmo enascatur. Nos etiam in horto aliquando & flauum & rufum habuimus. Panicum opinor rectius, quàm frumentum uocabitur, cognomento peregrinum. Cordus Triticum Bactrianum nominat. Facile crescit, et maturefcit maturè. Triticum Turcicum uel Indicum, rubrum & album, Vu.

Fructus quidam ex Guinea, Guanabanus forsan Scaligeri, C. Arborem hoc nomine Pini stipite, procera, fructu Melonis magnitudine, &c. describit Scaliger De subtilitate, exercitatione 181. partic. 6.

Fumaria, Capnium, Capnus, passim in aruis & locis cultis reperitur: De Capno Plinii uide supra in C. Est et Fumaria quædam montana, (quam ab Illyris Splet uel Split appellari audio: quod nomen funem significat, ab intorta similiter radice oblonga,) magnis & admirandis facultatibus nobilis herba, nondum satis mihi cognita: Italis, ut audio, notissima, eius species una flores luteos fert, quæ in monte Baldi ad Veronam reperitur, cuius loci incolæ eam nominant Chelidonium, altera candidos flores habet, ac reperitur in monte S. Iuliani in Heturia prope Lucam urbem: nec aliter inter se differunt, quæ tamen in Sclauonia nascitur, foliis constat aliquantulum pinguioribus, quàm quæ in Italia habetur, ut Aloisius Anguillara nos docuit. Videtur autem Capnus uel Chelidonia Phragmites Aëtii esse, & cognata Aristolochiæ rotundæ uulgo hætenus ab imperitis in Germania medicis existimata. Forma quidem foliorum & sapor à fumaria uulgari, ut audio, parum differt. Iconem eius inter Ioan. Kentmanni, picturas reperi. Alium Capnon Plinii uel Phragmiten Dodonæus pingit, herbam mihi incognitam, capreolis nitentem: quam in Germania inferiore in marginibus agrorum, & circa ueteres muros nasci scribit, pharmaco

Galega

Ga.

Galega. Vide Ruta capraria.

Galla, O. in Quercu aliqua nimirum.

Genista, R. K.

Genista humilis, C. Flos tinctorius Tragi. nascitur nobis sylvestris in collibus sic-
cis & apricis, circa Badam & alibi, **Pfingstenblumen**.

Genista iuncea seritur apud nos à quibusdam in hortis: sicut & in Italiae aliquot
locis, spectandi tantum gratia, Val. Cordus. Hæc mihi etiam hoc anno è semine
provenit, estq; nobis peregrina. Vide Spartus.

Genista uel Genistella spinosa, C. Hæc etiam colles quidam aprici apud nos abun-
dant, ut & alia quadam minima in Genistarum genere, caulibus angulosis & pecu-
liari quodam modo foliatis, Chamæspartium dixeris. Hæ duæ species, & tertia
quam Genistam humilem nominauimus, simul crescunt in colle iuxta Limagum fl:
infra Vuettingam monasterium proximè.

Gentiana, C. O. Species eius quatuor, magnitudine & florum colore præcipue
differentes, G. sed uidentur pleræq; aspernari cultum, præsertim quæ altius nascun-
tur in montibus, neq; enim caulescentes in hortis unquam uidi, neque florem aut se-
men emittere: ut neq; Elleborum album, Rhaponticum uulgo dictum, & alias quas-
dam, in nostris quidem regionibus. Facile tamen in hortis crescit & floret genus u-
num mediæ magnitudinis, foliis ferè Hirundinariæ. Flore ex cœruleo purpurascen-
te de qua paulò pòst. Norimbergæ in hortis Elleborum album & Gentianam bene
provenire, floresq; & semina proferre audio. Ego hortuli mei solum umbrosius, ar-
dius, & non satis pingue esse puto ad plantas quasdam perficiendas.

Gentiana cruciata, cuius radix crucis ferè instar dissecta est, **Wodelgehe**/Ae. Ea
passim apud nos in collibus siccis apricisq; & asperis crescit: radice plerumq; inter la-
pides sub terra latentes descendente, alba, peramara. In hortis uix apprehendit effos-
sa radix, & aspernatur cultu: semine uero in solo sibi conueniente melius nasceretur.

Gentiana foliis Hirundinariæ seu Asclepiadis quorundam, **Giffwurz**/Schel-
mentraut/C. Piperinus, G. Copiosa ubiq; apud nos locis montanis, circa semitas
alibiq; apparet. Effossa radix, & in hortos translata, apprehendit, durat, & caulè, flo-
res ac semina profert unà in hoc genere facillimè. Causam esse puto, quoniam radix
non singularis est, ut in plerisq; aliis, sed multiplex. Flores multos, confertos & ele-
ganter cœruleos extrema æstate fert.

Gentianæ species pulchra, Picris dicta, K. Picridis nomen forte recentior aliquis
ei confinxit: nam ueteres Græci, ut Theophrastus, Cichorium sylvestre Picridem
uocabant. Intelligit autem forte, K. Gentianæ speciem paruam in pratis humidio-
ribus autumno floribus cœruleo colore saturato insignem: quæ Plinii Calathiana,
aut eius species uidetur. Hæc aliquoties in hortulo mihi plantata, paulò pòst inte-
riit: quauis enim radix ei non simplex sit, locum tamen desiderat palustrem. Sic &
Gentianidem seu Gentianulam alpinam, nunquam retinere diu potui, iugis mon-
tium, aëri gelidissimo, & uentis niuosis assuetam. Sed neq; Violam Hippion à Cor-
do cognominatam, quæ & ipsa ueluti Gentiana perexigua uideri potest, in humidis
pratis, præsertim montanis apud nos, proveniens: sed cum amaritudine careat, di-
uersi generis fuerit. Gentianidem alpinam autumno superiore cū cespite plantauit:
quæ nunc etiam æstate pulchrè uiret: florem quidem producendum uix spero.

Geranii species quædam, G. una uulgaris circa urbem nostram, locis planis et are-
nosis præcipue emicans, folio Maluæ. Altera maior, montana, radicibus rubris, a-
stringentibus, **Blutwurz** appellant, hoc est, Ischæmon à facultate: (nam alia Plinii
Ischæmos est:) uiracissima in hortis: & flore perpulchro, è purpura subcœruleo.
Tertia fere similis montanæ, maioribus & latioribus foliis: quibus Aconitum lu-
teum repræsentat. nascitur in humidioribus pratis, in quibus ferè Bistorta etiam uul-
go dicta, flore rubente: hæc iam secunda æstate in horto mihi durat.

Geranium illud cui subrotundam radicem Dioscorides tribuit, in Illyria nasci-

Nn

*Gentianella in locis
nig. r. h. m.*

tur, superficie iam dicto simile: ab Aloysio Anguillara primum ex Illyria allatum superiore anno.

Geum Plinii, ut uidetur, herba quam uulgò Caryophyllatam à radicis odore uocant, aliqui Benedictam. Huius genera tria in horto mihi uiuent. Primum, quod urbani dixerim, radice odoratiore cæteris: hoc circa urbem nostram iuxta sepes alibiq; in umbrosis abundat. Secundum, riuale: nascitur enim iuxta riuos: & in hortis quoq; aliquandiu perdurat. Tertium, alpinum: pila lanuginosa postquam defloruit, maiore. Proximo autumno primum à me in hortulum translata, nescio quā uix futura. Quod si Geum forte alicui potius uideatur species laccæ, non cõtendendam. Scaliger Getiam appellat, quasi ad Geum alludens. Getia nigra (inquit) uulgaris est, & ad scoparum usum quaesita: sed radice spirante Cinnamomum, aut uerius Nardum, &c.

Gith. Quare Melanthium.

Gl.

Gladíolus uerus, G. è montibus Curiae Rhætorum ad me missus & plantatus, primis duobus annis folia quidem habuit, sed sine caule & flore: tertio & quarto floruit, & semen perfecit. Eundem in suis hortis alunt, Ae. Vu. C. A. Fert in uno caule modò duodenos flores, modò quinq; aut circiter. Aliqui Victorialem rotundam: appellant: ut Allium alpinum, herbam toto genere diuersam, Victorialem longam: propter similem radicis formam, multis ueluti lorice armatae.

Glaucium Papaueri corniculato simillimum, radice succo luteo prægnanti: floribus ex nigro, luteo rubroq; permixtis, (aliàs, floribus purpureis,) Patauit in horto Priulano, è Syria. [Vide Membræ & Papauer Cornic.] Nunc etiam Basileæ nasci audio in horto Theodori Zuuinggeri medici, angustioribus & pilosioribus foliis quàm corniculatum Papauer: cuius fortè species est.

Glaux uel Onobrychis Dodonæo (Tomo 2. Iconum, pag. 32.) existimata herba apud inferiores Germanos in hortis tantum colitur. Eadem, uel cognata ei, circa Curiam in pratis abundat, fructu echinato seu aspero, subrotundo, pecoris pabulo laetèq; augendo celebrata. Caules cubitales, fungosi, multi ab una radice surgunt: foliola Lentis ferè sunt, & in acumen exeunt, subtus hirsuta albicant: bina plerumque, octona uel nouena utrinq; in summo terna: satis coniuncta, sed recentius nata multum distant: insipida, &c. G.

Glycyrrhiza. Lege Dulcis radix.

Gn.

Gnaphalium. Vide Impia.

Gnaphalium marinum, (uel potius maritimum,) Vu.

Gr.

Græga. Vide Ruta capraria.

Graminis species Capriola uulgò Italis, Sanguinaria Auicennæ, O. G. In areis horiorum, alibiq; sua sponte exilit: ut & Dioscoridis gramen passim locis arenosis, geniculatis suis radiculis reptat: Cannaria Plinii ut uidetur. Nusquam non nascitur, abundant eo cœmeteria, At Theophrasti Cynops, quam Gaza Canariam uertit, Psyllium est.

Gramen album seu hirsutum, fibris radicum candidis, passim areis innascitur, inuisum mulierculis, quòd alimentum alijs herbis subtrahat. Hoc etiam aliqui Dentem canis Gallicè nominant: cum id nomen graminis potius debeat. De hoc Matthiolum sentire puto, cum scribit: Ex illo graminis genere, quo puerili dentes sanguinem è naribus eliciunt, Sclauì Carniolæ incolæ, item Goritenses, semen colligunt, deglubuntq; in pilis, & Milii uel Panici modo in carniū iure decoquant, granulis oblongiusculis, Panico minoribus, gustui nō ingratis, adeò ut Germani *Himmelbau* uocent, hoc est, cœlestem mannam. Hanc herbam Sclauì Cornici pedem uocant: Leoniceus Coronopum Dioscoridis putauit.

Gramen alpinū quoddam, Rabium cognominant lactariis, præcipuum, folijs breuibus

breuibus, carnosius, (non apparentibus nervis,) circa radicem radiatis in orbem pluribus, G. florem nondum uidi. pecori eius pabulo lactis copiam plurimum augeri aiunt.

Gramen Parnassi C. intelligit autem illam quam Poloni Enneadynamin uocant, Germani quidam florem Hepaticum, *Leberblümle*; in palustribus pratis nascentem herbam, & in hortis non facile durantem. Sed uerum Parnassi gramen a nemine adhuc demonstratum puto, nostro seculo.

Gramen a Fuchſio exhibitum, pulchris flosculis, candidis, & non indignum hortis, circa Tubingam passim iuxta uias & sepes Aprili mense florere uidi: apud nos non provenit.

Gramen alpinum quoddam, breuibus, solidis & mucronatis foliis, quod uulgo in Bernensium aut Valesiorum montibus Rabinum uocant, ceu principale puto: quod precipuum hoc uaccis ad copiam lactis augendam pabulum sit: hoc nuper in hortulum transtuli.

Gratia Dei C. intelligit autem uulnerariam illam herbam quam Tragus ficto nomine *Heiden hyssop* appellat: quæ circa sylvas & in collibus siccis, apricisq; sub fruticibus, passim apud nos obuia est, cultum non facile ferens. ea, si libet, uulneraria hyssopoides appelletur. Nostri aliam Gratiam Dei uocant, illam Sideritidis speciem, quam alii herbam Roperti. Galli quoq; aliam, quam Elaphoboscon aliqui putant: Tragus uulnerariae herbae nomine descripsit lib. 1. cap. 143.

Gu.

Guaiacum C. Puto autem ipsum sentire de arbore illa, quæ Patavii etiam hoc nomine in horto medicorum ostenditur: quam audio nasci in montibus circa Veronam: & è ramis eius aqua maceratis, rusticos uiscum parare: atq; ideo Viscaginè ab eruditis quibusdam ficto nomine uocari: quoniam Guaiacum non est: fructus eius immaturos, asfringere: maturos uerò ita dulces esse, ut ferè nauseam moueant.

Guanabanus. Vide Fructus.

Ha.

Halicaccabus, R. G. in Sabaudia alicubi uidi in campis nascentem, locis humilibus & humidis. Solanum uescarium. *Judentrieſe*.

Halicaccabus peregrinus a Fuchſio dictus, Caput monachi uulgo Gallis quibusdam, G. Non reperitur in Europa quòd sciam, præterquam in hortis. Toto genere a Solano halicaccabo differt.

Harmel, Harmala, K. C. foliis oblongis, flore albo: Ruta syluestris quædã, Vu. Vide in Ruta syluestri.

Hastula regia alia Asphodelus est, de quo diximus: alia in genere Maluarum, de qua leges infra.

He.

Hedera arborea, R. ea nimirum, quæ baccis nigris insignis passim arbores aut muros scandere & exedere uidetur. Eiusdem species luteis baccis est in horto K: Syluestre genus illud quod semper humi reptat, ubiq; obuium est.

Hedysarum. Lege Pelecinus.

Helenium. Vide Inula.

Helenium alterum Dioscoridis, Theophrasto simpliciter Helenium, hodie non satis cognitum, olim in hortis cultum apparet, sicut Serpyllum quoq; & Sisymbrium. Lege Theophrastum Historiæ lib. 6. cap. 7.

Heliochrysus uerus, Italicus: planta rara, pulchra & odorata, K.

Heliotropium maius, AE. Vu. C. G. aliqui herbam Cancræ uocant. Nascitur in aruis, flosculis candidis, scapo eorum inflexo instar caudæ Scorpionis, unde Scorpoides album dici poterit.

Eiusdem species altera, locis humidis gaudens, flosculis cœruleis: quam Scorpoides cœruleum dixeris.

Heliotropium minus, quod & tricoccum cognominant, siccū aliquoties uidi: ter

Nn ij

rae uerò hærens, nunquam. dignum certe quod in hortos recipiatur & specie sua, & uiribus medicis, quas commendari audiui, præsertim aduersus febres. Circa Monspelium sponte nasci audio, solo humili, arenoso & aquatico. Patauii feritur in hortis, seminibus è Creta missis.

Helxine quæ uulgò Parietaria dicitur, nusquam deest, omnibus ubiq; medicis & pharmacopolis notissima: humidis & umbrosis circa parietes locis uiuet.

Eiusdem species altera Cissampelus cognomine, in Conuoluulo dicta est.

Hemerocallis, C. Dodonæi nimirum, qui Liliū syluestre purpureum à Fuchsiō cognominatū pro Hemerocallide pingit. Hemerocallis uera, O. K. & alia quædam eius species K. Matthioli pro Hemerocallide Liliū syluestre pingit, quod in Italia passim inter segetes, in aruis, in pratis, montibus & uallibus reperiri scribit, flore aurei coloris: & alteram eius speciem, quam Fuchsius Liliū rubens uel croceū nominauit. Quòd ad uires, parū interest: utriq; enim Liliū (candidi) uires esse puto: quas & Hemerocallidi tribuit Galenus. Itaq; non errauerit (opinor) qui Hemerocallides, omnes istas appellauerit, adiecta aliqua differentia: ut sunt, alpina, aruensis, purpurea. Alii Hemerocallidem aliam esse putarunt, Bulbū scilicet litoralem Theophrasti, quod Monspelii Pancratium interpretantur, & pharmacopolæ uulgò pro Squilla minore habent. Hos fortè decepit Liliū marini nomenclatura, quæ apud Dioscoridem Hemerocallidi tribuitur. Cæterum aliud est Hemerocallis Theophrasti, toto genere diuersum.

Hemionitis Germaniæ peregrina est: in hortis quidem nostris translaturum cespitem facile duraturum sperarem: quandoquidem Phyllitidi nostræ tam facile diuq; duranti cognata uidetur.

Hepatica aurea, (herba trinitatis Italis, à folio nimirum tripartito: Germani aliam hoc nomine uocitant,) O. Nascitur in syluis, locis humidis & umbrosis: unde in hortos translata, diutissime uiuit: & ueris initio, aut potius ante uer, Februario mense, pulcherrimis cæruleis floribus tempus uernum nobis prænnunciat. Rarior est flore albo. Vtraq; hortulum meum ornat.

Heptaphyllum, O. nimirum Tormentilla uulgò dicta: quæ nusquam non apud nos collibus humidis emicat, in hortis non diu durat, uel Quinquefolium palustre: quod aliquos Heptaphyllum uocare uideo. Nascitur id circa Lacum Felium apud nos dictum, floribus purpureis.

Herba scala, O. nescio quæ.

Herba serrata, C. nescio quæ.

Herba trinitatis alia uocatur Italis, nempe Hepatica aurea ut iam diximus: alia Germanis, de qua inter Violas dicemus.

Herba uenti Monspelii dicta, Vu. *Ανιμοχόρην* in compositione Marciati unguentum magni nominatur apud N. Mirepsum: ubi Fuchsius: Herbam uenti (inquit) sunt qui Umbilicem Veneris esse dicant: alii Helxinem seu Parietariam: nonnulli Conosolidam minorem uocatam.

Hermodactylus Mesuæ folio maculoso, K. Circa Bononiam, ubi sponte abundat, Dentem canis uocant, aliqui non rectè pro Satyrio Erythraico ostendunt hanc aut similem quandam.

Herniaria à Gallis dicta, à nonnullis (ni fallor) Millegrania. in agro Monspelienſi ubique in aruis crescit. Tragus Empetron uocat, Germanice *Harnkraut*. In ripis Rheni infra Brisacum etiam uidi, G. æstiuæ est herbula: & seipsam profeminat.

Hi.

Hieracium maius Creticum, satium, Patauio nobis missum, G. A. Ae.

Hieraciū minus, agrestis herba, Hedypnois aliter dicta Plinio herba passim obuia, circa urbes præsertim & in hortis, maximo (ut puto) post Tragopogonem paporum globo, *Αόλιντραυρ*. Matthioli cum Intybis & Cichoriis hanc herbam pingit, Dentem leonis, aliisq; nominibus, recentioribus tantū nuncupans. Pro Hieracio

racio autem minori, herbam aliam minorē, Sonchis puto cognatam, exhibet, quod ad vires, parū interesse arbitror.

Hippion Cordi. Vide Calathiana uerna.

Hippoglossus, (melius Hypoglossus) seu Vuularia uulgò dicta, *Zeppflintraut/* K. Itali Bonifaciam uocant. Patauini quidam in hortis colunt. In Germania non puto nasci sponte. Adfertur ex Vngaria: ubi reperiri audio in ripis fluuiorum, solem occidentem uersus plerumq; locis non humidis. In hortis satum prouenit quidem, ut audio, sed pumilum manet, neq; fructificat. Radix quidem satis crassa, carnosa, & geniculata cū sit, herbam uiuacem ostendit.

Hippomanes. Vide nux Methel.

Hippomarathrum, K.

Hipposelinum, Lege Olusatrum.

Hirundinaria. Vide Asclepias.

Ho.

Hordeo obseruntur agri. Nascitur & quod Nudum uocant, in Italia.

Horminum, O. Sclarea nimirum uulgò dicta: cuius species una hortensis est, floribus ex albo subcœruleis: altera syluestris, nusquam non in pratis obuia, flore cœruleo ut plurimum, rarior albo: utraq; in hortulo nostro duos aut tres annos durauit. Hormini pulchra species, K. Aliqui Orminum sine aspiratione scribunt, Galenus Phormium.

Hy.

Hyacinthus, O. R. Vide Bulbine, & Bulbus syluestris. Hyacinthorum multæ species, V. u. Primus & secundus Fuchsi, A. e. Hyacinthi tres species, C. qui & Pancratium à quibusdam existimatum pro Hyacintho accipit. Hyac, orientalis, K. Varrii, Leuschnerus. Autumnalis, C.

Hyoscyamus uulgaris, circa urbē nostram nascitur, loco plano & ruderali: Matthiolus unum duntaxat Hyoscyami genus sibi cognitum scribit: flore aureo, & semine subflauo potius quā nigro: atque hic est uulgaris noster *Bilsensamen/* qui ab ipso & Fuchsio pingitur. Dodonæus officinis familiarem esse scribit, & nigrum nominat, tanquam à floris colore potius quā seminis: sicut album quoq; & luteum à se uocatos. Hier. Tragus & Dodonæus Hyoscyamum album quoq; pingunt atque describunt, qui in hortis Germaniæ inferioris seratur.

Hyoscyamus albus & luteus, æstiuæ herbæ, C. Fatetur autem se dubitare an uerè Hyoscyami sint. luteus quidem peregrina illa herba est, quam aliqui è Syria allatam aiunt, sapore acris: floribus Hyoscyami, luteis. Monspeli quidam Priapeiam uocant à forma fructus. Hyoscyamum nec sapore, ut dictum est, nec odore refert: nec aliter puto quā flore, calyce ac semine. Satus apud nos probe crescit, & facile maturat semen. Hyoscyami tertia species Patauini in hortis seritur: semine, quod nuper mihi sit amicus ad me, exili, subrufo è fusco, allato è Creta.

Hypecœum, K. C. & alterum spurium, (à Matthiolo nimirum pro Hypecœo pictum, quod Maluæ & Alcææ species est,) C.

Hypoglossus. Lege Hippoglossus.

Hyssopus uulgaris, nulli fere horto deest. Ramulus auulsus facile radicitur. Syluestrem nasci puto in Narbonensi Gallia: sed & apud Vallesios nostros sponte oriari audio.

Hyssopus Crispa, C.

Hyssopus de Moschata, Rurpodius, C. G. Peregrina hæc seu Cilissa Hyssopus à Dodonæo describitur: & cum iconibus Stirpium primi Tomi Fuchsi Antuerpiæ excusis cum nominibus & descriptionibus Hispanicis, sub libri finem depingitur: facile crescit fata.

Ia.

Iacæ syluestres herbæ, flores habent uiolacei coloris, unde & nomen forsan illis impositum est. Ia enim Græcis Violæ sunt, quanquam Iacæ nomen uetus non est. Scaliger alicubi Getiam pro Iacæ scribit, tanquam à Geo facto nomine: nimirum

Nn iij

quod nigra cognominata in hoc genere, radices ut Geum Plinianum, odoratissimas habeat: ut ipse scribit, ego haecenus odorem illum non inueni, cum tres aut quatuor species norim, omnes Centaurio maiori cognatas: quædam in pratis, aliæ parietibus, aliæ collibus siccis nascuntur. Hortis quidem dignissima fuerit species illa, si inueniatur, quæ Scaligero Cinnamomum aut Nardum olet, ueluti Baccharis quædam. Vide supra in Geo. Iaceam quoque aliqui uocant herbam prædictis longè diuersam, Violæ nigræ cognatam: de qua inter Violas.

Iasme, uel (ut alii scribunt) Iasminum, Ieseminum, Gelsiminum, floribus albis, suauissimi odoris, G. facile nascitur, etiam ramulis & taleolis: & propagatione breui multiplicatur: semine non item, ut puto. Iuxta parietes plantari debet, & opere topiario digeri, bene fert hyemes, ut mirer apud nos tam nobilem fruticem neglectum haecenus fuisse. Copiosum & procerum Lindauia uidi in caua dio domus Matthiæ Curtii. Idem alunt partim candido, partim etiam luteo flore C.K. Ruripodius. Arabum uernacula lingua (inquit Matthiolus) Zambach siue Sambach uocatur, nec diu est, quod in Italiam allatum est, quamuis nunc ubique horti opere topiario tum albis, tum luteis, tum etiam cœruleis Gelsiminis ornentur.

Iberis (sic enim scribendum sine aspiratione) à Matthiolo picta, G. semen ex Italia habui, facillimè prouenit, nasciturio syluestri cognata herba, fruticosa, multis, longis lentisque ramulis: anno altero in caule effunditur, & semina profert, quorum restibili fecunditate durat, hyemes contemnit, nec folia amittit quæ iuxta radicem sunt. Dodonæus aliam quoque Iberidē nominare uoluit, nasciturio prætenfe quodam, frequentissimum in pratis nostris, foliis ferè rotundis *Gauchblum*.

Ieseminum. Vide Iasme.

Ilex aquifolia. Lege Aquifolium.

Im.

Imperatoria, Quære Astrantia.

Impia Plinii, ut Matthiolus interpretatur: Gnaphalium quibusdam (ut Fuchsio) existimatum, *Xurtraut* / G. Collibus terrenis & apricis passim abundat.

In.

Intybum (Endiuiam uulgò) Italicum O. Verum, & alterum uulgare, R. Angusti folium, quod Scariolam aliqui uocant: & latifolium, quod ad acetaria hyemis terra obruitur, (ut dictum est supra in Cichorio,) G. Agreste sua sponte passim circa uias abundat. Vide Seres.

Inula, uulgò Enula, R. O. G. Hæc alibi puto in campis & pratis, sponte nascitur: unde campanam medici cognominant, hortensi nimirum præferentes. at quæ apud nos reperitur in hortis, & pratis circa domos urbi uicinas, omnis puto plantata est. Vide Helenium.

Iouis flos Theophrasti, nostris uulgò Cœli flos, *Himmeltsfle* / *Lychnis* aliquibus, ut Matthiolo: qui genus etiam syluestre eius apud Ananienfes inueniri tradit.

Ir.

Iris communis, G. hæc semina non fert: quod si hæc ipsa alibi syluestris reperitur, ut puto, Iris syluestris maior fuerit. Non solum autem in uno flore unius speciei colores diuersi reperiuntur, sed etiam in diuersis diuersarum specierum floribus totidem ferè iidemque, ni fallor, qui in arcu cœlesti. Iris albo flore, F. Ea, Matthiolo teste, è genere hortensium est, cuius radix odoris fragrantia & uirium robore Illyricam ferè equat. Ex epistola amici ad me: Lacuna uult omnes Iridis (siue arcus cœl.) colores in uno flore spectari, ex Dioscoridis sententia. Cornarius autem diuersos flores diuersis coloribus tinctos, ex sua uersione, (qua Græca Dioscoridis uerba prorsus sequitur,) sensisse uideri potest. Vidimus quidem nos Iridis flores totos albos, & totos cœruleos: alius fortè rubros: noui ego qui & melinos uiderit.

Iris Florentina, Ruripodius huius radices uegetiores sunt, & solidiores, siccatæque non corrugantur ut nostræ, gustu minus feruida, sceminam dixeris. Puto autem hortensem esse.

Iris

Iris Illyrica, Ae. K. O. *Iris sylvestris*, Hermolao Barbaro *Illyrica dicta*, K. crescit sponte locis mediterraneis *Illyriae*.

Iris tenuifolia, Ae. Hæc puto est, quæ in pratis humidis quibusdam apud nos crescit copiose; & semina quoque profert, *Illyrica* similis, ut audio; communi urbana undique minor. Eadem in hortulo meo iam aliquot annos durat. Ab hac differre puto duas *sylvestres* à Matthiolo exhibitas, in montibus & collibus saxosis nascentes.

Iris Arabica (si recte legi, & non potius *Illyrica* legendum est, ut conficio;) & altera celestis, (nimirum communis,) R.

Iris Matthiolo alia est *fatua*; eaque uel cœruleis, uel niueis floribus: Alia *sylvestris*, foliis reliquisque partibus, *fatua* similis, paulò minoribus tamen. Ex hac *fatua* originem duxisse uidetur cultu uegetior grandiorque effecta. Sic ille. Sed cum & *fatua* & *sylvestris* in hortis reperiantur, neque hæc optior in illam cultu degeneret, specie eas differre existimandum est. Est & altera *sylvestris*, inquit, foliis *Gladioli*, longioribus, radice tenui, lignosa, geniculata, subrufa, inodoraque; caule breui, flore cæteris longè minori, odore *Armeniæ* mali, &c. Sunt qui hanc legitimam *Illyricam* putent, *Illyricam* ab *Italica* differre existimantes. ego uerò *Illyricam* non uel genere uel specie à nostrate differre dico. sed quòd cœli solèque illius conuenientia præstantioribus polleat facultatibus. At cum fateatur *Illyricam* esse *sylvestrem*, *Italica* autem *sylvestris* species duas ipse proponat, existimandum est *Illyricam* uel alterutram ex illis esse, uel tertium genus *sylvestre* ab ea constitui. itaque indistincte loquitur qui simpliciter ab *Italica* nihil eam differre dixerit. Errant qui Iridem domesticam nullam esse, aut saltem à ueteribus non memoratam putant, quoniam Theophrastus dixerit Iridi nullum cultum accommodari. At Theophrastus de *Illyrica* tantum locutus est. neque de cultu hortensi dixit: sed Græce ἡ ἱρὶς καὶ ἡ ἰριδὶς καὶ ἡ ἰριδὶς, πλὴν τῆς ἰριδὸς καὶ ἡ ἰριδὸς καὶ ἡ ἰριδὸς. quæ uerba si Græcè legisset aut intellexisset Matthiolum, commodius illorum opinionem retulisset. non aliud enim sentit Theophrastus, quàm Iridis illius radicem, ut suauiter odorata ueneat, non aliter præparari, quàm ut circumquaque purgata acrasa, siccetur. Hæc prolixius, sed ab hortorum cultu non aliena.

II.

Isatis fatua, *Glastum*, Weib/O. G. facillimè nascitur; altero anno, si bene meminisse, caulem, flores & semina perficit. Alicubi agri hac herba conferuntur in usum tinctorum. *Sylvestre* genus eius apud Vuallesios nostros extat, & alibi.

Isopyron, C. id nimirum quod Dodonæus exhibet, quod Germani superiores *Biber tlee* uocant, inferiores *Bocyboonen*, id est, Fabam hircinam. Ternis enim foliis, fabaceis ferè, locis palustribus reperitur: radice longa, geniculata, &c. Hoc ille *Isopyron* putauit, quoniam alio nomine *Phasiolus* à Dioscoride dicitur. *Phasiolum* autem interpretatur Fabam communem, cui planta hæc similia habet folia. At *Isopyron* Dioscoridis *Aniso* simili folio constat, cuius extremitas in capreolum torquetur *Phasioli* instar, &c. hodie, quod sciam, ignotum.

Iu.

Iua aliqui *Chamaepityn* uocant, de qua dictum est supra. *Iua arthritica* & *moschata*, F. *Moschatam* puto alii aliam cognominant. *Rhæti* *Insubriae* finitimi, sic uocant herbulam montanam, *Tanaceto* cognatam, &c. aromatico odore insignem: quam autumno superiore in hortulo plantaui: & nunc etiam in fine lunii pulchrè mihi uiret: florem nondum ostendit, siue quòd nondum tempestiuum sit: siue quòd loco umbroso plantata est, & ætas huius anni 1560. humidior frigidiorque solito.

Iuiuba. Vide *Ziziphus*.

Iuniperus, R. Ea colles & montes nostri abundant, tum humili, quæ baccas maiores fert: tum arborecente, quæ minores. Minima est quæ in *Alpibus* nascitur: quæ aliquando plantata mihi, non apprehendit.

Na iij

Keiri uel Cheiri, Vide Leucoia.

La.

Laburnum Plinii, K. Ae. C. Quare Anagyris.

Lachryma Christi uel lobi, O. K. Hanc aliqui Lithospermi speciem faciunt: pro-
bè quidem si seminis substantiam respicias: modò Dioscoridis Lithospermum gene-
re toto differre intelligamus. hæc enim Arundineæ naturæ est, quæ in hortulo no-
stro aliquando sata, antè florem interiit. Monspelii in hortis frequentem uidi. Arun-
do Lithospermos forte nominari poterit, quanuis radix ei nō est ut Arundini geni-
culata, sed in multas statim ab uno principio fibras diuisa. Itali uulgò Lachrymam
lobuocant, nullo eius, usu nisi quòd mulierculæ seminibus istis filo traiectis suas pre-
ces numerant.

Lactoris. Vide in Erino.

Lactuca alba, nigra, crispa, G. Est autem crispa, ni fallor, eadem quæ sessilis & ca-
pitata: excaulis, Pythagoricis Eunuchion, mulieribus aslytis, (sic enim legendum,)
Cilicia aliquibus & Latifolia, crispa, latiorq; Cappadocia, admodum probata. Ca-
pitata quidem genus minus, in hortis nostris est: maius Basileæ, præsertim apud
Cælium Secundum.

Lactucæ syluestres quædam, elegantes herbæ, in syluis alibiq; apud nos inueni-
untur: una purpureo flore, aliæ luteo: in hortos transferri dignæ. flos omnium papa-
pescit. Ex his quæ in syluis humidis crescit ad quatuor aut quinque cubitos, Sonchus
arborescens Dioscoridis est forte. Species una ex illis, folio oblongo, subdulci &
grato gustu, anguloso: floribus luteis, &c. in horto multis mihi annis durauit.

Ladanum. Vide Ledon.

Lanium. Vide in Vrticis.

Lantana, uulgò Italici dictus frutex, quòd Viminum instar lenti eius ramuli sint:
pictus à Trago lib. 3. cap. 28. *Eleiner Wälbaum*: in plerisque sepibus nostris arbusculi
instar excrescit. Aliqui Viburnum hoc putant.

Lanaria, O. Saponariam uulgò dictam intelligens, ni fallor.

Lancea Christi, Vide Ophioglossum. Aliqui Sideritum primam Matthioli in æ-
quatilis nascentem sic uocant.

Lanceolam montanam, uocare libet herbam quandam in Albio nostro nascen-
tem, locis argillosis, rarissimam: foliis Plantaginis minoris, oblongioribus: radice ob-
longa, simplici, foris nigra: & si uratur, odorata. Hæc in hortulo meo plantata, pau-
lò post interiit. Alibi uidere non memini.

Lapathum hortenſe in Sabaudia tantum uidi, circa Laufannam, & alibi, ubi Lam-
pe uocatur uulgò. Huic simile est Lapathum syluestre, quod & Oxylapathum
uocant, à foliorum figura acutiore (quàm nonnullis, non quidem omnibus) Lapa-
this, nusquam non obuium. Hoc circa Friburgum Helueticorum ut audio, foliis ferè
rotundis inuenitur. Maximum est, quod aliqui apud nos in hortis ferunt, Rhabar-
barum monachorum dictum: quod idem aut omninò proximum Hippolapathum
(in palustribus locis, aut montanis nascenti) uidetur. Minima est coxalis, ab acido sa-
pore dicta: una maior, pratensis, longioribus foliis: altera minor, quæ circa Glaro-
nam nostram locis siccis & lapideosis ad pedes montium circa ripam Limagi nostri
nascitur: eademq; aut cognata, rotundioribus foliis, quam Galli & Sabaudi in hor-
tis ferunt, propter succum eius acidum, embammatis præcipuè utilem. Acetosam
Gallicam aliqui uocant. Est & aliud Lapathi genus syluestre, quod circa lacus nos-
tri ripas nascitur, in ipsa etiam aqua. deniq; Persicaria uulgò dicta, in humidis na-
scens, maculis nigris, Lapathum quoddam uidetur. Postremò Rhabarbaricum, La-
patis omninò affine est.

Lapathis etiam, (Oxylapathum præsertim,) adnumeranda est herba illa, quam San-
guinem draconis uocant, propter colorem in foliis & caule rubicundum, semine
simili, foliis minoribus, gustu astrigenti, Ae. G.

Lapfana.

Lapfana. Vide Rapisstrum.

Larix alpina arbor in altissimis Rhætorum & Vallesiorum montibus nascitur. Scaliger Græciæ ignotam esse prodidit. In colle urbis nostræ Tiliis consito Larices duæ spectantur; & Bernæ iuxta templum. Plantaueram & ego paruulas in pædio meo Larices: quæ non prouenerunt, diutius opinor in uia retentæ.

Laserpitium Gallicum. Vide Angelica & Astrantia.

Lathyrus in plerisque hortis apud nos, suis ipsa seminibus sparsis se profeminat.

Lavandula uulgò dicta, Stichadi ueterum cognata, sicuti & Nardus uulgaris: in Liguria (unde & in Africam uehitur) suæ spontis; & nisi fallor, circa Monspelium quoque in plerisque apud nos hortis colitur.

Laureola seu Daphnoides, F. Sponte quidem circa lacum Lemannum nascitur, foliis ferè Lauri, angustioribus, solidis, gustu feruidis, &c. Vide Piper mont.

Lauri aliquot, K. Ae. G. iam quatuor fortè annorum quædam & cubitales è bacis prognatæ. Ante hyemem in uasa transfero, sub tecto reponendas. Verè rursus in hortum, ferobibus in area excitatis. Iacobus Funccius, prætor urbis nostræ, annis iam quindecim ferè, Lauros iam quatuor cubitos altas habet: quæ tamen hæcenus nondum ei floruerunt, (alteri cuidam ciui nostro, proxima estate floruit sua, nescio quot iam annorum Laurus.) Curam eandem adhibet, quam supra Citris ab eo adhiberi diximus.

Laurus syluestris, Vide Tinus.

Laurum Græcam Plinii interpretantur aliqui arborem uulgò ab Italis dictam Sycomorum: de qua diximus in Azadaracht. Seritur Laurus etiam ramo, teste Plinio, de quo ueteres dubitauerant, Laurus uulgaris, quæ Baccalia tempore Plinii dicebatur, à baccarum fertilitate. Idem meminit Spadoniæ, mira opacitatis & umbræ patientia insignis, ea forte facilius in Germania, quàm alia Lauri genera duraret.

Laurus Alexandrina, C. Interpretatur autem Hippoglossum, de qua superius dictum est.

Le.

Lens maior, G.

Ledon, alterum Cisti genus (frutex è quo Ladanum fit) mas et foemina, A.

Lentiscus, Rurpodius.

Leontopetalum, quod Matthiolum pictum exhibuit, radicem recentem uir quidam eruditus, superiori æstate ad me misit: pugni crassitudine: quæ nescio quomodo mihi euauit. Semina eius in Italia non reperiri audio.

Lepidium Aeginetæ, Lauri folio, maiore, G. In plerisque ciuium nostrorum hortis commune, à Sinapis sapore *Senff kraut* dictum. Sponte nascitur Romæ intra & extra urbem, Crapinella uulgò dicta.

Leucacantha, id est, Alba spina, C. Intelligens puto Carlinam uulgò dictam, (de qua supra,) ex Dodonæi sententia.

Leucoium proprie Violam albam significat, (ut Melanium nigrum, Theophrasto,) sed eodem nomine cuiusunque coloris eiusdem generis flores appellantur. Sunt enim Dioscoridi Leucoii flores cœrulei, albi, purpurei, aut lutei. Mihi cæteri inter se omninò cognati uidentur, ut in solo colore differētia sit. (*Strasburger nägele*, nostris.) Lutei uerò nobis cogniti, qui Keiri Arabice uocantur, sui sunt generis: odore, sapore, specie tota, & duratione differentes: propter similitudinem tamen ad eiusdem nominis communionem asciti sunt. *Gäle nägele*. Leucoia proprie dicta, alba dico, purpurea & cœrulea (uel potius uiolacea, cœruleo purpureoque colore mixtis,) In hortis tantum apud nos uisuntur, & hyemem non ferunt, nisi sub tecto loco tepido reponantur. Reperitur huius generis syluestre in litore maris circa Monspelium. Lutea uerò hyemem facile ferunt: & syluestria in muris ac moeniis oppidorum, multis in locis, Galliæ præsertim habentur. Hæc

ante alia florent, initio ueris si loco aprico sint. Eorundem genus sylvestre minus, Argentinae circa uias & sepes in suburbis lulii, principio florens reperi. Viola alba, et species maior, flores multos singulis caulibus sustinens, C. Leucoii (inquit Dodonaeus) duo genera sunt, unum quod a satione anno altero, & deinde aliquot sequentibus, primo uere floret: alterum priori simile, minus tantum & tenerius: quod uere satum, mense Augusto ut plurimum flores profert. Vtriusque flores aut sunt rubei, aut ex purpureo in puniceum inclinantes, aut albi, aut cineri candidiori colore proximi.

Leucoia hortensia, quae praediximus, in plerisque omnibus mediocriter instructis hortis reperiuntur apud nos, & alibi.

Leucoium marinum purpureum, Vu.

Leucoium bulbosum Theophrasti, Ae. G. **Wys Hornungs blumen.** In syluis quibusdam apud nos circa Glattum fluium nascitur.

Li.

Libanotis prima ex Asia, Ae.

Libanotis prima Dioscoridis, quam Ferulaceam cognominarunt: ab eruditis quibusdam in Italia creditur, quae a nonnullis uulgo Ferula existimatur ut audio: suae spontis in montibus Italiae quibusdam. Vide in Ferula.

Libanotis (ferulacea) nigra Dodonaei, **Schwarz Hirschwurz**: & alba eiusdem, **Weyß Hirschwurz**: Fuchsius hanc Sefeli Aethiopicum facit, (ut & Matthiolus:) illam Peloponnesiacum. In hortos non facile transferuntur radicibus: e seminibus puto felicius exorturae. In collibus terrenis apud nos reperiuntur: alba quidem aprici, illa potius umbrosis in Albio monte.

Libanotis coronaria, Vide Rosmarinus.

Libanotis Theophrasti, C.

Ligusticum, uel Lewisticum, uulgo dictum, **Lybstickel**, R. G. de ueteri eius nomine nondum constat. Matthiolus Hipposelinon esse putat. In Africa audio plantam Silphii huic persimilem esse.

Ligusticum, seu Lybisticum uerum siue ueterum, C. Ae. Sic autem uocat Ae. Siler montanum uulgo dictum plerisque pharmacopolis: quod quidem si Sil, uel Sefeli aliquod non est, Petroselinum forte fuerit: uisum acrimonia, & amaritudine insignis, &c. Matthioli Ligusticum uidetur herba quaedam ferulacea, aut foeniculacea, quae in pratis riguis apud nos crescit, radice nigra: (quam Cordus forte Pastinacae nigrae sylvestris nomine descripsit:) quod si non est eadem, species certe proxima fuerit, sola forsan magnitudine differens. Idem quod Matthioli, pinxit etiam Dodonaeus.

Ligustrum, **Kern gerten**, circa urbem nostram copiose nascitur: frutex aptus se pimentis, propter lenta & flexibilia uimina.

Lilium album in plerisque hortis cernitur: sylvestre ubi nascatur, nescio. Plinius se minus eius meminisse: quae in nostro nulla sunt.

Lilia rubra diuersa sunt: omnia, ni fallor, sylvestria: praeter illa quae artificio hunc colorem contrahunt, ut meminit Plinius lib. 21, cap. 5.

Lilium purpureum a Fuchio & Trago dictum, Italici Martagon, in syluis et montibus nostris abundat: uulgo **Goldwurz** a flauo radicis colore uocant. Species eius duas notant, sexu (ut uidetur) distinctas: foeminae folia uiridiora: mari, qui rarius occurrit, nigriora. Hemerocallidem purpuream hanc dixerim. Translatum in hortos diu durat.

Lilium rubens uel croceum montanum: nascitur in saxis montium nostrorum, terra contextis: caule oblongis augustisque foliis comato, bulbis radicibusque albis, supra infraque fibratis. Flore Lili candidi, sed paulo minore. Rarius superiore. Pingitur a Matthiolo pro Hemerocallide altera. In hortis hoc etiam diu uiuit. Bulborum particulae separatae etiam germinant: sed aliquot annis florem uel non producant,

producunt, uel exiguum quoddam floris rudimentum candidum: donec augeatur & multiplicetur bulbus. **Rotberggilgen.** Hoc an Cynorrhodum Plinii sit, quærendum; aut aliud ex illis quæ hic memoramus Liliis rubris. De hoc puto sensit, K. cum in catalogo suo mihi nominauit Lilia rubra, humili cauliculo, siue semine.

Lilium rubens uel Croceum alterum, Hemerocallis Matthiolo, quod Italicum cognomino. **Rotwild Welschgilgen.** Hoc in Italia ubique prouenire scribit Matthiolus, inter segetes, in montibus, & uallibus, aureo colore. Describitur & à Marcello Vergilio. Florum eius extrema non reflectuntur, ut in Liliis plerisque aliis. Hæc Lilia esse conficio, quorum in catalogo horti, K. mentio fit, his uerbis: Lilia pulcherrima floribus rubris, qui tanquam in corymbo confereti complicantur, duo decim ferè, uel octo decim, uel plures. His circa singula folia, singula semina collocata proueniunt: quibus in terram sparsis, intra annum recètes bulbi germinant. Item in catalogo horti Ae. Lilium rubens seminiferum, deniq; R. Lilia crocea, quæ semina in caule habent.

Lilii rubentis genus, uidetur etiam Tulipa Turcarum, cuius picturam cum ad uirum quandam doctissimum misissem, is Cynorrhodum Plinii (uel ut ipse legere mauult, Crinorrhodum) esse putauit. Sed ita dictum à Plinio Lilium in Italia quoque nascitur: Tulipa uerò ista (nam & alia quædam hoc nomine uocatur herba, luteo flore, &c.) Italiae (ni fallor) prorsus peregrina est, nisi in horto fortè aliquo conspiciatur. Mihi Augustæ in horto magnifici uiri Ioannis Heinrichi Heruerti florentem uidere contigit unicam plantam, Byzantio (ut aiebant) allatam: Eam exhibui & descripsi in hoc uolumine in fine Quatuor librorum Cordi de Stirpium descriptionibus. Cynorrhodi quidem Lilii Hyacintho similis, Hesychius etiam meminit.

Lilium rubens arundinaceum Turcarum hortis frequens esse, meminit Bello-nius: foliis Cannæ seu arundinis Elogiæ, radice graminis illius quod Dentem canis appellant Galli, sed multo crassiore. Hoc si quis à radicis forma Cynorrhodum uocare uoluerit: aut à foliis Cannorrhodum, non absurdè fecerit.

Lilia montana cœrulea, quæ & candida reperiuntur, Chr. Piperinus: de Iridisne an Lilii propriè dicti specie aliqua sentiens, nescio.

Lilium conuallium uulgò dictum, **Weienryß.** Viuacissimum in hortis: propagat & multiplicat se ipsum radiculis geniculatis reptantibus. Semine puto non crederet: quod ei corneum & amarissimum est in acinis rubentibus. In collibus, uallibus, & syluis proximis abundat nobis hic flos, locis umbrosis, quod mireris, omnium odoratissimus: & pulchro nomine dignissimus, quod à ueteribus impositum dum quaerimus, interim, si libet Callionymum appellemus, iustiori ratione quàm Anonymum olim quidam ignoto sibi nomine plantam uocitarunt: uel Chamæcytinum. Est enim Cytinus flos satiuæ Punicæ, ut Balaustium syluestris. habet autem hæc herba florem Matthiolo teste, Balaustii uel Arbuti effigie.

Limonium, hoc est, Bistorta, diu in hortis durat, G. In pratis quibusdam humidis, à quibus & nomen tulit, copiosè nascitur, montanis præsertim. Eius species duæ uidentur esse, magnitudine differentes.

Limonium Monspelienisium Didymus Obrecht Argentinae: foliis ferè Polemonii, flosculis luteis, conferctis, exilibus, oblongis, &c. Mihi quidem cum Limonio nihil commune habere uidetur: & suspicor propter uocum uicinatem Limonium aliquem pro Polemonio protulisse, &c. Pingitur à Dodonæo tanquam altera Polemonii species. Crescit (inquit Dodonæus) ut & primum Polemonium, locis asperis, lapidosis, montanis. Apud nos (in Germania inferiore) plantatur in hortis.

Linaria uulgò dicta, (Osyris quibusdam: mihi non uidetur) & in hortis aliæ quandiu durat, & sponte passim nascitur locis siccis & apricis: floribus luteis. Est et species quædam eius alpina, minor, flosculis cœruleis perelegans, G.

Lithospermum commune, uulgò ineptè Milium solis, Mauritanii Milium Soler appellant: quoniam in montibus Soler frequens nascatur, G. O. Prouenit apud nos

sponte passim, prope Silum torrentem iuxta oppidum nostrum, solo ferè arenoso: Hortense cultum non amat. Lachrymam lobi sunt qui Lithospermum maius appellant. Vide in Lachryma.

Lithospermum fruticosum, & alterum uirgatum, Aë. uirgati nomine forsan commune intelligens, fruticosi uerò Lachrymam lobi.

Lithospermum minus, Vu. Id nimirum quod à Matthiolo pingitur, & in aruis sponte exilit: quod nunc etiam in meo hortulo in fine lunii ferè defloruit: caule uno, uirgato aut ramofo ualde, sesquicubitali.

Lo:

Locusta à quibusdam dicta, *Nislettraut*, G. estur in acetariis per hyemem: reperitur enim in aruis hyeme tota uirens latissime, foliis fere Oleæ, ceu Oliuella quadam: Oliui etiam sapore quodammodo, insipida alioqui. Quod si cū Dracone hortensi misceretur, ipsa olei, ut ille aceti salisq; saporem afferret.

Lonchitis altera, K. Aë. Ea montanis allueta locis, non facile in hortis nostris apprehendit, nec durat. In Germania tamen inferiore, crescit etiam humilibus locis, in syluis & marginibus fossarū. *Spicant* aliqui Germani uocant, fortè quod radices radicam *Spicam* aliquo modo referant. Huius duo genera in horto alit, R.

Lotus satiuæ, G. Ea feritur uulgò apud nostros lactarios presertim, qui recoctam (ut uocant) herbis coniungunt, ex quibus hæc præcipua est: unde & nomen ei imposuere, *Zigertraut*/*Stundtraut*/*Sibengezeyt*. Hanc olim Lotum syluestrem esse putabam: quod ad facultates quidem nihil interest: in forma tantum aliquid discriminis est. Oxyn Plinii nunquam ad Lotos pertinere existimaui, ut nuper quidam, memoria nimirum lapsus putauit, &c. Lotum enim utranq; Fœnogræci uires habere semper agnouit, Oxyn uerò contrariis esse præditam.

Lotus syluestris, G. Ea in Italia feri solet, sed etiam sponte (ni fallor) nata ibidem reperitur. Trifolium odoratum uocant. Viribus (ut dixi) à superiore non differt, quas cum Fœnogræco utraq; communes habet: ut neq; odore & sapore: sed flores habet luteos & in siliculis seminata: illa in glumis breuib.

Lotum pentaphyllum dixerim herbam, qua imperiti quidam pro Meliloto hætenus abusi sunt, in odora prorsus. Nascitur ubiq; in pratis & collibus siccis: floribus luteis, subnascens siliculis. *Gäle Tubentropsle*. Folia ei quina, quorum tria prominent, bina, cauli uel ramulis hærent. Species eius duæ sunt: una minor, læuis, supinata: altera, maior, modice hirsuta, & erecta magis, astringenti gustu, &c. Matthiolus Lotum urbanam nominauit: non probo.

Lotus palustris, Vu. sentit autem forte de illa, quam ternis foliis in palustribus locis nasci diximus, supra in Isopyro.

Lotus arbor, G. lam plus quam bicubitalis. Alebat illam in horto Forerus notus Virodurensis medicus pereruditus, quatuor cubitorum iam proceritate: sed superioris hyemis iniuria ei interijt. Eiusdem plantæ aliquot uiuunt in horto, Vu. & K. Hanc arborem Itali uulgò nominant Fago, non tanquam Fagum Latinorum, sed à Lotophagis forte per apocopen. Folia ei fere Vriticæ.

Lu.

Luciola, Vide Ophioglossum & Cyperellam.

Lunaria, R. Sentiens puto de illa, quam Græcam cognominant:

Lunaria Græca, G. C. Rotunda et longa, O. rotundam intelligo, cuius siliques sint rotundæ: longā uerò siliquis longis. Nascitur in montibus quibusdam, cū alibi, tum Helueticorū, circa Glaronam & Curiam. Species duæ sunt: una floribus inodoratis: & hæc quidem, ni fallor, editioribus tantum locis: nullo alio discrimine. Facile ē semine prodit, duratque in hortis nostris: & folia (Viola nigræ tere si milia, maiora) per hyemem retinet. Anno secundo caulem fundit, (& circumquaq; fruncans, latiore solo ad tres cubitos assurgit,) cum floribus & siliquis latis compressis, lauib., argentei nitoris cū maturuerint. In ea læuitate Lunæ faciem noctu representari aiunt, sicut in lapide etiam Lunari seu Aphroseleno, quem

&

& specularem uocant; inde nomen utriusque. Sed lapidinetus, herbae notum, Quo enim ueteres nomine plantam hanc dixerint, nondum constat. Dodonaeus Violam latifoliam nuncupat. Herbarii quidam (inquit) uocant Bolbonac, Brabant *Penningbloemen*, uel *Paeschbloemen*. Alii scribunt Bulbonach, nescio qua dialecto aut significatione. Helli *Flitteren* uocant. Graeca unde cognominata sit nescio, nisi aut nomen aut res est Graecia in Italiam forte primum illata sit. Semen latum, compressum, rufum, & cum aliqua amaritudine acerrimum est: unde ego Thlaspi generibus hanc plantam adnumerarim, & Thlaspi montanum appellauerim: ad indicandum simul formam. siliquae praesertim ac seminis: facultates, & natales poterit & Lunare cognominari. Accedit sententiae nostrae Dodonaeus, & Thlaspi praesertim Crataeae, hoc esse putat.

Lunaria Graecae similes producit siliquas herba, laticae scilicet & compressas, sed minores: nec ea lauitate, sed asperas & squarosas: nec eodem colore. Flosculis luteolis, foliis simplicibus, oblongis, asperis, albicantibus, G. K. Semen ex Italia habui: bene provenit: aestiua herba, si maturius & aprico loco feratur: tardius uel umbroso loco sata, per hyemem durat, & altero anno fructificat. Alyssum cognatum suspicor. Semen ex Italia allatum est: ubi in montibus sponte nasci arbitror. Dodonaeus Alysson Dioscoridis hanc facit: & ab aliquibus Lunariam maiorem uocari tradit.

Lunaria Arthritica, *Flüßblümle*. Vide in Arthritica.

Lunaria minor, A. e. ea nimirum quae a Fuchsio eodem nomine depingitur, quae sponte nascitur in faxis montium. In hortis quidem diu durare posse uix puto.

Lunaria burissa, A. e. sic autem herbarii quidam Scorpioides Matth. nominant, si bene memini. Herbula est flosculis luteolis: siliquis gracilibus, longis, articulatis, inflexis,

Lupini communes, G. R.

Lupini Hispanici flore luteo & caeruleo, K. R.

Lupinus syluestris, O. G. Species eius duae, floribus caeruleis, C.

Lupinus salictarius, uulgo Lupulus, *Hopsen*. In sepibus nostris passim abundat. Vitis instar colitur a Germanis Septentrionalibus pro condienda eorum ceruisia.

Lutea uel Luteum Vitruuii ab eruditis quibusdam existimatur esse herba, quam Tragus lib. cap. u. non recte Antirrhini nomine pingit ac describit. *Orant oder Sterckkraut*: foliis simplicibus, angustis, rugosis, oblongis, multis circa radicem: caule duorum aut trium cubitorum, flosculis referto, pallidis, longo deinceps ordine ut Verbaſcum, &c. Nascitur areis incultis, limitibus agrorum, & secus itinera. Huius planta una ante triennium in hortulo mihi est semine nata, sparsis ab ea cum maturuisset seminibus, hortum repleuit. Caulem & semina edit secundo anno. Alii qui hanc temere Struthium appellant. Aliqui Resedam Plinii: sed aliam Resedam doctissimus Aldronandus Bononiensis nobis ostendit, quae Arimini etiamnum nomen seruat: quam Lucas Ghinus Sesamoides maius uocabat: cui cognatum uideatur quod Monspelli Phyteuma nominant, etsi foliis multum diuersis.

Ly.

Lychnidis nomine antiquo herbas alii alias ostendunt: plerique illam, quam nos Florem lous appellauimus: (Vide supra) Lychnidem satiuam uel coronariam faciunt. Dodonaeus Ocimoides nostrum, Lychnidem syluestrem uocat. alii herbam quandam in aruis & circa agros Tritico consitos nascentem, quam nonnulli Persoliatam rubeam uocant: alii Lychnidem monachorum, *Rarthüſer blümle*. Aestiua est herba. Dodonaeus Vaccariam nominat, & Ocimoides esse suspicatur. Lychnides quaedam: & species una agrestis, K. Lychnidis species floribus elegantissimis, C.

Lyfimachium luteum, quod luteos flores fert, G. in hortis diu durat, & radiculis suis se propagat. Nascitur iuxta riuos & humidis locis sponte: sicut etiam purpureum cognominatum cui flores rubent: non colore solum, sed specie tota diuersum.

Oo iii

CON. GESNERI

Id minus diu in hortis uiuit. Dodonæus Lysimachiis adnumerare uoluit tertium etiam genus, foliis oblongis, serratis, flosculis cœruleis, &c. quam ego Anagallidis aquaticæ uulgò dictæ speciem esse potius dixerim. Nascitur apud nos in foliis quibusdam, aquam ab exspatiente lacu recipientibus.

Ma.

Maizum. Vide Sorgum.

Majorana. Vide Sampsuchum.

Malacocissum Democritus Aquilex mollibus Hedere foliis depingit caule tene ro, sese cuiuscunq; quod fuerit nactus inuolvente. Subesse aquam ubi reperitur, affirmat. Videtur autem lasiones siue Asines, seu Conuoluuli species maior, aut Vitis nigra quâ Ruellius Cyclaminū alteram existimat, aut non longè dissimilem. Vtraq; & sponte apud nos crescit: & in hortis à rei herbariæ studiosis colitur.

Malua agrestis maior, locis cultis ferè apud nos sponte prouenit: minor incultis, circa uias passim. Sunt & Alcea & Ibiscus Maluæ agrestis genera.

Maluæ quatuor genera, R.

Malua Romana quibusdam dicta, Hastula regia Apuleii, (nam alioquin Hastula regia Asphodelus est.) *Enrofen*. Differentia ei à floribus colore candido, & rubro: & quod flos uel simplex uel multiplex est. In nostro orbe satiuā tantum habetur, G.

Malua crispa, quam aliqui (non superiorem) Romanam cognominant, foliorum margine crispo & fimbriato eleganter, O. G. K. Hæc etiam in hortis tantum colitur: ad octo pedes excrescit, flores uerò in Maluarum genere minimos profert, albican- tes, modicè roseos: in fine æstatis & autumno floret.

Malua arborecens Dendromalache, O. G. Hanc primū Argentinae in orto Herlini uidere mihi contigit, sex aut septem cubitos altam, ramis brachiatam, truncu coligoso. Perit hyeme primis frigoribus si sub diu relinquantur, radicitus. Florere hæcenus aut fructificare non uidi.

Malua (uel potius Althæa) Theophrasti. Vide Albutilon.

Malua Veneta. Vide Alcea peregrina.

Malum insanum, C. G. Massarius Melongena uel Melentzana uulgò Græci: quo nomine etiam Strychnū appellant. Aliud est Manzinanion Aëtio, nempe ra dix Aegyptiæ fabæ. Fructus unius speciei puniceus est, alterius albus. Solanum po- miserum dixerim. Agreste enim Græci Agriomelentzana uocant, Zacharia Cal- liergo teste. Insaniam quidem fructus hic minime facit: sed aliorū quorundam Stry- chnorum, quibus hæc herba aliquo modo similis est, uidentur autem Græci recen- tiores multa uocabula à Latinis mutuati. Fructum apud nos non perficit, nisi maturè admodum feratur. Melensana (inquit, Ruellius qui fruticem hunc describit. li. 2. ca. 4.) Galli Amorū poma nomināt, fortè quia propter elegantiam et pulchritudi- nē dignum sit amari. Fructus est pomi magnitudine, in orbem circinatus, in quibus cartilago granis intercepta cucumeraceis cōtinetur: quæ edendo sit. Estur uulgò ex oleo, sale, pipere, fungorum modo coctum, &c. Eodem gaudet cultu quo Cucume- res & Melones. Est & aliud Pomum amoris ab aliis dictum. Vide infra in P.

Malorum genera quamplurima optimaq; in hortis & prædiis nostræ regionis proueniunt: præcocia, media, serotina. Horum aliqua durant tribus, quatuor, aut pluribus mensibus, quædam usq; in sequentem annum, donec alia maturecant, com- modè reposita. Malorum genera quædam (non quælibet tamen) ramis & brachiis suis in latitudinem diduci ab elegantia studiosis solent: ut brachia undiquaq; in sur- perficiem ferè planam extensa, tecti cuiusdam speciem, pedamentis in orbem dige- stis sustentata, præ se ferant. Eiusmodi non pauca apud nos priuatis publicisq; lo- cis uisuntur.

Mala Apiola dicta Italica, dulcia illa quidem, tam iucundè fragrant, ut uniuersas Indias sua superent suauitate, Scaliger.

Mali humiles duorum generum: una, cuius fructus poma Adami uocant. Vtraq; frutex potius quam arbor.

Malus

Malus nana, (Zwerg äpfel,) Matthias Curtius Lindauiae. Poma fert Paradiseis uulgò dictis non dissimilia, albicantia: quæ sub finem Iulii maturescunt. Arbustum non supra quatuor cubitos assurgit, fruticans à radice.

Malus quædam ex Italia: cuius poma magna & rugosa in præcio sunt, Pampin appellant. Idem Curtius.

Mala Cydonia siue Cotonea, nullis ferè instructoribus hortis defunt. Coronea magna, Vu. Pira Cotonea (Struthia Galeni, ut uidetur) pulcherrima & maxima, Vu. Coronea Piris similia, Matthias Curtius etiam Lindauiae alit. Persica arbore in malum Cydoniam inserta, Cydonium malum enasci uidemus, Nic. Monardus Hispalensis medicus.

Mala citrea. Vide supra in Citro.

Malum Armeniacum, uel præcoquum (duracinum) commune, G. Amarellen/Barilleli.

Mala Armeniaca ex Vngaria, magna & optima, Vu.

Mala Armeniaca candicantia, gustu suauissima, nucleo oblongo, dulci, ut Amygdala uideantur, Vu.

Mala Armeniaca alia, longè maxima, quæ ille existimat esse uera ueterum Armeniaca, Vu.

Malum aureum. Lege Pomum aureum.

Malus Persica. Vide in P.

Malus Punica, C. G. In hortulo quidem meo uix cubitalis nunc est, sed admodum fruticosa, nam ante biennium contra hyemem non munita, superficiem amiserat: sed denuò germinauit à radice. Bicubitalem uidi Argentinæ in horto Massarij: Mali Punicæ ad triginta, Vu.

Mandragoras, R. A. K. Ae. F. G. Vu. Cum fructu quidem adhuc in Germania non uidi. Latet aliquando, ut dixi in Achanto. In Italia alicubi sponte nasci puto. In horto amici quarto postquam satus est anno nuper floruit: fructus autem nullus subsequitur.

Mandragoræ generibus aliqui adnumerant Solani genus, quod Itali Bella donna uocant. Vide inter Solana.

Manna Polonis dicta, alia fatiura est, alia syluestris, eaq; melior. Vide in Gramine supra.

Maron, O. Vide Clinopodium Dodonæi. Mari ueri rarissime herbæ semen peregrinum in Italiam fertur, nec nisi maxima cura provenit.

Marrubium album, G. In plerisq; hortis alitur. Agreste nasci cum alibi, tum circa Argentinam uidi. Nigrum, quod Balloten uocant, nusquam non agreste abundat. Me.

Medica uera, genus Trifolij procerum, plurimis ab una radice caulibus, siliquis intortis cochlearum instar, floribus subcæruleis, Ae. G. R. Aliquot iam annis in hortulo nostro uiuit: flores & semina fert quotannis: alta hoc tempore cubitos quatuor: colligatis ad perticam caulibus, ne supina iaceat. Circa Luteriam sponte nasci audio. Circa urbem nostram in marginibus agrorum reperitur Trifolij genus, Medicæ per omnia simile, sed floribus luteis, & siliquis non ita intortis.

Medica minor, K. G. Trifolium tortuosum puto à quibusdam dictū intelligens.

Medicæ species plures, C. Sex numero, Vu. Inter cæteras unam Itali Ferri equini nomine appellant. Vide supra in Ferro.

Medion, Ae. Bononiæ olim Lucas Ghinus in horto mihi demonstrabat. Rapi syluestris genus maximum, quod Medium appellabat. Dodonæus Violæ Marianæ nomine pinxit. Reperitur in syluis & montibus Italiæ, foliis oblongis, floribus purpureis: et altera species albis. Ego olim an Lonchitis esset hæc herba, dubitabam.

Melanthium. Vide in Nigella.

Melilotus uera nascitur apud nos in aruis, alibique, locis arenosis præcipuè.

00 iiii

flore luteo: & altera species, albo. Vulgus Trifolium aureum appellat. Melilotus Italica quibusdam dicta, uel Trifolium odoratum, quod in hortis feritur. Loto non Meliloti species est, ut supra indicauimus. Loto pentaphyllo a nobis dicto imperiti aliqui pro Meliloto abutuntur.

Melissophyllon ueterum, uulgo Melissam esse dictam non dubito. Nam & Citrago appellatur ab odore quo Citrum refert: mihi quidem iucundo, etsi quibusdam ingratus, & uelut cicmicum odoris uideatur. Ea nullis ferè hortis deest, & multis annis perdurat. Huius etiam syluestre genus inueniri scribit Matthiolus.

Melissa uera, Rurpodius. De alia fortè quàm uulgari sentiens, Fuchsius nimirum. Melissa, uel Cedronella, id est, Citrago Turcica à quibusdam cognominata, nusper in hortis alicepit, Byzantio, (ut audio) allato femine, O. Ae. Vu. G. Odore multò grauiore & magis ad cimices accedente est, quàm uulgaris: angustioribus & oblongioribus foliis, herba æstiuæ, floribus purpureis.

Melissophyllon quod pro uero exhibuit Fuchsius, G. copiose in syluis nostris nascitur: & in hortos translatum aliquot annis manet. Lamium syluaticum dixeris, quanquam à cæteris Lamis non nihil differt: à Melissa quidem uulgo dicta, toto genere distat. Tertium Melissa genus copiose in Bauaria iuxta Ingolstadtium prouenit, odore suo planè Citrum referens, præsertim quum aridum est. Hoc Selapfia Ingolstadianæ pro Melissa utuntur, Fuchsius lib. 1. De compositione medicamentorum: de hac ipsa (opinor) sentiens, quam pictam dedit.

Melo pepones uel Melones, R. Pulcherrimi & uarii generis, K. Melo spinosus, O Fructus maximi sunt Anguria, quam Melo peponem ob id Galenus uocat, quod non distincta sit canalibus ut Pepon, sed rotunda ut malum. Odorem quidem & saporem Melonis refert, manditurque cum interiore parte, quod in Peponibus non fit. Sapor eis insipidus, substantia frigidissima, &c. Cardanus.

Memitha, C. Papaueris cornuti speciem puto intelligens, floris colore differenterem. Talem enim herbam pro Glaucio (quod Arabum Memithe est) in Italia ostendunt.

Mentha hortensis trium generum, G. Prima communis & maior omnibus ferè hortis. Altera nobilior, rotundioribus, & rugolis seu crispis foliis. Tertia minima, rubicunda, sicut admodum odore, ad Sisybrium & Ocimum accedens: hyeme etiam uiret; & furculo inflexo propagatur. Hanc Tragus, Sisybrium hortense uocat: Matthiolus uerò alteram, nempe crispam. Mentha feritur furculo, non semine, ut Theophrastus scribit. Solet quidem radiculis reptantibus se propagare. Mentha syluestris, quam Mentastrum uocant, ubiq; in aquaticis prouenit.

Mentha Græca uel Romana, uel Saracenica à nonnullis dicta, toto genere à Menthis propriè dictis differt. Vide supra in Costo hortensi.

Mercurialis mas & foemina, locis ferè cultis omnibus circa Vites & in areis hortorum copiose nascuntur plerisque regionibus. Tiguri deerat: sed è Bada oppido proximo planta una atq; altera in hortulum meum ante annos aliquot translata, ab eo tempore abundat: & similiter in hortis amicorum. Agrestis quidem in rudibus circa urbem nostram maioribus foliis, mas duntaxat, (ni fallor) ubiq; occurrit. In syluis etiam nostris abundat species alia, quam pro Cynocrambe quidam accipiunt: quæ in hortis etiam annis aliquot durare solet, & radiculis suis transuersis se propagare. Itali Castagnariam, uel Castrangulam uocant quod folia quodammodo castanæ habeat. Superiores æstiuæ sunt, G. Hæc in cibo oleris modo sumptam gratior quàm communis uidetur, & aluum bene soluit.

Mespili arbores satis uulgares hîc & alibi in Germania sunt. Aronia uerò Mespilus siue Tricoccus, cui folia Oxyacanthæ sunt: in Germaniâ nondum peruenit, quod sciam.

Meum uel Meon, O. G. Ae. Nostri **Bärwurz** dictam pro Meo non temere usurpant. Ea facile nascitur in hortis etiam de solis capitibus radicis rescitæ, plantata, & multis durat annis. Fuchsius hanc herbam Sefeli Creticum uel Tordylium appellat.

appellat: pro Meo tamen usurpari posse concedit. Vide mox in Muttelina.
 Milium uulgarè in agris feritur. Indicum uerò uel Saracenicum à Fuchſio dictum, uulgò Sorgi, à noſtris etiam in hortis, propter raritatem; & culmorum comæ-
 ue uſum ad ſcopas, &c.

Millefoliū uulgò dictū, *Garbe*, paſſim in agris & collibus obuiū eſt, frequētius
 albo flore, rariuſ rubro. In hortis etiā ſatis diu durat: & radicibus ſuis ſe propagat.

Millefolium Strathiotēs, herbula teneris foliis, minutiffimis, ſemine etiam mini-
 mo, odore ſuauiſſimo, Vu. Non aliud uidetur Millefoliū nobile ab Hie. Trago di-
 ctum, lib. 1. cap. 160. Quod cū alibi reperitur, rarum tamen: tum Baſileæ prope ur-
 bem, qua Birſa fluuiolus ingreditur: & forſan idem quoq; quod peregrinum uel o-
 doratum in horto ſuo uocat, D.

Millefoliū luteis floribus, D. Pingitur hoc à Dodon. qui rarū inuētū eſſe ſcribit,
 Mo.

Morſus diaboli uulgo dictus à radice ueluti præmorſa, unde Succifæ nomen
 Fuchſius finxit, nota ubiq; in pratis humidis herba, G. in hortis parum durat.

Moly Plinii ſecundum Dodonæum, C. Phalangium noſtrū, ut ex pictura & de-
 ſcriptione conſicio. Pſedomoly Dodonæi, C. Graminis ſpecies, in litoribus maris
 proueniens.

Morus arbor fructu nigro, in Heluetia paſſim habetur, præſertim in hortis, G. In
 Italiæ & Sabaudia (ut circa Lemanum lacum) uicinis regionibus alba etiam
 Morus colitur. Quo modo ex trunci aut ramorum maiorum, ſerra diſſectis parti-
 bus, Mori ſerantur, ut multæ citòque proueniant, Rei ruſticæ authores tradunt,
 Mu.

Muris auricula. Vide Pulmonaria Plinii.

Muttelina uulgò in alpiſ ſecta, à noſtris *Muttri*, caros alpinus quidam uide-
 tur: radicibus Mei ſerè figura & ſapore, ſed infirmioribus. Autumno ſuperiore ali-
 quot eius radices in horto plantauit: quæ nunc etiam in fine Iunii pulchrè germinant:
 ſed nondum florent. Eius pabulo in montibus uaccæ plurimū & optimum lac red-
 dunt: ſicut & Mei pabulo in Apulia: unde caſeum caballinum dictum cōfici audio.

My.

Myrica, uulgò Tamarifcus, G. Rurpodius. Hanc aliquoties fruſtra plantare co-
 natus ſum in hortulo meo ſiccaneo. Hoc anno demum in prædio ad riuiſculum mihi
 plantata benè prouenit, & floruit Iulio menſe: translata ē Sili torrentis iuxta urbem
 ripis: ubi copioſe prouenit, cū alibi, tum paulò ſuperius quàm miſceatur Limago.
 Alterius generis eſſe puto quam circa Monſpelium uidi, trunco ſatis craſſo, etc. nam
 noſtræ truncus pollicis magnitudinem parum excedit.

Myrrhis, O. G. C. Ae. Rurpodius. Aliqui Italicam cognominant, alii Ceriſolium
 Hiſpanicum, *Spaniſch Kürbel*. Planta una ante triennium ex ſemine eius præ-
 longo mihi prouenit, foliis dulcibus, necdum in caulem aſſurgit.

Myrtus, Rurpodius. Myrti plantæ decem, Vu.

Myxus alba quorundam, Sycomorus uulgò Italis, Quære in S.

Na.

Napellus. Vide in Aconito. Scaphuſiæ in horto quodam & apud nos quoque
 flore albo inuenitur.

Napinatura inter Napum & Braſſicam eſſe uidentur. In agris, non hortis ſerun-
 tur. Rari apud nos; commendantur ex agro Vimenſi.

Narciſſi uarii, Leuſchnerus Miſenæ. Tres ſpecies, C.

Narciſſus Italicus, flore candido, odoratiſſimo, K. Hunc puto eſſe qui à noſtris Li-
 lium D. uirginis nominatur: qui ſos in montibus ſupra Curiam ſylueſtris, ut audio
 reperitur, G.

Narciſſus alius, candido flore, pulchro, odorato, K. R. O.

Narciſſus luteus, odoratus, qui initio Martii floret, K. R. C. O. Ae. alius luteus, K.

Narciſſus purpureus & luteus, Vu.

Pp

Nardus Celtica uel Gallica, K. Nos etiam ex altis Valesiorum montibus à Caspare Collino nostro missos, aliquot eius cespites proximo autumno plantauimus: & rudimenta floris iam uidimus, ipsi sua lingua **Selliga**, quasi Saliuncam uocant. Et profecto non alia est Saliunca, quam Celtica Nardus: eademq; Phuherbe, id est Valeriana, prorsus cognata. Viret etiamnum in hortulo meo, sed male, ut alpinum coelum desiderare uideatur.

Nardus Indica, (nisi Gallica scribendum sit potius,) Ae. R.

Nardus uulgò dicta, in hortis nostris plerisq; cultu, in agro circa Monspelium sponte abundat. Cum Nardis quidem propriè dictis ab antiquis nihil commune habet, ut neq; Lauandula, quæ in hoc genere ceu scemina est: à Fuchio Pseudonardi appellantur, hæc scemina, illa mas cognomine. Mihi ad Stichadis naturam, specie, odore (caphurato ferè) saporeq; accedere uidentur, propius quidem quam ullius alterius ex illis quas nouimus plantis. Surculo foelicius quam semine prouenit. Vide etiam in Spica.

Nasturtium maius, album: & minus nigrum, G. Syluestre persimile hortensi, pu to me in altis quibusdam montibus olim reperisse. Genus illud syluestre quod **Welsamen** uocant, à Fuchio & Trago depictum, sponte apud nos non reperitur. In Sabaudia circa muros & rudera frequens uidi, ut in regione ducis Vuirtenbergensis quoq; Dodonæus Thalictrum facit. Inferiores Germani quidam Sophiam nominant. Apud nos pratense quoddam syluestre est, **Gandblumen**: & aliud riuale, circa faxa riuorum, **Steintresich**: aliud deniq; palustre, floribus luteis: Sinapi forte adnumerandū. Hæc omnia ab hortensi genere aut potius specie differunt. Nas citur & in uineis quod **Abtrefsch** appellant, foliosum, acre, Februario flores, &c. Nerium. Vide Rhododaphne.

Ni.

Nigella (aliàs Melanthium, Gith) Damascena, semine nigro: sicut & alia uulgaris, G. Vulgaris nostræ species altera semen subflauum habet, & odoratius. Syluea stris etiam in aruis nascitur, ut circa Liechstalam Basiliensium oppidum uidi. Hanc aliqui (ut Cordus quoq;) non rectè pro Cumino syluestri accipiunt. Damascenæ hoc peculiare, quod capitulorum eius calices inferius pulchrè coronantur foliis.

Nil Arabum. Vide Conuoluulus cœruleus.

Noli me tangere, G. Tragus hanc herbam Esulis seu Tithymalis adnumerat: nō rectè: nam neq; lacteum liquorem habet, nec uiribus nec specie cum illis conuenit. Siliquæ eius maturæ, tactu dissiliunt. Vide supra in Balsamine. In horto meo circa sepem abundat, æstiuæ herba, & è semine suo quotannis resurgens. Vidi sæpe in montibus, locis asperis, lapidosis & humidis. Flos colore & forma aconitum luteum refert. Veneno forte non caret. Gustata fauces rodit. **Judenhüel** quidam Germanicè uocant, Non desunt qui Scorpioides existimarint.

Nu.

Numularia à Fuchio dicta, G. Nascitur passim circa sepes et alibi, locis humidis: eius species alia est, quam syluaticam à natalibus aut marem dixerim, minorem, acutioribus foliis, & erectam ferè. Superiorem sceminam aut supinam nominemus. Aliqui Centimorbiæ & Delphaticæ uocant.

Nuces iuglandes in agro Tigurino abundant, hortis inutiles: primū quia non solum uasta magnitudine sua nimium inumbrant cætera: sed homini etiam noxia umbra earum existimatur: deinde quia cum profundissime earum radices sint, quantafere superficies (ut uulgò creditur) exhauriūt & emaciant solum, succo pinguiore omni ad se attracto.

Nuces iuglandes, tum saporis præstantissimi, tum corticis adeo tenuis, ut leuissimo digitorum compressu frangantur.

Nux Auellana, Corylus, Vide in Auellanis.

Nux Methel Auicennæ, Stramonia Fuchio. Aliis Pomæ spinosum, Turcis Taoulæ, Græcis hodie Paracoccalon, uel Barycoccalon, quasi nux grauans, torporē et somnum

somnum inducens: quibusdam Corona regia, Melospinus Venetiis, Gallis Pomme de Perou, G.K.C. Vu. Nux quidem improprie dicitur, cum durum foris nihil habeat, pomum uerius quam nux. Flos ei tanquam Conuoluuli in sepibus, sed multo maior, odore graui quidem, sed aromatico fere, nec sine gratia, ut mihi uidetur. Foliorum uero odor grauis simul & foetidus, ut plerorumque frigidorum uenenoſum. Mandragoris annumeranda uideri possit haec planta, aut sui generis esse, potius quam Solani cum poma ferat: sed nos quoque Solana Pomifera quaedam congnominabimus. Bellonius Solanum somniferum nominans (aliud certe Dioscoridis hoc nomine est) in planicie circa Hiericho sponte nasci scribit. Aloisio Anguillare audio hanc plantam uideri Hippomanes, à Scholiaste Theocriti dictum: & conuenire ei descriptionem, uocabulo uno transposito, ut spinosum scilicet de fructu, non de folio dicatur. Ego ut huic opinioni non contradixerim, ita non aliud Lycopersium Galeni existimo, &c. Forſan & idem Dioscoridis Pharicum fuerit. Monspeli Solanum Romanum uocant, ex Hispania ad se allatum dicentes.

Oc.

Ochrus Galeni, O. Leguminis genus Ciceri cognatum.

Ocimastrum uerrucarum libet appellare herbam quandam aestiuam apud nos, Ocimi foliis, flosculis candidis, pulchris, uasculis seminum exiguis, rotundis, hirsutis, quae paruas ceu uerrucas referunt. Nascitur circa sepes, nullius uel nominis, uel usus apud nos.

Ocimoides (Lychnidis syluestris nomine depingit Dodonaeus) album, purpureum uel roseum, rubrum, alpinum, G. Aliqui Been album & rubrum uocant, ineptè: ut illi etiam qui Polemonium pro Been albo accipiunt. Marem in hoc genere dixerim, cui apices è medio flore prominent: foemineam, cui nulli: idque in utroque colore: nam & mas albus purpureusque reperitur, & foemina similiter. Haec odoratior est, praesertim uesperis, quo tempore rursus aperiri flores et odorem recipere uelutique resurgere solent, tanquam Hesperis Theophrasti: nam sole meridiano ita flaccescunt ut mortui uideantur. Anno secundo floret. Durat tres aut quatuor annos, ni fallor. Passim apud nos sponte nascitur locis siccis, circa macerias, sepes & alibi. Genus illud cui flos magis rubet, in albis: minus odoratum caeteris, uel potius in odorem prorsus. Dodonaeus Ocimoides nostrum Lychnidem syluestrem uocat. Plantatur (inquit) in hortis alba & purpurea, & longo cultu aliquando florum folia multiplicat. Saponaria inferioris Germaniae pharmacopolis.

Ocimoides peregrinum dixerim, flores quos ab Hierosolymis denominant, croceo colore splendente longe pulcherrimos. Eiusdem species minor reperitur, quae primo anno floret, G. Flores Hierosolymorum appellant uulgo: quanquam non è Syria, sed Dacia allatos audio. Aldrouandus Creticum cognominat. Diu durant in hortis nostris, radice uiuaci. Semina tempestiue maurant, & facile ex illis oriuntur. Flos odore caret, & sole nihil afficitur. Aliqui ante fenestras in pensilibus hortis a-lunt, tanta gratia est florum. Species minor cubitalis est, aut paulo excellior, rarioribus floribus: maior bicubitalis. Florent anno secundo, durant pluribus.

Ocimum, quod uulgo Basilicum nominant, id est, regium, ab odoris praestantia, diuersorum est generum: quae apud nos in uasis tantum & altibus hortis conferuntur. Herba aestiuæ, pruinæ impatientes: ideoque non prius serendae quam cum nulla tum floret cum radice euulsum & in uas uitreum angusti colli aqua plenum impositum, diutissime uiuet, radice in aqua crescente: adeo *φιλυδιον* est. Maioris aliud Caryophyllatum ab odore dicitur, aliud Citratum, quod maximum est, & Melissophyllum seu Citrum olet, rarius nostris: mihi quidem satum in uasis pulchre prouenit.

Od.

Odontitis Plinii, K. Hanc Plinius in pratis nasci scribit inter Fœni genera, cauliculis densis ab eadem radice, geniculatis, triangulis, nigris: flore purpureo, py-

Pp ii

fillo: hordei semine in alis: foliis parvis, Polygono longioribus,
Oenanthe, Lege Filipendula.

Ol.

Olea aliquot, Vu. Olea procera, quæ superioribus aliquot annis floruit: hoc uero anno 1572, demum æstate fructum, non prorsus tamen maturum produxit, K. Vidi et ego Oleam cubitalem Augustæ in horto magnifici D. Ant. Fuggeri. Arborem equidem in nostro coelo prouenire miror, quum hyems, frigus & uenti plurimum ei noceant, Theophrasto teste: florenti etiam imber, Adde quod tardè admodum crescit: & afflatum maris desiderare uideatur: quare olim (Plinio teste) non putabatur nasci nisi intra ccc. stadia à mari. Plurimæ quidem circa Benacum nascuntur: multæ etiam circa Roboretum apud confederatos nobis Rhætos, prope sed ultra alpes, Insubriâ uersus. Inde autumnio superiore allatas mihi arbutulas duas plantavi in uase, propter instantem hyemem.

Oleastris species, ut quidam putant: ut alii, Ziziphus alba, A. Lausannæ alibi in Sabaudia quidam in hortis alunt.

Olius atrum, quod Itali uulgò Alexandri uocant, pharmacopœæ Petroselinum Macedonicum, O. G. Durauit mihi tribus aut quatuor annis in hortulo, loco nimis umbroso consitum: quo tempore semel tantum flores & semina protulit: interdum latuit, Heyme germinat ac floret, teste Cardano. Bernæ in horto Aretii nuper floruit, Græcè Hipposelinum uocant plerique. Sed Matthiolus pro Hipposelino Ligusticum uulgare pingit Hipposelinum uerum, K. Rurpodius, Matthiolus an aliter intelligentes, nescio.

On.

Onobrychis. Vide infra in Ruta capraria Italorum, & supra in Glauce.

Ononis non debet plantari in hortis, ne fiat anonis, hoc est, inutilis & noxia alia herbis. Oblongis enim & ualidissimis radicibus longè lateque reptat, & sese propagat. Sponte in aruis alibi crescit, inuisa agricolis quorum sæpe aratra sistit aut moratur. Leuis est uere & prima æstatis parte, deinde aculei superueniunt. Reperitur, ni fallor, etiam perpetuo laevis. Flores purpurei in uulgari montanæ, quam uidi in Gemma monte Vallesiorum, lutei.

Onopordum, Basileæ in horto Zuvinggeri.

Op.

Ophioglossus à Fuchsio dicta, Ae. in pratis quibusdam (humidum & pingue solum amare aiunt) apud nos copiose nascitur. Maio mense reperitur, postea euanesceat. Folio singulari semper, unde Henophyllum uel Monophyllum dixeris. Enam quæ Germanicè sic uocatur, *Einblat*, caule edito, altero folio augetur. Tora etiam nostra non semper unifolia est. In hortis parum durat: & fortè etiam ruri, ubi sparsis seminibus eam multiplicari puto. *Naterzünge* Itali (ni fallor, Bononiæ præsertim) Serpentinam uocant: aliqui Lanceam Christi, uel Luciolam. De ueteri eius nomine non constat.

Opulus, Aceris species minima: alio nomine Rumpotinus, montibus & collibus apud nos frequens est. Circa Verbanum lacum maritatur Vitibus.

Or.

Orchis. Quare in Testiculo.

Origanum uerum montanum, Leuschnerus.

Origanum Creticum, O. Origani Heracleotici uel Hispanici species, K. G.

Origanum onitis, rara planta, K. Rurpodius.

Orig. syluestre uulgare, G. Tragoriganum, Rurpodius. Idem aliquot annis ex cultum in horto, K. tandem periit. Tragoriganum alterum, C. Illud nimirum quod Dodonæus pingit Serpyllo per simile. Tragorigana (inquit) in hortis tantum coluntur à diligentioribus: eius speciem alteram aliqui Prasium uocant, alii pro Thymo ducunt.

Origanum Haracleoticum (uel Hispanicum à nonnullis dictum.) Antuerpiæ quod ex Hispania aduehatur, C. Pingit hoc quoque Dodonæus: odoratus candidiusque esse scribens.

Origano

Origano cognata uidetur, quæ uulgò Maiorana maior dicitur.
Orminum. Quære Horminum.
Ornithogalum, K. Nascitur in Brabantia passim in agris & aruis, ut et circa Monspelium.

Ornithopodium Dodonæi, G. Sic autem ei nomen finxit Græcum, quoniam Brabantii similiter nominant *Voghelvoet*, id est, Auis pedem, propter siliquas articulas extremitate recurua, quinas aut senas, ad exemplum pedis auium. Nascitur passim apud nos in collibus & pratis siccis apricisq; foliolis e regione binis, multis deinceps, lenticulæ, minoribus. Flosculis in corymbo luteolis. Loti pentaphyllino-stri similibus, odore exili, suauis, lactis quodammodo uel lasmini florum. Verus nomen ignorare se ait, nisi fortè Polygala sit. Ferro equino Itatorum (de quo diximus) cognata uidetur.

Orobus, A. G. Semina à Bellonio accepimus: cuius diligentia Lutetia etiam Orontium non pauca proueniunt, seminibus ex Italia aduectis.

Orobanchæ uera in agris uel syluis nascitur. Orobanchæ uerò Ruellii, Gallis Tenia dicta, alia uidetur, quæ cirris suis ceu brachiis legumina obuoluit & strangulat. Helxine Cissampelo, ut conficio, similis herba: sed flore minuto: quæ passim in nostris etiam hortis & agris inuisa nascitur. Volubilem nigram uocant: gustu glutinoso, subacido: semine triquetro, nigro: radice una, candida, do drantalia: qua cauliculi plures prodeunt, oblongi, distorti, ramosi, lenti, &c.

Orobis à Græcis dictus, hoc est, Eruum quod ad Theriacæ compositionem requiritur. Legumen est nullis capreolis, siliquis secundum semina interceptis, ita ut in furnis coniuncti panes. Semen foris album est, intus rufescit, O. Vu. G. Facile prouenit. Circa Lugdunum (unde semina accersiui) agros eo conseri audio. Inueniatur & syluestris: sed non in Germania quod sciam.

Orobis albus, O. Superforem rubeum uulgò cognominant.

Ou.

Ouariam, uernacula lingua (*Liertraut*) uocari audio herbam mihi incognitam in Saxoniarum hortis & Francofordiæ: quæ dissecta aspergatur ouis trixis, propter saporis acrimoniam.

Ox.

Oxyacantha Dioscoridis, Spina alba uulgò dicta arbuscula uidetur, quæ in sepibus nostris abundat. Est enim sepimentis aptissima, propter multas, ualidas acutascq; spinas. Hæc mihi Plinii Spina appendix uidetur: & alibi simpliciter Spina.

Oxyacantha Theophrasti, Ae. Theophrastus Oxyacantham suam perpetuò uiuere tradit, incunte uere germinare: semen reddere post occasum Vergiliarum.

Oxys Plinii passim circa sepes, locis umbrosis & muscosis emicat. Itali quidam in hortos transferunt.

Oxytriphylum, K. nimirum Trifolium Asphaltites: de quo infra.

Pa.

Pæonia fœmina, K. G. In plerisq; apud nos hortis colitur: in quibus uiracissima est, ita ut si effossa radice exiguum aliquid relinquatur, inde repullulet. Syluestrem nasci audio in summis supra Glaronam nostram montibus, e quibus Serua fluuius oritur. Reperitur etiam multiplici flore, quod rarissimum est.

Pæonia mas, folio nucis K. G. Curtius Lindauia. Rara fuit hætenus in hortis. Syluestrem in Germania nasci non puto. Vtranq; reperiri audio in Generoso dicto monte prope Luganum, quod oppidum est Heluetiorum non procul Lario lacu. Icon eius à nemine hætenus exhibita est, ne à Dodonæo quidem, qui tamen in hortis eam habere fertur. Tragus, quem & Dodonæus secutus est, Dictamnium uulgarè, id est, Fraxinellam Itatorum, Pæoniam marem esse putabat: sed non conuenit descriptio. Huius radix quidem tragon, id est, hircum olet, non tamen idcirco Tragium est, ut quidam putant: nam Tragium primum, Lentisco ferè per omnia simile est, sed minus. Alterum Scolopendrii foliis insignè.

Pp iij

Pæonia ultra prædictas tertia species, minor, C. Quæ mihi etiam nuper ab eo transmissa una cum aliis quibusdam, tam longo itinere, in hortulo uiret. In Catalogo, O. *Pæonia* species quatuor reperio: ex quibus una nimirum fuerit *Fraxinella*, de qua diximus.

Paliurus nobis incognitus est: nec senserim cum Amato Lusitano, qui illicem *Aquifoliam* nostram (ipse *Agrifolium* nominat, & ab *Aquifolio* non rectè distinguit) *Paliurum* facit.

Paliurus *Africana*. Apud nos (inquit *Ruellius Gallus*) paucis antea annis frutex inuenitur, qui etiam arborescere pollit, folia per ambitum laciniatim sinuato, rotundo, molli, ramis *Spini*, quem *Album* cognominant, modo aculeatis. baccis rotundis, rubris, myrteis, longe maioribus, gustu iucundo: qui & uinum suauitate sua commendat. Condiuntur & grato ori cibo. Cœpit mea memoria propagari insita, quantum reor, albo *Spino*. Qui colunt in hortis, uelut alienigenam & aduenam arborem *Myrobalanum* appellant. Hanc esse putauerim nullis ferè notis reclamantibus *Paliurum* *Africanam*, eam præsertim quæ non siliquetur. Hæc *Ruellius*. Eadem puto est *Connarus Athenæi*.

Palma in Europa an usquam fructificet, nescio: de arbore proprio sic dicta loquor. Nam species quædam minores, ut *Chamariphes*, & quæ *Musas* appellatas fructus ferunt, in Italia etiam Hispaniaque fructus perficiunt: & in Gallia *Narbonensi* quoque, ni fallor, uel utraque, uel *Chamariphes* *Margaridæ* sue saltem. *Palma* arbores circa *Monspelim* habentur, sed steriles. Audio *Monachii* (quod oppidum est *Bauariæ*) in horto principis *Palma* exiguum haberi. Ego *Indicæ* *Palma* folium pedes ferè denos longum, & totidem latum ab altera parte, aridum seruo: misit ad me dono à *Ioanne Baptista Hoffstettero* pharmacopœo, *Augustæ Vindelitorum* celebri. Eam arborem in Hispania etiam (aut Lusitania) iam provenire nuper quidam nobis asseruit.

Palma species pumila, quæ *Musas* uocatos fructus fert, &c. Lege quæ proximè retrò scripsimus. In *Aegypto* circa *Memphim* plurima nascitur. Propagine feritur. Seritur iam & *Neapoli* in Italia, inquit *Alexander Benedictus*: in annum durat. *Folia* hyeme decidua, uere renascuntur, &c.

Panaces *Heracleum*, pulcherrima planta, O.K.C. Ex eo colligitur liquor *Opanax* dictus *Pharmacopolis*. Vidi aliquando in hortis Italiae, aliqua cum *Sphondylia* nostro similitudine, maius.

Panaces *Asclepium* *Paraui* quidam in hortis ferunt, nescio quo provenit.

Panaces *Chironium* forte fuerit *Virga aurea* uulgò dicta *Italica*: uel *Doria* (sibene memini) in *Prouincia* uulgò nominata, (alia quàm *Virga aurea*), quam in horto D. uidisse me puto.

Panacratium uerum, Vu. *Soilla* minor. *Dodonæus* *Panacratium* interpretatur herbam quam *Fuchsius* pro *Hyacinthi* genere exhibuit: quod audio *Monspessuli* *Ophioscorodon* existimari à doctis, et uulgò ibidem *Allium caninum* nominari: a dice rubenti & bene acri. Circa *Lausannam* in aruis reperi. Idem *Dodonæus* *Panacratium* alterum nominat *Bulbinem* nostram.

Panicum legumen uulgare apud nos, agrum non hortum decet.

Panicum Indicum. Vide *Sorgo*.

Papauer minus, nigro semine, nigrum uel commune, in hortis nostris abundat: alicubi agri eo obseruntur ad exprimendum oleum. est ubi syluestre nascitur.

Papauer album, satium, flore & semine candidis, feritur à pharmacopolis nostris. Huius & altera species reperitur, *Dodonæo* teste, cuius florum folia sunt creberrima & dissecta.

Papauer rubrum etiam aliquando seui in hortulo. Huius capita inquit *Dodonæus*, rotundiora sunt, non longa. Semen subnigrum. Huius quoque, ut superioris, species reperitur foliis florum crenatis & dissectis.

Papauer erraticum, quod *Græci* *Rhœadem* uocant, rubro flore in aruis apud nos

nos ubiq; emicat, altera demum estate florens. Huic similem herbam, sed aestiuā, flore luteo, si bene memini, aiunt apud Vallesios alicubi in agris secali consitis reperi-
ri, et *Sani* appellari ab incolis.

Papaueris rara quædam species, O.

Papauer cornutum uel corniculatum, luteo flore, G. R. K. O. Vu. Facillimè nasci-
tur, & semina in tempore maturat in hortis nostris: & seminibus sparsis sese reparat,
Vide sequentia.

Papauer cornutum rubro uel purpureo flore, rarius, in aliquibus hortis, ut Au-
gustæ, alitur, O. K. Vu. Vide Memitha & Glaucium, Papauer corniculatum nasci-
tur in maritimis, floremq; fert croceum. Nos in Hispaniis, præsertim regnis Ara-
goniæ & Castellæ, longè à mari per multa miliaria, circa uias & arua duas alias spe-
cies inuenimus: unam flore ualde rubeo, cætera similem, sapore tamen non ita falso:
et alteram minorem per omnia, flore uiolaceo. Semina omnibus nigra: Monachi in
in Mesuen. Posterior hæc species à Dodonæo exhibetur Iconum Tomo 2.

Papauer spumeum uidetur genus quoddam Esulæ paruū, quod Tragus pro Pe-
plo pingit inter Tithymalos Esulam exiguā nominans, radice inutili, locis cultis ali-
quibus sponte nascens: foliis paruis, angustis, longiusculis. Nihil ei cū Papaueribus
cōmune præter liquorem lacteū, etc. Plinio Peplos aliās Syce, uel Mecon aphrodes
dicitur: semine minore quā candidi Papaueris. Inter Vites ferè colligitur, &c. Fo-
liis Rutæ paulò latioribus. Dioscorides tres herbas diuersas facit: nam Chamæsy-
cen aliter Sycen uocat, genere quidem conuenire uidentur. Et Galenus quoque Pe-
plum aliās Papauer spumeum uocari tradit.

Parthenium, hoc est, Matricaria uulgò dicta: circa muros hortorum & rudera
sponte nascitur. Alii Cotulam foetidam interpretantur, quæ circa uias & limites
agrorum ubiq; abundat: item in hortis, locis siccis & lapidosis.

Pastinaca uulgò Carota dicta, O. Tria eius genera apud nos reperiuntur, radici-
bus luteis, purpureis, albis. *Rubli*. Inter syluestres herbas Dauci Pastinacis cognati
uidentur: & aliæ quædam forsan propius. Cartōn (accedit uocabulum ad uulgare
Cariota) Pastinaca est magna & bene aucta, meliore succo, &c. Athenæus. Hæc for-
tè est quæ iam sequitur Pastinaca.

Pastinaca uulgò dicta, *Pasteneien*, minus frequens est apud nos: frequentissimū
Basileæ & Argentinæ. Hoc Dodonæus pro Elaphobosco pingit, Reperitur etiam
syluestre in pratis obuium.

Pe.
Peccen Veneris, siue Scandix, nisi inter segetes nostras abundaret, locum in hor-
tis meretur.

Pelecinus, Securigada, G. K. R. C. Semen ei in siliquis oblongis rufum, securis
effigie, unde nomen Pelecini: amarissimum, unde & Hedyfarum fortè per antiphra-
sin dicta est. Apud nos inculta non prouenit, alibi in aruis sponte, nusquam tamen
in Germania quod sciam. E seminibus suis restitibi fecunditate reparatur, et hyeme
etiam uiuet.

Pelecinus falsus, C. Pingitur à Dodonæo Tomo 2. Sponte apud nos nascitur lo-
cis siccis & apricis quibusdam.

Pentaphyllum, Quinquefolium, ut nusquam non obuium, pinguiori & humi-
diori solo gaudet, ita in hortis etiam durat, flagellis suis ubi terram attingit per in-
terualla articulata apprehendens, (Fragariæ modo cui cognata uidetur,) seq; ipsa
propagans.

Pentaphylli etiam aliæ quædam species sunt, minus communes apud nos, mino-
res, magisq; syluestres quodammodo: à Trago descriptæ: ex quibus unum etiam
depinxit, floribus albis: foliis ferè Lupini, quod etiam in hortulo, Ae. alit. Est & a-
liud Pentaphyllum album quod Petreum cognominauerim, pulcherrima herba:
Id primū reperi copiosum in mœnibus Vuallstadit oppidum, sed muris nunc
reparatis nullum est. Deinde in faxis montis supra Sanameasam oppidulum,
iuxta introitum in fodinam ferri, quæ maxima antiquissimæque illic est. Hanc

Pp. iiii

speciem superiore autumno in hortulorum transtuli. Pentaphyllis denique etiam Tormentillam uulgo dictam adnumerarim: quæ in pratis aliisque locis passim apud nos abundat; in hortis parum durat.

Pepones, R. Dodonæus pingit Peponem latum, & alium rotundum: & tertium magnum, quem & Cucumerem Turcicum uocat.

Perfoliata uulgo dicuntur herbæ quædam, Diaphylla Græcè dixeris: quarum caulis transigit & penetrat folia: unde & Germanicum nomen *Durchwas*, hoc est, Diaphyes. Sed una præcipue, quæ à Fuchsio & Trago pingitur, hoc nomen sibi uen dicauit. Ea quamuis multis in locis sponte nascatur, solet tamen apud nos etiã in hortis ferri, partim propter eius raritatem hic, partim quod ad sanandos ramices ac prominentias umbilici, singularis eius uis existimetur. Maiorem hanc cognominat Tragus. Aestiuæ est herba.

Perfoliata minor, O. Ea nimirum quam Tragus descripsit, similis prædictæ, foliis tamen acutioribus, & crassioribus: & siliquis oblongis quales ferè Brassicæ sunt, cum superior nuda ferat semina.

Perfoliatam Achilleam appello herbam, quæ in collibus nostris, non frequenter men reperitur, floribus luteis, Lysimachii ferè, quorum singuli foliis constant octonnis. De hac sensisse Plinius uidetur, his uerbis: Aliqui ueram esse Achilleam tradunt, scapo cœruleo, pedali, sine ramis, ex omni parte singulis foliis rotundis eleganter uestitam, Cœruleum quidem colorem non obseruauit: reliqua conueniunt. Aestiuæ est.

Periclymenum (Caprifolium Latine quibusdam. Syluaticus Pyxanthum Caprifolium nominat) in syluis Sabaudia & circa Argentinam sponte nascitur. Nostris in hortis plantant, ut pergulas uel arpegias eo innectant: circumuoluit enim se sua sponte: aut iuxta muros pangunt: facile enim in altum scandit, ad secundum etiam cœnaculum domus: ut & uiriditate ornet fenestras: & specie odoreque florum suauissimo oblectet, id quod multo tempore facit. Floret enim paulatim. Viuit in hortis annos quam plurimos. Huic cognatus est syluestris quidam frutex, qui locis saxosis nascitur apud nos passim in sepibus, muris, syluis, acinis rubicundis, gemellis, non circumuoluitur, etc. *Beinhülzen* uocant nostri, hoc est, *Xylosteon*, à duritie ligni tanquam ossea. Pingitur & à Dodonæo ceu Periclymeni species. Periclymeni speciem unam reperiri tradit Dodonæus, cuius folia non ut in superiore bina & distincta, sed in medio unita sint, transeunte per medium caule. Hæc nimirum est quam Matthiolus pinxit.

Persica mala non unius generis, abundant in nostra regione. Maiora & odoratiora nostris circa lacum Verbanum uidi. Persica Ungarica trium generum: quædam magnitudine pugnat: alia intus & foris colore aureo: alia intus sanguineo succo, Vu. Postrema apud nos etiam rara non sunt, duracina, & serotina. Persica malo in Cydoniam inserta, Cydonium enascitur: ut supra scripsi in Malo Cydonia.

Persicorum generis sunt etiam præcocia seu Armeniaca mala. Lege supra in Malis.

Petasites circa montium radices in pratis humidis apud nos luxuriatur. In hortos translata locis umbrosis uel humidis diu durat. Floret ante folia primo uere. Semen ei nullum. Trago teste.

Petroselinum uulgo dictum, ueteribus simpliciter Apium est. De Petroselino ueterum leges in Sesele.

Peucedanum, K. F. C. Massarius Argentinæ: ubi etiam sponte nascitur prope urbem, in pratis, iuxta Carthusiam, radice ad duos aut tres (ut audio) cubitos longa, succi seu potius liquoris plena, sulfur olente: foliis oblongis, ternis ferè, &c. Hier. Tragus etiam Peucedanum in suis hortis copiose provenire scribit. Vulgo *Wilden fenchel* uocant, hoc est, Fœniculum agreste: non rectè. Aliqui *Schwebelwurz*, à sulfureo radice odore. Crescit (teste Trago) in altis, umbrosis & opacis syluis, ut Hercynia, & Spessarto, & Idaro dictis uulgo: item in Vuasgoia & Monte tonitruis.

Phalans

Ph.

Phalangitis seu Phalangium herba, G.K. Nascitur sponte in collibus siccis & locis montanis apud nos, floribus Lili, sed parvis: maiores duplo quam nostri sint, in montanis Sabaudiae pratis uidi. Herba, ut quibusdam uidetur, Asphodelo cognata est: quanquam dissimili radice *Grassgilgele*. In hortis probe crescit: annos (ni fallor) tres aut plures durans. Hanc Dodonæus, si bene coniicio, ex pictura & descriptione, pro Moly Plinii exhibuit.

Phalaris, O. G. Semen ab Ollingero accepi. Facillimè crescit. Pingitur à Dodonæo: qui apud inferiores Germanos semen Hispanicum uel Canariense uocari ait, quod inde allatum sit. Audio speciem unam syluestrem esse, alteram satiuam.

Phasioli, O. Legumen nimirum quod & Phaselum uocant, idem forte Smilaci hortensi. Matthioli quidem pro Phasiolo in Dioscor. lib. 2. cap. 101. & rursus cap. 140. pro Smilace hortensi, herbam eandem pingere uidetur: nisi quod pictura una inflexa, altera recta est. Alius est Phasiolus, qui & Isopyròn, de quo supra.

Phaselus Turcicus aliquanto maior est nostro: sed admirabili naturæ arte humanam effigiem refert, fronte, oculis, naribus, (si tamen pediculi partem illi annexam relinquant): ore, quod quasi duobus testibus munitum est, ac mento. Nihil certe humanæ faciei natura similis fecit, Cardanus.

Phaselus syluestris uel niger à Dodon. dictus, aut Faba syluestris, (nā Fabā uulgò dictam, ueterum Phaselum esse putat: ac in duas species, maiorem, & minorem quæ & rotundior sit, diuidit:) similis est satiuæ, nisi quod capreolos habet, quibus satiuæ caret: semen globosum, nigrum, non maius Piso, & inter mandendū ingrato sapore, odoreq; foetido. In Germania inferiore sponte nata nō reperitur, sed in hortis quorundam. Hæc forte est, inquit, Cyamus, aut Faba ueterum. Ego neq; syluestrem esse toto genere, neq; sapore ingrato, & odore foetido, de ueterum Faba dici posse arbitror. An uerò Phaselus eorum sit, perpendendum est accuratius. Nos diuersi generis Pisis nigra interdum in hortis serimus propter raritatem, sapore odoreq; a communibus Pisis nihil distantia.

Phillyrea siue Ligustrum, G. Eadem sepes nostræ abundant, *Kerngarten*. A. Iam Phillyream nominat Bellonius, sua primū cura in hortis Luteciæ conlita: quæ etiam Venetiis in orto Maphei de Mapheis medici cernitur, è locis saxosis et montanis Italiæ, ubi sponte nascitur, translata.

Phu maius & minus, O. Vulgò Valerianam uocant. Nos & hortense genus unum habemus, & syluestria tria: maius commune, minus, & saxatile seu petraeum montanum. Omnia facile in hortis proueniunt, durantiq; saxatile quidem diutissime. Vna enim iam planta decimo aut amplius anno mihi uiuet in orto. Cognata his herbis omnino etiam Nardus Celtica est: & (ni fallor) Indica quoq;.

Phu peregrinū, seu, ut à quibusdam hodie uocatur, Valeriana Græca, herba pulchro flore, cœruleo, sed inodorata radice, K. A. Ae. C. Rurpodius, Excrescit interdum ad duos cubitos, (inquit Aretius in epistola ad me:) in summo caule cœrulei multiflores sunt. Viridem nondum uidi: & foliorum specie tantum puto, non uiribus & natura Phu propriè dictam referre.

Phyllitis, quæ uulgò lingua ceruina dicitur, G. In multis apud nos hortis bene diutq; uiuet. Syluestris nascitur etiam alibi locis collium saxosis & umbrosis, tum prope Limagum infra Badam nostram: & Glaronæ.

Phyllum, C. Dodonæi nimirum, quod is lib.: Iconum pinxit & descripsit, his uerbis: Phyllum, herba semine quidem Mercuriali similis, sed reliquis dissimilis. Tenuis enim candidaq; lanugine tota incanescit, ac leniter hirsuta est: folia Oleæ foliis similia, sed latiora paulò. Errare eos hinc manifestum est, qui Phyllon cum Mercuriali confundunt.

Pi.

Picea si est, quam nostri Abietem rubram (à corticis colore) appellant. Abundat ea syluæ & montes nostri: & in hortos etiam translata arbuscula, breui adolefcit, G.

Piceastrum quidem in altissimis montium nostrorum syluis nasci aiunt, materia

Qq

longè puriore & politiore. Ego nondum satis consideravi.

Piceastrum esse puto, cui maxima (ni fallor) rigidissimaq; in Coniferarum genere folia sunt, nostris montibus & collibus, etiam proximis urbi nostræ, frequenti. *Foren/ Rien.* Aliqui ipsam Piceam in altis montium sylvis nascentem pro Piceastro accipiunt; *Foren* uerò *Tædam* interpretantur.

Pimpinella minor sylvestris, crescit in collibus siccis, hirsuta modicè. Habetur & sativa laevis, G. Non aliter opinor quàm culta à sylvestri differens, tenerior, & acetiis expetita, in quem usum sylvestris adhuc tenera substitui potest. Semina habui è Gallia. Cucumerem olent. *Peu wivide* à Nic. Myrepsò scribitur: de ueteri nomine nō dum constat, Pimpinella à Germanis uulgò dicta, aliis populis Saxifraga nominatur, Italici cognomento hircina.

Pimpinella maior, in pratis humidis suæ spontis, G. Durat aliquandiu & floret in hortis.

Pinguicula uel Liparis uocari potest: propter pingua & tenera folia, semper humida: in humidis quibusdam pratis, præsertim circa sylvas et montes nascens herbula, foliis Oleæ ferè: caule nullo. Floribus Violæ nigræ, specie & colore. Viret aliquantisper in hortis, sed perennare (ni fallor) non potest.

Pinus arbor in Germania fortè nulla est, ni firmissima, ut in hortis, K.R. V. apud Italos in hortis colitur propter nucleos Pineos, *cin zamer Ziernen bañ/an wel chem zame Zirbelnussen oder Ziernussen wachsend.* Audio & Genevæ spectari Pinum in loco quodam publico.

Pinaster, Pinus sylvestris in altis montibus Rhætorum & Valesiorum. Nec ulla arborū (opinor) altius nascitur, *cin wilde Ziern baum*, G. In orto ante annū è nucleis aliquot mihi exortæ sunt, quæ partim uirent adhuc, partim perierunt. Nuclei quidem eius ut minores, ita gratiores sunt quàm Pini.

Piper uerum, ut quidam existimant, Jac. Oppenheimer pharmacopola Francfordiæ ad Mœnum: qui iconem etiam ad me dedit.

Piper uerum ex India, hæcenus non uisum, R. Pseudamomum, quod apud nos spontaneum est, aliqui antehac pro Pipere demonstrabant in Gallia. Idem aut persimile fuerit cuius Matthiæolus meminit his uerbis: Piper foliis fruticis Ribes uulgò dicti, sapore & odore Piperis uisitato simile, in racemis nascens. Sed aliud se uidisse tradit Neapoli, simile Vitalbæ, Italici uulgò dictæ, id est, Viti sylvestri causticæ nostræ. Huius plantas aliquas iam etiā in nonnullis Germaniæ hortis apparere audio, ut Schorndorffii ad arcē. Piperis, ut uocabant, arbore, uidi Ferrariæ in hortulo Ant. Mariæ Nigrosoli, altitudine bicubitali, foliis ferè Mali punice, sed pallidioribus.

Piper Indicum uulgò dictum, quod aliqui Capsicum uel Cardamomum Arabicum interpretantur, longum, O. G. Rotundum, O. quod Fuchsius latum cognominat: qui etiam tertium genus exhibet, rubeum & nigrum uocans. Tria eius genera, C. Aestiva est herba, & nisi primo uere apud nos feratur, siliquas suas pulcherrime rubentes non perficit. Siliquæ aliæ longæ sunt, eæq; uel crassæ uel graciles: aliæ breues & latæ, in diuersis speciebus. Zinigber caninum Auicennæ secundum aliquos aliis Piper Indicum, Hispanicum, Calecuticum, Bresilicum.

Piper montanum in Italia multi uocant, quod nostri *Zyland*, Fuchsius *Daphnoides* uulgare, Dodonaus *Chamelæam* falsam. Nascitur copiose in syluis ac locis montanis nostris. In hortos quoq; translatus, satis diu perdurat, G. C. Eiusdem species alpina minor, superiore autumno hortulo meo commissa, uiret etiamnum: sed flores & fructus non productura uidetur. Vis utriq; caustica, omnibus partibus, os & palatum non aliter quàm Euphorbium accendens. Aliqui non recte *Laureolas* uocant. Facile nascuntur: crassius enim radicis & tenax est cortex. Maior nunc bicubitalis mihi uiret.

Pirolam uulgò dictam, (*Wintergrün* nostris, quod hyeme etiā uireat: et *Walbmangolt*, quasi Betam syluaticam,) à Piri arboris folio, sæpe frustra in hortulo plantare conatus sum, quamuis cum terra sua erutam. Desiderat enim in syluis suis, solo duro,

duro, sicco, muscoso, umbroso, & uentis perflato uiuere: ubi radiculis suis geniculatis instar graminis se propagat.

Pirorum differentiae uariae apud nos reperiuntur: magnitudine, figura, odore, sapore, colore & tempore quo maturefcunt, diuersae: quas in praesentia persequi prolixum foret.

Pirorum genera diuersa, Matthias Curtius Lindauiae: è quibus praecipue commendantur Moschatula cognomine (*Muscatbyrle*) ab odore, perparua, dulcia. Maturefcunt in fine Iulii, (*Superba*, Chia, Myrapidia, praecocia) Et alia quaedam parua, quae Virginea cognominant, (*Juncf strawenbyrle*), grato & dulci sapore: quae siccata etiam placent. Et maiora quaedam, quae Regia uel Regulana uocitant (*Kärgelsbyren*) è Curia Rhætorum aduecta. Haec quidem apud nos etiam rara sunt, maxima post Libralia.

Pira omnium nobis (in Gallia, inquit Car. Stephanus) gratissima sunt, quae uulgo Bonchrestiana cognominantur: non ob hoc solum quod in eximia suauitate liberale pondus equent: sed quia tantae sunt teneritudinis, ut gustata statim eliquefcant, & perennent, gestatumque tolerant. Primum quidem Neapolim usque delata Carolo octauo ibi res gerente, à felici illa Campania. Haec ille. Sunt & apud nos Libralia quaedam, quamquam rara, pondere ad uncias quindecim & amplius quandoque: inaequalia, tuberosa, succi plena: sed haec diu seruari non possunt.

Pirus Bergamotte, Ae. De Pirorum generibus qui uoluerit plura, leget apud Cordum nostrum, ac Traguntitem Ruellium, Car. Stephanum, & Herm. Barbarum.

Pisorum genera uaria, K. Ea quidem in agris non hortis seminari decet.

Pisa nigra, G. *Moosenerbs*. Vide in Phaselo syluestri.

Pisa rubra, Vu. Nescio an de illis sentiens, quae floridissimo colore rubro, una macula nigra excepta, ex nouo Orbe nuper allata sunt: quae uidi quidem, an uero in Orbe nostro fata etiam proueniant, nescio.

Pistacium, C.K. Arbusculae eius aliquot, Vu. Hanc arborem (inquit Car. Stephanus) uidisse memini Venetiis, permultis in locis: item etiam Parisiis in aede diuae Mariae: atque adeo in horto Renati Bellai Cenomanensis episcopi, &c.

Pityusa uidetur non alia quam Esula uulgo dicta: qua rura nostra ubique abundant. Sed peritissimus omnium rei herbariae Anguillara horto Parauino praefectus, Pityusae cuiusdam è Creta, non uisae antehac in Italia.

Pl.

Plantago trium generum passim apud nos reperitur, maior, minor, et media. Alia est aquatica, sed improprie Plantago dicta. Est & maritima, à Dodonaeo exhibita.

Platanus in Graecia & alibi forte suae spontis est: in Italia è semine tantum. Ego non semel frustra terrae mandavi. Lutetiae, ni fallor, à Bellonio fata prouenit. Cardanus alicubi scribit Platanos in Scotia multas esse & bene prouenire: quod equidem miror. Scio deceptos aliquos Aceris genus latifolium pro Platano accepisse.

Po.

Polemonium, quod pharmacopolae aliqui Been album non recte nominant, cui pro calyce est folliculus seu utriculus quidam calathi specie, cauus, inanis: flos albus, radix cubitalis, &c. G. Non diu uidetur in hortis durare: sed passim sua sponte nascitur in pratis siccioribus. Vide Been album. Polemonium Monspelii uocant plerique herbam, de qua in Ruta capraria dicemus.

Polemonium alterum, C. Videtur autem Been rubrum à pharmacopolis uulgo dictum intelligere. Nam Dodonaeus etiam Polemonii speciem id facit: sed nihil ad Polemonium ueterum. Vide etiam supra in Limono Fontanoni.

Polium primum siue montanum Dioscoridis, K. Vu. C. O. Aliqui recentiores hoc Polium maius cognominant. Hoc non semel in uasis uerno tempore mihi satum prouenit, uix ad trium digitorum altitudinem: sed ante autumnum, medio fere Septembri interiit. Argentinae in horro, O. probe crescit & floret. Sponte nascitur locis siccis & apricis in Italia. & circa Monspelium, grati & aromatici odoris.

Qq ii

Polium alterum, uel minus, fruticosius & infirmius, A. G. In collium & montium locis, praesertim saxosis, sponte apud nos prouenit. Rhæti nobis uicini Herbam auream uocant (*Guldintraut*) à præstantia nimirum ad remedia quædam, In horro plantas erutas cū terra sua aliquoties plantauit, quæ intra annum aut citius perierunt, Siccum, saxosum & apricum locū requirit. E semine felicius prouenturū sperarem.

Polium (Pulegium fortè) Ceruinum Monspelii dictum, Vu.

Polycnemum. Vide Clinopodium.

Polygonatum, uulgò Sigillum Salomonis, *Wyswurz*. In syluis solo pingui & opaco passim emicat: & in hortos translata annis permultis durat, relictis in radice ueterum caulium uestigiis cū cicatricibus: ut & aliæ quædam, quarum ætatem inde computaueris.

Polygonaton erectum, quod à Fuchσιο pingitur, G. caules nō obliquos ut prius, sed rectos fert: & quanquam aliquid similitudinis cū præcedenti habeat, genere tamen toto differt. Prouenit apud nos locis montanis, umbrosis, saxosis, ut circa thermas Fabarias: in hortis quoque uiuacissimum.

Polygala. Vide Ornithopodium.

Polygonus mas, in hortis sponte & passim circa semitas nascitur: fœmina in palustribus.

Polypodium, R. G. Arboribus & saxis innascitur per syluas & montes. In hortis non bene nec diu uiuit, licet iuxta murum aut saxa cū suo cespite plantetur.

Pomum aureum uel amoris dictum, uel de altero mundo, in frutice peregrino, æstiuo, qui Solanis cognatus uidetur, (Solanum pomiferum dixeris, sed alterum, ad Mali insani differentiam) grauis & fœtidi odoris: fructus sepe inodorus est, nec insuaui, nec noxijs in cibo, magnitudine mali orbiculati seu parui alicuius: rotundus: sæpe uerò maior, inæqualis & tuberosus: colore aureo: & in altera specie rubro: in tertia, albo, O. G. Vu. C. K. Facile apud nos prouenit, & fructum maturè perficit. Rigari gaudet, & solo pingui, in arcis aut uasis. Malum insanum etiam aliqui Pomum amoris uocant, ut supra dictum est.

Porrum etiam nostræ mulierculæ alunt, sed minus ac in alijs regionibus copiosum. Et si magnopere laborent hortorum cultores (inquit Matthiolus) ut eorū Porri longi, crassi, candidi ac teneri euadant: nesciunt tamen eos capitatos efficere ceparum instar: quamuis ii apud ueteres in frequentissimo usu fuerint, quod longis qui propriè sectiui appellantur, lapidiores, gustuique gratiores haberentur. De his tanquam præstantioribus scripsit Dioscor. non quod à sectiui genere differrent: qui bus mangonio capitati fiunt, tegula in transplantatione supposita, incisile prius ante medullam folijs, ne adolendi facultas in sublime feratur, nec ad radices, sed in ipso capite consideat: uel sarculo conuelluntur radices, ut delumbatæ alant, neque distrahant, ut scriptum reliquit Plinius lib. 19. cap. 6. Hæc Matthiolus.

Porrum sectiuum, quod sic uulgò Germani uocant, (*Schnittlauch*) à superiori et ueteri sectiuo differens, à Dodonæo Schoenoprasum uocatur, ficto nomine: nam et inferiores Germani *Biesfloock*, (alijs *Bisflauch*), à lunco & Porro composito nomine uocant: pro folijs enim lunci inanes ei sunt. Nos Gethyllidem appellabimus: quam Nicandri Scholiastes Ceparum genus esse dicit: forma autem diminutiua uidetur à Gethyo: ita ut Gethyū sit species in hoc genere maior: quæ & ipsa apud nos reperitur in hortis, sed rarior: & mitior ad condimenta existimatur. Gethyllidem quidem syluestrem in uno tantum loco uidi, ad Lauffeburgum oppidū iuxta Rhænicatarrhactā inter saxa. Scio grammaticos Græcos in Gethyi & Gethyllidis interpretatione uariare: sed inter alia hæc ceu uerisimilia delegimus. Ampeloprasum, syluestre genus Porri est, à natalibus inter uineas dictum: ut & Scorodoprasum, odore Allii, folio Porri: quod in pratis quibusdam reperitur. Et Porrum petrarum, quod in saxis circa Badam nostram nascitur. Nisi id Allio potius cognatum sit. Carolus Stephanus Ruellium secutus Gethyum Theophrasti, interpretatur Porretam uulgò à Gallis dictam & Ciuetam, quasi Porraginem et Capulam: hoc est Porrum

rum sectium à Germanis uulgò dictum: idq; in agro, id est, inter agrestes herbas. Idem in horto: Bulbi genus (inquit) quod in hortis coma copiosiore uiret, nucleis gracilioribus, uulgu nostrum uocat des Porrettes, uel Oignonnettes, à Porri uel Vnionis tum sapore tum forma. Eadem quoq; grandioris formæ bulbos (de Cæpa Aſcalonia quibusdam existimata fortè sentiens) donarunt appellatione. Theophrasto Gethyum olus hortenſis est, capitata seu bulbosa radice: caulis magna pars sub terra est. Semen ei infirmum non multo tempore durat: à satutardè, nempe decimo aut duodecimo die germinat. Seritur Ianuario: sementis eius per æstatem est. Imbres diligit, uel simpliciter, uel à principio saltem.

Portulaca maior, hortenſis, O, G. Apud nos minor, quæ & syluestris alibi est, frequentior habetur.

Pr.

Priapea. Vide Hyoscyamus è Syria.

Primulam ueris, alii Arthriticam, alii Bellidem nominant: de utraq; predictum est.

Prunus quæ fructus magnos, purpureos & acido sapore fert, Lindauia **Hengst** uocat, nostri **Bockshoden** uel **Pflaumen**, G. His similia etiam cerei coloris, minus frequentia, apud nos reperiuntur.

Pruna parua, serotina, cereola, quæ nostri nescio unde **Zipparten** appellant, G.

Pruna præcociora, parua, uersicoloria, à tempore quo Avena metitur apud nos dicta, **Haberrieden**, passim nobis abundant.

Pruna Neapolitana oblonga, (dulcia, ni fallor,) quorum species una alba est, altera punicea, Matthias Curtius Lindauia.

Pruna Vngarica, quæ uulgò **Tuuesca** uocant, (**Zwetschen**) duorum generum: maiora & oblongiora: & alia minora, rotundiora, dulciora, Curtius Lindauie. Prioris generis arborem nos quoq; habemus, è nucleo ad quatuor iam cubitos enatam. Cuius quidam noster adultam habet, sed quæ non bene fructificat, Basileæ in horto Io. Jacobi Lofs, probè perficit fructum.

Pruna Vngarica præstantissima, Damascena fortè, Vu. Eiusmodi Venetiis mittuntur aliquando Augustam, magno precio, crassa & carnosa, subacida. Hæc (uel oblonga Neapolitana) aliqui Imperatoria siue Augusta cognominant, quod iis Imperator Augustus oblectetur. Vna aut altera arbor Augustæ est.

Pruna alia Vngarica aurei uel cerei coloris, magnitudine oui gallinacei, aut etiam anatini, carnosa, gratissimi saporis, Vu. K.

Pruni diuersis arboribus inferuntur, ut Nuci, Malo, Amygdalo.

Prunus syluestris, Spinus in plerisq; sepibus uiuis nascitur.

Pl.

Pseudamomum. Vide Amomum.

Psyllium, R. A. Vu. Aliquando mihi in horto satum pulchre quidem excreuit, sed hyeme præueniente seminis maturitatem non est cōsecutum. Psyllii duo genera, K. tria, O. Semel in horto satum, seipsum profeminare & restaurare scribit **Donæus**.

Ptarmica. Vide Pyretro cognata.

Ptarmica alia Monspelii dicta, uera (ut existimant) hac æstate floruit, A.

Pu.

Pulegium in plerisq; apud nos hortis uiret. Sponte circa Argentinam, & alibi, in pratis humidis luxuriatur. Patavii Calaminthæ genus uidimus, Pulegio specie, odore saporeq; tam simile, nisi quod rectum nascitur, ut prorsus ei cognatum iudicem. Aquaticum Pulegium, uulgò regale dicitur: montanum uerò, multis Polium, cem. Aquaticum Pulegium, uulgò regale dicitur: montanum uerò, multis Polium, foliis multò antedicto minoribus, flore cœruleo: caule recto, dodrantali, &c. Carolus Stephanus. puto autem Pulegium illud montanum cuius meminit, Monspelii Ceruinum cognominari. Id quidem hoc uere Lugduno ad me missum, pulchre in hortulo meo crescit, coliculis pedibus, candidis, erectis, ab una radice pluribus: foliis longioribus & angustioribus, Hyssopifere: odore & sapore omnino Pulegi uulgaris.

Qq iii

Pulegium petregum uocari potest, Germanici nominis (*Steinpoley*) imitatione, herba aliquibus Clinopodium existimata, quæ sponte apud nos in muris, et locis siccis saxosisq; & collibus apricis crescit. Hancputo Calaminthæ montanæ nomine non rectè exhiberi à Trago lib. .cap. 10. Eadem fortè est, de qua Car. Stephanus sic scribit: Aquatico Pulegio similis quædam planta in montibus et siccis locis crescere solet, quæ Gallis Pouliot sauuage, quibusdam Polium montanum appellatur: folio Serpylli, sed paulò latiore, flore cœruleo: apud eū collem Luteriæ uicinum frequens qui Eritius dicitur.

Pulmonaria Plinii, Italis hodieq; uulgò sic dicta, sine maculis apud nos, reperitur in Albio monte, G. gaudetq; locis humidis & umbrosis. Illa uerò cuius Plinius meminuit foliis maculosis, in Italia tum hortis tum sponte frequentior est, nobis rarior. Audio tamen in montibus quibusdam Bernensium reperiri, O. K. Est autem omnino Symphyto alteri seu Consolidæ maiori dictæ cognata herba, sed undiquaq; minor. Syluium audio hanc Myosota, id est, Muris auriculā Dioscoridis existimasse. Plantatur in Germania inferiore plerisq; hortis, non alium ferè in usum, quam ut misceatur ferulis, præsertim placentis ex ouis, Dodonæo teste.

Pulmonaria eadē quæ Vegetii, Consiligo est: quæ Pulmonariæ nomine hodieq; apud Anglos uenit. Vide in C.

Pulmonaria Gallica, Gallis hodie uulgò dicta, siccis & lapidosis locis & in muris circa urbem nostram multa est: nec non in syluis, præsertim Fagorum, *Büchspid:* olus quoddam syluestre, Lactucarum generi cognatum. Commendatur ad pulmonis uitia, paronychiam & uulnera. Hæc fortè est Scopa illa regia (nam & aliæ eodem nomine sunt) quæ apud Plinium demonstratur, ramis oblongis, foliis ex interuallo lactucinis, sed rigentibus & lanuginosis, flore luteo: radice promissa, tenui. Et forsitan eadem fuerit Sideritis etiam illa Plinii (nam aliæ sunt Dioscor. Sideritides) quæ sit latissimo folio, Scopa regia appellata, uulneribus præcipua: quanquā Ruelius Carpentariā à Gallis dictam (i. S. Barbaræ herbam) pro Sideritide ista accipit.

Pulmonariam aliqui (Sabaudi aut eis uicini Bernenses) uocant herbam illam, quam nos Saxifragam montanam. Vide infra. Et inter Musci genera, arboribus ad hærens, quam Pulmonariam recentiores medici nominant. Vulgus nostrum uerna cula lingua Marrubio id nomen tribuit. Alicubi Gentianam quandam pumilam in pratis humidis prouenientem, *Lungenblümle*, id est, Pulmonis flosculos uocant.

Pulsatilla Italica uulgò dicta, Cauda uulpina Amato Lusitano, sed alia est Alopecurus ueterū. Vide supra Anemone quædam. Alia est Polonorum Pulsatilla, nempe Astrantia nigra nostra.

Py.

Pyrethrum, O. R. C. Rurpodius. Huius etiam Argentinæ plantas duas in horto Massarti medici primū uidi: foliis ferè Millefolii latius se spargentibus. Mihi etiam hoc anno è seminibus Pyrethricis plures plantæ enatæ sunt, radicibus albis etc. Vide Tarchon. Pyrethrum alpinum quoddam paruū in summis alpidibus, (id est, Gothardi monte) reperi.

Pyrethro cognata quædam herba, oblongis serratisq; foliis. Locis aquosis nascitur: circa Luteciam in pratis: & prope Basileam iuxta fluuiolum qui in oppidum minus intrat. Tarchon aquaticum dixerim. Falluntur qui Parmicam putarunt. Hoc in hortulo etiam mihi uiret, sed minus lætum humiliusq; propter siccitatem: repit ra dicibus suis.

Que.

Quercus in syluis nostris crescunt, duorum generum opinor, *Eich & Hageich*, Quantum proffit cura arboribus (inquit Cardanus de Varietate rerum lib. 6. ca. 23.) præcipue ostendit Quercus Basileæ in diui Petri nemore (area publica Tiliis conferta,) Truncum terni uiri diductis manibus uix ambiunt. Altitudo (trunci) minor quam hominis. Exerit in uertice sex aut septem stolones (imò ramos magnos & la-

tos, quos tabulata dixerim) sensim ascendentes, ut imaginem patera referant. Inde crebrioribus ramis, tum & ramusculis ita densatur, ut olim referant Caesarem Maximilianum coenasse in ea, discubuisseq. Siquidem ambitum pedes centum continere haud dubium est, cum numerando illū circumiuerim. Ergo hac diligentia quamuis sterili (nō est sterile) solo frigidoq. celo, Basilica Quercus cū Lycia Platano iure de certabit. Et quamuis gloriatur Licinius Mutianus, eius provinciae legatus, coenasse saepius sub Platano cum octodecim sociis: multo tamē plures Quercus Germanica supra excipiet, quā Platani illa adumbraverit. Sed discrimen est quod Mutiani Platanus 77. pedum altitudinem habuit. Quercus haec, ut dixi, humillima est.

Quinquefolium. Quare Pentaphyllum.

Ra.

Ranunculi, siue Batrachii multa sunt genera: proprie autem ita dici videntur quae locis aquosis, & ubi ranæ frequentant, nascuntur. Horum unum pinguibus ac splendidis foliis est: (quod apium risus, uel apium Hemorroidum uocant) id primo loco Matthiolus pinxit. Alterum simplicia, oblonga & angusta folia habet, Olea ferē: quod a Dodonæo oues occidere fertur, qui foliorum marginibus eminentia quædam appingit, quod a tatis aut potius speciei alterius proximæ signū est. Nunc aliam quot mensibus in horto meo uiret. Tertium, minima & multifida habet folia: florē partim album, partim luteū: humi sternitur. Tria hæc genera, foliorum quidem specie prorsus differunt: cæteris fere omnibus conueniunt. Omnia caustica sunt, & nascuntur palustribus locis apud nos: præsertim ubi lacus expatiatur. Hæc in hortis nisi aqua sublit, non durant. Alia Ranunculi genera nascuntur in pratis, & collibus, alibiq. magnitudine & foliorum hirsutie distincta. Genus illud cui hirsutiora sunt folia, caulis longior, & pluribus incisuris folia, Sardoum Ranunculum dicemus, urentem & ipsum. Genus id quod per terram magis repit in pratis, & acrimonia caret (unde & inter olera uulgus recipit,) aliqui Cronopodem uocant, de quo diximus in litera C. (Huic cognatus est syluaticus quidam a Trago & Dodonæo descriptus,) Colitur hoc etiam in hortis nostris (sicut & præcedens) flore multiplici, tum luteo splendente (unde & nomen factū a nostris, *Glyssolinle*) tum albo. Diu durant, flagellis suis, ut Pentaphyllum se propagantes. Siccis locis & in collibus nascitur genus quoddam humilior, quod aliqui Flammulam uocant, a præcipua urendi ui, præsertim in radice, quā globosam habet: unde Apuleius Verticillum nominasse uidetur. Nostri uulgo *Gehöplere glyssolinle* a calyce florum inuerso. In hortulo aliquoties mihi plantatus non durauit. Est & aruensis quidam æstriusq. Ranunculus a Fuchio depictus, frequens apud nos, conceptaculis seminum aculeatis, G. Montanos etiam Ranunculos in Heluetiorum montibus nascentes, albis floribus, tres noui. Vnus ex his minimus est: caule uix ultra quatuor digitos alto: acerrimus. Ex eo destillata aqua in Vallesiis quidam propinant Gallico morbo affectis, & mire purgare aiunt. In hortis aliquandiu durat, per duos fortē aut tres annos, *Jägerkraut*, G. In saxis ferē aliorum montium terra interfectis & musco nascitur. Alius est magnus, magnis & latis foliis, qui flore etiam multiplici in hortis colitur: genere ab aliis differens, quod & forma & sapor præ se ferunt. Crescit in montium locis humidis & aquosis. In hortis facili ubiuis & diu uiuit, G. Tertius qui *Sidertsche* appellatur in Bernensium montibus: unde, A. noster in hortum transtulit: a quo etiam descriptionem, picturam & semina eius accepi, & nuper ipsam plantam recenitem. Floret (inquit) hæc planta in horto nostro: quæ sponte in montium locis umbrosis accirca Larices crescit: radice alba, rotunda, multis fibris, qualis Ellebori albis ferē est. Caules ab ea multi erumpunt. Florere incipit primo uere floribus ut Ranunculum, minoribus, candidis. Folia habet magna, Platani fermē modo incisa. Hæc ille, Chamæplatanum, si libet, uocemus. Vix enim (Ricino excepto) folia Platano similiora uidi, tum figura, tum magnitudine ferē me pari. Sapor eis subacris & nitrosus: qualis & secundo generi ex albis montanis.

Qq iiii

Ranunculum phragmiten appellauerim, quem Fuchsius tertiam Ranunculi-
pud Dioscoridem speciem facit, ut similem ei alteram flore lacteo, speciem quartam
eiusdem: quoniam passim apud nos in sepibus nascitur, etc. *Wergenblumen*. Vide
supra in Anemonis.

Ranunculi Dioscoridis secundam speciem, herbae Sardoae nomine, Dodonaus
Pulsatillam Italorum facit: de qua leges inter Anemonas.

Ranunculum quartum Marthioli flore albo, (quem depingit, non autem descri-
bit, ne uerbo quidem,) foliis Napelli ferè, ut pictura prae se fert, nondum uidi. Inter
Ranunculos & Aconita ambigere uidetur herba illa montana, cuius inter Aconita
mentio facta est.

Raphani tria genera enumerat Plinius, crispum, leue & campestre: quae Germa-
nia etiam hodie agnoscit, inquit Bern. Dessenius. Sed quod à Plinio Algidenfe di-
citur, longum, succosum ac translucidum, hortis inferioris Germaniae tam frequens,
ut nullum ferè aliud norint: hoc apud Batauphrygios nostros in eam magnitu-
dinem crescit, uti uiderim quod triginta libras penderet. Quamobrem minime
mirandum, in Germania infantium puerorum magnitudinem aquare, Plinium scri-
psisse. Vulgaris est Raphanus, qui utilis brachii amplitudinem non excedit. Sunt
autem hi translucidi: & adeo fragiles, ut in taleolas absque ferro confringi queant.
Multum ab acedine illa ac saporis uehementia, qua secundum genus pollet, rece-
dunt: & sanguine imbuti, linguam usque adeo non uellicant. Theophrastus quin-
to de caus. plantarum capite quinto, hyeme cum maxime uigent, terra radices Ra-
phani obrutas, ut nullum imbrem admittant, ac direptis quibusdam foliis, mira
crassitudine distendi docuit. Alterum genus Rapi figura, Syriacum appellatum,
in superiori solum Germania prouenit: uehementissimum & tenerissimum, nec mul-
ta humiditate redundans: quapropter parcius editur. Nam qui affatim ingerunt,
praeter frequentes ructus, rosionis quendam sensum in stomacho experiuntur. Ter-
tium, quod fronde copiosius quam radice, & plurimum agreste, à Latinis Armo-
racia, à nostris uoce parum corrupta Raphanus marinus uocatur. Hoc saepe in pa-
scuis Tuhantum circa lacus & stagna crescit, atque in pinguis Phrygiae paludibus
copiosissime uidetur. Rheni superioris accola in hortis transplantant, meliori quo-
dam cultu & natura. Extremae planè acedinis est, unde quibusdam radix Piperis
appellatur: uulgo *Pfefferwurzeln*, & *Wyrhettich*. Sicille. Laudatur hodie
Argentina cum alijs fertilitate soli, & nascentibus in eo uariis naturae (imò Dei per
naturam) donis: quae à maximo illic hortulanorum & olitorum numero serun-
tur & coluntur: & inter alia Raphanis eximijs. Tragus uulgarem Raphanum &
rotundiorum, quem à ueteribus Corinthium & Syriacum dictum putat, Argentor-
rateni & Spirensi agris familiarem esse tradit: praelongum uerò, dulciorem ac mie-
torem Metensi ac Lotharingico. Hunc Algidensem Plinii, Theophrasti Cleonae-
um facit. Habetur apud nos praeter commune genus alterum (ex Italia puto) cuius
cortex nigricat: & tertium cuius radices pars magna supra terram excrecere solet,
utrumque communi praestantius, sed rarum. Raphanum maiorem, uel marinum
uulgo dictum, nostri in hortis tantum plantant: diu & probe durat, capitibus radi-
cum resectis plantatur, non semine, quod non fert, Trago teste. In Sabaudia memi-
ni aliquando reperisse in pratis, infra Lausannam oppidum: satum fortè potius pur-
to quam sponte natum. Facile enim ubiuis nascitur. Tragus quidem in humidioria-
bus pratis sua sponte nasci scribit, & Theophrasti radicem Thraciam uel Liothalas-
sium esse putat.

Rapistrum passim in aruis nascitur: idem quod Lapsana uel cognatum, agreste
olus.

Rapis arua conferuntur non horti.

Rapa rubra, Vu. Betae speciem intelligo, de qua dictum est supra.

Rapi genus minus, exprimendi è seminibus olei causa in agro Metensi seritur.
Radix non editur. Id ad Sinapis naturam accedit, Trago teste.

Rapi

Rapi sylvestris multa sunt genera quod Dioscorides simpliciter sic uocat, uideatur id esse quod nostri uulgo Rapunculum. Eo minus est de quo supra diximus Campanulæ cœruleæ nomine. Et aliud maius, foliis ferè Vrticæ. Maximum, quod aliqui Medion uocant. Dodonæus Violam Marianam. Sunt & Vuulariæ quibusdam dictæ in pratis non alterius generis. Et in syluis ac montibus, quarum flores ceu in spica sunt, alii cœrulei, alii pallidi, superiorū floribus, qui calathiformes sunt, ut Medion, Campanula cœrulea, &c.

Reseda. Vide Lutea.

Rh.

Rhabarbaricum uerum nascitur Romæ in horto Scipionis ad S. Apostolum, ubi etiam à se depicti doctissimus Io. Kentmannus cum aliis plurimis iconibus participem me fecit. Is, inquit, (Scipio ciuis Romanus) quatuor radices habebat, et planè affirmabat, in Turcia semen seipsum collegisse, & ex eo semine has radices sibi progeneras. Inter dicebatur autem à Paulo III. qui rerum naturalium, & herbarum amator erat, ne uenderetur alicubi propter raritatem. Sic ille. Omnino quidem Lappathorum generis uidetur hæc herba.

Rhabarbarum monachorum uulgo dicta herba, ubi quæ in cultioribus hortis satâ reperitur, R. G. Est autem Hippolapathum, aut eius species.

Rhamnus, Leuschnerus, Rurpodius,

Rhamni secunda species, K. C.

Rhamni tertia species, Matthioli, Vu. C.

Rhaponticum uulgo dictum. Vide in Centaurio maiore, Acantho, & Gentianæ.

Rhodia uulgo dicta radix, *Rosin wurz*: è Pannonia (puto, ubi sponte crescit,) primùm allata, Ae. R. K. C. Huius radicem proximo autumno Leonhardus Fuchs ad me misit. & uiret mihi etiamnum pulchrè, sed florem nondum protulit.

Rhododaphnè siue Nerion uidi anno superiore Basileg in hortis doctissimi uiri Cæli Curionis & aliorum: item Argentinae Massarii & D. E. semine, aiunt, facile provenit. Auulsis eius etiam stolones crescunt. Hyeme sub tecto includi debet. Mihi aliquoties satum non provenit. Nunc stirpem duorum ferè dodrantum à Cæl. Curiione donatam pulchrè crescentem habeo.

Rhus Plinii existimatus Monspelii suffrutex, C. Verum Clymenum Dioscoridis. Nunc in meo etiam horto Antuerpiam à C. transmissus nascitur, sed nondum perfectè propter recentem plantationem. Videtur autem facile nasci, sicut & reliquæ herbae astringentes ferè.

Ri.

Ribes. Vide in Ceanotho.

Ricinus. Lege Cici.

Ro.

Rosæ hortenses albæ, multiplici, folio passim apud nos in hortis abundat. Earum frutices proceriores sunt, quàm quæ rubras ferunt.

Rosæ rubrae urbanae, simplices, uulgares nobis. Item aliæ ex purpura albicantes, folio multiplici. His diebus in horto amici Rosam uidi dimidia parte candidissimam, altera purpuream.

Rosæ Alexandrinæ, uel Persicæ, uel Damascenæ, uulgo Incarnatæ dictæ, ante annos aliquot raræ nobis, nunc satis frequentes. *Zybsarb rosen*. Harum rosaria (inquit Nicol. Monardus Hispanensis medicus) nostris maiora & uiridiora sunt: foliis amplioribus: aculeis plurimis & acutioribus. Florum numerosam copiam fundunt: quæ foliis quinis aut senis constant, medio inter album & rubrum colore. Ruderatum amant locum. Seruntur, inciduntur, cremantur, transferuntur sicuti nostra. Harum Rosarum apud Italos, Gallos, Germanos, diuersas quæ gentes nunc est frequens usus, quas Damascenas uocant: quoniam ex Damasco nobilissima Syriæ urbe creduntur aduectæ. Apud nos uerò triginta ferè sunt anni, ex quo earum notitiam

Rr

attigimus. Apud magnates & nobiles fuit in primis in magna aestimatione, ex his
 rolis medicamentum, (syrupus ex multiplici earum infusione,) uel mel rosaceum,
 foliatum, &c. nunc uero ubiq; habetur, ita ut non sine seplasiariorum iactura pe-
 rierit usus pharmacorum. Hæc ille. Sed uideo Damascenas uel Alexandrinas ro-
 sas diuersas esse, ut differentiar causa has, Persicas tantum nominare præstet.

Rosæ citrinæ seu luteæ, C. Rurpodius.

Rosæ moschum fragrantæ, luteæ, K. Augustæ luteas alunt in hortis lautiores
 quidam, quas inodoras esse audio, (& uulpinas cognominari) frutice tamen odo-
 rato, quem uidi illic uirentem iuxta parietes hortorum, odore ferè syluestris Rosæ
 foliorum, quam à uino nostri denominant. Florem siccum tantum & inodorum ui-
 di. Nunc plantas duas in horto alo: sed non feliciter germinantes, quòd diutius (opi-
 nor) in itinere detentæ sint: & iam circa solstitium odorem etiam amissile uiden-
 tur.

Rosa muscata, (alia à præcedente,) simplex & multiplex, C. Rosæ muscatæ uel
 Damascenæ, parua, simplices, albæ, Curtius Lindauræ. Flos est quatuor foliorum
 tantum, (ut audio) floret in Italia toto ferè anno, Augustæ uix ante autumnum.
 Aliæ nobiles, densifolio flore, paruo, purpurei coloris diluti, Idem. Harum fruticem
 Augustæ etiam uidi, in uase, tanquam à frigore ei metuerent ut recondi sub lectum
 posset. Earum speciem priorem esse puto, de qua Amatus Lusitanus: Sunt præte-
 rea (inquit) aliæ Rosæ albæ ad citrinum tendentes, parua, pauca (tria quatuorue)
 folia habentes, ut & syluestres quibus similes sunt: quæ ferè per totum annum in
 arbore uidentur, quas moscatas ab odore, uel Alexandrinas uulgo appellat: aliqui
 Damascenas. Hæ uerò odore caput tentant: & potentissimè aluum subducunt, non
 minus ac Scammonium: ita ut si sex uel octo folia acetario miscueris, totum pur-
 gatorium reddas, qua de causa ab illis tanquam pernicioso medicamento naturæ
 uim inferenti, abstinendum suadeo. In Hispania rarò uidentur: & ab aliquibus cum
 incarnatis confunduntur. Hæc ille. Audio easdem marinas à nonnullis uocari, ali-
 que iam in hortis monachorum præsertim & ditiorum hominum, circa Verbanum
 lacum quoque. Sed fortè genus diuersum est. Præstantissimæ rosarum quæ puni-
 ceo colore rubent: proxima laus iis quæ in rufum (rubrum) candicant, incarnatæ uul-
 gò dictæ: uilissimæ albicantes. In quarum tamen genere eæ odoratissimæ excipiun-
 tur, quæ Hetruscis Damascenæ, & aliis Moschettæ uulgo dicuntur. Siquidem non
 modò cæteras excellunt, quòd colore admodum suauiter fragrent, sed quòd etiam ma-
 gis aluum subducant, Matthiæolus. Monachi interpretes Mesuei Nesrin uel Nesrin
 Arabicè hunc fruticem uocant, aliàs Rosam Seni: & è syluestrium genere esse pu-
 rant, sicut & incarnatam uel trentaphyllam uulgo dictam à foliis triginta: & albam,
 quæ & centifolia dicatur.

Rosæ Indicæ magnæ, coloris aurei, Vur.

Rosæ syluestres, Cynosbati uel Cynorhodi nomine ueteribus dictæ, passim se-
 pes utuas apud nos replent.

Rosæ syluestris alia, humilior, in collibus siccis & apricis, toto frutice suauissimè
 odorato nascitur: unde à uino nostri **Wintrosle** denominant. Hunc cum aliquan-
 do in hortuli mei loco umbroso plantassem, probè quidem excreuit, sed odorem a-
 misit. Cuius quidam noster partim in ipso muro hortuli sui, partim iuxta, loco a-
 prico, ualde procerum & suauissimi odoris, quem nectareum dixerim, hunc frus-
 ticem habet: quem annis quàm plurimis illic uixisse apparet: à quo ego etiam ac-
 cepi.

Rosæ syluestris, à Maio mense denominata uulgo nostris, **Weientrosle**, colitur
 quidem in hortis etiam ab aliquibus apud nos: crescit uerò sponte ad radicem
 Albii montis, horæ itinere ab urbe: minor, odoratior & præciosior est Cynor-
 rhodo, in hortis facillime durat. Hæc eadem fuerit Rosa campestris Tragi,
 quam Germanice uocat **Danrosen** / **Haberrosen** / **Seldetrosen**. Hæc in-
 quit magnitudine tum florum, tum foliorum excedit illam cuius folia fragrant
 spinis

spinis non perinde minacibus. Flores seu Rosæ huius fruticis, colorem magis rubro & elegantiore tinguntur, odoris (meo quidem iudicio) inter omnia genera suavisissimi, tactu pinguiore. Luxuriat hic frutex plerumque in humectis ac minime fertilibus auenaceis agris, aliisque nonnullis dumetis, raro supra tres cubitos assurgens. Serpentibus in terra radicibus se propagat, facileque & nullo negotio plantari potest. Huius species altera (inquit) Rosas prorsus candidas proferri: odoris minus iucundi: in siccanis agrorumque limitibus, & iuxta itinera, lunio ac Iulio mensibus florens.

Rosa alpina dicta ab Heluetiis montium incolis, *Alprosen/Hünerlaub*, &c. Folia Oleæ uel Rhododaphnes habet, ruffa parte supina: florem rosei (rubri uel è rubro albicantis) coloris. Frutex duos pedes altus, totus odoratus est & pinguis. Species eius altera foliolis minimis, Acinariae palustris nostræ (*Moosbeere* uocant) foliolis persimilia, nascitur in Adula monte Rhætorum: inde autumnoproximo mihi allata, & in hortulo plantata: ubi nunc media hyeme egregie uiuet, nec perdit folia: duraturam tamen uix spero, altissimis, siccis, uentosis & apricis frigidisque locis assueram. Species hæc rarissima est. Prior in plerisque altis montibus reperitur: quam qui Nerion montanum appellant non laudo: nam neque uenenosus est, neque siliquatus frutex.

Rosmarinus seu Libanotis coronaria, duplex: unus nobilior, angustiore folio: Cordus tenuifolium seu minorem appellat. Alter ignobilior, Cordus syluestrem uel maiorem nominat. Vterque iam apud nos in hortis colitur. Nobilior siue urbanus noster, flores ex albo cœruleos habet. Audio inueniri speciem, cuius flores omnino albi sint. Syluestris è Sabaudia hortis sæpe ad nos adfertur: idem in prouincia Narbonensi, ut circa Monspelium sponte prouenit: & hyeme pauperum etiam focis uritur. Prouenit tum ex semine, tum ramulis auulsis commodius. Topiaria arte digeri facile potest, in uarias figuras. Sic pulchre digestum Basileæ uidimus in horto Ioan. Jacobi Lofs: & in cœnobitarum Gallia Italiaeque aliquot hortis: Biturigibus scenam siue attegiam Rosmarino procero inflexoque supra opertam, ut triclinium caperet.

Rosmarinus ita ut in Gallia, arborefcens ferè, Vu.
Ru.

Rubia sativa, à radicis colore dicta, qua ad eundem colorem utuntur tinctorum. *Rôte*, Ac. O. R. G. Nos cognitionis tantum gratia, & ad remedia in hortis plantamus. Alibi ea conferuntur agri in usum tinctorum. In horto meo alta nunc est cubitos fere septem.

Rubia syluestris tam ubique obuia est, ut in hortum transferre nemo dignetur.

Rubia syluatica aspera, *Waldmeister* à nostris dicta, G. Frequens occurrit in syluis, pedali aut cubitali cauliculo: locis umbrosis, pinguibus, opacis & syluestribus gaudens, margine foliorum aspero, caule quadrato: flosculis albis, odoratis. Altera foliis est læuibus, caule terete, bicubitali ferè: flosculis albis, inodoris, G. Vtriusque meminit Tragus: priorem depinxit. Huius speciem aliam longioribus & angustioribus foliis in colle iuxta Scaphusiam inuentam sibi nuper quidam ostendit. Sunt & alia syluestres huius generis species multo minores: quas circa Bononiam Squinanchicas, aut Herbas uite appellant.

Rubus uulgaris passim circa sepes & alibi, mora sua obuiis sponte præbet. Alia eiusdem species, humidioribus præsertim locis, humi reptat, nec unquam assurgit: ita Chamæbatus inter Rubos, ut Chamæcissus inter Hederas.

Rubus alpinus humilis est, sine spinis: quare Idæum dixeris: moris rubris, acidis, quæ paucioribus granis constant. Hunc primum obseruavi in monte Pilati ultra Lucernam, super saxis terra intectis.

Rubus Idæus à plerisque doctis existimatus, moris rubentibus, suauiter odoratis: circa syluas apud nos reperitur, spinis raris & paruis. Hunc Argentinæ in horto uidi, procერიorem quam sponte nascatur, spinis nullis, si bene memini. *Hindbeere*.
R r ii

*Ruscus, R.O.K. Suffrutex in hortis'uiuacissimus. Plantam unā ante octodecim annos ē Sabaudia horro mecum attuli, nescio cuius tum ætatis. A quo tempore hæc in hortulo meo pulchrè uiret per totum annum. (quamuis bis aut ter in hortos translata diuersos:) uere germinat, & ueteribus areiscentibus coliculos nouos promittit: floret etiam aliquando, & flori rudimenta uel hyeme in medijs folijs ostendit. Fructum quidem toto hoc tempore nullum ne inchoauit quidem. Radix uidetur talis esse, qualis ferè Hypoglossi & Polygonati: ideoq; tam diuturna. Pedis altitudinem non excedit: non minuitur nec multiplicatur, nisi ut dixi. Refracti foris à radice coliculi seorsim germinarent.

Ruta hortensis in plerisq; omnibus hortis. Hæc cura & ætate uidetur propemodum arborescere posse. Semine uel furculo seritur. Rutæ hortensis (inquit Tragus) duæ species sunt, sed ad eodē inuicem consimiles, ut nisi singulari diligentia nemo facillè discernat. Quæ nobilitate præstat, ea tenerior, nigrior & longe exilior uulgaris existit. Eius folia ex multis alijs rotundis, lenticulamq; imitantibus foliolis constant. Hæc raro florem profert: ferroq; incisa, facillè inarescit. Vulgaris autem Ruta per omnia maior, folijs uestita latioribus, frequentibus, cæsi colore. Vtraq; florem gerit luteum, &c. Seritur Ruta & semine, & furculo: idq; multo felicius.

Ruta syluestris per omnia similis hortensi, sed undiquaq; minor. Nasceitur circa Monspelium. Hæc ē semine aliquando mihi prouenit. Hyeme perit, nisi sub tecto seruetur in cella tepida aut uinaria. Flos ei luteus, Vu. A. Puto autem duplicem esse, unā minoribus folijs, de qua iam diximus: alteram maioribus, hortensi similiorē. Rutæ syluestris iconem depictam clarissimus hoc tempore Torgæ medicus Ioan. Kentmannus ad me misit. Folijs, ut icon præ se fert, longioribus & angustioribus quam hortensis, floribus partim albis, partim purpurascens. Caulibus ab una radice ternis. Hanc plantā (inquit) accepi à Pet. Bellonio Cenomano, redeunte ex Aegypto, qui dixit uerū Harmel esse: tertium Rutæ genus apud Diosc. alias reperitur in Macedonia & Toleti. Florem habet album, folia non dissimilia folijs Rutæ: capitella (uascula seminum rotunda) maiora quam Ruta hortensis: pluribus ab una radice cauliculis. Hanc in hortis alunt, Ae. Vu. folijs oblongis, flore albo, etc. Vide Harmel supra.

Ruta pratensis Lutetia uocatur in pratis proximis nascens herba: cuius flores albi uel purpurascens, nullis folijs, folijs apicibus aut cincinnis longiusculis cōstant. Reperitur & apud nos locis saxosis & umbrosis, circa sepes sylvarum alicubi. Folia Aquilinæ uel Aquilegiæ uulgò dictæ, fere similia habet, A. G. Plurimis annis planta una in horto iam mihi durauit. loco umbroso. Aliqui circa Sabaudiam hanc non recte Rutam caprariam uocant. Cognata huic uidetur Saxifraga lutea, de qua infra. Simile est etiam ei Thalictrum à nonnullis dictum, &c.

Ruta capraria Italorum, alio nomine Galega (quasi Gallica: nam & Regallicum, & Galeni herba quibusdam dicitur) uel Gralega, Ae. K. C. Rupodius. in Germania sponte nasci non puto: in Italia abundat, præsertim iuxta aquas, uel ubi substrata, Cardano teste. Alijs etiam nominibus diuersis in diuersis Italiae locis appellatur: ut sunt, Castra cane, Lauanese, Lauannan, Fœnogræcum syluestre, Thorina uel Taurina, Martanica, Saracena, Capragina, & herba Nefa, Fœnogræco satiuo tota persimillima est. Non seritur in Italia: sed locis pinguibus humectisq; copiose prouenit, Monachi in Mesuen. Eruditi quidam Onobrychin à ueteribus dictam iudicant. Matthiolus contradicit, ut iis etiam qui Glaucem faciunt. Pingitur Ruta hæc à Dodonæo. Videtur (inquit) nonnullis Polygala esse, & nomen Galega à Græco corruptum. Item à Matthiolo in Glaucē. Vulgaris est adeo in Italia ut semina nemo colligat: quare sæpe frustra petiit.

Ruta capraria Gallorum, Monspelii uulgò sic dicta: folijs Rutæ, sed uiridioribus, ex atro tamen, flore luteo, copioso, Vu. Frutex uel suffrutex est lignosus, folijs fere ternis, floribus ut lasme, sicut in planta arida apparet: acinis nigricantibus, qui semina aliquot continent, calidè nature, &c. E semine superiori anno mihi proa diuit,

diuit, & in uase per hyemem durauit sub tecto; nuper Sphondylorum iniuria perijt. Enata est etiam Berna, A. cui nuper floruit luteo flore: & O. Massarioq; medicis Argentinae. Viret nunc etiam hyeme, nec folia amisit in uase, dum hac scriberem. Eruditi quidam Polemonium Dioscoridis hoc esse multis persuaserunt. Ego aliud demonstravi supra in P.

Ruta muraria uulgò à Germanis dicta, in muris hortorum & mœnium nobis abundat. Herba Adianto magis cognata quàm Paronychia, tantùm abest ut ipsa sit Paronychia, quod quidam putat.

Sa.

Sabina, R. G. Reperitur apud nos in hortis tantùm, in quibus floret quidem: sed fructum rarissimè profert. Semel tantùm memini me fructu eius reperire in arbuscula huius generis quatuor cubitorum aut amplius, in horto loco sublimi posito, itinere duarum horarum (si probe memini) è Suitia pago. Putatione adhibita in arbusculam, sed tardissimo incremento, euadit. Gaudet Sabina humo (inquit Tragus) cui è parietibus lateres tusi admixti fuerint. Seritur surculo auulso terræq; immisso, & facile radicitur: processu temporis in uiridem & elegantem arborem, quæ tamen sese magis in latitudinem effundat, quàm in altum erigatur, euadens. Cum in arborem grandiusculam excreuerit, quotannis rotundas & nigras Iuniperiq; simillimas baccas producit. Hæc ille. Ego sæpe auulsos Sabinae ramulos frustra terræ mandauit. Felicius forte cresceret à matre sua deflexus in terram ramulus, donec apprehenderet, uel per uasculum terra plenum dependens traiectus: quod in Cornis arboribus aliqui faciunt. Idem Tragus lib. 1. cap. 189. Sauinae syluestris nomine pingit & describit herbulam dodrantalem, Sabine similem, sed in odorem, luteis in cacumine iulis: fructu nullo quam in arenosis altissimorum nemorum locis nasci scribit; eam etiam nondum uidisse memini, à Sabina tamen toto genere differre dixerim.

Saccharum (siue Sacchari canna, hoc est, Arundo) non in insulis Oceani occidentalis nascitur, sed in Hispania etiam (ni fallor) colitur. Celebris Francofordiæ ad Moenum pharmacopœus Iacobus Oppenheimer, iconem huius Cannæ qualis in horto suo nascitur ad me dedit: & plantam insuper uiuam (& alia quædam) mihi pollicitus est.

Sagapenum existimatum ferulacea herba, A. F. Rurpodius. Vidi & Auguste in horto præclari medici Adolphi Oconis.

Salicaria, O. Lysimachium puto intelligens. Id enim à Salicis foliorum similitudine Germani *Weyderich* nominant.

Saluica. Quære in Nardo Celtica.

Salices in hortorum marginibus & circa fossas aut riuos pangendæ sunt. Multa earum genera habemus, satua & syluestria. Syluestrium quæ minima est, Siler appellatur. Alia lato folio, *Salwyden* nostris: quæ etsi passim sponte nascatur, hortum tamen ornare potest, uere primo præsertim, cum floribus & iulis odoratis uisendam se præbet, &c. Salicem etiam è semine nasci, nec uere frugiperdam esse, ut Homerus putabat, obseruatum est ab Hier. Trago.

Saluia in nullis non hortis toto anno uiret, quanquam rugosis foliis. Frequentior est Latifolia: infrequentior, cui folia angustiora, & candidiora: nobilem cognominant nostris, uel auritam. Rarissima, inter illas media ferè, non aurita: odore cæteris minus grato, G. Saluiis nostræ mulierculæ accumulare solent ramenta de corticibus Piceæ coriariis usitata. Surculo feruntur. Viuacissima sunt in hortis: & quidem eò magis, quò minus florere permittuntur, sicut & alia pleræq;.

Saluia syluestris Monspelii dicta, à folii similitudine. Lege in Verbasco, Nostris Horminum, Saluiam syluestrem nominant. Saluiam montanam aliqui uocant Scordium alterum nostrum.

Sambach, uel Zambac. Vide Iasme.

Sambucus gaudet locis humidis & pinguibus. In hortis si colatur, diu uiuit: & in arborem satis crassam proceramq; euadit.

Rr iii

Sambucus montana acinis rubris tanquam in racemo digestis, G. In montibus & syluis quibusdam suæ spontis.

Sambucus palustris uel aquatica Germanice dicta (*Wasserholder* / *Schwels* *cken*) in sepibus, & alibi locis aquosis apud nos non rara: acinos rubros latiusculos in umbella profert. Sylvestri flos simplex est. Hortensi multiplex, magnus, albus, in globum coactus, pulcher aspectus, adeo ut fructus nullus sequatur. Aliqui *Schönballen*/id est, Globos formosos nuncupant. Audio etiam purpurei coloris Basileæ in hortis reperiri. Frutex est: & si curetur, arbuscula fit. Chamæplatanum appellantes hanc arbusculam non laudo. Abundat mihi sylvestre genus, nec deest hortensianum floribus globosis.

Sampuchum, Vide in *Amaraco*.

Sanguinea uirga Plinio dicta, Italis hodieque *Sanguis* uel *Sanguaro*, passim in sepibus nostris crescit. *Rot Kergercken*. Cornus fœmina secundum aliquos.

Sanguis draconis uulgo dicta herba, inter *Lapatha* est.

Sanguisorba, Vide *Pimpinella*.

Sanicula nomen uulgare apud recentiores chirurgos, Germanos præcipue: a sanandis uulneribus factum, herbis uariis attribuitur. Vna tamen præcipue & simpliciter sic appellatur, passim in syluis umbrosis & humidis obuia, folio quinis aut pluribus incisuris diuiso: quâ *Sanicula* maris nomine *Fuchsius* depinxit. Nos eo in genere fœminam aut differentiam ullam, nondum obseruauimus. Ea quidem quam *Fuchsius* *Saniculam* fœminâ cognominauit, genere toto differt. Vide *Astrantia nigra*. *Sanicula* simpliciter dicta in hortulo meo iam aliquot annos durat, & hyeme tota uiuet.

Sanicula alba, à radice alba, nam flos etiam superiori albus est, dicta: aliis *Helsica*, quod apud *Hellios* forè sua sponte oriatur: quamquam medicus quidam *Helsus* à me interrogatus per literas respondit, in *Hessia* se non reperire. Italis, ni fallor, *Dentaria*, quod in radice quidam ceu dentes appareant. *Cordus* hanc *Coralloides* uocasse uidetur à radice figura. Huius enim hoc nomine iconem, floribus tamè luteis, *Hier. Heroldus* ad me misit: alias uerò duas *Ioan. Kentmannus* communicauit, ab illa differentes. *Allatam* (inquit idem) hanc herbam ex *Apulia* accepit à *lo. Brunstero* *Norimbergensi* medico. Secundam etiam speciem passim in *Pannoniis* & *Marcomanis* uidi, radice alba, *Alabastris* modo splendente: unde aliqui *Aconitum pardalianches* nominare uoluerunt. Has qui in horto plantarit nondum inueni, dignas certè hortensi cura: & apparet ex crassis nodosisque radicibus uiuaces in hortis futuras. Germanis uulgaris est herba, quam *Saniculam* appellant, foliis *Pentaphylli* maioribus: radice candida, miro naturæ ipsius artificio nodulis ac laciniis quibusdam elaborata, &c. *Matthiolus* in capite de *Symphyro*.

Sanicula alpina à quibusdam dicitur *Arthriticæ* genus alpinum, de quo leges in *A. lacteis*, quorum folia punctis sanguineis asperguntur: crescit in syluis uel locis umbrosis editorum duntaxat montium. In hortum meum translata multis iam annis durauit: digna certè hortensi cura. Semina ei longe minima, & (ni fallor) inutilia. Ex iis enim sponte in horto meo aliquoties sparsis nihil unquam prouenit.

Sanicula lata, R. Nescio quænam herba.

Saponaria uulgo dicta, quæ locis arenosis & apricis prope flumina aut torrentes sponte crescit, roseo flore, odorato, G. albo, Ae. *Rurpodius*. Hanc *Dodonæus* *Alisma* interpretatur. Diu durat in hortis. Serpit enim suis radicibus.

Saponaria Italica, Ae.

Satureia, uulgo à medicis dicta, hortensis, condimentaria & æstiuæ herba, inter olera nascitur: & seminibus quibus abundat sparsis, restibili quotannis fœcunditate sese multiplicat. Hanc aliqui *Thymbra* hortensem uocant. Alia est *Thymbra agrestis*, quæ nascitur in prouincia & aliis regionibus calidis sua sponte: quam *Dodonæus* depingit: & à quibusdam in Germania inferiori satam in hortis uocari

uocari scribit: usum eius ad condimenta & remedia eundem esse qui Thymi uel Satureiae uulgo dictae. Vide Thymbra.

Satyrium uerum tria folia profert, ad terram infracta, Rumici aut Lilio similia, minora tamen, ac rubra. Colligitur in tractibus sabulosis & arboribus conditis: ex quibus nos olim frequenter eruiamus, ac maxime circiter Hierlem, eximium Hollandiae oppidum. Radix una est, bulbosa, mali magnitudine seu forma, fulua, intus ceu ouum candida, gustanti dulcis, & ori non ingrata, Bern. Dessenius. Videtur autem sentire de Bulbo syluestri illo, quem Fuchsius Hyacinthum minorem foeminam uocauit, cuius una species coeruleo, altera candido flore reperitur. Hunc enim Dodonaeus quoque in Annot. Tomi Iconum, Satyrium Triphyllum facit: Erythronium uero Satyrium, eiusdem generis herbam binis foliis, &c. Crescit utraq; species in syluis umbrosis, inquit Dodonaeus, ab herbarum uero studiosis colitur in hortis.

Satyrium Erythraicum, forte est Tulipa à Turcis dicta, flore rubro, Lili instar, foliis etiam Lili, radice bulbosa, &c. quam uidi Augustae in horto magnifici uirilo. Heinrichi Heruuarti: quanquam semen ferre negant. Eam descripsi pluribus, primo loco inter quinque illas plantas, quarum icones et descriptiones Val. Cordi libris De plantis subieci.

Satyrii species an Orchis herbae sit, quae reperitur apud nos bulbo singulari semper, similis alioqui ceteris, sed minor, foliis binis, considerandum. Monorchin dixeris.

Satyrium basilicum alpinum, flore ex purpura nigro, tanquam adusto, (unde Brendli nomen impositum: odore omnium suauissimo, ceu styrcis: quem etiam aridus, & in pollinem tritus, diutissime retinet, Chr. Piperinus. Nos etiam aliquando plantauimus Laufannae: sed uix ultra annum puto in hortis durare, & semen inutile esse: sicut reliqua Orchis genera.

Saxifraga alba, C. G. Alba cognominatur à colore florum. Semen ei nullum, aut potius inutile. Radix ex pluribus granis ruffis conglobatur, quorum singula seminum loco sunt ab iis quidem granata cognominare licebit. In hortis non diu durat. Nascitur in pratis quibusdam siccis, asperis, macris, circa Scaphusiam, Brugam, Basileam, & alibi: Maio praesertim quaerenda. Ceteris enim mensibus aestiuis non apparet. Hyeme uiuet, si bene meminit: et si quidam usque ad annum sequentem latere scribit.

Saxifraga aurea, foliis superiori similis fere, unde & nomen ei factum: à similitudine foliorum dico, non à uiribus iisdem. De his enim nondum constat, sui omnino generis, flosculis luteis, C. Rarissima apud nos est: & cum allatam aliquando plantassem, paulo post perit. Sponte in humidis & aquaticis locis crescit.

Saxifraga hircina, uel simpliciter Saxifraga, maior & minor, floribus albis in umbellis, G. Radix fere hircum olet, acris admodum. Minor siccis, asperis & saxosis locis, in collibus & circa muros apud nos abundat. Maior uero locis humidioribus & pinguibus. Huius (maioris dico) etiam in alpinis species una flore rubente inuenitur. Vide in Pimpinella.

Saxifraga lutea, à colore florum uel radices, G. Thalictrum Dioscoridis aliqui faciunt. Galli circa Monspelium Saxifragam simpliciter nominant: nostra enim hircina uix reperitur illis. Inferiores Germani Pigamum (quasi Rutam Graeco nomine: est enim Rutae pratensis similis tum foliis fere, tum floribus, qui similiter è multis tantum apicibus constant, sed colore sunt luteo: ut cognata uideatur.) Alii Rhabarbarum spurium, quod siue foliis siue radicibus quoquo modo sumptis uentrem soluat. Alii Barbam caprae minorem: (quae à maiore, de qua supra diximus) toto genere differt: quod multis conferatque floribus, quae apicibus tantum ceu pilis constant, spectabilis sit. Dodonaeus huic Barbae caprinae suae minori aliam herbam similem in eodem capite coniungit ac pingit: minorem, solo falso prope mare nascentem: quam Hypocoum esse coniicit: mihi non uidetur. Saxifraga lutea illa, quam Heilblat Germani praesertim Saxones uocant, nascitur apud nos in ripis alicubi prope lacum. Memini in maceria ripae inuenisse, & in montibus inter lapides. In horto plantata durauit aliquandiu, sed maligne floruit, & radices luteas non in altum extendit, sed Sisa-

ri in star contraxit, substantia fungosa, pluribus simul cōplicitis. Huius species duæ, maior & minor, sunt in hortis, A. & Ae.

Saxifraga montana, siliquas gerit, radice alba, nodosa, quibusdam ceu squamis extantibus, G. Crescit in Albio monte, non procul urbe nostra, solo pingui species una quinis per singulos pediculos foliis. Folia singula ceu Fraxini sunt. Flores purpurei, tanquam Leucii, maiores, foliis quaternis conditi. Reperi & aliam speciem circa sylvas non procul Scaphusia, septenis in uno pediculo foliis, floribus candidis. Herbae sunt acres: Raphani ferè acrimonia. Vtraq; in hortulo meo per biennium fortè durauit, nō sata, sed translata ē montibus: ubi una radix diurnior mihi uidetur, & ipsa sese propagare. Circa Sabaudiam Pulmonaria uocatur: ab Italis quibusdam puto Dentaria, à squamis denticulatis in radice: sicut & Sanicula alba superius dicta.

Sc.

Scabiosa uulgò dicta trium generum: duæ minores, una scabra hirsutaq; altera laeuis, in pratis siccoribus & collibus apud nos copiose proueniunt. Tertia maior, quam ab ouibus aliqui denominant, (ut Dodonæus, qui hanc magnitudine mediam facit: hirsutam uerò iam dictam, in hoc genere maximam: sed in nostra regione secus se habet, cuius folia non diuiduntur, locis editioribus, pinguibus, & humidis gaudet. Omnes in hortis bene ac diu durant, lacea nigra diuersi omnino generis est, contra quam aliqui putarunt.

Scammoniae frutex, O nobilissimus & eruditus ciuis Patauinus (ut audio) Prius nomine, Scammoniam ē Syria allatam in horto habuit, herbā Conuoluulo cœruleo (quem granum Nil appellant) persimilem: floribus albicantibus, (illis etiam, ni fallor, campanae seu calathi effigie,) qui priusquam aperiuntur, rubicundi apparent: semine etiam simili. Perit ei, nescio an secundo tertioque anno, siue quod natura non diutius dureret forte, siue aliam ob causam. Primæ quidem hyemis iniurias fortiter pertulit: semina etiam an protulerit ignoro. Monspelii aliam quandam Scammoniam ostendunt floribus exiguis, &c.

Scandix est in Pectine Veneris.

Scilla uel Squilla, A. R. Rurpodio Francofordiæ, etiam florem protulit. Radix mihi olim in horto plantata, folia quidem produxit: sed non apprehendit, nec ultra tres menses durauit. Scilla uera, C. Veræ quidem epitheton ab eo additum puto, propter Pancratium, quod aliqui pro Scilla substituant.

Scylla Epimenidea cognomine, crescit (ni fallor) in horto Patauino, seminibus & Creta accersitis.

Scolymus. Vide Carduus hortensis.

Scopa regia. Quære Pulmonaria Gallica.

Scoparia uulgò dicta, Italis Beluidere uulgò (quod nomen etiam aliis herbis attribui uideo.) Vide supra Belle uidere.

Scordium uerum. O. R. G. K. A. Ae. Verum dicimus, quoniam superiore seculo cum hoc ignorarent medici & pharmacopola, Allium quoddam sylvestre substituebant. Sponte in pratis humidis & palustribus nascitur circa Lemanum lacum non procul Laufanna, circa Norimbergam, & alibi, non multis tamen locis. Hyemem in hortis facile fert: & coliculis per terram reptantibus propagatur, tum sponte, tum si quis inflexos terra obruat, eminente tantum extremitate: sed quoniam non profunde hæret, resoluta terra quæ gelu astricta erat, facile eleuatur & perit, ni si terra operias.

Scordium maius Plinii, uel Scordotis, quod Saluiae sylvestris nomine pinxit Tragus lib. 1. cap. 4. de Nepeta inscripto. Dodonæus Sphacelon appellat: aliqui Ambrosianam: Ruellius Polemonium facit. Nascitur locis montosis, macris, asperis & apricis: ut in monte Albio nostro, & in colle imminente oppido Eglisouia. Translatum in hortos non diu durat. Scordio planè cognata est herba, sapore, uiribus, & odore fere: meo quidem iudicio ad remedia Scordio præferenda, quod odor

re

bitur. **Hindclouff** quidam Germani uocitant, Aë. G.

Scorpioides Matthioli, A.D.G.C. filiquis instar scorpii caudæ articulatis & in summo reflexis. Vide *Lunaria* Burissa.

Scorpiurus, K. Videtur autē Scorpoides intelligere. Veteres Heliotropiū etiā Scorpiurū uocabant. Tragus Dofcor. Theoph. et Plinio etiā Scorpius: pusillus frutex, aculeatus, in maritimis nascens, sine foliis, &c. uiris doctis in Italia non est incognitus. Eius semen ab amico expecto, qui id ab Aloisio Anguillara (doctissimo diligentissimoq; nouarum stirpium indagatore & nomenclatore) accepit, ac simul alia quedam.

Se.

Sebesten: Vide Myxus.
Secacul. R. O. Polygonatum puto intelligentes.

Sedum seu Semperuium uulgarē maius (quod eruditi quidam Cotyledonis pos-
us quā Sedī specie esse docent) quanquam super tectis & dium & muris antiquis
afici gaudeat, crescit tamen in horto etiam facili. Semperuium radice nulla uiuit,
femen fert, & sibi ipsum radix est, Scaliger: non quidem radicem ei deesse sentiens,

ut consilio: sed quod ea sit uiracitate, ut quanquam non nitatur radice nec apprehenderit, foliis tamen & caule crescat, uel iacens super solo aut tegulis. Dioscorides Stratioten in aquis Semperuiuo similem, sine radice uiuere tradit.

Sedum maius uerum, è Græcia nuper allatum, audio iam aliquos in Italia habere: hyeme si rigetur, perire. Huius iconem à Io. Kentmanno accepi: qui eam sibi uisam scribit Venetiis Murhani in horto clarissimi Veneti Hier. Corneli: qui ex Alexandria hanc plantam, ut & multas alias raras ex Candia & Cypro, cuius insulæ præfectus fuerat, afferendas curauit.

Sedum minus Dioscoridis, foliis in mucronem exeuntibus, in Germania non mihi uidere: ut neq; Dodonæus, in hortis tantum apud inferiores Germanos uideri tradens, R. In Sabaudia & Gallia uidere memini. Nascitur Dioscoridi in petris, parietinis, maceris & scrobibus opacis.

Sedum minus alterum (Crassula minor quorundam) uulgare nobis, passim ueteres muros & moenia implet, foliis obtusis, floribus albis.

Sedum tertium Dioscoridi, pusillis & crassioribus foliis, flosculis luteis, succo acri & erodente. Illecebra priuatim dictum, prouenit copiose in faxis, muris & locis arenosis apud nos.

Sedum minimum, foliolis breuissimis, latiusculis, acinosis, obtusis, subacidis: binis, alternante positum: flosculis candidis intus, foris roseis. Huius species una maior & candidior est, altera minor & rubicundior, ceu mas & femina, G.

Sedorum in faxis montium (aliqui Phylla nominant) uarie sunt species, magnitudine, figura, coloribus, floribus, &c. inter se differentes. Sunt quædam minime, & flosculis tum figura tum colore pulcherrimis egregiæ: quæ in hortis parum durant, ni fallor. Aliæ maiusculæ, ad Sedum maius uulgare nostrum accedunt, et in hortis diutius durant, quamuis in solum aræ defixæ. Horum species una foliis est minoribus, albicantibus & ferratis. Alia similibus quidem foliis, sed margine piloso, non serrato. Floribus quidem multum differunt. Minoris & gustu dilutioris flores pauci sunt, candidi, punctis sanguineis, minimis, aspersis, nullo penè caule, ut nunc mihi nascuntur: aliæ enim in caule mediocri mihi natos puto. Maioris & acidioris caulis pedalis, flosculis partim candidis, partim purpureis refertus, & unum in latus struthionis pennæ instar inclinans. Vtrumq; hoc anno mihi floruit. Folia marginibus & asperis branchias piscium referunt. Non laudo qui Phylla nominant.

Semperuiuum. Vide Sedum.

Sena, C. Senæ folliculi (inquit Matthiolus) è ramusculis prominent, tenui pediculo appensis: quo fit, ut maturescences, paruo uentorum flatu facile decutiantur. Planta est frigoris impatiens: ob idq; feri uult Maio, nec ultra autumnum perdurat. Siquidem (ut pluries expertus sum) prius sata, facile frigore deperditur: serius uero hyemem similiter non tolerat. Sic ille. Consilio autem eum de Sena communi et uiliori sentire: qua minor & efficacior est Alexandrina, Europe hortis nescio an hactenus cognita.

Senecio, Erigeron, nusquam non obuius est, circa oppida præsertim & loca culta. Senecio fœtidus appellari potest ab odore herba, maior, pinguioribus foliis, luteo & similiter pappescente flore, &c. D.

Septem fratres. O. Nescio quæ herba.

Seris, idem quod Intybum supra dictum. Verrucaria Seridis species, C. Aliqua Verrucariam uulgò dictam, interpretantur Seridis speciem: alii rectius Heliotropium minus.

Serpillum passim locis siccis, asperis & apricis luxuriat: & pro diuersitate locorum ac coeli odorem mutat ita ut alicubi, Theophrasto teste, Thymum planè redeat. Serebatur olim in hortis, idq; surculo non semine, ut idem scribit. Inuenimus et quod citrum oleret.

Sesamoides, uel Elleborine, (alia à Consilagine), K. Vide Elleborine.

Sesamoides alterutrum quidam esse suspicantur herbam Ellebori nigri radibus uiribusq; foliis Abrotaniferè. Vide in Elleboro nigro.

Sesamum

mentur. nominatur &c Plantatum mihi aliquan

reconuenit. Non desunt qui pro Ligustico accipiant. Videlicet prius L.

mina hoc uere frustra seui.

Ionii pro Sefeli Cretico exhibet, quod non probo.

re Zuuinggero prouenerunt.

asin collibus apricis apud nos proueniens ferulacea herba, Apio montano (de quo

coliculis teneris, gultu calfaciente, non grato, et immo
 1. bellote pulchre adhuc uiret: sed nondum caulescit.

petrosi nasci dicat.

nam quandam pingit cuius in commentariis ne uerbo quidem meminit.

bam f. Barbaræ vulgò dictam pro Sideritide hac accipit, Dodonæus negat. Ss ii

Sigillum Salomonis, Polygonaton ueterum.

Siliqua arbor, Græcis Ceratonia, Arabicis scriptoribus Carube, C. Rurpodius. Vidi et apud ciuem quendam nostrum, e semine ortam dodrantalem hanc plantam: quæ per hyemem ei interit. Germani s. Iohannis panem uocant, Alia est quam Belionius Siliquam nominat: de qua lege supra in Azadaracht.

Siliqua Inda. Vide Cassia.

Silybus. Lege Cardopatum.

Sinapi in agris potius quam hortis serendum est. Tria Sinapis genera, inquit Car. Stephanus: syluestris, ubiq; sponte nascens: exilius, quod uulgus (Gallicum) a minori proceritate Sanelam uocat: alia numerosioribus altioribusq; ramulis brachiantur, Rapo similia: sed folio minore & asperiore. Verum semen euariat in uno: rufescit in altero candicat.

Sison, C. Dodonæi nimirum: quod is ab Herbariis scribit paruū Amani uocari. Sifer uel Sifarum, *Girgele*.

Sisymbrium agreste aquaticum, passim in aquaticis exilit. In hortulum meum, qui siccior est, aliquoties translatus, non diu durauit.

Sisymbrium hortense prædicto simile. Seritur sureulo potius quam semine, ut Theophrastus tradit. Vide in Mentha.

Sisymbrium alterum Dioscoridis, Nasturtium aquaticum aliquibus, uulgo *Bummenteschich*: in fontibus & riuis abundat, & per hyemem pro acetariis legitur: sicut & alterum Nasturtii aquatici genus, siccius duriusq; & acrius: quod *Steinkeschich* uocamus.

Sium etiam, herba odorata, in aquis nascitur, hortis non idoneum. Iuxta Basileam hoc repperite memini in proximo. A nostra urbe longius nascitur, inter Disbedorphan & Vuangam pagos. Sium non odoratum recentiores quidam uocarunt Anagallidem uel Portulacam aquaticam ab aliis dictam, *Bachbungelen*: cui nihil cum Sio commune. Nascitur in aquis & palustribus ubiq;.

Sm.

Smilax hortensis, O. G. Alia species, O. Smilaces, K. *Welschbonen*. Vide supra in Phasiolo.

Smilax læuis Fuchsio & Matth. Conuoluulus Plinii est: de quo supra diximus.

Smilax aspera in Germania non reperitur, nisi lata in hortis quorundam diligentiorum, ut Dodonæus scribit. Nascitur autem tantum in calidioribus regionibus, ut puto: asperis & petrosis locis: circa Monspelium & alibi. Plinius quidem tradit nasci in aquaticis, incultis, humilibus & umbrosis.

Smyrniū uerum, K. & Basileæ in horto Zuvinggeri medici. Veri semina ego quoq; uidi, nigra (si bene memini) rotunda, & planè odore Myrrhe. Satum appareo re puto in horto Patauino. Matthioli quidem Smyrniū uocat, Olus atrum aliis dictum: Tragus Alstrantiam nostram.

So.

Solanorum (indocti Solatra uocant) permulta sunt genera, quamuis a Dioscoride quatuor tantum memorata. Omnibus acini sunt, utq; seminibus albis pleni. Pleraq; aliquam in foliis & floribus similitudinem habent: odore graui, ut refrigerante & humectante prædita.

Solanum hortense quoddam olim erat, quod nunc etiam circa hortos ferè nascitur, circa rudera acuias locis humilibus: sed coli desiit, acinis nigris. *Nachtschat*.

Solanum rubrum, Ae. Luteum, Rurpodius. Eadem cum uulgaris, cui acinos nigros esse diximus, nisi colore differrent.

Solanum uesticarium in Halicaccabo est. Halicaccabus peregrinus a quibusdam dictus, cum acinis careat, &c. è Solanorum genere non est.

Solanum furiosum, R. Solanum manicum Bern. Lessenius scribit se uidisse Græcisingæ in horto Cornelii Bebingii.

Solanum somniferum duplex, Ae.

Solanum

Solanum frutescens, C. Fruticosum, baccis (acinis) rubris, foliis amygdali, K. Idem hoc puto, quod Itali quidam pro Amomo Plinii accipiunt, & Indicum cognominant: mihi etiam est semine ex Italia misso ortum, iam altera aestate duos doctores æquans nondum ostendit florem, hyeme sub tecto seruatum. Amicus quidam in Italia sesquicubitale uisum sibi ait. Quidam Strychnodendri nomen finxerunt. Vide in Amomo.

Solanum peregrinum, & aliud ex Prouincia, Rurpodius: qui peregrini nomine Solanum fruticosum, aut Halicacabum peregrinum uidetur intelligere.

Solani genus syluaticum, quod nostri *Schlaff beer* & *Dollwurz* uocant, G. baccas aut potius poma Cerasorum instar, coloris est cœruleo nigricantis fert. Italici Bella donna dicta: sponte apud nos circa syluas alibi locis incultis abundat. Aliqui Morion esse suspicantur, uel potius Mandragorâ Theoph. Radice est crassa, uiuax proculdubio in hortis futura: sed ne pueri fructus sua specie inuidentes deuoret, uitæ periculo, ut in aliis Solanis, ita hoc precipue, cauendū. Quidam mortale cognominant.

Solanum somniferum, O. Non aliud opinor à syluatico iam dicto. Matthioli tres somniferi icones proponit: primam legitimi Dioscor. somniferi, ut apparet: tertiam somniferi nostri, Belle donne nomine Venetis usitato: Vulgò (inquit) Hei ba rii Solatrum maius uocat: secundam, nostro quidem similis, sed longioribus foliis, etc. Cuius in commentariis ne uerbo quidem meminit: iconi Solatrum somniferum inferibit: neque de prima aliud, nisi quod Pisis à Luca Ghino missam accepit. Dioscorides in saxis nasci tradit non procul à mari. Nostrium quidem legitimi, sicut & Mandragoræ, omnibus sui partibus succedaneum esse posse mihi uidetur.

Solanum quoddam fruticosum, plurimum apud nos nascitur locis dilutis, & æquam plerumque subesse indicat, sæpibus aut fruticibus aliis innitens, floribus Solanici communis, cœruleis, luteo per medium apice: acinis rubris, &c. G. R. Aquas amat: & ramulus in aquam impositus, breui radículas emittit, instar Salicis. In terra citam putarim surculum defixum facile crescere. Inuenitur & albo flore, sed rarer. Antegit & topiario operi conueniret, nisi grauior esset fruticis odor. Florum quidem & acinorum species non uulgaris est. Solatrum mortale quidam appellant, mihi inter Solani genera minime noxium uidetur. Alii rectius perpetuum, quoniam caules in eo perennant: nam folia amittit hyeme. Aliqui Amaro dulcem: quod si quis ramulus aut corticem mandat, primo ingratus uideatur gustu, sed quò diutius manditur eò insignior eius dulcedo se prodit: unde nomen ei factum à nostris *Je tenger je lieber*.

Solanum tetraphyllum, G. Sic nominò genus illud Solani quod foliis ut plurimum quaternis, rarissime quinis aut pluribus, in syluis nostris frequens est. Quidam non recte pro Aconito primo accipiunt. Refrigerat certe insigniter. Aconitis uero omni bus uis est septica, erodens, feruida.

Solanum pomiferum, Malum insanum uulgò dictum. Vide supra in M.

Solani pomiferi genus aliud. Vide Pomum aureum.

Solani pomiferi genus tertium, si libet, appelletur, quod uulgò Pomum spinosum uocant, &c. Lege in Nuce Methel.

Soldanella. Quare in Brassica marina.

Sonchus asper & lauis, uisitur in hortis, (sua sponte nimirum) campis et uiridis, Matthiolo teste. Cicerbita Italici, nostris *Nasentöl* / *Gans distel*. Lactucæ syluestris quædam species.

Sonchis cognatum uidetur etiam olus syluestre illud, quod nostri à lacte *Wilderer* uocant: Dodonæus Lapsanam facit.

Sonchus arborecens Dioscoridis. Vide in Lactucis syluestribus: harum quædam procerissima in syluis humidis nascitur, puniceo flore: & alia luteo, circa moenia, humidis locis, &c.

Sorbus, Ac. Reperitur apud nos in montibus. Sorba, alia rotunda sunt ut mala, quæ odore & suauitate præcellunt: alia turbinata ut Pira: alia ouata, ut mala quædam, obnoxia Acori, Germanis *Speierling*. Generosissima quibus circa pedes

culos tenera folia, Sorbos & Cornos in mitiores arbores sui generis inferi posse qui-
dam crediderunt. Item in Pyro, Pomo, & Cotonea: sed id nunquam uerum esse aut
posse iure fieri potui comprehendere. Rectius crediderim inferi posse aut debere in
Oxyacantha, quemadmodum & Mespila.

Sorbus torminalis, K. Apud nos syluestris abundat, locis montanis: folio fere
Platani, minore. *Aressel* Trago. Cordo Crataegus Theoph.

Sorbus alpina, uel pilosa Italis dicta, Gallis *Tralier*: nostris *Elzbitel/Thelsbir-
le/Onser strawen birle*: (aliquibus *Wälbaum*/quod nomen etiam alii arbori attri-
buitur.) Ficui Idææ cognata, ut conicio.

Sorbi tres species, C. Sorbis etiam cognata uidetur, si fructum respicias (nam fo-
liis superiores etiam plurimum differunt) Diospyros in D litera.

Sorbus torminalis Plinii, Gallis *Alisier*, G.

Sorgum uulgò dictum, O. Seritur à quibusdam in hortis, apud nos quoque cum
propter raritatem, tum quòd coma scoparum usum præbeat. Sunt qui *Midium* In-
dicum aut Saraccenicum uocent: alii *Panico* potius cognatum putant. *Maizum* ali-
qui uocant, ut Cardanus, Indico uocabulo.

Sp.

Spartus uel Spartiſſi, O. A. C. Rurpodius. Spartus mihi prognatus (inquit A. in
epistola ad me) uerus esse uidetur: habet enim omnino caulem sine foliis. Vide Ge-
nista.

Spartus Hispanicus, Ae. Hunc Theophrasto incognitum fuisse aiunt: carere eum
foliis, flore, semine: contexi ex eo sportulas Ficuum.

Spatula foetida, O. K. A. Rurpodius. Vu. Ae. C. Huius semē saepe frustra hortu
lo nostro commissum. Aretius Bernæ prouenisse sibi scribit: sed nondum perfecit
se semen. Eruditi Xyrin appellant. Spatula foetida, Spatula media, Spatula mini-
ma, Schorndorfii in horto Io. Schmidlappii mercatoris.

Sphondylium seu Spondylium nascitur in pratis, pinguisbus præsertim uel me-
diocriter humidis, abundè apud nos: maius quidem in montibus, Panacis Heraclii
gemulum: quidam non recte pro Brancha ursina accipiunt.

Spica Italica odorata, K. Nescio an Nardum Celticam, (quæ tamen alibi in horti
eius catalogo nominatur,) intelligens.

Spina ceruina uulgò dicta Italis, *Arüßbeere*, G. Sponte apud nos in sepibus a-
bundat, Tragus & Dodonæus inter Rhamni species ponunt. Aliqui solutuam co-
gnominant.

Spina citrina uel lutea, à floris colore, Vu. D. Sponte nascitur, ni fallor, circa Mō-
spelium, & aduersus morbum regium cōmendatur, acanacei generis herba æstiuæ.

Spina solstitialis circa Monspelium ubi sponte nascitur, D. Herba est bicubita-
lis, æstiuæ, albicans, lanuginosa: foliis angustis, oblongis, amaris. Caules rigidiuscu-
li sunt, alba medulla referti. Floret solstitio: flos flauus in pappos abit, supra calycem
quæ multis, longis, exilibus, pallidisq; aculeis riger: nec alibi aculeos habet: cognata
fortè Stellariæ à quibusdam dictæ, (quam Cardui stellati nomine Dodonæus ex-
hibuit,) flore etiam simili præterquam colore. Cum eodem in amaritudine cōuenit,
& ni fallor, remedio quoque. Mirè enim commendatur ad mouendas urinas & calcu-
los educendos succus huius herbæ, aut aqua destillata, aut contrita pollen: ut ex cla-
rissimo medico Argentinenſi Didymo Obrechtio primùm cognoui: qui cum in hor-
to suo longè instructissimo hanc herbam alat. Carduus uerò stellatus ubiq; circa ur-
bem Argentinam abundet, sitne aliqua inter has stirpes, tanquam duarum unius ge-
neris specierum cognatio, melius iudicabit. Intuba & solstitiales spinas, è pratis uerè
euelli præcipit Columella lib. 2. cap. 18.

Spinaceum olus uulgò dictum, *Vinetsch*, in omnibus hortis apud nos seritur,
cum alio tempore, tum sub hyemem ante Septembris medium, & per hyemem de-
metitur. Spinachia manifestum habet sexum, Scaliger. Conicio autem marem ab
eo intelligi illum, cuius semē spinosum est: foeminam, sine spinis. Aliqui Spanaciam
nominant.

nominant, tanquā ex recentioribus Grecis sumpto nomine, ut et Seutlomalachum, quasi dicas maluceam Betam, inquit Ruellius, nimirum quod figura & denticulato seminis habitu Betam, & mollitia Maluam mentiretur. Arabes Hispanicum o-lus appellauere. Sic ille. Sed fortē Seutlolphum potius, hoc est, mediæ inter Betam ac Rumicem naturæ, quā Seutlomalachum, appellari meretur.

Spondylium. Lege Sphondylium.

Squilla. Vide Scylla.

St.

Stachys duplex, Ac. Stachys Cordi, O.K.

Staphisagria, K. O. G. Vu. C. In Germania nullibi sponte (quod sciam) nascitur, nisi fata: amat umbrosa loca.

Staphylo dendron Plinii, G. K. C. **Pimpernüsse**. Arbor trans alpes, inquit Plinius, simillima Aceri, alba in materia, fert siliquas, & in iis nucleos sapore nucis A-uellanae. Itali quidam, ut Romæ, uocant Sambucū ualidam. Crescit apud nos sponte in sepibus, quamuis rara: & uidetur locum humidum amare. Frequentior, ut audio, circa Arouiam.

Stella herba à quibusdā Italis uocatur, quæ à nostris **Sinnaw** à quibusdam **Pes Leonis** uel **Achimilla**: Matthiolo **Stellaria**. (Is enim **Sellam** herbam uulgò alicubi **Coronopodem** uocari ait.) Crescit nobis affatim in syluis, et montium pratis: in hortos translata, ad duos fortē annos durat.

Stœbe Dioscoridis, O. De Scabiosa fortē sentiens. Alia est Theophrasti.

Stœchas uel Stychas (simpliciter, uel Arabica cognomine,) O. C. G. Vu. **Rurpodius**: sed in hortulo nostro ad maturitatem non peruenit. Circa Monspelium in siccis & apricis sponte nascitur.

Stœchas citrina uulgò dicta, Vu. Circa Monspelium in muris & petrosis, si benè memini, abundat. Ageraton aliqui interpretantur. Sabulosa, aspera aridaq; terra, pratisq; accampis soli maxime expositis, præsertim uerò ad tractum Rheni (hinc **Rheinblumen** appellant) inter Spiram & Vuormaciam, nec non circa Hagenuiam, Nouiburgum, & in Vuasgoia affatim luxuriat, Tragus.

Stramonia Lege Nux Methel.

Stratiotes est in Millefolio, Fluuiatilis Stratiotes, quoniam & in fluuiis & radice nulla crescit, nihil ad hortum.

Struthium quibusdam dictum. Vide in Lutea.

Stychnodendrum. Vide Solanum fruticescens.

Styracem arborem, ad quatuor cubitos enatam, si benè memini, idèq; è semine, **ni fallor**, anno superiore uidi Augustæ in horto doctissimi medici Adolphi Oconis, A. F. qui nuper etiam de ea ad me scripsit, his uerbis: Styracem meam quodammodo bifurcatam in duas partes radicitus diuisi, & ex una arbuscula duas feci, satis insignes. Supererat mihi ex dissectione radix, quam uidendam ad te mitto, ut (si uideatur) terræ committas, quamuis ut pullulet, difficile fore arbitror. Atq; utinam ex ea prouenire posset arbor meæ non dissimilis, quæ me præ cæteris mirifice delectat, tū quod sciam nullam eius generis reperiri in Germania nostra, præsertim finitimis huic nostræ ciuitati regionibus: tum quia foliorum & florum etiam pulchritudo speciosa uidetur. De fructu tamen in hisce partibus despero propemodum, cum talis apud nos aeris clementia non sit, quæ fructus eiusmodi ad maturitatem perducere possit. Sic ille. Agitur autem nunc tertius mensis ex quo radicem illam, cum exigua stipitis resecti parte plantaui: quæ nondum quidem pullulauit, cortice tamen adhuc uiuet & spem aliquam facit. Venetiis olim in horto monasterii cuiusdam, memini me iustæ magnitudinis hanc arborem uidisse.

Sy.

Sycomorus ueterum, Ficus Pharaonis uulgò in Syria, in Europa (opinor) nō apparet. Morus Aegyptia Theophrasto, aliis Ficus Aegyptia: quod nomen etiam **Cæroniæ** arbori attribuitur, sed improprie, cum in Aegypto nō proueniat. Morus Aeg-

Ss iiii

CON. GESNERI

gyptia peregrinari omnino nequit, Theophrastus hist. 4. 2. Recentiores Sycomori nomen arboribus diuersis tribuunt, alii alius. Galli sic uocant Arborem Iudæ, de qua dixi supra in A. Itali, præsertim monachi, Azadaracht Auicennæ, de qua itidem supra dictum est. Pet. Crescentiensis arbusculam paruulam, similem sanguinea uirgæ, &c. Ruellius Sycomorum appellauit Acer montanum, quod Allobroges uocant Plane, ut uir quidam eruditus ad me scripsit.

Ta.

Tanacetum, G. & in plerisque hortis. Nasceitur & sponte, non quidem apud nos: sed circa Argentinam copiose, & alibi, præsertim in aquarum ripis & uinearum aggregibus.

Tanus. Vide Vitis nigra.

Tarchon Auicennæ & Symeonis Sethi: uulgo eruditi Draconem uocant, hortensis uel acetarii cognomine: foliis Hyssopi, sapore Pyrethri, &c. Hoc alunt Curtius, (qui & mihi communicauit) & K. Aliqui Drabam faciunt: quod non laudo. Sub hyemem fimo equino alioue tegi debet: sic & contra hyemem muniatur, & uere citius copiosiusque erumpet: tum quidem precipue placet in acetariis, siue per se, siue aliis potius condimenti gratia additum: nam & salis & acetii ferè saporem repræsentat. Coliculi cum digitales fuerint uere, propagentur per terram, cacumine tantum eminente: sic breui multiplicantur. Radix una, discerpi & per diuersas partes plantari potest. Floret hoc quidem, sed semen nullum aut inutile profert. Linum factum in Cepe secto, eam ex se progignere plantam, quam uulgo Draconem uocat, Thuscis olitoribus persuasum est. Cuspidei ei figura folium, serratum ut Beonica, sed molliter & obscure. Surculi uiminacei, floscellus candidus. Saporis acrimonia commendationem attulit ad usum acetariorum. Radix penè nulla, eorum arguit temeritatem, qui Pyrethrum fecere nomen. At mihi non semel Lini semen cum ira, uti iusserant, seuissem. Draco nullus extitit, Scaliger in li. . Aristotelis De plantis. Ego quoque me semel atque iterum frustra expertum memini. Sed Tarcho nostro hortensi folium minime serratum est: syluestri modicè.

Tarchon aquaticum Monspelii Serpentina, fruticosa, uel potius ramosa herba, G. Vide Pyrethro cognata.

Taxus arbor crescit in montibus nostris, specie quadam Abietis, latioribus foliis, multo humilior: acinis rubris, paruis, umbilicatis, glutinoso humore plenis, &c. O. Facile crescit arbuscula parua transplantata, sicut etiam Abies & Picea. Durare ultra seculum putarim: nam & materia huius arboris in terra maxime omnium durat. Arborea duæ in orto uicini mei eadem proceritate uigent, qua me puero erant, iam ferè per quadraginta annos. Fructificant raro, non singulis annis, nescio an similiter in syluis.

Te.

Telephium Anacamperos nostra. Vide supra in A. Sed etiam genus minus et acre, Telephium olim uocabant. Eruditi quidam hodie pro Telephio Dioscoridis accipiunt herbam, quam alii Cerinthen existimant. Vide supra in Cynoglossa montana & Cochlearia.

Terebinthus in aliquibus Italiæ hortis reperitur, ut Venetiis in Franciscano coenobio. In Germania nusquam uel sponte nascitur: uel in ullo (quod sciam) orto reperitur. Circa Monspelium abundat: & in montibus prope Veronam, & Tridenti ad eum montem in quo arx Episcopi est, & alibi in Italia.

Testiculus uel Orchis herba, species quam plurimas complectitur: quas enumerandi locus hic non est. Nasceitur in pratis, collibus, syluis, montibus, umbrosis, apricis, siccis, humidis, aliæ atque aliæ species. Radices omnium è gemino quasi bulbo constant: qui in aliquibus palmatus seu manus instar & digitatus est. Vide supra in Satyria. Reperitur apud nos species una, minor, bulbo singulari. In hortos translata uix ultra annum mihi durarunt, aut duos ad summum.

Teucrium uerum, R. R. Ac. C. Id nimirum quod Fuchsius, Matthiolus, & Dodonæus

donæus pingunt. Sponte sua in Germania nusquam provenit, quod sciam, inquit Fuchsius: satum tamen copiose nascitur. Marthiolus pluribus in locis reperiri ait, Triflagini rã simile, ut sepe ex tempore uisa oculos decipiat, &c. Nascitur hic frutex Basileæ etiam Zuuinggero, seminibus ex Italia allatis: & mihi quoq; etiam nuper exorta est una eius planta. Tragus pro Teucrio pingit Veronicam uulgò dictam *Erenbyss*: quæ herba frequens circa sylvas nostras (duorum generum) in nostro etiam hortulo uiret.

Thalictrum quorundam. Vide in Saxifraga lutea. Thalictrum Dodonæi est inter Nasturtia syluestria superius.

Thanus. Vide in Egano.

Thapsia, Rurpodius. Vera nascitur in Gargano Apuliae monte: semine, ni fallor, inter ferulacea latissimo. Eius radice aliqui abutuntur pro Turbit: & a quibusdam uocatur Turbit montis Gargani. Hæc mihi etiam olim è semine provenit, sed hyeme prima (si bene meminì) perijt.

Thlaspi uerum, O. G. C. Bursa pastoris ferè similis est herba, æstiuæ, acris. Bursa pastoris Thlaspi fatuum dixeris. Hæc nobis passim abundat sponte: illud in Germania non nisi satum, quod sciam.

Thlaspi alterum Dioscoridis fuerit fortè Raphanus maior uel marinus cognominatus, de quo prædiximus.

Thlaspi Creticum, ut quidam uocant, Dodonæus Drabam facit, C. G. Floribus subcœruleis. Diu floret, ad flores propensa herba, æstiuæ. Cum in summo semina maturat, ab imo saepe floret iam sub hyemem: & partibus summis detractis, ab imo regerminat floretq;. Semina è Creta primùm nostra memoria aduecta puto. Acrimonia simul & amaritudine excellit.

Thlaspi montanum uel Lunare. Vide Lunaria Græca.

Thymbræ uera, R. K. C. Rurpodius. Vide in Satureia.

Thymelæa uera, K. R. quæ coccum Gnidium fert.

Thymus uulgaris, R. O. G. K. Non bene durat apud nos. Hyeme seruandus in uasis domi. Basileæ & alibi melius. Semen eius (teste Plinio) deprehendi non potest. Flore satum nascitur. Translatum ex Attica Thymum, & uix flore satum prouenit alibi, eodem teste: sed non durauit, assiatum maris requirens: quæ antiqua opinio erat de omni Thymo, ideoq; non nasci in Arcadia. Thymis quidem nunc etiam lapideos campos in Prouincia Narbonensi refertos scimus. Mihi è seminibus nuper plantæ aliquot natæ sunt. Ramuli inflexi radices agunt & propagantur.

Ti.

Tilia minor seu mas, G. Steinlinden.

Tilia in urbe nostra magnæ procere quæ collem Palatinum, quem uulgò Aulam (den Hof) nominant, quàm plurimæ decorant, pulcherrimo Tiliæto: & extra urbem passim in fossis circa moenia, egregiæ spectantur huius generis arbores: ut passim sub eis sedilia in umbra non desint senibus & aliis animi gratia obambulantibus. Harum maxima truncum habet inferius ea crassitie, ut si uiri duo mediocres amplectantur, dodrantes quinque adhuc supersint. Sed præcipue spectabiles sunt duæ ille huius generis arbores, quæ infra urbem statim ad Limagum uisuntur, media inter eas domo, cui planca utrinque iunguntur, in qua conueniunt qui sclopetis exercentur: ita digestæ, ut mensis aliquot in utraq; collocatis maximus conuiuium numerus, tanquam in cœnaculis et tricliniis capiatur, infra, supra et circumquaq; brachiis & frondibus Tiliarum ambientibus, &c. Similes aut etiam elegantiores Scaphusiae ad Rhenum demonstrantur. Omnes quidem sic formandæ arbores, ne truncus cubitos quatuor excedant curandum est, ut quicquid ab ea altitudine superest, totum in tabulata, siue brachia & ramos effundatur, sicut & de Quercu Basiliensi supra dictum est, impietatis illo genere à quo & Impiam herbam denominauit antiquitas. Tilia utraque quòd in hortis Lutetiæ nunc spectatur, industria Bellonii fecit. Sexu distinguitur apud Theophrastum: ita ut mas sit sterilis, ramosior,

Ti

densior, materia flava, & arida, &c. Fœmina fructum habeat, materia alba, &c. In syluis ac montibus nostris genera duo crescunt, *Linden* & *Steinlinden*: eadem, ni fallor quorum Theophrastus meminit. Abundat hæc arbor humore nativo glutinoso: qui factus & longa uia sit, (quantum hoc etiam fructui debet, paruo scilicet & sicciori, ita ut minime exhauriatur:) & in prima ætate flecti digeritque facilius queat.

Tinctoria ex Antuerpia, R. Aliam puto quam Rubiam intelligens: quoniam Rubiæ seorsim in catalogo eius mentio fit.

Tini, semen ex Italia Bellonius delatum mihi communicarat: sed non prouenit mihi. Hanc (inquit Plinius) syluestrem aliqui Laurum intelligunt: nonnulli sui generis arborem. Differt colore, est enim ei cœrulea bacca. *Tini* (inquit Bellonius in epistola ad me) permultæ mihi in hortis uiuent, è semine enate, hyemem minime reformidantes: sed diu humi (sub terra) durant, antequam conſurgant.

Tithymalus characias cognomine, O.K.C.Ae.G. Quia Fuchſius & Matthiolo pingitur. Nascitur circa Scaphuſiam, Baſileam, & Badam noſtram, aſperis apricisque locis. E semine aliquando mihi nata hæc, poſt biennium, ſi bene memini, perit. *Cypariſſias Matthioli*, *Pityuſa* aliorum eſt. *Dendroides, Rurpodius*. Hanc eſſe puto, quæ in ſylua parum diſtante Argentina iuxta Carthuſiam copioſe naſcitur. Memini & ſupra Baſileam in colle ſaxoſo reperiſſe, Matthioli quoque *Dendroides* inter ſaxa naſcitur. *Helioſcopius, C.G.* Paſſim in hortis & uinetis emicat eſtiua herba, *Myrſinites* uel *Myrtites, C.Ae, O.K.G.R.* *Rurpodius*. Pingitur à Matthiolo cum nuce, à Dodonæo ſine nuce. *Paralius, C.G.* *Rurpodius*, qui à Matthiolo & Dodonæo pingitur. (quærendum an hic *Cypariſſias* ſit: Matthioli autem *Cypariſſias*, potius *Pityuſa*.) Nascitur frequens in Selandia, ſolo maritimo & arenolo. *Peaſadonius* à Cordo cognominatus, *Ae.Iſ* paſſim (ni fallor) ſponte naſcitur. *Characias Tithymalus Matthioli*, quem (ueluti rarum) à Luca Ghino ſe accepiſſe ſcribit, à Dodonæo etiam eodem nomine exhibitus: idemne ſit, quem Dodonæus pro *Pithyruſa* maiore pingit & Fuchſius, pro *Tithymallo platyphillo*, conſiderandum.

To.

Tordylium, O. Non aliud puto quam *Sefeli Cræticum* intelligens, de quo ſupra. *Tordylium, C.* Sentit autem de *Tordyllo Dodonæi*, quod *Caucalis Bellonii* eſt. Vide in *Caucalide*.

Tr.

Tragacanthæ plantula unica, C.

Tragium, C. intelligit autem *Dictamnū* uulgo dictam, id eſt, *Fraxinellam*, cuius radicem hircum olere aiunt. Sed aliud uidetur *Tragium Dioſcoridis*.

Tragopogon in pratis noſtris abunde creſcit, duorum generum: uterque luteo flore. *Habermard.*

Tragopogon puniceus, O.G. In aliis regionibus, Italia præſertim, luteus deſcit, hic abundat. Facile naſcitur, uiuere per hyemem. Aestate ſecunda flores & ſemina profert, ac perit.

Tragopogon peregrinus uel *Hispanicus* dici poſſe uidetur illa herba, quæ *Hispanice Eſcorſonera*, hoc eſt *Serpentaria* dicitur, quod contra ſerpentium uenena proſit: depiſta in ſine Iconum *Stirpium Fuchſii* cum breuiſſimis deſcriptionibus *Hispanica* lingua editarum nuper Antuerpiæ. *Tragopogonis* autem genus eſſe monuit me *Petrus Coudenbergius* pharmacopœus Antuerpianus percelebris: qui hortu etiam ſui catalogum miſit. In *Tarraconenſi* *Hispania* (nunc uocant *Cataloniam*) herba *Mauri* cuiuſdam induſtria cognita eſt, quam uocant *Eſcorzone* ram, aduerſus uenena præſtans: quæ etiam ſtrenue morbis oculorum auxiliatur. Vulgariſ eſt in prouincia *Carthagena*, iuxta *Darienem*. Exiſtimant eandem eſſe quam olim *Protemæus* liberatus ſit, &c. *Cardanus* lib. 6. de rerum uarietate. His ſcriptis radices eius aliquot à clariffimo *Lugduni* medico *Iac. Dalechampio* accepi aridas ex *Hispania* ei allatas puto, tam breui quidē tempore, ut, electa ex eis recentior una, in horto

horto creuerit, Radix est do drantalís, singularis & simplex, cortice tenui arboris li-
brum referente obducta: quò facile detractò arida, interior superficies fusca est,
pars uerò intima albicat, aut etiam subruffa & in medio subflaua est, insipida, sub-
dulcis.

Tragoriganum. Lege in Origano.

Tragus uel Tragium, marítima herba, O.K. & A. cui semina adhuc non protu-
lit. Vide Scorpium.

Tribulus terrestris Dioscoridis, O.G. Facile crescit, & semina maturè perficit, æ-
stiuu herbula. In Germania uix usquam sponte nasci puto. Tribulum terrestrum so-
liis Portulacæ Matthiolus ait se uidisse Venetiis in maris litore, prope diui Nicolai
facellum, ab eo diuersum, quem exhibeo. Lucas Ghinus Pisís ad me misit. Quidam
Carduum stellatum uulgo dictum, Tribulum terrestrum non rectè uocant. A quati-
cus crescit in aquis profundis, cum alibi tum in lacu nostro superius circa Tungam,
ut audio.

Trichomanes, G. Nascitur passim in syluis, locis saxosis & umbrosis: & in ueteri-
bus muris fossarum urbis nostræ.

Trifolium simpliciter, quod & Asphaltites, id est, bituminosum ab odore cogno-
minatur, O.K.G. Vu.C. Circa Monspelium sponte natum reperi. In Germania non
nisi satum prouenit. In Area seminatum aliquando eadem estate mihi floruit matu-
rè, sed semina ne ostendit quidem, nescio quo uitio: suspicor autem non debuísse
tam citò florere: nam aliàs in uasis secunda demum æstate floruit, & semina perfecit:
durauitq; nī fallor, tribus annis: cum illud primò interierit. Folia ei minora rotun-
dioraq; sunt ante caulem: quo adulto folia angusta oblongaq; in mucronē exeunt:
ut Oxytriphylum tum dici mereatur: quanuis hoc aliqui ueterum (ut Plinius) spe-
cie distinguunt à duabus aliis unius generis speciebus.

Trifolium odoratum (Italorum,) R. Hoc Lotus syluestris uidetur, de qua di-
ctum est supra.

Trifolium caballinum, *Stundkraut*, Lotus satiuu esse mihi uidetur.

Trifolium pratense seu uulgare, capitulis florum purpureis, in omnibus ferè pra-
tis luxuriatur, albis per folia maculis. Circa Lugdunum speciem aliam uidere memi-
ni, quod Hemorrhoidum cognominant aliqui, nigris maculis. Est & altera species
maior, in collibus & aruis apud nos frequens, acris gustu, ut abscessu textio calida ui-
deri possit.

Trifolium uulgare albo flore in pratis & collibus nostris obuium durioribus &
longioribus foliis albicantibus.

Trifolium pulchrum flore candido, K.

Trifolium marinum (maritimum) quoddam, Ac.

Trinitatis herba. Vide Hepatica aurea.

Triticum ubiq; in agris seritur.

Triticum Turcicum, Indicum, uel Bafricanum, Lege in Frumento.

Tu.

Tussilago, Vngula caballina uulgo, quanquam arenosa loca amat quibus aqua
subest: nasci tamen in hortis etiam, et aliquot annis durare potest, locis umbrosis, G.
Floret primo uere.

Va.

Vacaria Dodonæi. Vide in Lychnide.

Valeriana. Vide Phu.

Ve.

Verbena omnibus nota ubiq; nascitur & calcatur.

Verbenaca supina uidetur, quæ Consolida aurea à nostris dicitur, aliis Britanni-
ca. Planta incognita Romæ passim proueniens, æris, florem cœruleum mense Se-
ptembri producens: foliis, floribus & caule ferè Verbenacam representans, K.

Verbasci species diuersæ passim apud nos obuiæ sunt. Ex his Fuchsius pingit

Tt ii

candidum, quod in marem ac sceminam dirimit: & nigrum: & quartum quod syluestre uocat, foliis Saluiae, &c. quam aliqui Blattariam uocant. Blattaria flore purpureo & citrino, C. Rurpodius. Verbasci nigri species uidetur Blattaria Plinio dicta, **Goldknöpf/Schabentraut**, Dodonaeus. Saluia syluestris dicta Monspelien-sibus, eruditis quibusdam species Verbasci syluestris, diuersa ab illa Marthioli, licet non multum, Vu. G. Folia ei tanquam Saluiae hortensis sunt, colore, figura & magnitudine: flores lutei. Hoc anno fata mihi quoque prouenit, & in uase nunc etiam hyeme uiret domi: sed iniuria quadam postea ante florē mihi periit. Aliud uidetur Verbasci syluestre à Dodonaeo exhibitū, cuius folia Saluiae foliis similia facit, maiora, molliora, &c. In Germania inferiore nusquā nisi in horto quodā instructiore sibi uisum ait: floribus luteis, quibus coliculi summi per interualla, ut in Marrubio, conantur. Idem habet, C. Verbasci maius, minus, albi, O. flore purpureo, K. montanū, idem, ex Apulia allatum, idem, Syluestre ex Italia, Zuvinggerus Basileae.

Verbascula quorundam nos Arthriticās uocauimus.

Veronica uulgō dicta quibusdam, **Erenbryß**. Vide in Teucrio. Quae propriē sic dicitur, mas uocatur à Fuchsiō: foemina uerō ab eo dicta, toto genere differre uidetur, Elatine quorundam, ni fallor.

Verrucaria, O. Seridis aut Heliotropii species. Quare in Seride.

Vetonica uel Betonica (Graeci ferē per t geminatum scribunt.) Alia est supradicta, in Syluestris. Alia toto genere diuersa, altis, coronaria: quam recentiores Tur-nici flores (Ocellum, Barbaricam) et Caryophyllos ab odore simili, uocāt. **Nägeleblümen**. Species eius multae sunt, magnitudine, colore, & foliorū numero differētes: aut enim maiores, aut minores proferunt flores: eosq; aut candidos, aut rubentes, aut uiolaceo ferē admixto purpureos, aut Rosae syluestris colore, aut uarios & guttatos, item flore uel simplici, uel multiplici foliorum numero. Sunt in quibus flores bini iungantur, ita ut unus ex alio medio excrecere uideatur. Basileae apud doctissimum uirum Con. Lycosthenem uidi in una planta flores triū generum. Audio & plurium reperiri. Plantantur surculo auulso in uasis: & hyeme in cellas reponuntur. Seminibus feri non solent: ita enim putantur ad agrestem naturam redire: & si multiplici flore cōstent, ad simplicem. Si florere prohibeantur initio, ita foliorum in floribus numerum multiplicari aiunt, praesertim si stercorentur & rigentur diligenter. Viuacissima est & plurimis annis edurans planta. Turnerus Cantabricā appellare uoluit: eamq; in urbanam & syluestrem diuidere. Syluestriū illa species quam uulgō nostri **Graßnägele** & **Frieseneugle** uocant, ad Altiles proximis accedit, per omnia minor. Plantatur haec in hortiū etiam muris, nec metuit hyemem, uiuacissima & diu durans. Alia in petrosis collibus, & asperis, sabulosis apricisq; locis nascitur: folio latiore, breuiore: Saponariae simili, floribus permultis simul congestis. **Steinnägele**. Hanc Lindauiae in Curtii horto alibiq; uidi: & ē semine natam nunc alo. Florer anno secūdo, pulcherrimis floribus: qui medio ceu orbe perexiguus punctis candidis ornantur. Syluestrem quoq; reperi, si probē memini, ad ripas Gryphii lacus nostri. Aliqui puto Scarlatam uocant, tanquam à coccino floris colore. Tertia in pratis humidis emicat, folio multipliciter dissecto: unde à Germanis **Wüsterwillen** uocatur. Huic etiam similis species in hortis alitur à Dodonaeo depicta. In Flammula, quam ab odore Caryophyllum uocant, frequens est apud Italos, ut ex maiore flore prodeat minor flosculus: duplices nominant, Scaliger, Mihi Flamma seu Flammula Theophrasti, genere differre uidetur.

Vesicaria. Vide in Halicaccabo.

Viburnum. Lege Lantana. Sic enim dictum Italis fruticem, aliqui Viburnum interpretantur: alii Vitem syluestrem causticam nostram.

Vicia inter segetes ubiq; copiose prouenit: minori (angustiori & oblongiori) quam Aphaca folio, tenuiori caule, flore in purpuram rubescēte, siliquis longioribus, gracilioribus: semine non rotundo, sed latiusculo similiter lentit: quae etiam Aphacae seminum figura est, Galeno teste. Haec Marthiolus qui utranq; pingit. Aphacen

phæen eius Dodonæus (in posteriori editione) Viciam facit. Viciam uerò ipsius Arachum nominat. Aphaca ubiq; sponte in Italia nascitur, & à multis etiam seritur ad columbarum saginam, Matthioli.

Victorialis apud recentiores, alia rotunda dicitur, de qua leges in Gladiolo; alia longa, de qua dixi in Allio alpino.

Vinea peruinca. Vide Clematis.

Viola simpliciter dicta, uel nigra cognomine, Martio mense apud nos erumpit circa urbem copiosa, iuxta sepes præcipue. Theophrastus libro 6. tradit posse eam toto anno florere, sicut & Oenanthem, si certa ratione curetur: qua etiam Dasypodion cognominatum, (Dasiphylum mallem) hoc est, multipliciflore hoc genus etiam tradit, frequētius apud Gallos & Sabaudos, nobis rarius. Ego à Sabaudis primū huc attuli, nunc multis in hortis habetur: est enim uiuacissima herba, & radicibus sese propagat. Flores diuersis anni partibus edit, semina nunquam. Syluestrior species flore ferè nullius odoris est, minoribus & acutioribus foliis, flore maiusculo & dilutiore, radicibus magnis repēs & circunquaq; se propagans. Rarior est albo flore, quanquam satis frequens nobis. Rarissima luteolo & minore, in syluis & montibus interdum apparens.

Violæ nigre per similes flos, quem aliqui trinitatis cognominant. A colorum numero, nostri septenos ei colores, uulgari nomenclatura Heptachrum appellantes, at tribuunt: in odorus, sola colorum elegantia & uarietate placet. Aliqui non rectè Antoram, Dodonæus Violam flammeam: aliqui laceam, fortè quòd humi iacere uideatur. Crescit in aruis inter Triticum & alibi, ut in montibus quoq;. Aruenlis minor, minusq; pulchris coloribus est: hortensis elegantior, siue cultus ratione, siue quòd species diuersa sit: ex mōtibus fortè translata: montani enim hi flores maiores sunt, & albi quoq; luteiq; maiori ex parte, syluestres inueniuntur.

Viola alba, Leucoium Græcis dicta. Vide in L.

Viola equina Sueuis dicta. Vide Calathiana uerna.

Viola flammeam Dodonæus, ut dixi, florem trinitatis uel Heptachrum à nobis dictum facit. Aliqui Indicum florem appellatum: neutram sententiam approbo: ut neq; Scaligeri, florem Caryophyllum uulgò dictum interpretantis.

Viola è Flandria, K. Leuciorum forte genus aliquod intelligens: Fuchsi Matronales.

Viola fruticosam à se primū inuentam (in montibus ni fallor) Franc. Calceolaris pharmacopœus Veronæ ad Campanam auream percelebris, nigra communi per omnia similem, nescio an etiam odore, in horto educat.

Viola Mariana. Vide Medion.

Viola matronalis Fuchsi, (apud Dioscoridem nomen hoc inter Leucosii nomenclaturas est,) ficto ab eo nomine. Aliqui Violam hyemalem uocant, interpretantes Germanicum nomen Winter violen. Brabant Mast bloemen. nostri Psinsnāgele, quòd circa Pentecosten floreat. Solerius Gallus Hispanicam Violam. Aliqui Hesperidem ueterum interpretantur. Flores fert anno secundo albos, interdum roseos aut subrubentes quod rarius est. In plerisq; hortis apud nos inuenitur. Inueni & syluestrem si probè memini, olim supra Liechthalam oppidū Basilienis.

Virga aurea uulgò ab Italis dicta, Solidago Sarracenica Fuchsi. Heidisck Wundkraut Germanis, (forte Panaces Chironium cui Lapathi folium tribuitur, &c. nisi id potius Doria circa Monspelium dicta est.) Nascitur passim apud nos locis siccis & apricis circa syluas, & alibi. In hortum quoq; translata, aliquandiu durat: Aliam eius speciem uidī in mōte supra Sanam casam (uulgò Salgansam) oppidū, in quo fodina ferri est, longioribus & angustioribus foliis: quā Argentinæ etiā in horto Massarius medicus alit. Sunt qui Lyfimachium luteū Virgam auream nominent.

Virga sanguinea. Vide Sanguinea.

Viscum nec natura prouenire puto, nec ab homine feri posse. Serunt id alio imprudentes turdi ipsi malum sibi.

Vitex est in Agno.

T t iii

Vitium differentiae non paucae sunt apud nos: sed plures in calidioribus regionibus, ubi uuae melius percoqui possunt, maiore hominum cura ut diuersa & generosa uina nascantur. Nostra ferè omnia acerbata sunt, idque eò magis quò propius ciuitatem nascuntur: paulò remotius enim nascentia, (ubi montes non impediunt & ut prorsus non nascantur in causa sunt,) pleraque mitiora sunt. Quoniam ciuitas nostra non solum frigidis Aquilonibus ut finitimi tractus, exposita est: sed Austros etiam natura tepentes, frigidos experitur: quòd eis accidit (Austris inquam, ut refrigerentur) dum alpes perpetuis rigentes niuib. perspirant. Apud Vuallesios nostros multae & generosa uinorum genera nascuntur. Cuiusdam nostri è uinaceis natae uites aliquot, post annos aliquot bonas uuas protulerunt. Mihi etiam è uinaceis uuarum passerarum maiorem quas Cibibas uocant: ac minorum (in quo genere rari sunt acini qui uinacea habeant) prognatae uites quinto iam anno durant, necdum fructificauit. Vuae bonae uarij generis, praecipue tamen albæ, magnæ, quas Cibibas uocant, Vu. Muscatellinae ex Vngaria, Vu. Aliæ ex Vngaria, acinis longis admodum: appellantur ab ea figura *Geißdutzen*, Vu.

Vitis syluestris quæ Labrusca dicitur, non aliud à satiuâ differt, quàm quòd cultu destituta est, ut Marcellus Vergilius sentit: sed cum propter omphacium (quod uulgò agrestem uocant,) à Gallis & Italis colatur, nec tamè agrestem suam naturam deponat, specie etiam differre uideri potest. Huius species una fructum non perficit, sed florem duntaxat quem cœnanthen uocant. Altera fructum fert acinis exiguis, nigris, astringentibus. Labruscæ flores (inquit Marcellus Vergilius) nunc etiam condiendis & odorandis uinis diligenter leguntur. Audio in Alsatia Labruscam racemiferam sponte nasci: sicut & circa Brugam oppidum ad Arulam flumen, tum albis tum nigris acinis. Apud nos quidem nec sua sponte nascitur, nec colitur à quocquam, quòd uel ex fatiuis Vitis uuae nostræ satis acerbæ sint, & quamquam annis tepidioribus uina mediocria, interdum etiam optima nascantur: acerbata tamen et quæ omphacii instar sint, nunquam defunt à superioribus annis seruata.

Vitis syluestris caustica, (flore enim, semine, cortice & radice uim urendi habet,) passim sepes nostras inuoluit, & in syluis arborescendit: Clematidi plane cognata: quare à nonnullis recentioribus similiter Flammula nominatur. Sunt qui ueterum Viburnum faciant. Matthioli, ni fallor, non distinguit.

Vitis alba syluestris Bryonia, R. K. G. Suae spontis passim inter sepes reptat, circa Basileam, Brugam, alibi quæ in agro Tigurino, quod sciam, nulla. Semine alundemisso iam aliquot in hortis luxuriatur. Radix ei prægrandis & uiracissima.

Vitis nigra syluestris, O. G. si modo est eadè quæ Tanus Plinii, quam Matthioli pingit, quamuis radicem non probè, fructum uerò omittit: & capreolos addit, forsitan descriptionem Dioscoridis in hoc non naturam secutus. Ego cum capreolis nunquam uidi, sed uiticulis tantum suis flagellis se circumuoluentem. Aut igitur Dioscorides lapsus fuerit *ελκας* in hac planta nominando: aut non propria significatione usus: aut Vitis nigra Dioscoridis hæc non erit. Accedit quòd fructum eius primo uiridem, in maturitate nigrum facit: cum Tanus acini post uiriditatem semper ru-beant. Item quòd Dioscorides minus efficacem huius uitis radicem facit, quàm albæ: cum Tanus radix exulceret, quòd meo periculo didici, Vitis albæ non item, aut non adeò. Interim hanc Vitem nigram esse non negabo, aut proximam ei speciem: quoniam non inuenio aliam quæ propius ad descriptionem accedat. Sponte nobis abundat in syluis & montibus proximis, *Schmârwurz* nomine uulgò nota, quòd alibi Viti albæ attribuit. Vbi nascitur, aquam subesse significat ut plurimum, ni fallor: quamobrem Ruellius Malacocissum Democriti hunc esse conicit, alibi uerò Cyclaminum alteram Dioscoridis. Tanus, alias Tamus dicitur (Italis hodie uulgò Tamaro) unde & Taminia uua, quanquam ea Celso Staphisagriam herbam significat.

Vitis Idaea, *Heidelbeere* uulgò, ut primus ego obseruaui, & uiros aliquot eruditos consentientes inueni. Aduersatur quidam de re herbaria bene meritis: & Vi-

tem

tem Idream interpretatur illam quæ Passulas Cōtinthiacas uulgò dictas ferat. Ego nobilissimum illud uix passæ genus non in Ida, nec aliis præ altis niuosisq; montibus nasci putarim: sed uel in planitie uel collibus apricis, magna hominum cura. Vitis Idæa, (inquit Theophrastus Hist. 3. 17.) est fruticosa: uirgis paruulis & ramulis cubitalibus penè exporrigitur: quibus acini laterales nigri adhærent, magnitudine Fabæ, dulces, uinacebruti instar aliquid (γλαυκώλης τι) intus continentes, folium rotundum, induriduum paruumq;. Transfuit hunc locum Plinius lib. 14. cap. 3. sed parum feliciter, & pro Idæa Alexandrinam posuit, &c. Non mirum est autem suffruticem montanum Vitis nomine appellatum: quando & Ficus & Laurus et aliarum arborum nomina suffruticibus propter aliquam similitudinem tribuuntur, &c. Genera huius suffruticis duo reperiuntur, magnitudine tantum diuersa. Conatus sum aliquoties frustra, tum semine sato, tum frutice translato ē syluis, in hortulo meo alere. Anno quidem superiore in horto Petri Figuli Lithotomi amici mei plantatus uideret etiamnum, nescio an duraturus, nō dum flore aut fructu edito. Durum, macrum, editum & uentis expositum solum amat.

Vitis Idææ species altera acinis rubris, foliis similibus, in altis montibus Helueticorum nascitur: & in horto, C. Ipse in catalogo Vaccinia rubra uocauit. Pinguntur à Dodonæo bis, altera icone meliore.

VI.

Vimī per pauca apud nos sunt, exq; parua, ex montibus proximis puto translata. Videre memini paulo infra Albii nostri cacumen.

Vr.

Vrtica sylvestris maior & minor, ubiq; notissima est. Mascula uel Romana, R. O. G. Sponte apud nos non crescit, semina maiora habet, & ueluti cōglobata. Sunt & Vrticæ mortuæ uulgò dictæ, non urentes, nec unius generis, passim obuix.

Vu.

Vuacrispa. Vide Ceanothus.

Vulneraria appelletur à nobis herba, (uel Consolida aut Sideritis,) cognominē rustica, passim in pratis siccis & collibus crescens, foliis circa radicem Lapathi pratensis fere figura, minoribus, multis, crassis seu carnosiss, trientalibus, subacidis: caule uno & altero, pedali, in cuius medio folia minora, seu multifida sunt, in summo corymbi luteorum flosculorum, qui in quibusdam ceu folliculis mollibus, albicantibus, hirsutis pluribusq; confectis, continentur. Radix subest singularis, alba, capillata. Hanc herbam literis hæcenus quod sciam nullis celebratam, multis uerò experimentis apud rusticos nostros nobilem, Vulnerariam (ut ab aliis Consolidis uulgò dictis distinguatur) rusticam nominemus. Quidam Germanicè simpliciter Wundkraut uel Klein Wundkraut, in Bernensium agro Gachheil (ut alii Anagallidem) nominant.

Vuularia. Vide in Rapo sylvestri.

X.

Xanthium passim circa oppida & in rudibus reperitur, G:

Xylum, C. hoc & Gossipium uocant, ē cuius fructu lana uulgò arborea dicta capitur. Bononiæ in Luca Ghini hortulo uidisse olim memini. Herba est, foliis Vitis, &c.

Xyris. Vide Spatula.

Z.

Zambach. Vide lasme:

Ziziphus, uulgò lūiuba (Z in l mutato,) C.

Ziziphus alba in Oleastro est.

FINIS

AD LECTOREM.

His fere perscriptis accepi catalogum Stirpium instructissimi horti
Ioannis Schmidlappii egregii mercatoris & ciuis Schorndorfi in regio-
ne ducis Vuirtembergensis, quem hic subnectere libuit, non omnibus,
sed rarioribus tantum in eo nascentibus commemoratis.

Abfintium Rom.	Delphinium purpureum et album.	Melanfana punicea et alba.	Solanum Indicum.
Acanthus uerus.		Melilotus Italica.	Spatula foetida: alia media:
Acetofa rotunda.	Dictamnus falso dicta, id est	Melissa maior.	alia minima, omnes semi-
Aethiopis.	Fraxinella.	Melones zuecarini.	nifera.
Alcea hortensis.	Digitalis Fuchfj maior &	Meloepones.	Stachys.
Alkali herba.	minor.	Meum.	Stichas Arab.
Alyffus Dioscoridis.	Doronicum.	Milium nigrum.	Strubium, nescio quale.
Amaranthus Plin. magnus.	Elleborus albus.	Narciffus uerus: alius cœru-	Tblafpi Creticum.
alius ceu pinnatus, mit	Elleborus niger vulgaris.	leus.	Thymus.
langen federn: alius	Eringium: aliud marinum:	Nigella Damascena: alia lu-	Tulymalus myrtites.
ceuerft aus, pulcherri-	aliud montanum, diuer	tea.	Trifolium aureum uulgo d
mus, mit hanc fem	fo ab alpino nostro.	Pœonia mas: item femina	clum.
men.	Eupatorium Mesue.	rubra & punicea.	Trifolium bituminosum.
Ammi.	Frumentum cum spica gran	Papauer crispum.	Vetonica, uel herbe Tun-
Amomum falsum. Plinij pu	de, furculosum.	Papauer spumeum falsum.	ca syluestris species, ut
to iuxta aliquos.	Gentiana.	Petrofelinum Macedonicu.	puto, Steinnägela:
Anagyris minor.	Gladiolus albis floribus.	Phalangium.	lia Gefechr winter nâ
Anturhinum floribus ru-	Gladiolus Indicus.	Phalaris.	gcle.
bris, albis, roseis, luteis.	Gratiola.	Piperis arbuscula.	Viola Martia multipliciflo
Aristlochia rotunda, uera	Heliotropium minus, Ver-	Piper Indicum uulgo di-	re.
nimirum.	rucaria.	clum.	Viola matronalis Fuchfjal
Asphodelus uerus, aliâs ma	Hordeum nudum.	Pifâ capitata.	ba & rosea: Winter
rinus.	Horminum uerum.	Podium montanum.	veyel.
Attrachylis: alia Antwerp.	Hyacinthus Fuchfj cœru-	Poma amoris lutea, rubra,	
Ballamina.	leus & albus. Ho-	& tertium genus croci	FINTS.
Barba hircina purpurea.	nungeblumen miet	rubore.	
Brassica mar. i. Soldanella.	sternlinen blaw vñ	Pomum S. Iohannis forticar	
Buphthalmus.	weyß.	bor Ceratia.	
Calendula multiplici flore.	Hyocyamus albus.	Priapeia.	
Chamaeleo niger.	Hyssopus moschi odore.	Pfyllium uernale.	
Caryophylli Turcici rubri,	Iasminum albis floribus.	Pyrethrum: aliud odoratu.	
Vetonica altitlis species	Indicus flos communis: eius	Rhodia radix.	
ni fallor.	dem species maior flore	Rose Lugdunenses: alie	
Centaureum maius.	multiplici: & minor si-	multiplices: alie lutee.	
Cerinthia Plinij.	militer.	Sanguis draconis Lapatii	
Chamaemalum nobile:	Iris syluatica parua, flore	species.	
Charancia uulgo dicta.	cœruleo, seminifera.	Satureja alba.	
Cistus femina.	Lachryma Iodoci uel Iobi.	Scarlete flores. Est autem	
Citrullus.	Lapathum Sabaudicum.	species Vetonica uel her	
Conyza uera odorata, alia	Leucoia alba, punicea, ro-	be Tunica syluestris.	
maritima.	sea. Welsche som-	Scolymus spinosus: alius lee	
Coriandrum Venetum.	mer veyel.	uis.	
Coronopus.	Linum hyemale.	Scoparia	Studenten
Cucumis erraticus.	Lupini syluestres.	frauf.	
Cucurbita species rara,	Malua crispa.	Scordium.	
muschel fürbis oder	Marum.	Sesamoides.	
Schwum fürbßle.	Medica Parisinorum, alia	Siciliana.	
Cyclaminus minor.	lutea: alia minor.	Smilax (uel potius Conuol-	
Cyperus.	Medium.	uulus) cœruleus.	

CATA

CATALOGVS PLANTARVM

HORTI CLARISSIMI VIRI PETRI MICHAELIS
civis Veneti, in uico S. Geruasi: quem Ita-
licè scriptum ab amico ante annos
quatuor ferè accepi.

Acanthus radicis glandifera. Eupatorium Mesuæ è Syria. Osyris flore cœruleo aut uio-
laceo.
Argolethros Plinij. Faba Aegyptia.
Alaternus Plinij. Faseolus purpureus Indicus. Panaces Chironium Theo-
phraasti.
Alimus Crateus. Ficus Aegyptia.
Allaria alpina. Foenogrecum recentiorum. Polycnemum.
Aristolochia radicis crasse. Folium, Dioscoridis nimis. Pyramidalis quædam plan-
ta.
Actea Plinij. Galetti, si rectè lego, nescio. Quadrifolium.
Aspalatus uerus. quid. Radix idæa.
Asphodeli species aliquæ. Gingidium Plinij, si rectè. Rhaponticum.
Balanus Myrepsica. lego. Rosæ moschate, sine spinis.
Batrachium, Ranunculi spe- Hyacinthus, Tulipa Turca- Sanicula foemina.
cies. rum, uel Lalle. Sebaustus ex Oriente.
Bellio Plinij. Hyoscyamus Aegyptius. Sedum maius Dioscoridis.
Canella, seu Cinnamomi uul- Hyssopus quædam, uel Ser- Sedi plures species.
go dicti, folia. pyllum rectum. Sementina ex Oriente.
Carduus nobilis. Lichen Plinij. Sion Plinij.
Carus. Liliu Alexandrinum. Sifari plures species.
Caryophyllorum ex Orien- Lonchitis prima et secunda. Smilax lenis ex Creta.
te folia. Lunaria Borissæ, species Cen Spina ceruina.
Cedronella, species Nigelle. taurij minoris. Staphylodendron puto: nã
Cepæ. Lycium secundum Indicum. Italicè scribitur Albero
Chersium (fortè Corsium, Mandragoras mas. de l' uua
quod est radix Loti Aegy- Melongena uel Mala insa- Tomentaria è Creta.
ptia) Theophrasti. na spinosa. Trafi uel Dulcichini.
Chondrilla Plinij. Musa. Verbascum uiscosum è Creta.
Chrysogonum. Narcissus flore multiplici, è ta.
Corniola, Lutea Plinij. Constantinopoli. Et alia quædam incognita.
Colocynthis duo genera. Narcissus luteus, species Tu uarie.
Daucus Creticus. lipe Turcica. Alius lu-
Dichlamus marinus. teus autumnalis, species
Elatine secunda. Colchici.
Epimedium. Nardus montana uera.

CELEBRATVR ET

Ducis Florentini hortus:
in quo præter alia Pula-
ebra aut rara, hæc et-
iam uisuntur,
ut audio.

Myrtus laurea.
Laurocerasus.
Laburnum.
Solanum somniferum uerū.
Geniste species trifolia, quã
aliqui non rectè pro Cy-
tiso accipiunt.
Thapsia.
Ferula.
Smilax læuis uera, quam et
in monte Atho sibi ui-
sam Bellonius ait.
Caprifoliū Memphiticū, ut
Bellon. uocat, quodcirca
Memphidem Aegypti
in sepibus provenit, apo-
cyno simile, liquore et-
iam albo mnanas, ut il-
lud croceo: sed amplexi
caule et in altum ascen-
dens: species Smilacis læ-
uis aut apocyni.
Herba baccifera, folio Sili-
quastri Fuchsi, &c.

FINIS.

FINIS.

CONRADI GESNERI APPENDIX

LIBRI SVI DE HORTIS GERMANIAE, AD FRAN-
ciscum Calceolarium, pharmacopolam Veronen-
sem ad insigne Campanæ aureæ.

POSTQVAM Dominicus Monthisaurus, (uir non solum felici artis medicæ usu summus, sed etiam phi-
losophus præclarus, et Græcis Latinisq; literis instructissimus,) mutue nobis amicitie, humanissime Calceo-
lari, author fuit, multa ab eo tempore beneficia tua copiose et liberaliter in me collata percepi. Quæcunque
enim in genere Stirpium et uniuersa materia medica abs te petij, ea iam aliquoties cumulatisimè, et magno semper
petitionis meæ scenore ad me misisti: uti cum aliàs, tum proximo uere proprio ad te nuncio tam longinquo itinere
misso, qui Stirpes aliquas rariores tute citoq; abs te mihi adferret, benignissimè sum expertus. Et quanquam ego
perparum uicissim mitto, (quoniam regio nostra parcissima fert, et ego negocijs alijs occupatissimus operam rei
hortensi, ut uellem, dare non possum: ac uix unus aut alter præter me apud nos huic cultui deditus est,) non tamen id-
circo desistis, et noua subinde donas, quæcunq; occurrunt, quod quidem bonitatis tuæ, et sincerae amicitie, non
uulgatis illius, quæ utilitatem magis quam uirtutem ac honestatem spectat, argumentum illustre est. Exigua certè
V u

sunt quæ Germani præstare possunt hac in parte, nisi ab externis adiuentur. Plurima eorum quæ veteres descripserunt Germania non fert, ut in Stirpium, ita animantium quoque præsertim aquatiliū genere. Scripserunt enim illi ferre de maritimis, aut non ita procul à mari, mediterraneo maxime, nascuntibus plantis, cælo calidioris et siccioris: si aut etiam de piscibus mediterranei præcipue maris. Germania uero nostra in frigido humidoque tractu procul à mari abest: et maxime aliæque peregrinæ stirpes in ea neque sponte nascuntur, neque ex feminibus facile enataeque, uix durant: maritimæ autem eius ad Oceanum oræ, quæ à nobis alpiū accolis longissimè distant, per pauca (ut audio) præferunt, partim ob cæli frigiditatem, partim (ut conijcio) quod perpetuis ubique Euripis litora obruantur. Quare tantilla hæc, etiam imperfecta, boni consulenda sunt: præsertim inter hæc renascentis nuper harum rerum cognitionis principia. Principij enim ubique uis et authoritas summa est, etsi re ipsa penexiguū aliquid sit. Sed hæc sinamus. Propter ingenuam quidem animi tui erga me liberalitatem, cum his diebus Appendicem libelli mei De hortis Germaniæ meditarer, illam utcumque exilem et extemporaneam, tibi potissimum, tanquam et amico summo, et optime merito, et in re hortensi diligentissimè uersato, dedicandam existimaui. Nam qui tantilla hæc, quæ antea ad te missi, grato animo acceperis, hunc etiam utcumque breuem et leuissimè opere libellum, non aspernaturum te mihi promittebam. Non tam autem ut publicè beneficijs tuis obligatum me profiterer, dedicatiuncule huius, quæ longè infra meritum tua est, consilium cepi: quàm ut hac occasione te incitarem ad maius subinde Stirpium rei, hortensis studium: quod ego certè præclarum, et magnanimitati coniunctum esse statuo: quippe quod ad honestam oblectationem, et gloriam, magis quàm ad lucrum aut commodum priuatum referatur: et non solum præsentis tui homines, sed ipsa quoque posteritatem inuuet: id quod magnanimi uiri proprium est, isque in hoc ipso liberalis, qui præsentis tantum spectare uidetur, laudes excelsit. Etsi enim herbarum generis pleræque anno uno aut paucis darent, nec ad posteritatem numero, speciem tamen feminibus conseruata, transmittuntur. Arborea autem plantate uel insite semel, plurimis annis edurant, et ad posteros transeunt. Præter uoluptatem uero, quam ipsæ quæ terra eduntur aspectandis, capimus, magna à plerisque uel utilitas uel necessitas ad uitam ualeitudinemque hominis conseruandam aut restaurandam innat. Proprius quidem studioforum naturæ ex eis fructus hic est, quod cognitis hac occasione plantis, ueterum de eis scripta legendo non sine magna uoluptate intelligunt. Nam quæ ignores legere quid oblectet? Scire autem uel per se pulchrum et expetendum est. Sed hæc de re uerba facere non institueram. Præsentis institui hoc est, tibi optimo summoque Hortorum conditori et cultori, dedicandum de re hortensi argumentum conuenire. Tu enim pulcherrima hæc Stirpium cognitione non modò plerosque seculi nostri pharmacopœos, sed ipsos etiam medicos quàm plurimos longo post te intervallo relinquis. Tu non proprium modò hortum Veronæ uarijs et raris plantis conseruisti, et prædium iuxta excelsum montem Baldum diligentissimè colis: sed etiam in nobilissimæ cuiusdam uis uestrae patricij palatio hortum multis pulcherrimisque Stirpium generibus mirifice exornasti, ita ut ciuium simul et peregrinorum admirationem spectantium mereatur. Hoc superius à me dictum oportebat, Appendicem hanc à me scriptam esse, cum liber meus De hortis Germaniæ ad finem operum Val. Coradi Argentinæ imprimendus, ad manum non esset: nec reuocari, typographo ad operis finem festinante, ut suis quæque locis alphabetice serietim insererentur, posset. Itaque seorsim potius consignare uolui, quæ ab eo tempore quo librum misi imprimendum uel in meo plantauit hortum, uel in aliorum catalogis obseruauit, quàm omnino omittere. Nec pudet me operis imperfecti, quod primus ego inchoaui neminem in eo secutus: in hoc præsertim argumento, quod nulla forte ætas perficiet. Nullus enim nouas plantas inueniendi finis est: nondum omnes nostri orbis nouimus, aut ad hortos traduximus, nedum alieni. Sed cum infinitus homini hic labor sit, modus aliquis statuendus est: ut tandem postquam multas uariasque Stirpes colere tentatum fuerit, pulchriores utilioresque, tantum, et quæ cultum facilius admittant, durentque melius, recipiantur in hortos: cæteris suæ naturæ relictijs. Tu quidem, charissime Calceolari, non solum terræ hærentes Stirpes pleræque omnesque nosti, (ut supra dixi,) et suis designare tum antiquis tum recentioribus aut uernaculis nominibus potes, et rarissimas quasque in hortis alere soles: sed etiam in instructissima officina tua Veronæ, optimas lectissimasque plurimas, ut et reliquam materiam medicam selectiorem, recondis, nec ulli ad hanc rem sumptui pareis. Quod facile animaduertis nuper, cum ex multis simpl. medic. quibus recenter ad THERIACAE antidoti compositionem usus es, specimen singulorum liberaliter mihi communicasti: qualia sunt, Folium uerum, (sicuti uocas, antehac mihi non usum, Nardo aut Celtice cognatum ut conijcio:) Scordium Creticum, Thymus capitatus, Dieltamnus Cretica suis cum floribus, Marum aut Amaraci sue Sampsuchi genus è Creta. Proueniunt autem hæc, et alia quædam calidæ odoratæque herbæ in illa insula, multò quàm quæ alibi ferè nascuntur odoratiores, acriores, et magis albicantes aut lanuginosæ. Quam obrem Galenus è Creta potissimum ad Theriace mixturam accersi uolebat, quanius multò meliores nostris quæ in Germania nascuntur, huiusmodi herbas passim circa Romam nascentes et aliunde habere potuisset: cum uniuscuiusque generis optima quæque ad præstantissimam hanc antidotum deligenda rectè censeret. Tuo quidem exemplo uita nam etiam nostri pharmacopole moti, ad hanc antidotum parandam, et alias quoque maioris præcij compositiones, cum prædictas herbas è Creta, tum aliunde quoque optima quæque selecta haberent: qualia sunt ex cæteris quæ ad me misisti Ammoniacum, Thuris masculi glebarum æmulum, sincerum ac purum, cum frangitur splendens, et si maridas, lactea albedine insigne, subamarum. Myrrha odoratissima, bene amara, pinguis ac tenax, superficie squalida et ueluti rubiginosa, minutis glebis, quæque contracta intrinsecus unguium ferè modo albicantes uenas ostendat. Sagapenum rufum, perlucidum, acerrimum, porri ferè odoris. Liquor panacis purus, et plerisque à Diosc. attributis optimo notis, conspicuus. Ac similiter Galbanum, idque adeo pingue, ut digitis statim lentescat. Bitumen Iudaicum uerum, uireo splendore, odore in hoc genere grauissimo. Terra Lemnia, (seu sigillata uera) è Byzantio, difficilis acquisitum.

*Theriacale Stirpium
Catalogus.*

STIRPIVM APPENDICIS

Hortorum libros xxx. nuperrimè Lugduni edidit Benedictus Curtius Simphorianus eques in Ecclesia Lugdunensi, quos Ioannes Tornæsius typographus Regius excudit in folio, satis magno uolumine: in quibus arborum duntaxat historia continetur, partim ex probatissimis quibusq; authoribus, (philologia etiam non omissa,) partim ex ipsius autoris obseruatione collecta, ut titulus pollicetur.

IOANNES VOLMARIUS pharmacopola eruditione & diligentia excellentius, reiq; herbaria peritissimis quibusq; conferendus, Esslingæ (quæ ciuitas Imperialis est, Vuirtembergensi ducatu finitima) hortu pulcherrimu & instructissimu habet, in quo plurimis iam annis uarias & externas stirpes magno studio educat: quarum pleraq; nomina, & si quid præterea ab eo circa singulas obseruatum est, ut ab ipso accepi, huic Appendici inserui, nomine eius modò integris literis scripto, modò V. tantum initiali notato. G. uerò nostri nominis nota, nostros hortulos indicat.

Prædicatur etiam nobilis uiri CHRISTOPHORI PRAVNI rationibus satis à Cæsarea maiestate præfecti Halæ in Valle Oëni, &c. hortus amplissimus, & uario herbarum, fruticum arborumq; genere locupletissimus: in quo uel Prunorum genera spectantur uiginti, &c.

STIRPIVM APPENDICIS

Enumeratio alphabetica.

A.

ABROTONVM fœmina Fuchsi, Absinthio Pontico eiusdè haud dissimile, V. Aliud fœmina, mari persimile, sed maius, latioribus & albioribus foliis, ignauius, G. Crescit Abrotonum quouis loco, sed melius efficaciusq; aprico ac secco, ut odorata & fruticosa lignosaq; (περυσινά uocant Græci) omnia: Hyssopus, Thymus, Sampsuchum, Absinthium, & huiusmodi. Abrotonum utrunque topiarium dixeris, non quidem propriè ut ea quæ duci flectiq; ad diuersas figuras facile possunt: fragiles enim eius ramuli sunt, sed quia putari & tonderi ad diuersas figuras facile sustinet, & rami rescisci aut taleæ, uel leuiter impacti, ad quamuis figuram, facillimè crescunt.

Absinthium maritimu ad sex annos habui: nunc ad occasum uergere uidetur, V.

Absinthium Ponticum Fuchsi, non multi amaroris, (Vulgare quidem nostrum duplò amarius est,) sponte proueniens Tubingæ, astrictionis cuiusdam particeps. V. G. Album è Vallesia, uix ultra biennium in horto durans, G. Vide in Abrotono, Santonicum, Ollingerus. Alpinum humile, non diu in horto mihi durauit.

Acanthus mihi flores nunquam produxit, Volmarius superiore anno producos sibi sperabat.

Aceris species tres, G. Harum unam uoco montanam, nostri uulgò **Lynbaum**: cuius truncum femoris serè crassitudine, quatuor (& amplius) cubitos longu, super na parte abscissum, proximo uere plantaui, prato mediocriter humido: qui nunc æstate pulchrè germinat, ita ut perfacile eam crescere & durare appareat.

Achillea, V.

Aconitum primum Dioscoridis, id est, Tera Valdensium, multis annis in hortis durare potest, ut in meo experior. In alio enim hætenus nullo uidi.

Aconitum cœruleum montanum minus, foliis hirsutis, subrotundis, minoribus, minusq; incisus quàm cætera Aconita. **Bergritter** spòile in montibus Bernensis ditionis rustici uocant, à similitudine florum colore & figura serè cum Consolidâ regali dicta. Est autem Napelli species. Napelli uerò nomen meretur non omne Aconitum (etiã si Itali hodie uulgò non distinguant,) sed cuius radices ceu parui Napi sunt, G.

Aconitum pallido flore, Lupariæ, seu Lycocioni nomine uulgò dictum, benè in

in hortis durat, contra quam olim putabam: & multis, ni fallor, annis, G. Eiusdem species alia floribus albis, foliis minoribus, radice simili, nempe latiuscula, dissecta, G.

Aethiopsis, G. Aethiopidem habeo (inquit Volmarius) eandem cum illa quam Matthiolus pinxit: & pulchre quidem conueniret cum descriptione Dioscoridis, si seminum uascula, bina tantum semina caperent. Adhuc radicem uiscidam à Dioscoride ei attributam, non habet. Neque etiam exiccatae cornu durities: aut saltem talis, qualis in Scolymī radice sentitur. Sic ille. Secundo anno, ut puto, flores & semina profert. Quarendum an Verbasci potius species sit, Thryallis scilicet uel Lychnis.

Alcea Bononiensis, V. Sentit autem de illa, ni fallor, quam Alceastrum aliqui uocant: Tragus Alceam peregrinam seu Veneram.

Aloës herbam (inquit Val. Cordus lib. 4. De plantis cap. 110.) ex Hispania allatam plantam, omnibus, quibus à Dioscoride describitur notis respondentem. Hyeme tamen ob gelu eruenta est, & in tepido aliquo loco suspendenda. Nam in aere quoque suspensa uiuit ac incrementum capit, cuius rei causa etiam amphibion appellatur. Non enim in Arabia Indiaque tantummodo prouenit, uerum etiam maritimis Apuliae & Hispaniae partibus sed faciendo succo inutilis. Hæc ille. Ego Aloës plantam parutam proxima hyeme tota habui, partim in calido hypocausto, partim in alio ei proximo frigido aut tepido ferè: demum Aprilis die uigesimo cum uespere tepido pluuiam expectarem (erat enim siccior planta) exposui sub dio. sed pluuia subito secuta non est, & planta periit, foliis ceu coctis, & uiore omni amisso, et si nox satis tepida fuerat. Nunc aliam habeo, tuum munus Calceolari charissime: quam solam nimit frigoris proxime hyemis iniuria tibi relicta, mittere ad me dignatus es. Eam aliquandiu suspensam domi reliqui. sed hodie primum (Calendis Iunij) cum radicem eius plantam siccam animaduertentem terræ immisi in uasculo, experiundi gratia: & forsan arenae per se, aut cum terra permixtae, immisisse præstitisset. Audio alios quos multis annis domi suspensam seruare, arena tantum, quæ interuallis irrigetur, linteo alligato circumposita.

Amomum officinis falso dictum, V. Hoc (inquit) quibusdam Petroselinum Macedonicum uidetur, aliis Sison.

Anagyris, G. cubitalis ferè. Cacumen uere resecuri, quod per brumam aruerat: quam causam esse puto, ut malignius germinet. Anagyrida sapius, sed non ueram, habui. Faba erat unicolor, cœrulea, cum uarii coloris, ut Ricini esse deberet, V.

Anemone montana. (si ita uocare placet,) uel Pulsatilla Italarum (Ruchschell Germanis), bis in horto mihi plantata, durauit paucis mensibus, postea euanuit.

Antoniana, uel S. Antonii herba foliis hirsutis, sponte circa riuos & fossas nascens, rarior in uentulæ uisibus, G.

Apii crispi nomine herba ex Italia missa ab amico, syluestris, ut apparet, nec Apii seu Petroselini uulgaris odore æmulum, G. Veteres Apii crispi nomine herbam satiuam intellexisse uidentur. Plinius libro uigesimo capite undecimo Apium fœminam mare nigrius, acrius & crispius facit, tanquam generis unius duæ sint species proximæ. Theophrastus non aliter quam cultu differre ostendit, hist. lib. 1. cap. 5. Apium, inquit, si satum conculcetur, cylindricè spissetur coarcteturque, crispum aiunt prouenire.

Arisarum, G. quod tu nuper misisti mi Calceolari, foliis oblongis ut Matthiolum pingit, &c. Et forsan ad idem genus pertinent, bulbuli illi Auellani paulo minores, summæ acrimonie abs te missi: quorum superficiem & herbam uideri opto. Commisi quidem aliquot eorum terræ, succo enim pleni erant, sed an prouenturi sunt dubito. Intrinsecus pulpa candeat, cortice foris fusco, in nonnullis etiam articulato, & Trasi dicti radiculis per similes figura ac magnitudine. Hanc adolentescentes lasciuiores per lusum inter se gustandam præbent. Cogit enim nimio feruore aperto aërem captare cum qui gustarit, cum astantium risu. Stemptio

autem aceto feruorem extingui aiunt. Sic & radicis illius, quam a te primum siccam accepi, necdum herbam noui, qua in uino infusa Fabæ magnitudine, eoq; ante coenam per horam circiter, admixto simul alio uino, epoto, omnis cibi appetitus tollitur, irrisione quadam lasciuorum adolefcentium, itidem antidotus est haustum acetum.

Aristolochiam rotundam & Pistolochiam, V. ante triennium seuit: sed nihil apparuit: ut ne mihi quidem, cum illarum utranque & longam non semel seminarim.

Asparagum Italicum audio nonnihil a nostro differre: & in nonnullis Germaniæ hortis crescere. Syluestris Asparagi illius quem Corrudam appellant semina ex Bononia a Luca Ghino olim accepit, V. Sed ex illis satis nihil emicuit.

Asphodelus luteus, pulcherrima planta, Volmario fructum tulit præterito anno: sed uasa (inquit) inane semen ferebant: estq; adhuc superstes. Habet & Asphodelum album. Luteus, (id est floribus ceu liliis luteis, & eiusdem coloris radice) caule procero, & floribus superiore parte referto, totoq; foliato, superiori æstate florebat Augustæ in horto generosi uiri D. Vlrici Fuggeri. In hortulo meo trium generum nascitur: Vnus maior, & propriè dictus Asphodelus Dioscoridi descriptus. Is folia a radice nunc circiter tredecim habet, duos dodrantes longa: bulbos radices quam plurimos: sed caulem nondum ostendit, etsi ante tres aut quatuor annos, si recememini, e semine mihi ortus. Alius, mediæ magnitudinis, radice lutea, oblonga, non bulbosa, foliis ferè totidem a radice, similiter triangulis ut superior, minoribus, sex digitos longis, sed malignius crescere uidetur: sapore acri satis. Tertius minor, foliis subteretibus, cepitiis ferme, non tamen cauis, dodrantalibus, caulibus bipedaneis, ramosis, ab una radice pluribus: ita ut alii semina ferant, & nouus semper subnascatur, flores albos egregios sustinens. Flos non maior Leucoio, seminis constat foliis, linea fusca medium quodq; folium distinguente, apicibus intus luteis: calyx nullus. Fructus in caulibus deinceps per interualla magnitudine Pili breuibus pediculis affiguntur, tripartiti, luteo (si immaturos premas) liquore pleni: in quibus semina terna, fusca, uaria, triangula. Radix subest non longa nec bulbosa, ni fallor, fibris multis albis subnixa. Superioris anni uere hunc cum seuissem, autumnosubsecuto floruit: sed semen perficere non potuit. Inchoatum uerò, hyeme tota, in cellam uinariam repositus, retinuit, & uere perfecit: & simul in eodem caule, qui iam aruisse uidebatur, flores rursus edidit: mox uerò nouos in nouis cauliculis, floretq; etiam nunc initio Iunii: & florum æstate tota futurorum spem facit, ut meritò Anthericum ueteres Græci Asphodeli caulem excellentia quadam a floribus denominarint. Hoc genus aliqui, ni fallor, maritimum cognominant.

Althæa diutissime durat, quamuis enim radix uetus quarto ferè anno interit, enascuntur tamen nouæ e uetere.

B.

Balsamina quæ & Momordica, Volmario Eslingæ bis ad maturitatem peruenit, altera sæpius.

Blattaria luteis & cœruleis floribus Norimbergæ in horto Ollingeri.

Borrage & Buglossus, albis utraq; floribus, ibidem.

Buglossus, G. albis floribus.

Bulapathum in horto, V. maius Hippolapatho, quod Rhabarbarum monachorum uocant.

Bulbocastanum aliquot annis habui, nuper uerò amisit: quoniam autumnosuperiore transplantaueram, nec satis profundè, ita ut Bulbus frigore nimio proxime hyemistæsus sit. Viret autem hyeme, æstate euanescit.

C.

Carpesium. Vide Phu saxatile.

Calamintha odore Pulegii, cuius officinis Gallicis usus est, paucissimis Germanorum officinis nota, V. G. Stirpes eius singulas non ultra biennium durareputo, sicut & Calaminthæ montanæ nostræ.

Cerinthæ

Cerinthi Plinii, V.

Chamelææ binæ plantæ aliquando prouenire Volmario: quarum una deinde in cellario periit, altera hyemis iniuriam perpeffa sub dio (texerat enim stramine) cum ad Februarium usq; incolumis peruenisset, à quodam nebulone euulsa est.

Chamæmalum nobile, ut uocant, G. Puto autem singulas plantas non ultra tertiam æstatem durare. prima quidem non florent. Dodonæus hanc Camomillam Romanâ uulgò uocari ait à Germanis inferioribus; sicuti & luteâ odoratâ, quæ duplex est: una capitulo foliato, altera sine foliis. utranq; ex Hispania primò aduectâ.

Chamæmalum rubris floribus, Ollingerus. Anemone quorundam fortè.

Chamæmalum nobile, (Parthenium nobile Trago,) frigoris & hyemis quantumuis duræ, contemptrix herba, prouenit in muris sepibusq; & aliis quibusdam locis. Circa Metas urbem, Bipontiq; & alibi in hortis colitur. Per terram sparsa procumbit, ac facillimè ubicunq; humum attigerit, radicatur, haud aliter quàm Serpyllum: quare è surculis decerptis sine negotio plantari potest, Tragus Chamæmalum quident uulgare, annua herba est: bisq; anno floret, uere primùm inter segetes: dein de autumno in agris rapitiis.

Cisthum oblongis, non rotundis, foliis bis orientem uidit Volmarius, & ad mediocre incrementum ei prouenit: retinuitq; in longam usq; hyemem straminibus tectum: tandem amisit.

Citraria. Vide Melissophyllum.

Cnicus, G.

Colocynthis, (id est, Cucurbitula) amara & medicata, alium purgans, alia minor est, medicis in usu. Alia maior, figuris differens. est enim oblonga quædam & flaua: & alia rotunda, uaria. Alia fessilis ferâ, nigra, maculata, magna instar Cucurbitæ: & differens ab hac fessilis alia minor: quas omnes audio Basileæ in hortis medicorum quorundam inueniri: & ego Laufannæ olim ex illis quasdam alui.

Colutea ut quidâ uocant, Senæ cõgener, ut Ruel. uult, V. G. Semina è matre prolapsa sponte crescunt. Cordus in alpinis sponte nasci asserit, à Brennero usq; in Italiâ.

Conyza uera minor, ut ex odoris præstantia conicit, Volmario crescit quam altior uno pede, quod culturæ dandum putat. Hæc serò admodum ad Arcturi ortum, ut Plinius dicit, florem fert, aliquando tamen anticipat, V.

Costum amarum simul & dulcem Tubingæ in horto Fuchsi medici, & Stuttgarti in illustrissimi principis horto prouenire, aut certe prouenisse nuper audio, illius radicem cum acrimonia amaram esse, huius acerrimam.

Cotula foetida uulgaris, crassioribus foliis, plerunq; inter segetes nascitur, annua (ni fallor) herba. Est & alia non foetida, priori similis; item alia, tenuibus Fœniculi foliis (aut Mei) breuioribus, hyemem sustinens, amara admodum, G. Semen amicum quidam Lugduno missum communicauit. Floruit æstate superiore: et hac etiam florem eius proditurum expecto. Chamæmalum amarum dixeris.

Crithmus, uulgò Creta uel Salsa marina, Ollingerus. Amat solis reflexum ad parietem, & salugine gaudet. Periit Basileæ docto cuidam uiro, nimio frigore. Floret anno secundo. Volmario Esflingæ aliquoties satus, nunquam produit.

Croci bulbi, domi forte neglecti autumno floribus emissis se produnt. Hos ego superiore autumno plantauit, qui deinde folia emisit, quæ tota hyeme & uere habuerunt: nunc (Cal. lunii) marcescunt.

Crocus montanus bene durat in hortis, sed rarò floret. Floruit mihi quidem bulbis annuus superiore Martio, cãdido flore, Croci omninò sed inodoro, sed nullo semine relicto, syluestres copiose & florent & semina relinquunt. Folia citius quàm in satiuo euanescent.

Cyclaminum Italicum orbiculatum, non oblongum ut Rhæticus est, Volmarius bis florentem duobus annis habuit: sed superiori æstate ei periit. Mihi loco umbroso plurimis iam annis durat.

Cucurbita quædam fessilis, rara, alba, lata, compressa ab altera parte: planta pau-

Vu iiii

STIRPIVM APPENDICIS

lo maior est Cucumere. Margines partis latioris crispis ueluti funbris eminent, Basilea in horto Io. Bauhini medici.

Cynoglossus minor, ni fallor, appellanda herba, multis uirgis pedalis aut longioribus, foliis Scorpionis palustris ferè, simplicibus, nulla à medio neruo fibra, asperis: floribus Pulmonaria Plinii, cœruleis; radice longa, nigra, lignosa, G. Circa Scaphusiam sponte prouenit: & Badæ in colle ad dextram supra Limagum flumen.

Cytisus meus iam bicubitalis, rudimenta florum ostendit, Iunii die 3.

D.

Daphnoides è Sabaudia missum, ubi ad lacum Lemanium sponte prouenit, autumno superiore plantatum uiret mihi adhuc, sed non satis lætum, & tenuioribus foliis, quæ ad Daphnoides nostrum uulgare, (quod Piper montanum Itali uocant,) ferè accedunt.

Daucus Creticus è monte Baldo, (unde in hortum tuum translatus mihi communicasti optime Calceolari,) satis pulchrè uiret. Eundem puto (aut certè simillimum, eiusdemq; generis, & eisdem uiribus,) in altioribus apud nos montibus inueniri, ut quem circa Lucernam, Pilati uocant: & ab incolis male uocari *Wolfswurts*, nulla (quod sciam) ratione. Aconitis enim hoc nomen debetur. Radices aliquot longiusculæ, uergetæ & carnosæ subsunt, odore saporeq; Dauci syluestris communis. Foliola angustâ; coliculi subhirsuti albicantes.

Daucus palustris à me dictus, pluribus annis translatus in hortos durat.

Dauci syluestris genus, foliis ferè Cicute, nigrioribus, radicibus oblongis, nigricantibus foris, sapore Pastinacæ: caule sesquicubitali. Folia etiam digitis attrita, subdulcem Pastinacæ odorem spirant. Aliquot iam annis in horto mihi durat. Nasctur autem sponte in semitis uinearum graminosis. Meminit eius Cordus, ni fallor, alicubi, nescio iam quo nomine.

Digitalem purpuream loca opaca amare audio, & sponte cum alibi tum supra Curiam Rhætorum nasci.

Diospyrus dicta à quibusdam arbuscula, foliis ferè Rosæ, Pomo Cerasi magnitudine ferè, umbilicato, cœruleo, specie & figura omnino Vitis Idææ, adeo ut uel Lotus alpina dici mereatur. nam & suauis est fructus, & ita aptus stomacho: ut qui copiose etiam ingesserit, non grauetur. Semina insunt quina, ruffa, latiuscula, rariorem Pyri: sapore etiam non dissimili. Succus pomi est lenis, dulcis, aquosus. Nasctur in Albio monte uicino urbi nostræ. Quidam *Slåbirtle* uocant: unde nos Pyrastrum Idæam uel petræam uocare poterimus. In hortum translata anno superiore, uiuit quidem adhuc, sed malè.

Draconis uel Tarchi hortensis unius radices diuelli possunt, et plantari, ut ex una plures proueniant. Fimo equino sub hyemem muniri debet. Syluestris & serratus durat quidem in hortis, sed durior est quàm mitescat cultu.

Dracunculum minorem, cuius folia albis uenis insignia sunt, perq; hyemem durant, ad duos annos habui, dein sine pistillo & fructu perijt, V.

Dulcem radicem ante aliquot annos plantatam, autumno proximo effodi: & radices magnas oblongasque, quæ rectâ in terram descendeant, amputatas in usum seruauim. Capita uerò radices unius in quinque partes distraxi: quæ rursus plantatæ crescunt, sed parum adhuc, primo scilicet anno. Ex iis quas mercatores afferunt uiridiores, quæq; germina aliqua ostendunt, deligi plantandæ possunt.

E.

Echium minus appellârim herbâ in horto meo nascentè, à nemine (quod sciam) depictam aut memoratam: quæ prima facie Lithospermis cognata uideri potest. Caulis est trium uel quatuor dodrantum, (herba tota aliquando trium cubitorum,) teres, solidus, asper: inq; uirgas multas & longas diuiditur, æquales ferè, ut quænam ex eis potior sit, non facile dicas, & caulis primitiuus totus in illis consumitur. Lentæ & flexiles hæ uirgæ sunt, & in terram procumbunt, nisi fulciantur. Ab iis certe ramosum

ramosum aut fruticosum genus hoc Echii cognominari meretur. Est quando etiam alter caulis, a radice statim exit, & forsā plures interdū. Radix recta descendit, parua, brevis, alba, uel subrubra etiam, lignosa, singularis, minimis & perpaucis fibris prædita. Folia sunt Oleæ ferè uel Scorpionidis palustris cœrulei, similiter carnosamodice, & neruo medio simplici nō fibrato, simplicia, hirsuta & aspera: albicantia et magis quidem supina parte: insipida, nisi quod herbaceum quiddam sapiunt, ea nullis petiolis adherent coliculis, singula, maioribus interuallis inferius. Si mandas, asperitate quadam inter dentes collisa crepant. E foliorū alis (circiter dodrantem aut amplius supra radicem) foliola quina stellæ instar radiata surgunt, perbreui sed crasso pede, qui è cauliculo oritur, nixa, in quorū medio flosculi sunt albi, parui, caui, quinque partiti, uulsiiles ut Buglossi: & (ni fallor) singuli semper, intra barbula illas quinas seu radios quibus cōtinentur cōiunctis: nō enim seaperiūt aut radiantur donec perfectū sit semen. incipit autē florere ab imo. Flosculis succedūt semina singula, bina, ternā, uel ad summū quaternā, Echii omnino seminū magnitudine & figura, uiperæ caput quodammodo referēte: latitudo enim superior utrinque ceu in oculos leniter protuberat, & antrorsum attenuatur tanquam in rostrū: inferior pars utrinque depressa, in medio prominet instar carinæ inuersæ. Hæc cū scriberem Iunii mensis dies 8. erat: & flosculi in summis tantum coliculis uisibantur ad pollicis altitudinem, inferior pars omnis semina ostendebat. Herbam annuam esse puto & uiribus Echii præditam, ostentante in ipsa seminū facie natura, cui usui produxerit hanc herbam. Ignatiorem tamē Echii dixerim, quod minor, tenuior, annua, & inutili radice herba sit. Echii quoque temperamentū ei attribuerim, primo gradu refrigerans, medium inter frigidum ac humidū, & abstergendū uim. Quod si quis hanc herbam Lithospermopotius congenerem fecerit, non pugnabo. Val. Cordus certe Lithospermū maius quoque ad Echii et Anchusarum genus pertinere ait, idque ueteres nō animaduertisse.

Elleborastrum, G. Sic autē appello herbam Abrotōni penè foliis, radicis forma & uiribus Elleboro nigro respondentem: unde & Tragus Elleborum nigrum alterum appellat: aliqui Consiliginē esse somniant: Cordus si bene recordor, Buphtalmum. Sed forsā ad Anemonas potius referenda fuerit. Flos in ea luteus, magnus, uernus, solē sequitur. Semen est nigrum, mali ferè seminis figura & magnitudine, id carnosa quadam laxa substantia, partim uiridi, partim alba ambitur. Hærent autem semina plurima connexa in pilula, maiore quam Auellana plerumque, subrotunda uel longiuscula. maturēscunt ea & legi debent Cal. Iunii ferè: idque maturē. decidunt enim seruato uisore suo, antequam plenē matura putes.

Ellebori nigri, (præter Consiliginem nostram ueram, quæ & ipsa Ellebori nigri species omnino est, & iam dictum Elleborastrum,) species tres, G. Harum una Elleborus niger uulgaris est: altera per similes uulgari, sed foliis maioribus, longioribus albioribusque, sceminam dixeris. allata mihi ē uicinis lacui Lario locis. Tertia Italica floris purpurei: cuius radicem unam tu misisti suauissime Calceolari: quæ longo itinere humidior flaccidiorque facta, metuo ne nō apprehendat: superficiem quidem statim rescidi.

Eruum album & rufum ex Italia, Italici puto Mocho in Hetruria dictum, G. quorum utrumque quoniam summa illa amaritiei, quam Orobo, id est, Eruo tribuit Galenus, caretian uerus sit Orobus dubitari potest: eruditū quidam ut Fuchsius, ni fallor, pro Cicercula accipiunt.

Eryngii duas species a Luca Ghino missas accepit Volmarus: unam cœruleis, alteram subcœruleis floribus, mox ad albedinem tendentibus: posterius Eryngium maritimum esse puto, foliis rotundis. Utrumque semine non primo, sed altero demum anno oriri obseruauit idem V. Eryngium magnis latisque florum ac seminum capitulis (unde aliqui improprie Rosam Hierichuntidem uocant,) foliis angustis, ualde incis, amplissimum, prouenit anno superiore in horto illustris uiri D. Virici Fuggeri Augustæ.

Ficus Indica uulgo dicta, (cuius ante triennium folia terna coniuncta plantâ-

XX

STIRPIVM APPENDICIS

ram,) sub finem hyemis anni huius 1561. Martii principio, folia habebat marcescē
tabidāque, non ut prius, hydropica, nec decidua, cum ne ui quidem reuellere potue
rim: quod miror, cum ter aut quater illa hyeme rigauerim: intus quidem puncta e
rant rubra.

Filicum species diuersæ, G. Fœmina: sic autem appello, quæ pluribus ab una
radice foliis germinat nullo caule: multis iam annis horti mei incolæ: mollior uel te
nerior aspera, de qua nunc dicemus: & durior molli, foliis modice incis non cuspi
datis, coliculis lanuginosis, fœminæ similis, foliis pedibus, angustioribus, non
ita latis in medio. Foliorum partes subrotundæ, singulæ suis marginibus asperissi
sculæ sunt, & mucronem perexilem breuissimūque erigunt. Folia nouem aut de
cem ab una radice prodeunt. Nervus medius folii parte auersa hirsutus est, lanugia
ne ruffa. Potest autem aspera cognominari: sicut mollis altera, cuius molliora & al
biora sunt folia. Asperæ similis est hæc, sed folio breuiore aliquanto, & nulla nerui
medii lanugine. Exit & ipsa (adultior forte tantū) in aculeos foliorū marginibus,
sed molles. Videri poterat eadem asperæ, ætate tantū minor: sed omnino species
est alia. nam aspera lanuginem habet in neruis, ut cunq̃ teneis adhuc & recentia
bus foliis, hæc non item. Est & alia similis molli, foliis dodrante paulo longio
ribus: quæ supina notantur punctis ad luteum uiridēque & album colores mix
tos tendentibus. Lanuginis in neruo inferius aliquid subest, sed parū. Crescunt
hæ Filices omnes in sylua, quæ horæ itinere ab urbe nostra abest, inter Septentrio
nem & Occidentem. Palustris uerò circa lacum Felium duarum ab urbe horæ
rum itinere. Dryopteris uerò (ut aliqui uocitant) palustri similis, sed minor, &c.
in collibus diuersis, præsertim Badæ infra Thermas statim iuxta fluuiū ad læ
uam: ubi & Filix quædam minor, læuis candidiorque, foliis ualde incis & mol
libus nascitur: quam & alibi in muris reperi. Mas ubiq̃ nascitur, procerior unius folii
pede, alius duriori folio, alius mollior, tanquam duæ unius proximi generis species
sexu distinctæ. Præter has alia etiam Filicum genera à Baubino obseruata in pro
pinquis Tiguro syluis, & in horto mihi recens plantata nunc non describam.

G.

Gentiana maior, foliis magnis, latis, subcœruleis, hoc tempore denis, & caule
iam dodrantali, nescio ante quot annos cum radice primū plantata: paulatim
forte intra paucos annos ad iustam proceritatem mihi assurgit, ac flores produ
cet.

Geranii maioris species tres: quorum unum foliis est magnis, figura ferè & ma
gnitudine Aconiti lutei, hirsutis, asperis: alterum ei simile, minoribus paulo foliis,
asperioribus, nigrioribus, ueluti mas in eodem genere. G.

Gladiolus Indicus, quem tu nuper cum aliis plantis diuersis liberalissime Calceor
lari donasti, G. Typhæ fere similis, foliis insipidis: radicibus albis, & earum nodis
Filipendulæ similibus.

Glaucium superiore anno Basileæ in horto nascebatur excellentissimo medico
Theodoro Zuinggero.

Glaux, G. E semine ex Italia misso, herbula foliis glaucis uel incanis, hirsutis, ter
nis ut in Loto herba, quibus succedunt alia bina ad caulem, gustu astringenti. Se
cunda iam æstate in horto mihi uirens nondum floruit.

H.

Hippomarathrum semine maiori quàm uulgari, magisq̃ medicamentofo. Lo
cum maxime apicum requirit, difficulter & serò ad modum maturescens.

Hyoscyamum albis floribus in horto habuit olim V. habetque etiam nūm
Ioannes Schmidlappius, egregius Schorndorffii mercator, rei q̃ hortensis studio no
bilis.

Hyssopus moschata uel Cilissa, à Cilicia regione, G. odoratio nostra uulgari
hæc est, moschi fere odore quodam: sed, ut audio, breui degenerat, locis præsertim
umbrosis, & ad nostram accedit. In hac miratus sum, quod cum prima æstate flo
reat,

reat, perennet tamen, nescio quandiu durans, iam enim secunda tantum æstate, mihi uiret. Germinare citius uidetur quam nostra, & seminibus deciduis seipsam proleminat. Vide etiam in Abrotono.

I.

Iris Illyrica, G. nuper à te missa, mi Calceolari, similis ferè nostræ Iridi syluestri mihi niori, quæ in pratis humidis aliquibus, et si paucissimis inuenitur, nec diu durat in hortis.

L.

Lachryma Iodoci, (aliis Iobi,) Milii genus, inquit V. Ferè ad maturitatem mihi peruenisset, ni præmaturo frigore adustum fuisset.

Lacucam Romanam Basileæ quidam in hortis educunt, folio similem Seridi, & in cibo suauem, ut audio.

Lapathi genus minus acidiusq; Oxalis dicitur, cuius semē difficulter colligitur, nam subito decidit priusquam probè maturescat. Huius species una rotundioribus est foliis: altera oblongioribus, & pratensi similior, sed tenerior, &c. G.

Lapathum rotundum, G. Id hoc anno Io. Fabricius Ecclesiæ Curienfis apud Rhætos pastor, doctrina & pietate eximius ad me misit. Folia habet rotunda ferè, radicem transversam. Nascitur in montibus supra Curiam, & non procul Friburgo Helueticorum ut audio, aliqui Rhabarbari nomine appellant, propter similitudinem aliquam, nam uero quoq; Rhabarbarico in Perside nascenti folia rotunda tribuunt.

Laurus Alexandrina, Bonifacia uulgo, (nostris Zäpfletraut. Vuularia,) quam tu hoc uere cum cæteris plantis dono misisti, ornatissime Calceolari, pulchrè adhuc in hortulo meo uiret: & cum Rusco cognationis aliquid habere uidetur, unde similiter faciliè diutissimeq; duraturam mihi polliceor.

Leucoia quatuor generum, alba, rosea, seu purpurea, rubra & punicea. Voco autem hic punicea, quæ rubro colori, cœrulei aut nigri ferè parū addiderūt, (bunrot Germanus diceret.) Vide distinctionem Dodonæi. Diferens ab his genus est Leucium illud albū, quod recentiores aliqui Violam matronalem uocant, Hispanicam (puto) Solerius, alii Hesperidem. (Tragus Persicam uel Parthicam Herm. Barbari Violam, hanc esse putauit: cum Barbarus disertè, nō hanc, sed lasminum, uel leseminum uulgo dictum sic appellari posse censeat, &c.) Germani quoniam benè ferat hyemem, Violam hyemalem uocant, nostri à Pentecoste uel Maio denominant, quò tempore fleret, incipit autem secunda æstate demum.

Lisbanotis Volmario semen protulit, quod tamen ab eo satum nō prouenit, & tandem perit.

Lilia rubra duorum generum: quorum alterius semen simile est semini Martagonii Italorum, V. Martagon illud, quod Lilium croceo colore fert, secunda aut tertia forsan æstate oritur, Idem.

Linariæ uulgo dictæ species montana, parua, ut Sedum paruum ferè referat, floribus cœruleis, G. Nascitur circa Curiam Rhætorum, & alibi in montibus.

Lonchitis altera seu aspera, quam Matthioli pingit, tuum donum Calceolari, belle mihi uiret ad parietem umbrosū plantata. Eandem, ni fallor, reperi superiore anno in colle inter Badam nostrū oppidum, & balnea ei subiecta, supra dexteram Limagistui ripam. Aliam montibus nostris familiarem Tragus Aspleni syluestris nomine exhibet: quam Ghinus & Maranta Lonchitidis nomine digniorem existimasse uidentur.

Loti arboris (quam Ledonnier Monspelii uocant) ramulus refractus, & terræ mandatus superiore autumno, mihi crescit. Arbuscula è semine iam ferè quatuor cubitos æquat.

M.

Maluam arboream habuit V, brachii crassamento, quæ ei & flores & semina protulit: postea perit.

Xx ii

STIRPIVM APPENDICIS

Malus quædam prope urbem nostram non floret, & fructificat tamen.
Mandragoram V. uel ter prodeuntem uidit, sed nunquam alterum ueris tem-
pus attigit.

Martagon. Vide in Liliis.

Medica, satis respondens descriptioni Dioscoridis, sed semini nulla in condimen-
tis gratia, V.

Medion purpureum à quibusdam dictū, in horto alit V. sed minime (inquit) Me-
dion est, planta nonnunquam binos cubitos æquans, cognata huic, ni fallor, quam
Fuchsius Campanulam uocat: nam & hæc flores campanæ forma fert, sed triplò fer-
mè maiores quàm (Campanula) nostras. Oritur autem è semine, nō primo, sed secun-
do demum anno. Vide Viola Mariana.

Melissophyllum Fuchsii, uel (ut quidam appellant) Citraria, (nomine ficto nimirum,
nulli uerò genti usitato,) V. Vulgaris quidem nostra Melissa (inquit) ut offi-
cinæ uocant, odore Citrum quàm proxime refert: utcumq; quidam delicatuli ad eam
tanquam cimum foetore infamem nausent. Citraria uerò illorum nullo citri odo-
re (quanquam nomen id præ se ferat,) commendabilis est. folia etenim Vrticæ po-
tius odore imitantur. Florum odor quidem gratus, at nihil Citri in eo. Sic ille. Ego
Citrariam illam, Lamium syluaticum maius appellarim.

Mentastrium foliis orbiculatis ferè instar Menthæ, nobilioris crispæ, rarum apud
nos & officinis ignotum habet V. Huius semen (inquit) non ortum est mihi primo
anno, sed sequenti, aut forsan tertiâ æstate.

Molyza Hippocratis, id est, Allii genus simplici capite, in hortis quidam alunt,
& Hyacinthi speciem imperiti quidam esse putant. Eius pictura à nullo adhuc, quod
sciam, exhibita est.

Myrrhis ab eruditis quibusdam existimata herba, à nemine adhuc picta, aut de-
scripta quod sciam, G. Matthiolus Myrridem suam, quamuis raram & ab aliis non
positam, pinxisse, contentus non describit, ut solet plerumq; id quod libenter dico,
non quidem eū reprehendendi gratia (ut maleuoli accipiunt,) sed ad aliquam descri-
ptionum diligentiam in rebus obscurioribus adhortandi. Nostra caules ab una ra-
dice producit plures, rotundos sesquicubitales ferè, hirsutos, & leuissima substantia
alba infarctos, dulces & odoratos mansu. Folia habet magna, forma ferè Cicutæ, dul-
cia, & sapore ferè Chærefolii, mollia & hirsuta. Umbellæ Cicutæ, floribus albis con-
ditas. Floret anno secundo, initio Maii: Semina subnascuntur oblonga & magna, e-
minentibus angulis striata, digiti transuersi longitudine, gemina, & in geminū mu-
cronem exeuntia: dulcia, sapore Aniso proxima, intus alba, sex aut nouè ferè ab uno
principio. Hanc descriptionem ex tempore ad plantam unicam, quæ in horto erat,
descripsi. Radicem nondum inspexi. Cognationis aliquid cum Chærefolio uulgari
habere uideri posset, si uel minimum, ut illi, liquoris ei inesset: quo prorsus caret. A-
lia uidetur Myrrhis Anguillæræ, floribus luteis. Hæc nostra præ cæteris mihi ue-
sterum Myrrhis esse uidetur: in hortis coli dignissima.

Myrti arbuscula, quam misisti recentem Calceolari, non crescit mihi, etsi diligen-
ter in uase plantata: ut neq; semina terræ hoc anno, & superioribus non semel, man-
dara. Vnde à nostro cælo eam abhorre conicio.

N.

Narcissus albus uel albis floribus, quem Dioscoridis esse retur, V. qui Narcis-
sum album quoq; non primo, sed secundo anno è semine nasci monuit. Val. Cor. re-
fert (inquit amicus quidam meus in epistola ad me) quempiam Tridenti & Vene-
tiis coli, qui uere flores ferat, & nonnunquam etiam autumnō ante brumam, foliaq;
illius etiam ante hyemem prorsus erumpere, quorum neutrum in meo uidetur. nam
folia prodeunt Februario, flos uere: sed nunquam bis florentem uidi. Theophrasti
etiam Narcissus, diuersus ab illo est. nam caulem cum flore porrigit, foliis exitū tar-
dantibus usq; ad reslorescentiam: terq; ait florere anno, tria q; sationum tempora o-
stendere. Hæc ille: cui respondeo: in Theophrasti lib. 7. cap. 12. Historiæ, ubi hæc de
Narcisso

Narcisso traduntur, mendo sum esse locum, & pro Narcisso, quoties eum cum Scilla nominat & confert eo in capite, legendum esse Crocum, tum rei ipsius ueritate id indicante, tum Plinii testimonio libro uigesimo primo, capite decimo septimo, ubi locum hunc Theophrasti transtulit. Quod nisi pro Narcisso Crocum legas, Theophrastus ipse sibi aduersabitur, semen manifestum Narcisso negans, quod paulo ante ei attribuerat, eodem in capite scribens Lirium (solet autem Narcissum alio nomine Lirium appellare, ut libro sexto capite sexto constat,) manifestè è semine provenire. Libro sexto certè capite sexto, quanquam locus est mutilus, fructum Narcissi decidere & sponte germinare scribit: & qui legunt, inquit, defigere eum solent, Est autem serotinus admodum cum post arcturum & circa æquinoctium floreat. Mox uerò capite septimo Narcissum inter uernos flores, qui Violam nigram etiam præueniat, ponit. Quorum utrumque uerum erit, si bis anno floret, uere autumnocp. Ter quidem anno eum florere nusquam dixit Theophrastus: nam ut concedam libri 6, capitis 1. Narcissi nomen ubique rectè legi: non tamen ter eum florere scribit: sed Scillam solum ter florere ueluti obiter admonet: hoc uerò ex professo & Scillæ & Narcisso commune facit, quòd utraque florem aliquandiu ante folia emittit, &c. neque reflorescentis Narcissi mentio fit, ut malè uerit Gaza, una litera deceptus. Legit enim *αὐτὸν*, id est, reflorescit: pro *αὐτὸν δὲ*, id est aruerit. Sic autem uerti debet. Fructum conspicuum non parit (Crocus uidelicet, non Narcissus:) sed ipse flos una cum caule marcescit: & postquam aruit, tunc folia exeunt. Hæc ex meis observationibus te celare nolui. Theophrasti certe codex Græcus, innumeris in locis perquam uitiatus est: & Gazæ translatio mala: quibus uitiis qui mederi uellet, non utriusque solum linguæ peritum esse oporteret, & ipsos Theophrasti libros diligenter euoluere, ac inter se conferre, Historiæ præsertim cum illis qui sunt De causis: & quæ ex eis transtulit Plinius: sed insuper iudicio præditum esse acri, & Stirpium ipsarum quas memorat Theophrastus non uulgarem habere cognitionem. Quæ omnia uix in unum hominem cadunt. Conabar ego iam dudum hac in re aliquid: sed crescente ætate, ualetudine infirmiore, & uariis negotiis impeditus, aliis hunc laborem relinquo. Præstabit autem hæc omnia breui (ut spero) feliciter R. Constantinus, uir summæ in utraque lingua doctrinæ, & artis medicæ Stirpiumque historiæ scientissimus: ut & alii quidam editi ab eo hæcenus libri testantur: & edendus breui totius linguæ Græcæ incomparabilis Thesaurus amplissime declarabit. Ab hoc etiam, quoniam se totum Reipublicæ literariæ deuouit, Theophrastum sua lingua emendatum, una cum duabus translationibus latinis, altera Gazæ altera cuius ipse autor est, Annotationibus quoque & Iconibus Stirpium adiectis breui expectamus, & omnia interim ad perficiendum hunc conatum quam felicissima ei precamur.

Nardus Celtica ad sesquiannum mihi durauit in horto, diligentia quidam adhibita, diutius durare posse uidetur.

Nasturtium Hispanicum in quibusdam Germaniæ hortis colitur, maius (ni fallor) nostro: & unum forte ex prædictis Nasturtii speciebus.

Nasturtium alpinum hortensi minori per simile, minus iam altero anno mihi durauit, & semina protulit.

Nasturtium hortense aliud est foliis simplicibus, pollicem latis, tres longis: idque uel læue & albius, uel subhirsutum minusque album. Aliud foliis ualde diuisis, hoc etiam duplex ni fallor: minus scilicet, ac maius, quod ad Ranunculi pratensis folia tum forma tum magnitudine accedit.

Nigella agrestis & sponte inter frumenta proueniens, odore. Officinarum Nigellam referens, sed tamen inferior, V.

○

Ocimoides croceum durat aliquot annis: licet primo anno floruerit. Mihi enim hoc anno pulcherrimum est in horto, quod anno superiore satum uere, æstate prouecta flores, sed paucos habuit:

XX iii

Olusatrum, (Matthiolo Smyrniū, officinis Petroselinū Macedonicū.) fa-
pius (inquit V.) mihi ortum, semper absq; fruge perit. Schmidlappio uero (merca-
tori Schorndorffii) cui semen communicāram, & flores & semina edidit.

Onobrychis, Galega uel Castracan Italorum, V. G. Inclinat quidem Cordus, &
alii nonnulli, *Onobrychin* esse hanc plantam, sed meo iudicio (inquit V.) esse non
potest: nam dodrantalem Dioscorides facit, cum Galega duos cubitos multoties æ-
quet.

Origanum Creticum, V. Vulgari (inquit) quod quidam *Tragoriganum*, alii
sylvestre *Origanum* esse uolunt, planè simile, nisi quòd flores albos habeat. Idem in
meo hortulo pulchrè uiret, anno superiore seminatum, & hac æstate eius flores ex-
pecto. Odoratus & acrius nostro est: sed paulatim degenerare V. obseruauit.

Orminum uerum quorundam, coliculis summis pulchre cœruleis, ita ut flores ui-
deri possint. Depinxit id Matthiolum, sed foliis latoribus: quæ longiuscula & lon-
giora (ut *Saluæ* minoris ferè) pingere debuerat. Semina in ore retenta non aliter
quàm *Ormini* nostri maioris, seu *Sclearæ* hortensis, glutinoso succo obducuntur.
Odoris nihil aut parum habet: annua uel potius æstiuā herba. Querendum autem
an *Sideritis* prima sit potius quàm *Orminum*.

Ornithogalum, G. quod nuper à te accepi, candidissime *Calceolari*, una cum cau-
le pedali floribus onusto, radicis bulbus albus, satis magnus & uegetus est, & tuber-
cula quædam ostendit erumpentium radicularum: unde breui multiplicatum iri
spero. Caulis ipse quidem nimium mollis & tener mox interiit.

P.

Pæonia mas & fœmina, G. Fœmina nobis uulgaris est. Maris plantam adultam
misit clarissimus Lindauia mercator Matthias Curtius, quæ plantata superiore an-
no mox floruit, sed semen non perfecit, hoc anno iterum floruit, & semen tam fert.
Habeo etiam nouellas aliquot plantas è semine mihi natas, non primo sed secu-
ndo anno. A fationis quidem tempore uix ante nonum annum florere aiunt.

Paliuri frutex ortus, & incuriosius tractatus, in horto V. frigore perit.

Panaces Chironium, ut quidam putant, herba Doria uulgò Italis, *Raphanus syl-*
uestris uulgò *Monspeli*, ubi sponte (ut audio) iuxta aquas crescit, G. *Lapathum* simi-
lis est herba foliis & caule, qui bicubitalis ferè in hortulo nostro est. Folia inferiora
circiter dodrantem longa sunt, (computata etiam petioli parte, qui & ipse foliatus
utrinq; est,) aut palmo longiora si petiolum etiam totum computes: simplicia, nisi
quòd utrinq; angulis exiguis qui in puncta candida exeunt, notantur. nervus me-
dius albicat, succo multo abundat, mollia flaccidaq; sunt, paulò postquam decerpse-
ris, ut *Costus* hortensis aut *Lepidium* ferè, satis carnosa. Sapor cum acrimonia ali-
qua amarus. Multa sunt circa radicem: in caule singula per interualla. Caulis unus
et simplex est. Florum in summo corymbi lutei, ut in *Costo* hortensi, uel *Virga au-*
rea, foliolis raris & angustis, quinis ferè, singula capitula seminum seu apicum me-
diorum ambientibus. Semen accepi à clarissimo Argentinensi medico Didymo
Obrecht.

Panacis Herculei planta, quam tibi debeo mi *Calceolari*: sed metuo ne longo iti-
nere infirmata radix intereat: superficies quidem amplius nō apparet. Semina eius
hoc anno & alias frustra seui.

Pancratii semen Schmidlappius (mercator Schorndorffii) à me accepit, & ortum
uidit, sed rursus periit: mihi ne ortum quidem est, V.

Papauer Memphiticum, magnis & pulchris floribus multifidis, album & purpu-
reum, & mediū coloris, G. Idem puto, quod aliqui recentiores *Papauer opii* uocant,
semine coloris albi sed ad roseum uergentis, si bene memini. Dodonæus *Papauer*
fatium album duplex haberi pro dit, unum integris, alterum minutim dissectis flo-
ribus, & similiter nigrum. Nigri dissecti flores albos, roseos, & rubros, superiore an-
no hortulus noster protulit.

Papauer flore multiplici. Tubingæ in horto Fuchsi nasci audio,

Parthe-

Parthenium nobile, Vide in Chamæmalo.

Perfici arboris species Italica, fructus maiores proferens, in horto patricii Tigrini Felicis Engelhardi, mediocris iam magnitudinis.

Perfici præcox uel Armeniaca, cum femoris crassitudine truncum haberet, & nouem fortè cubitos altū, integra effossa autumnò ex horto quodam, & in prædium meum translata, pulchrè crescit, & uere quidem floruit, sed fructus non habet nunc, nec mirum primo transplantationis in tanta arbore anno.

Plugetraeum, G. Sic autem uoco Phu speciem in opacis montium saxis nascentem: quæ uel Carpesium, uel ei cognata esse herba uideri potest. Caules enim emittit multos, qui etiam si sicci exuicq̃, & ueluti *καρχα* quædam, id est festuca aridæ uideantur, multis tamen annis durat, & quotannis germinat, in calidioribus nimirum regionibus, calidioris tenuiorisq̃ naturæ.

Plantago maritima è semine nata, anni secundî mense Maio mihi floruit, foliis primū latiusculis & Plantagini similioribus, secunda uerò æstate per angustis, ceu coronopodis, sed simplicibus, duos palmos longis, trineruibus. Coliculis pluribus, ad sex digitos longis.

Polemonii prætense nostrū duplex, aliud apicibus florū albis, aliud purpureis.

Polemonii genus è monte Pessulano, Fontanoni cognominant, G. Floret mihi nunc initio Iunii corymbis purpureis, Valerianæ quadam similitudine. Flos nudus est, (sine calyce, oblongo canaliculo) Centaurii minoris specie, superius in quinque folia diuisus, apicibus per medium binis, inferius ceu calcar adhæret: suavis odoris, uesperis præsertim. Caules à radice plures prodeunt sesquicubitales, caui, albicantes, sicut & folia, læues. Folia bina sine petiolis ex caulibus & ramulis, simplicia, tres digitos longa, in acutum exeuntia, amariora quàm nostri Polemonii. Fruticosa omnino herba est.

Polium Italicum & Germanicum, V.

Polygalum Rhaetici plantæ duræ, Curia à doctiss. uiro Io. Fabricio missæ, G. Polygalum autè uoco eam herbam, quoniam & in pascuis ad lac pecoris augendū præ cæteris prædicatur, (uulgò enim aiunt, es sei das best milch fûrter,) & ad Dioscorid. descriptionē, foliis Lenticulæ è regione positis per octo uel nouè deinceps ordines, quibus unum in summo accedit, solidis seu crassiusculis, simplicibus, insipidis, subacerbis, in exiguum mucronem desinentibus, & parte supina albicantibus, hirsutisq̃. Rhaeticum autem cognomino, quoniam circa Curiam Rhætorum crescit, & abunde quidem in pratis infra Curiam usq̃ ad Riuarium lacum, nec ultra. Audio tamen etiam non procul Basilea inueniri.

Pulegium ceruinum Monspelii dictum, sub hyemem ex area in uas transtuli, id nunc mihi in horto pulcherrime uret, foliis simplicibus, angustis, oblongis, Histopiferè: coliculis albicantibus, pluribus ab una radice, rectis, pedibus, uno etiam cubitali.

Pyrethrum Germanicum V. G. Pyrethrum in Italia paludibus Pisanis prouenit eum umbella & caule Fœniculi, inquit V. in epistola ad me. Germanicum uerò acrius est Italico, si ambo exiccata fuerint. Verum autem & Pisanum si uiride fuerit (ut doctiss. medicus Henr. Munzingerus mihi retulit) multò acrius est Germanico. Crediderim in Germania quoq̃ prouenire. Tragus enim tradit in montibus perenni niue obrutis, item in sylua Hercynia, duo genera Fœniculi prouenire: quorum alterum acerrima radice sit insigne ut Zinziber, alterum multò remissioris acedinis. Dioscorides uerò Pyrethri folia & caulem syluestri Dauco & Fœniculo comparat, umbellam Anetho. Dauco etiam Cretico folia Fœniculi tribuit. Syluestrem quidem Daucum non describit, sufficit autem Fœniculo quoq̃ eum comparasse. Ex his genus illud quod acrius est, facile Pyrethrum esse crediderim. Hæc ille. Germanicum Pyrethrum superiore anno satum, nuper Aprili mense florere incepit, floribus Chamæmali ferè, sed maiore capitulo: quod ambiunt folia alba intus, foris rubentia, capituli proportionem parua. Herba ipsa Millefolium repræsentat, crassior tamen & hirsutior.

X x iiii

STIRPIVM APPENDICIS

Q.

Quinquefolium luteis floribus rectum, non serpens, V. Tale sponte nascitur circa Zurzachium Helvetiorum.

Quinquefolium albis floribus, V. Eiusdem species quædam in saxis montium nascens, G.

R.

Radix Rhodia, ut quidam appellant, perpulchrè mihi crescit, coliculis ab una radice uiginti quatuor, quorum longissimi pedales sunt, & absq; floribus; qui uerò recens è medio germinant, florum rudimenta, quinto iam lunii die, ostendunt.

Ranunculus albus maior, foliis Platani ferè, altius incilis, duplex, G. Vnus syluestris, flore simplici, sponte proueniens iuxta riuos & locis riguis montium. Fideret schi rara Bernensium uocant. Alter illi similis, sed flore minutiusculo multiplici, in hortis hiccoli solitus, G.

Rhus Plinii Monspelii dictus, ante annum Antuerpia mihi missus ab eruditissimo pharmacopola Goldenbergio, satis pulchrè adhuc uiuere; nò crescit, tamen ut uellem, necdum flores ostendit.

Ribes syluaticus, frutici uulgò Ribes dicto plane cognatus, & fructu simili, sed maiori, in syluis Bernensium, (uulgò *Xeechbeere* nominant,) sponte prouenit locis opacis: foliis parte prona hirsutis, supina læuib; (cùm hortensis utrobq; læuia habeat folia,) solidis & crassiusculis. Ante annum mihi plantatus, pulchrè adhuc uiuere, & longæ durationis spem facit.

Rhododendrū hyemis superioris iniuria mihi periit, ut & alibi aliis. Volmarius Elslingæ ante annos aliquot è duabus sibi enatis plantis, unam sub dio reliquit per hyemem, alteram in cellarium reposuit, sed utraq; perierunt.

Rosa moschata, uel Damascena Alexandrinæ, Nefrin Serapionis, ut Anguilla ra docet: magno in hortis nobilium quorundam Germaniæ uiuorum, & quidem paucorum, studio colitur: Monspelii (ni fallor) syluestris exit. Ego nuper ex amplissimo horto generosi & illustris uiri domini Geor. Fuggeri horto plantas eius quatuor nactus, plantaui. Flores nondum uidi. Folia minuta & ordine quadruplici binaria profert, quibus unum in summo accedit. Hyeme superiore pleriq; isti frutices frigore perierunt.

Rubia fatiua diu durans, & plurimùm se propagans, G. Syluestrium una communis ubiq; nascitur. Alia syluis familiaris est, eaq; duplex: una minor, & asperior; altera maior & læuior. Omnes in hortis diu durare possunt.

Ruscum ante complures annos plantaui: qui cùm fructum non ferret, & multi ab una radice coliculi prodirent, distraxi in quinq; plantas, & partim loco umbroso re, partim magis aprico posui. Crescunt autem omnes & nullum uidentur solum aspernari.

Ruta procerissima superiori hyeme mihi interiit, tribus ferè cubitis frigore perditis: & uno supra radicem relicto, qui uere repullulauit.

Ruta capraria Italarum, G. Galega uel Gralega uulgò: aliquibus herba Galeni, Gallica, Regallicum. E semine hoc anno mihi prodiit, foliis albicantibus, matiusculis, nullo insigni sapore, (gustauit autem herbam recens è semine progeneratam.) Pulchrè à Dodonæo pingitur.

S.

Sabina non maior solùm & pungens quæ Cupresso comparatur, Tiguri in hortis habetur, eaq; frequentior: sed etiam minor quæ pungit, & comparatur Myricæ, in horto Petri Figuli Lithotomi & Chirurghi optimi, amici & compatri mei charissimi.

Sampsuchum. Vide in Abrotono.

Satureia albis floribus, per hyemem quoque ut Hyssopus perseverans, V.

Scarlata flos. Vide in Viola Mariana.

Scordium, V. G. In uase quidem magno pulchrius id mihi aliquando quàm in terra

terra provenit. Proxima hyeme tectum stramine ferè computruerat, nisi cauissim:
Loco humido & palustri (sed uentis exposito) nimirum lætius proveniret.

Sesamoides minus uel *Elleborus luteis floribus*, V.

Seseli Peloponnesiacum quod *Matthiolus* pingit, è *Rhætiae* montibus allatum
proximo uere doctrina & pietate excellens uir lo. Pontifella Curiae ludimodera-
tor ad me misit: speroq; id melius duraturum, quam quod ante annos aliquot plan-
taram: nam per totam hyemem superiorem Curiae, in horto lo. Fabricii Ecclesiae pa-
storis eximii, caelo humiliori assuescere coepit.

Sferra cauallio Italis dicta herbula, *Ornithopodio* *Dodonæi* similis, filiquis in-
curuis, quarum singulae soleas ueluti equorum, per interualla aliquot referunt.

Siciliana ab Italis dicta, formosus frutex, V. Hæc doctissimo *Fuchio* *Androsæ*-
mon ueterum (ut audio) uidetur, etsi neq; flos tritus, neq; etiam folia, manus sangui-
neo succo inficiant, cum id *Hypericon* uel *Ascyron* faciat, quibus ob hoc ipsum *An-*
drosæ mi uocabulum adscitum est. multò magis autem id facere debebat *Androsæ*-
mum ipsum primario proprioq; nomine eam ob rem (ut *Plinius* exprimit) sic appel-
latum. Hæc amicus quidam noster. *Anguillara* non per S. sed per C. *Cicilianam* scri-
bit, & *Clymenum* *Plinii* interpretatur, aliud à *Dioscoridis* *Clymeno*. Ego *Plinii*
Clymenum *Hederæ* foliis, omnino pro *Periclymeno* accipio, sicut & *Clymenum*
Theophrasti. *Clymenum* uerò quod *Græcos* *Plantagini* comparasse tradit *Plinius*,
Clymenum *Dioscoridis* est.

Smilacis asperæ semen plus semel terræ mandauit, ortum illius ad triennium us-
que intactis areolis expectans, sed frustra, V.

Smyrnum, V. idq; uerum (inquit) *Dioscoridis*, ut mihi uidetur. semē etenim ro-
tundum instar *Brassicæ* profert, nō oblongum ut *Olusatrum* uel *Petros.* *Macedoni*
cum officinis dictum. Ortum est proximo uere, imminente autem *Canis* ortu, ex-
ruit herbula illius: putabamq; planè de illa actum esse, sed accedente autumnō rur-
sus emerit, atq; per totam hanc hyemis (anni 1559) clementiam, uiridis herbula uisa
est, sicut & nunc in sequuto uere. Crediderim illi apricitatem loci noxiam esse, nam
studio apricum locum selegeram, sperans me maturitatem promoturum. Semen à
Luca Ghino medico *Imolensi* *Bononia* acceperam.

Solani species orta in horto V. cuius acini (inquit) *Halicaccabi* nostratis acinos
æquabant: colore phoeniceo baccarum *Asparagi*. ferebat etiam in uesculis acinos,
sed frigore præoccupata planta maturitatem non assequabatur.

Sonchi genus, Terra crispa uulgo *Auinione*, tenera & grata acetariis herba, G.
Semina *Lugduno* accepi. Nascitur etiam in ruderibus & parietibus apud nos *Son-*
chi genus, læue, foliis rubicundis uel omnino, uel aliqua ex parte duriusculis, lacte
plenis, amaris, trifariam & profundè incisis: caule pedali, uel altiore paulò, flosculis
luteis. Hoc puto (ut doctissimus *iouenis* medicinae candidatus lo. *Bauhinus* noster
nos monuit) *Anguillare* *Lactuca syluestris* illa fuerit, cuius meminisse ait *Galenum*
lib. 2, uidelicet *De alimentis*, cap. *De Lactuca*, G.

Solanum syluaticum quaternis foliis, (raro quinis,) loco umbroso hortuli mei
plantatum, diu durat, seq; suis radicibus repens propagat.

Sorbus torminalis G.

Spatula foetida uulgo dicta, V. G. provenit autem mihi ex semine altero anno.
Cordus & alii quidam *Xyridem* hanc *Diosc.* faciunt, Sed *Dioscorides* (ut V. ob-
seruauit) *Xyridi* caulem crassum cubitalemq; dedit, in *Spatula* autem illa neq; cras-
sus neq; cubitalis est. Semine satis respondet, ut & radice: quam quidem primo non
crassam, sed capillarem monstrat.

Spatula foetida alia: cuius semen primo anno non exit, V.

Stachys, floribus *, gravioris odoris quam *Germanica*, à *Fuchio* et aliis data, V.

Styracem *Augustæ* *Vindelicorum* in horto habet excellentissimus medicus *A-*
dolfus Occo: & refractum ab eo stolonem cum radice anno superiore mihi donauit.

Y y

STIRPIVM APPENDICIS ENVM. ALPHA.

qui terræ commissus à me & toto anno relictus, permansit quidem uiridis, sed non germinauit, nec apprehendit etiam, ut animaduerti cùm tandem euellerem. superior enim pars aruerat, sicut & infima radices, in medio adhuc uirebat. Vnde colligimus arborem hanc diu durare posse si semel apprehenderit. Venetijs in hortis quibusdam Styraces satis magnæ uisuntur: & calidioribus Italiae tractibus etiam suæ spontis inuenitur, lachrymam tamen, ut in Syria, non fundit, Anguillara teste.

T.

Thlaspi Creticum, G. V. Acris hoc amariuscq; est illo quod Fuchsius & alii exhibent: quanquam hoc propius ad Dioscoridis descriptionem accedat.

Tithymallus myrtites uel myrsinites, V. G. non tali fructu seu capite, ut Matthiolum pingit: sed sicut reliqui Tithymalli tum flore tum fructu: maiore tamen: & cùm maturum testa dura, ut in nucis, semen maiusculum & subruustum includit. Coliculi ab una radice quàm plurimi sparguntur: quorum nullus primo anno floret: sectando autem, aliqui eorum, ita ut plures ferè sine flore relinquuntur. tertia æstate quid fiat, nondum animaduertere potui.

Tithymallus dendroides quidam, uel Turbit quorundam: missus à te, humanissimi me Calceolari, & resecta superficie plantatus, nondum regerminat mihi. Idem autem, aut certè simillimus, circa Argentinam sponte crescit.

Trifolium asphaltion, generosa certè planta, si illius & sapor & odor apud nos non deficeret, V.

Trinitas appellata Italis, Germanis Hepatica aurea duplex: minor, quarum communior flores cœruleos profert: rarior, albos, & maior: quam tuæ liberalitati acceptam refero mi Calceolari, punctis albis per folia insignis, G.

V.

Verbesina (ab aliqua puto foliorum cum Verbena similitudine, aliàs Forbesina,) Italis dicta, passim hic in palustribus emicans, G. Videtur autem mihi ea planta floribus Indici uulgo dictis cognata, flore quidem multò minore, semine simili, & odore ferè, similiter annua & aquosis gaudens, &c.

Viola Mariana (uulgo Scarlata, Scharlach nâgelin,) V. Herba est similis suis folijs Saponariæ uulgo dictæ, quâ Dodonæus Alisma facit: sed flore prorsus Caryophylli seu Betonicæ altius, minore, &c. Sed alia est Viola Mariana Dodonæi, quâ alij Medion appellant: nomine recentia diu uirgine (propter pulchritudinem floris opinor) conficta. nam & flos louis noster, Lychnis Matthioli, pulcherrimo flore, unde etiam Cœli flos à nostris dicitur, ut olim nimirum louis, ab alijs Warten rösle, id est, Rosa diuæ Mariæ uocatur. Alia etiam Viola marina Plinii, cuius meminit lib. 1. cap. 4. Tusculanam Violam odoratiore & augustiore (nisi angustiore legendum sit) aliquanto folio describens, quàm marina Viola sit. Ego Violam marinam aliam nondum noui, quàm Leucoium marinum.

Viola fruticosa, pulcherrima planta, Martiæ, seu nigræ Violæ folijs & floribus consimilis per te primùm inuenta, optime Calceolari, & mihi communicata: quæ si non creuerit, ut metuo, quoniam radix infirmior est, & longo itinere allata, semina ab humanitate tua expectabo.

Vitex uel Agnus Norimbergæ in horto Ollingeri. Hoc obiter moneo, nuperri-
mè mihi obseruati, Theophrasti plantas quas Ison uel Oeson *ἰσόν*, uel *οἰσόν* quorū po-
sterius tantum probo) uocat, ab Agno nihil differre, ut Plinii & Eustathii authorita-
te confirmari potest, nam quæ de Iso Theophrastus, eadè ferè Plinius de Vitice. i. Agno: & Eustathius Homeri interpretres *ἰσόν* interpretatur Agnon: quamuis alibi Sa-
licem aut speciem Sparti. sed Agnū Latini quoq; Salicem Amerinā nominant. Ga-
za imperitè ex Theophrasto Ison, Aequum, & alibi Oeson Iuncum interpretatur.

X.

Xiphium Dioscoridis nunquam, bis autem seu, mihi progenitū, loco ad quartum usq; annum uacuo relictū: cùm Patavii inter frumenta nascatur: & forsan apud nos etiam cum frumentis satum emerget, V.

FINIS.

Aconitorum variegata species, & inter alias una mirabilis, cuius radix plurimis per intervalla nodis consistat, quorum singuli singulos ueluti scorpios referunt; sed hanc Doronici uulgo dicti speciem esse, flores & folia ostendunt, &c. in hortis non diu durat. Aegilops uerus, Agni seu Viticis plantae multae, Aloë, Alypum; Alyssum duplex, unum Dioscoridis, alterum Plinii, Amaranthus, Ambrosiae species; Amellus Vergilii, Conyzis puto cognatus; Amomum, ut doctissimo Anguillara uidetur. apud nos quidem in frutice sponte crescit in aquis; & ego Pseudamomum iam olim appellare solitus sum. Anagallis, Anchusae diuersae, Androsæmum, Anemone species, Apios, Apocynos, Arabis seu Draba, Arbutus, Arisari species duae, Aristolochia longa & tenuis, Asarum, Aster Atticus, Astragalus Dioscoridis, Atractylis.

ylis.
Berberis: Bifolium, Ophrys Fuchsi puto: Botrys.

Cacalia, Cachrys, Caulocalia, Centaurium maius, Chamelæa, Chamelæon albus seu c.
Carlina, Chamæpitys, Cisthus, Clematis altera; Clymenum, uulgò Saponaria; Co-
localia, Convolvuli species cœrulea, uulgò Flos noctis; Coris; Crithmus spinosus,
seu Passinaca maritima, Cynocrambe,
Dianthus, Diptamne, Gretea, Doronicum Auicenne, Dorycnium, Dra

seu Passinaca maritima, Cynocrambe.
Daucus Creticus, Dictamnus Cretica, Doronicum Aiticense, Dorycnium, Dra-
cunculus maior.

Echium, Elichryfus, Eringium maritimum.

Echium, Elichrylus, Eringium maritimum.
Ficus Indicæ aliquot, quæ hyemis elapsæ iniuria omnes perierunt: Fœnogra-
cum, Ferula ex Apulia.

Gentianæ duæ species, Gladiolus Indicus elegans, Glaux, G.
Glycyrrhiza [Dioscoridis, nifalfor.] Hippocelinum, Holoferum, Hyacinthi, Hype= H.

Glycyrrhiza [Dioscoridis, nifallor.]
Heliotropium maius & minus, Hippofelinum, Holoſteum, Hyacinthi, Hype-
ricum.

Isopyrum.

Isopyrum.
 Laferpitium, Laurus Alexandrina, uel Bonifacia uulgo, Lentiscus, Leontopetalum, Libanotis, Ligusticum uerum, Ligustrum, Lithospermum, Lonchitis arbor, Lycium uerum, Lycii species.

Lycium uerum, Lycii species.
Mandragoras, Marum, Medium, Melilotus uerus, Mespilus prima, Momordi- m.
ca siue Balsamina, Myagrus, Myrtus.
In herbis parum durant: Nux methel. N.

Nardus Celtica & montana, quæ in hortis parum durant: Nux methel.

Onobrychis, Origanum onitis.

tem mihi Pharnaceum non aliud esse quam Centaurium maius, ex Plinio: aliqui herbam Doriam Italici uulgo dictam interpretantur, quæ cum Lapathi folium habeat, Chironium Panaces potius fuerit: et si in huius historia pro Lapatho, aliale sit, Amaraco, Itaque Hyssopum campestre à Trago Germanice dictum (De hyssop) à quadam foliorum similitudine, pro Chironio Panace quidam accipiunt. Herbulam quidem illam, uulnerariam esse constat. Pityusa, Platanus, Po-

Y v ii

lium, Polypodium, Poma amoris alba & rubra, Psyllium, Ptarmica Fuchsi & alia,
Pulsatillæ species duæ, Pyrethrum.

R Radix Rhodia, Rhamnus, Rhododendrum rubro & aliud roseo flore, Ruta
sylvestris quæ & Harmala.

S Sambucus racemosus, Saxifragiæ species rara & miræ efficaciæ: Sedum maius,
quod proxima hyeme tibi perit, sponte in maritimis nascens: Sefamoides: Sefeli
triplex, Aethiopicum uerum, Massiliense & Peloponnesiacum: Sideritis: Solani
species diuersæ, furiosum, halicaccabum, somniferum, peregrinum: Spina alba, cui
flos in echino subcœruleus: Stachys, Staphisagria, Staphylodendrum uel Pistia-
cium sylvestre, Stramonia, Symphytum petraeum.

T Terebinthus, Thlaspi species duæ, Thymelæa, Thymus Creticus, Tinus uel Lau-
rus sylvestris, Tithymalli omnes, Tora, Tragacantha, Tragoriganum, Tragus ue-
rus, Tulipani pulcherrimis floribus, ceu liliis, Turbit.

V Verbasci genera tum alia, tum lychnites: Umbilicus Veneris primus & secun-
dus: Vnifolium. Et alia complura.

DE SCILLA ET EIVS SPECIEBUS CONTR. GESNERI
iudicium ad Franciscum Calceolarium Pharmacopolam
Veronensem.

SCILLA nostra vulgaris, siue Pancratium sit, siue alia species Scillæ, rectè & uti-
liter in Theriacam additur: & uires omnes, quas ueteres Scillæ attribuunt, egre-
giè præstat, ut plurimis experimentis constat. Quamuis autem folium Liliæ eam
habere aliqui obiciunt, non Aloës, quod Dioscorides requirit, non idcirco tamen
à Scillarum genere excludi, & tanquam uenenosam reici debet. Matthiolus eam da-
mnat, quasi mitiorem iustè, & parùm efficacem. Anguillara contrario nomine, quasi
nimium uehementem & uenenosam. Ego tanquam bonam & convenientem anti-
dotis approbo. Debent enim ad antidotos quæ in eodem genere efficaciora sunt
deligi, potius quàm lenissima. Est, uehementior quàm Scilla alba edulisq; (Scillæ
nomine adhuc in quibusdam Græciæ insulis nota, ubi Scillam nostram Cepulam
caninam uocitant, ut Anguillara docet,) at eo medicatior est. Est uenenosam, si in
cibis, præsertim sæpius & copiosius, sumatur: non tamen uenenosam erit, si præpare-
tur quo debet modo, & aliis multis misceatur: sed iam uenenorum & morborum
multorum alexipharmacum fiet. Alba uerò & edulis si sic præparata antidoto mi-
sceretur, omnem uim medicamenti exueret. Est Pancratium, ut uult Anguillara:
non idcirco tamen uenenosam erit in antidoto, nec reicienda: cum ueteres Græci medi-
ci, Pancratium adeò simile fecerint Scillæ, ut ab aliis simpliciter quoque Scillam,
ab aliis Scillam minorem appellatum, & iisdem omnino utribus pollere, mitioribus
tamen, scripserint, quòd si uenenosius esset quàm Scilla, mitius profectò dici non de-
beret. Et ut ueneno eam non carere concedamus, non tamen ab antidotis excluden-
da est. nam Plinius quoq; uim ueneni Scillæ tribuere uidetur, cum scribit libro 20.
cap. 9. oxymelitis scillitici tantam uim esse, ut animæ extinctæ speciem momento a-
liquo præbeat, id quod nos etiam à uino scillitico factum obseruauimus in muliere,
quæ eo poto in uteri strangulationem, aut persimilem ei affectum ad breuissimum
tempus incidit. Arabes etiam de Scilla uenenata, loci natalis præsertim ratione, lo-
quuntur. Authores cum albam Scillam eligi iubent, præcipuè ad acetum scilliti-
cum, hoc ipso ostendunt, aliquam etiam esse ruffam Scillam. quæ quoniam uehe-
mentior est, præparari debet, ut minore periculo sumatur, assando, torrendo uel eli-
xando. alba uerò cum innocentior sit, præparari aliter non indiget, quàm ut in taleo-
las secta siccetur in umbra pro aceto uinoq; medicatis ex ea parandis. Ad theriacam
uerò

uerò Scillam albam deligere nemo iubet. Iam quòd ad magnitudinem attinet, Scilla uulgaris nostra, duplex uidetur, maior & minor: quòd si aliter quàm ætate differt: minorem, Pancratium dixerim; maiorem uerò Schinum, quo nomine ueteres (Hippocrates, Aristophanes, Theophrastus) Scillæ speciem nominarunt: etsi Gaza malè Lentiscum uerterit: ut & Cicero ex Arato: nisi forsan & ipse Aratus homonymia nominis deceptus, transcriptum ab alijs Schini nomen, pro Lentisco arbore acceperit, &c. Hispanica certè Scilla, quam cæteris acriorem esse aiunt, & maiorem, folio Aloës, simpliciter Scillam appellârim: eaq; si ad manum foret, præparata ad antidotos uteretur. Ego ex homine docto & fide digno cognoui, toxicum etiam apud Hispanos ex Scilla parari, sicuti ex Elléboro: quod magnum ipsius uehementiæ argumentum est. At Scilla edulis alba, quàm in Creta & Cephallenia adhuc existari Anguillara tradit, non simpliciter Scilla, ut ipse putat, sed Epimenidea Theophrasti uocari debet. Diuidit autè Plinius quoq; Scillam in genus medicatū & cibarium. Quòd si, ut dixi, Scilla nostra uulgaris minor, Pancratium est: & à maiori specie differt: uulgaris maior, (quæ tum ruffa, tum albicans (ut audio) adfertur: quæ colorum discrimina haud scio an in minori quoq; reperiantur,) non temerè Schinus uocabitur. Galenus quidem dubitat an Schinus Hippocrati idem quod Scilla sit, uel aliqua eius species: sed ex Theophrasto à Scilla differre, eiq; cognatam esse, liqui do apparet. Plutarchus Periclem schinocephalum cognominatum tradit, ab oblonga & acuminata capitis figura: additq; Schinum pro Scilla accipi. Hæc de Scillæ generibus habui à me diligentius obseruata: ex quibus etiam constat (ornatissime Calceolari) paratam à te nuper theriacam antidotum, è uulgaribus Scillis trochiscos non temerè receperisse. Scilla Theophrasto ter floret anno, & tria arandi tempora significat: & Arato similiter, etsi is de messe loquatur. Sed Aratus primò Schinum ter fructum producere ait: deinde etiam Scillam ter florere. Et quoniam is primùm ab Illicis simul & Schini fructibus, prognostica quædam tempestatum signa exponit, de duabus arboribus sentire uidetur, Illice & Lentisco: cum Schinum uerisimilius sit, illum quicumq; hoc ante eum scripsit, à quo ipse nimirum est mutuatus, pro Scillæ specie accepisse: sicut & Theophrastus alibi accipit. Lentiscus quidem an ter floreat alicubi, non constat mihi: non sit autem mihi uerisimile. Scillam ter florere minimè dubito: non ubiq; tamen, sed in Græcia & notis Theophrasto locis. $\epsilon\chi\iota\upsilon$ igitur per tota in prima fœmininò genere Græcis Lentiscum significat, & antiquioribus eorum aliquando speciem Scillæ $\epsilon\chi\iota\upsilon$ uerò per α diphthongum, masculino genere luncum. Vale Tiguri Cal. Iunii. Anno M. D. LXL.

CONRAD. GESNERVS AD LECTOREM, DE
QVIBVSDAM VEL EMENDANDIS, VEL ADDENDIS IN
suo De hortis Germaniæ libro.

ad. adde. l. lege, quod tamen plerumq; subauditur.

NVMERVS prior paginam designat, cum a. adiecto facie priori, cum b. posteriori. Posterior uersum, quod si unicus est numerus, is uersum solum paginae prius nominatæ indicat.

CVM Librum nostrum De hortis Germaniæ recens nūc aliquot fuerit potius. 244. b. 3. l. Accepi & tertiam impressum, nouum tamen absolutum, cursim reuoluerem, deprehendi emendanda quædam, partim leuioris momenti, quæ hic nō attingam, quod à quolibet medio-riter literato Lectore, facillimè emendari queant, ut sunt accentus, distinctiones, & alia leuiuscula: partim paulo grauiora, quæ prætereunda non duxi, siue ea typographorum culpe, siue meæ etiam inter condendum festinationi sint ascribenda. Pauca quædam bis posita occurrunt, quod ita contigisse puto: dum libri iam pridem inisi editio differtur, alia complura obseruauit, quæ seorsim conscripta ad typographum misi, ac suis locis inferi iussi, in quibusdam non satis memor prius etiam fortè annotata fuisse. Nuper etiam in peregrinatione per Rheticas alpes, quædam addidici, & alia aliunde animaduerti: quorum pauca huic libro adijcere uisum est.

237. a. 29. l. calidioribus. 31. l. ætiologicis. 52. l. libri sexti caput. 237. b. 13. l. propria. 238. a. 2. post, usus, punctum ad. & l. His etiam conueniunt pergulis, & c. 19. l. excel- lunt. 238. b. 1. Zuuinggerus. 239. a. 1. l. Coldenbergius. 22. Volmarus. 239. b. 27. medici. 37. indicabimus. 240. b. 11. l. PARS I. Quæ consideranda sint ante stationem. 4. 4. l. efferi. 241. a. 1. l. PARS II. Quenam in ipsa statione considerari debeant. 241. b. 48. l. PARS III. Postquam, & c. 242. a. 35. Cinis lixiuus, id est, à lixiuio reli- ctus, 46. post. Winterfreüter ad. Quædam utriusq; ge- neris reperiuntur, ut in Hordeo, Lino, Cannabi, & c. ha- bet enim horum unum quodq; species duas: quarum una æ- stiuæ, altera hyemalis est. 242. b. 18. in fine uersus ad. In apri- co enim horto odoratissimum huic fruticem inuenire me- mini: & iuxta mirum, partim etiam ex ipso miro letissi- mæ nascentem. 41. l. ut roeniculo: & alijs quibusdam licet non umbelliferis, ut Fabæ inuerse. 48. sed etiam Iulio. In fine eiusdem paginae ad. Atqui flos seu Caryophyllus Indi- cus aut Tunetanus uulgò dictus, tum maior, tum minor, cum annua herba sit, folia tamen florum multiplicat: sicut & Calendula. 243. a. 18. l. quæ ouium fimo. Post uersum ad. FINIS, dele. 51. Coldenbergius, & similiter in sequen- tibus, sicubi citatur, l. 243. b. Lemanum. 21. medicus & chirurgus. 22. hortum ac in eo. 37. Verba hæc, Vtrumq; auul- sis aut f. r. p. & facill. comprehendit, abundant. 39. l. non procul Roteulla, speciem Abrotoni inueni, per omnia su- n. mari, sed procrotiorem, candidiorem. 46. ad finem uersus ad. Species eius iam dictæ omnes auulsis aut fractis ramulis panguntur. 51. l. Bernensium, plurimum in Rheticis, sed pleriq; multo minus. 244. a. 2. l. meo per al. m. non sat bene, utrens potius quam crescens, postea interiit. 11. proue- nit. 20. post, hortis. ad. Plantam unam ultra biennium du- rare non puto. 39. post, uidi. ad. Sed hoc fortè Cotule ge- neri

hinc a Rabaginem uel Siliquastrum, teste Bellonio, recens-
tiores nescio qui. 22. post, loquitur, geminum nota: &
ad. mihi certe Aceris apud nos uulgaris speciem de-
scribere uidetur. 28. l. idem nomen Ceratonie ma-
gis. 30. uerba hec, Videtur autem C. Th. e. abun-
debet: sicut etiam uersus 31. Arborem uite. 38. l. Lutetia
est Sabine genus. 39. post, olent, ad. quidam uite arbo-
rem uocant. 51. Clematis. 249. a. 48. pro atris l. altis
23. post, docet. ad. Aliqui Italorum uulgo Perlaro uoci-
tant. Ad finem uersus 46. ad. Hinc eadem aut persimi-
lis uidetur que infra describitur Conyze maioris nomi-
ne. 250. a. S. pro, infra l. supra. Ad finem uersus 18. ad.
Vide Cotinus. 2. desiderantes. 35. post G. ad. Anguillara
tamen hanc herbam hodieq; in Græcie multis locis agere
uocari scribit. 50. l. in Sicilia nigra mentionem eius facit.
250. b. uersus sextus & septimus coniungi debent, & ita
legi: Blitum mac peregrinum, folijs ceu Amaranti maio-
ris, C. G. Corchoro c. d. & c. 20. l. albis etiam fl. 46. l. Bul-
monach. Q. Lunaria Ad finem uersus 48. ad. Floribus
albicanibus, G. 251. a. 52. post, alpina l. uocetur. Ad
finem ultimi uersus a. V. supra, Alpina alpinum. 251.
b. 27. l. Carduus benedictus, & Cneus uel Atractylis syl-
uestris. In plurimis apud nos hortis, propter magnum &
multiplicem eius in remedijs usum, ne uulgo quidem in-
cognitum, colitur. 29. post, satus. ad. Sponte nasci in
Lemni campis scribit Bellonius, & uulgo Gaidera
cantha, id est, Asini spina uocari. 252. a. 8. ad finem
uersus ad. Anguillara hanc Lappulam canariam Pli-
nij facit. 12. Cazalepra. 20. seipsam. 29. post, baccam
ad. (acinum potius) 36. l. Rechebere. 39. In ca-
lidis. 252. b. 6. post, G. ad. At Curie in horto Fabri-
cij nostri satis aprico, ad parietem, ubi Sol reflectitur,
plantatum, nuper Iunio mense pulchre florere uidi:
ubi semen etiam anno superiore protulit. 14. seratur. 15.
post, squalore, ad. ut tradit. Et inferius post Cerasus
mentionem subde hec uerba: Cerasus apud nos ra-
risime inferitur. Ex institutione quidem, ut Curie & alibi,
in Italia alibiq; multo maiora & solidiora poma fert. E
durauit. 259. a. dele hec uerba, nos fl. l. p. u. ex Theoph.
nucleo natam octauo uel decimo anno fructificare aiunt:
ex institutione citius. Et mox a noui uersus initio: Cerasus
Trapezuntia, uel Lauro cerasus, Pisis in horto Ducis. Re-
peritur & Genue, arbor magna & semper urens, Bello-
nio teste. 38. post, conatus sum, ad. Huius species altera,
ni fallor, reperitur arbore scens fere, fructusq; gemello, in
montibus prope Curiam: & in Burgundia, 40. ad fi-
nem uersus ad. quatuor cubitorum: sicut & in monte pro-
ximo supra Vuesum oppidum Helueticorum ad Riuarium
lacum, Tintendeere uulgo uocitant, & c. 51. l. refert flo-
ribus albis, & ad finem uersus 52. ad. Hanc in horto Chri-
stophori Piperini nostri natam audio. mihi quidem diffi-
culter in hortis alij posse uidetur. 253. a. 34. emicat. 51.
b. 29. aliquid. 254. b. ad finem uersus 8. ad. Cæruleo in
Rhætici albus Bauhinus noster inuenit. 27. l. Vide in
Carduus benedictus & sequentia dele, usque ad Co. 255.
a. 35. ad finem uersus ad. Vide in Bacchari. 34. post, ser-
ratis, adde, albicanibus & lanuginosis, ni fallor, inodo-
ra. Et uersus 35. ad. Sexto interijt. Sponte alicubi cre-
scit in rupa lacus nostri, radice admodum capillata candi-
dis & prolixis fibris. 45. post, quam l. idem aliqui uer-
terum Corchorum nominant. 255. b. ad finem uersus 21.
ad. Anguillare Cotinus est arbuscula, quam Itali uulgo
Scotano uocant, alibi Rosa. Eandem nos Barbam Iouis
Plinij facimus. Vide supra. Ad finem uersus 35. ad. Te-
lij, qui uicus est præclarus Telline uallis, in horto ad ma-
ceriam constitutum uidi. 1. pit autem suis radicibus per ma-
ceriam quoque: & diu durat. 44. post, alpinus, ad. (idem
nimirum genere syluestri iam dicto,) 256. a. 9. post, est
ad diuersi generis. 256. b. 4. pro idem l. italicus. 6. post,
futurus, l. Sed breui perijt. 12. ad finem uersus ad inde an-
te menses aliquot mihi missus à Calceolario Veronesi phar-
macopola, etiamnum mihi uret. Eundem postea ac simi-
les Daucos in Rhætici montibus circa Barmium alibiq;
inueni. 15. ad finem uersus a. Dodoneus Tomo 2. iconum
pag. 56. Apium palustre nominat. Sed non placet cum
Eleoselino ueterum idem significante nomine, homony-
miam fieri. 38. l. Pseudodictamnus. 52. pro ad l. apud. 257.
a. post, floruit ad. Hoc anno uixit quidem, sed non floruit.
22. post, uescuntur ad. Et ego nuper ex folijs coliculisq; eius
acetarium parauit, quod ut longe suauissimum mihi fuit,
ita etiam saluberrimum. 29. ad finem uersus ad. Eandem
herbam nuper inter Curiam oppidum Rhætiae præci-
pium, & Rhenium fl. satis abunde reperi. 48. ad finem
uersus ad. His scriptis à Fr. Calceolario Veronesi phar-
macopola accepi, hanc herbam etiam florentem reperi.
257. b. 14. herba, dele. 17. post, albam a. (ut Anguillara)
20. ad finem uersus ad. Alia est Leucacantha, id est, Alba
spina, de qua inferius. 23. ad finem uersus nota geminum
punctum, & ad. quam Itali Egano & Giegano nuncu-
pant: Anguillara non Laburnum, quod lignum eius non
sit album: sed alteram Ebeni Theophrasti speciem esse uult.
31. post, noster sit, dele que sequuntur uerba, usque ad, cum
Diosc. 258. a. 11. maritimum 44. post, nominat l. uel Si-
liquastrum, arborem inde, de qua supra scripsimus: fictis
scilicet nominibus. 52. ad finem uersus nota geminum pun-
ctum, & ad. alij potius ad Ornithopodium Dodonei refe-
runt. 258. b. ad finem uersus 9. notato gemino: ad, sed non
259. a. dele hec uerba, nos fl. l. p. u. ex Theoph.
cum hæc substituit: Sed cauendū est ne quis plantas quatuor
Theophrasti diuersas, Phlogem uel Phlogion, & Diosphy-
ron (arborem, quam Gaza Latine Iouis flammam uertit,) &
Genue, arbor magna & semper urens, Bello-
nio teste. 38. post, conatus sum, ad. Huius species altera,
ni fallor, reperitur arbore scens fere, fructusq; gemello, in
montibus prope Curiam: & in Burgundia, 40. ad fi-
nem uersus ad. quatuor cubitorum: sicut & in monte pro-
ximo supra Vuesum oppidum Helueticorum ad Riuarium
lacum, Tintendeere uulgo uocitant, & c. 51. l. refert flo-
ribus albis, & ad finem uersus 52. ad. Hanc in horto Chri-
stophori Piperini nostri natam audio. mihi quidem diffi-
culter in hortis alij posse uidetur. 253. a. 34. emicat. 51.
b. 29. aliquid. 254. b. ad finem uersus 8. ad. Cæruleo in
Rhætici albus Bauhinus noster inuenit. 27. l. Vide in
Carduus benedictus & sequentia dele, usque ad Co. 255.
a. 35. ad finem uersus ad. Vide in Bacchari. 34. post, ser-
ratis, adde, albicanibus & lanuginosis, ni fallor, inodo-
ra. Et uersus 35. ad. Sexto interijt. Sponte alicubi cre-
scit in rupa lacus nostri, radice admodum capillata candi-

am. i. h. t. n. q. u. f. 17. post. perficit, nota geminum: et ad. Plinius Theophrasti descriptionem, et Cor Nepotis (qui duratq; etiamnum. In fine uersus 20. ad. Quod si quid ex Polybio translulit) confudit. Ab his differt Fabra Græca, cuius Plinius meminit, Rome Lotus olim dicta propter fructus suauitatem, etc. 266. a. 17. dele hæc uerba, lygalon uel cog. In fine uersus 32. dele G. et ad. Hoc equidem Polygalon Rheticum dixerim: et aliquoties in hortu plantauit, sed non durauit: siue quod radices non satis integre fuerint, siue quod prata montana requirit, aut aliam ob causam. A Curia in pratis Vuallestadium usq; inueniri audio, nec amplius postea. [Reperi et luteo flore cognatam ei speciem in montibus.] Hoc pabulum uaccis lac augere uulgo creditur: unde et Polygalon uaccinum cognominari potest. Versus 39. deleatur, et in uersu 40. etiam hæc uerba hortorum, a. f. sp. e. ut et, delenda: deinde l. Gramen Dioscori. 41. Canaria. 42. post, cemeiteria. l. Theophrasti uero Cyn. 45. post, subtrahat. l. Italus uulgo Capriola, Sanguinaria alijs, in arvis hortorum alibiq; sua sponte exillit. 53. l. rabinum cognominant uulgo in Bernenium aut Valleflorum montibus lactarij. 261. a. 1. post, neruis, ad. solidis et mucronatis folijs. 2. post, pluribus, l. Hoc anno aut amplius in hortu mihi durauit: demum sine caule et flore periit. uaccis, eius pab. Versus undecimus cum tribus sequentibus, abundant. Ad finem uersus 26. ad Eandem aliqui Ebenum putabant nuper. Eruditiores Fabam Græcam Plinij, inter Lotti species, interpretantur. 261. b. ad finem uersus 6. ad. Reperitur etiam in alpijs, ut Rhetici alijsq; circa saxa. 19. Hemerocalles. Ad finem uersus 47. ad. Anguillara Epipactidem Dioscoridis hanc facit. 262. a. 39. Hypocoo. 52. laceæ. 262. b. 31. Seris. Ad finem uersus 39. ad. Nos nuper etiam in Rhetici alpijs syluestrem inuenimus, hortenfi odoratiorem. 263. a. 18. folijs. 25. uersus et πλῆρ. Ad finem uersus 48. ad. Hæc scripseram cum sine flore periisse animaduerti. Sponte non nisi in altissimis montibus crescit. ego in Branlio Rhetici proxime uerticem iugi unius reperi. Per simile est illi Millefolium alpinum, tum forma foliorum, et floribus, tum altitudine ferè pari: sed odore discernitur. 263. b. 34. post, odorata. ad. liquore quodam resinoso imbuta. Flore luteo, pappefcente, etc. 264. a. post uersum 13. infere, Laurocerasus. Vide in Ceraso. 36. ad finem uersus ad. Sponte in Creta crescit, et hyeme uret, teste Bellonio. 41. ad finem uersus ad. Alia est Spina alba, de qua in Echinopode leges. 264. b. ad finem uersus 8. ad. Sic ille. et duos sequentes uersus adiunge. 41. ad finem uersus ad. In calidioribus quidam locis, etiam Galliæ, semina proferre audio. 265. a. 4. sine. 26. Elegia. Ad finem uersus 41. l. Eius species due sunt, magnitudine differentes. minor, in altioribus tantum montibus nascitur. 44. pro luteis l. purpureis. 266. b. 2. Hortensem. Ad finem uersus 34. ad. Ad Glaucem potius retulerim, sicut et Dorycnium Monsbeliensium. 37. l. iam fortè quatuor cubitorum. Ad finem uersus 4. ad. Crescentiensis Fraxinagolum uocat: Itali Bagolaro circa Venetias: Galli circa Monspelum Micacoulier, alibi Fregolier. Mihi quidè omnino hæc lotus propriè dicta, nempe Lotophagorum uidetur: quam priore loco describit Theophrastus in Phaside insula nascentem, partim cum nucleo, partim apyro, non, id est, sine nucleo uel osse. Ab hac differt, quā in Continente nasci tradit: quæ an sit eadem cum Polybij Loto, (Zitzipho nimirum, id est, Iuuba nostra) querendum. Plinius Theophrasti descriptionem, et Cor Nepotis (qui ex Polybio translulit) confudit. Ab his differt Fabra Græca, cuius Plinius meminit, Rome Lotus olim dicta propter fructus suauitatem, etc. 266. a. 17. dele hæc uerba, Semen e. l. a. e. u. Et mox l. In Italia montibus etc. 22. l. nascitur in pratis, aliquando etiam saxi m. 27. post, G. ad. Sed mihi semen ob hyemem preproperam, non maturuit. 266. b. 11. dissimilis. 27. Ad finem uersus ad. Transplantauit aliquando sub hyemem plantam quæ proxima estate ad quatuor cubitos excreuerat, in uas satis magnū: sed periit. Alias multo humilior mihi nata est. 39. digna sint. 40. post, uulgo, ad. pomum. 267. a. 26. Acantho. 28. subsequutus. 40. post, uiuit, ad. (decimo iam ferè anno, una eademq; planta.) 267. b. 35. ad finem uersus nota: to gemino: ad. una longiore, altera rotundiore folio. 46. Castanea. et in fine uersus, sumpta. 50. ad finem uersus ad. Vide infra in Paliuro Africana. Syluestris quidem Aronia species uidetur, quam Sorbū torminalem dicimus. 53. post, ammis, ad. Mihi plantæ quedam ante decennium in area sic plantatæ adhuc urent, etsi quotannis ferè flores ac semina protulerint. 268. a. ad finem uersus 6. ad. Rubrum in pratis circa Curiam ut floris odore, ita specie differre uidetur. 15. ad finem uersus ad. Folia communis leuia sunt. hirsuta, inuentu rarior. 25. Caros uel Daucus alp. 27. l. quæ sequente etiam estate in fine lunij pulchre germinabant. 28. l. sed paulo post perierunt. Eius pab. uersui 29. subnecte hæc uerba: Flores purpurei sunt. Dauici Cretici loco poni poterit: quo uel efficaciorum esse conicio. 268. b. 15. post, hortenfi, l. in altis quibusdam montibus reperi. 18. l. In Sabaudia, et iuxta Chriam, circa muros, sepes et rud. 23. ad finem uersus ad. Fistulariam aut Herbam sanctam Itali quidam uocant, Galli Carpentariam. 41. l. Syluaticam montanāque, 269. a. 9. l. Aloisio Anguillara hæc planta uidetur Hippomanes. Ad finem uersus 14. ad. Anguillara quidem Lycopersium esse suspicatur. Pomo d' oro uulgo apud Italos dictum, (Galli puto Amoris pomum uocant,) alijs Pomum de Peru. Alij (uquit) speciem Melenzanæ hanc faciunt. 26. ad finem uersus distingue, et ad. a nemine, quod sciam, hæcenus memorata. 24. foeminam. 31. prorsus est. 35. l. pulcherri- mos anno secundo profert, et annis pluribus durat. 41. dele hæc uerba, Florent a. f. d. p. 269. b. 13. in fine uersus nota geminum, et ad. sed non apprehenderunt. 19. Hyeme 31. in fine uersus ad. Spina seu Carai genus est, cuius hoc nomine meminit Athenæus lib. 2. cap. 33. Hodieq; in Sicilia (inquit Anguillara) et Calabria Anapordo uocatur, ab Italjs Scarzo d' asino. Folia ei lata sunt, parum diuisa, hirsuta et alba. In summo caule, itidem spinoso, echinos edit, cum floret, purpureos. Semen simile Chico est, ubiq; nascitur. Post uersum 40. ad. Ophioscorodum. Vide in Pancratio. 46. dele omnia quæ sequuntur post. O. 52. Hæc racleoticum. In fine ultimi uersus ad. Hoc mihi etiam nunc Iulio mense floret, floribus candidis, aerius cæteris: anno superiore est semine mihi enatum. Floret etiam alterum peregrinum, nigrius, flore leuiter purpurascens, similis nostro uulgari: sed paulo aerius eo, ut candido hebetius paulo, ni fallor. 270. a. 18. Helixine. 270. b. 2. l. In hortulo pri- mum uirere cepit, sed breui interijt. 5. l. Paliurus frutex sepimentis idoneus. 8. l. Paliurus Africana, quæ et uino- sa cognom-

sa cognominari potest, ad superioris differentiam. Apud quidem in Pseudomomo nostro non deprehendi nos &c. 9. folio 15. post, Ruellius l. Eadem puto Paluro do,) 41. zingiber. 47. l. non produxit, & post aliquot Africanæ est Connarus Athenæi. Sed illa quam Ruellius menses perijt. 49. crassior. 273. a. 14. librale. 32. ad finem describit, Mespilus Aronia est, ut uir quidam eruditus nos uersus distingue & ad. semina cuidam amico meo dedit, monuit. Palturum uerè Apbriam (inquit) describit 10. si bene recordor. Ipse quidem in sententijs suis Italicè edidit Leo in Africæ historia Italicè conscripta, capite de Zarfa. ut super Stirpium nominibus, Pityusæ tanquam ignotæ 37. l. D. uidit: & communicato ab eo semine nunc mihi sibi meminit 39. ad finem uersus ad. His scriptis, Aceris fo= quocq; uiret. Semen fert anno secundo. 38. Squilla. 271. a. d. lium, ex Anglia Scotiæ uicina, quod illic pleriq; Platani 31. frequentissima. 32. hanc. Et mox: Reperitur huius etiam esse putant, Platani nomine ab amico accepi. 273. b. post f. i. p. o. genus. 35. mereretur. 42. ad finem uersus ad. Li= uersum 7. inferre hæc uerba: Polygonum Rbeticum. Trans= quiritiam syluestrem aliqui nominant. eam reperi tum in fer huc quæ scripsi in Glauz. 27. post, uasis. ad. Anguilla= plants, tum in montanis locis, asperis & lapidosis. 51. op= ra hoc putat Lycopersium esse. Vide supra in Nuce Me= pidi. 271. b. 7. Quirchowach. 272. a. post, paruis, pul= thel. 50. l. nascitur, nisi. 274. b. 17. l. Pulmonaria Vege= cto notato. l. Maiores a. q. n. s. i. m. S. pratis, (& infra Se= tij, eadem quæ Consiligo est. 30. l. adherentem quandam ptimum Rhetici montem, initio Pregalia uallis, uidi, Li= Pulm. 42. notato gemino: ad. & in Rhetici postea copio= lij etiam odore: & in radice sapore similiter glutinoso. fissimum graciles eius nodoseq; radicle reptant, flores Minor, ut quibusdam uid. &c. 42. ad finem uersus ad. Sed ceu chamæmati sunt, odorati, Bellidis speciem, paulo maio= nuper 10. Bauhinus noster, peregrinationis per alpes Rhe= res, folijs albi, capitulis lutei. 275. a. 24. l. folia, et pluribus ticas mihi comes, in itinere non procul Aluinouo fonte sul= incisuris, caulibus longior, Sardoum &c. 44. per, Tertius fureo, sibi uenientiam ostendit uirentem. 44. uiret. 47. qui, l. idem. Ad finem uersus 53. ad. Tertius, quem copio= Mercuriali. 51. l. appellant, abundant ea. 272. b. 3. Fre= sum in summo mōte Braulio Rhetorum inueni, sub finem quentem. 10. post constat. l. Anguillara quidem nuper lunij florentem, tria aut quatuor folia habet, simplicia, Pimpinellam, Sideritidem secundam Dioscoridis esse scri oblonga, angusta, striata: & florem in humili caule la= pfit, & in Chio hodieq; Sideritidem uocari. 24. wilder. Cteum singularem, Ranunculis alijs formâ similem. Herba 25. quæ paulo post omnes perierūt. 31. post, sapore ad. (huc tota uir: alibi nusquam adhuc mihi uisa.

EMENDANDA QVAEDAM IN VAL. CORDI LIBRIS.

NUMERVS prior folium indicat, posterior uersum. Si unicus sit numerus, uersum dum= taxat folij prænominati. a. faciem folij priorem, b. posteriorem. l. lege.

89. a. 29. Constantes, principio uiridi, mox in ruffo les. 97. b. 6. pro rotundam l. teretem. 98. a. Iconi po= pallescente, 39. nigra, ab una parte (nempe in annexu) sita inscribatur, Thalictum tenuifolium. Aizoi minimi cana. 51. enascuntur, omnes a. spectantes. 90. a. 36. hi titulo adde, luteo etiam florū colore, astringens.] toti decidunt, imis tantum. 90. b. 38. dele hæc uerba, Si= 50. luteis. 52. inutili. 98. b. Iconis inscriptioni adde: Epia= meon Setibi fortè Max. 91. a. 42. syluestri. Et reliquis pactis Anguillare. 99. a. 41. pediculi. 99. b. 9. aliqua in Titulo adde hæc uerba. Scorodonia nomen fi= olet, & gustatus. 100. a. 34. pro quo Lumo. 100. b. 10. Etum est: & syluestris quidem hæc herba est, sed dupliciaq; 101. a. 31. amplexi. Spicas 39. aut floribus triti= alia eiusdem generis urbana non inuenitur, ut ci 40. squamas. 102. b. sulcantur, profert 39. onustum. hanc ceu differentiam adijcere non sit opus. 103. b. 36. milio 104. a. 14. copiosissimaq; 41. binum 52. 91. b. 6. specie fruticosa. [Itali quidam, &c. 8. Thameocnemum. 104. b. 46. prodeunt 106. a. 37. ter= dictæ. 92. a. Ellebori nigri alterius icon hic addenda fue= na claud. semina. Semen papaueri æquale est, foris &c. rat ex Trago. 83. pag. 251. Est autem hæc uera Consi= 107. a. 10. papauere 22. furculos, 107. b. 46. exerunt, co= lore in purpura cæruleo, 110. a. Icon. capitis 76. Papa= ueris est, non Panici: cuius iconem dedit Tragus 2. 31.

92. b. 40. coliculorumq; indiuiduis adnatis, 44. quar= p. 661.
tam 91. a. Icon è regione manus leuæ, inscribatur, Elle= 37. l. conferctam, prodeunte è folijs, Increcente spica borine tenuifolia. 44. Anthora. 93. b. Iconum altera 34. aut à duobus inferioribus geniculis culmi undiq; 111. a. Ver= inscribatur, Bechium. altera, Anchusa minima. 34. aut à duobus inferioribus geniculis culmi undiq; 111. a. Ver= 46. Anchusis 53. fed alternatis 94. a. distracta: foris, 8. can ba hæc in fine pagine: (Hæc non Cordi Chamæ= dida: 94. b. 15. carnosus, capitata, omnibus i. n. radicibus peuce, mihi ignota: sed nostra est) transferri de= 20. 1010. 95. a. 19. rubentem 21. tenuiorem, d. c. constan= bent ad iconem proximè sequentem. In titulo etiam ca= tem 22. qui. 96. a. 39. geniculis 40. similia ferentes. Cau= pitis 79. l. Eadem uideri poterat Erica altera

Marthioli, (quam Dodoneus quoque alteram fa arbor, non Citrus, quod nomen Cordus pro
 citis ed ineptior eius pictura est, nisi flosculi cō Arangio fingit: & à Citro adiectiū sit citreus,
 caui & rubescentes obfarent: qui in Chamæ non citrinus. Inde in sequentibus quædā emen-
 peuce Cordi, albi & foliacei sunt. 112. a. 10. stricte dabis. 20. myrteoq; 24. citrus 27. similis: gustu 42. fide
 14. detractis, cum exaruerunt, tunicis, consp. p. m. quanti- cienda est. Cortices, ramos uestiunt, 44. Citrus 183. b. 52
 tate: 114. b. 39. Radicem habet p. & fibratam. 115. a. 4. Citrus 31. insident, 46. decidunt, sed etiam, 184. a. 2. de
 quod flos hic intus hirsutus 13. pondus habet. 20. ducat. nigrandi 10. rigorem 37. spectantes binis
 27. oblonge & grandi Colocynthidi, 35. habent, 43. 52. concipiunt. 184. b. 30. tria discrimina 31. sparteis 34.
 grandi & rot. 116. a. (cuius paginae numerus emendat= 35. diste, 185. a. 41. coherentibus: materia arboris m fo-
 dus est,) 46. l. auctum, maturescit. Magnitudo. 116. b. 2. lida. Gaudet. 185. b. 4. Eius ad nos diu peruen. 5. ex-
 cortex. Pulpa 116. b. 41. uerrucis 44. abundant. est ed= pressum. Tertium quoque, Omphacinum, 11. scarific. odore
 dem & c. 118. a. 51. Alphonsepones, 52. succo qui 118. b. Arangis ignauiore 46. noue inuent. 186. a. 46. Hic ipse
 Colocynthidis icon posita superius cap. 97. uidetur po= est, aut plane cognatus 52. corticis colore, 186. b. 13. occu-
 tius referenda ad hoc caput 110. 120. b. in Sexta specie pans, 42. sextantales gracilesq;. 189. a. 52. simile, 189. b.
 Ranunculi l. Vide in Nona specie infra. 121. a. 50. Pro Geniste angulose icon ponenda est alia, quam dea
 DECIMAM. 121. b. uersus undecimus, qui incipit, scribit Tragus 3. 8 p. 961. & uerba hec lemmati adscri-
 Weiss Bigwurze, etc. coniungatur uersus tertio. 122. benda: Tragus hanc simpliciter Genistam, uel
 a. 20. Chelidonio simile est, 124. a. Ad titulum cap. 8. Genistam maiorem uocat: sicut & Dodoneus
 adde hæc uerba: [Olus hoc ipsa Eruca est. Cordus qui etiam uirgas angulosas ei adtribuit. Aliud
 uero Erucæ (cui folia eius & siliquas confert) Genistæ est, omnium humillimum, quod Cha-
 nomine, Sinapi album hic intelligere uidetur, mæspartium Tragus uocat libro 2. cap. 7. co-
 ut hætenus pleriq; pharmacopolæ. Eruca Ro- liculis mirè & peculiari quodam modo folia
 mana quidem, cuius albicant flores, & quam tis, & nodis quibusdam ceu angulis per longis
 hic describit, nō tam album sinapi folijs refert, tudinis intervalla distincti,
 quam syluestre à Dodonæo dictum.]

169. a. 17. prætereuntium. 27. inuentu.] 44. pro o- 28. niueas 35. Lemmati adde: [Hanc, ni fallor, Spar
 dorem. l. saporem. 169. b. 38. foliorum quæ præter. 47. Dodonæus.] 46. simili & equali. 190. a. 3. lege
 Filice exigua. Numeri foliorum 171. & 172. emen- Spartus Hispanicus, uel Hispanica, Greci enim
 dentur. 171. a. 2. l. Ea ut faciliè conijcio, est Lonchi- foeminino gene. proferunt pro stirpe: pro fune
 tis altera quorundam, quam & c. Et ad finem autem neutro, & a prop. Dodonæus exigua foliola sunt
 lemmatis adde. Viret autem etiam hyeme, de mis ramis appingit, quibus tamen rami adultiore carent.
 quo Cordus dubitauit, Trago teste: qui etiam 191. a. l. com adscribe: Icon hæc est Fabæ Græcæ Pli-
 radicem eius describit. 41. l. acetabula uocant, figu- nij, ut eruditiores hodie iudicant, nam ante an-
 ram imitantes: 171. b. 40. spacijs aduersis, secta: 172. a. nos uiginti quidam falso Ebenum, alij Guaiac
 Trichomanis icon hic abundat, ut excusatum cum uocitabant. 191. b. 12. intus rem. 26. aque 193.
 est superius Cap. 177. 173. a. 45. l. plenum, gustu ad= a. 44. plenam, 45. euanescente fortè legendum. 194.
 modum suauem & uinosum. 174. a. 36. foliaceum. 174. a. 11. Styracis fructus uidetur, fractus. 195. a. 8.
 b. 24. tamen, dele. 30. staminibus. E singulis (stribus) bi= Lemmati adde: Meminit eiusdem fructus Anguil-
 ne 46. De mascula leg. inf. 175. a. 4. Leucoio 7. circun= lara nomine Croni & grani Anelcen apud A-
 ferentia. Singulis 52. antilycium sit, 53. aliqua. Paucis acu= uicennam. 18. dehiscetes. 21. eximenda atq; abijcienda,
 teis Pirastri modo sepitur. Materia est dura. 175. b. 8. l. 196. a. quam, abundat: legi tamen potest tanquam. 197.
 Caffægrün/ (i. uiridis color pictoribus in usu. 42. sed magnam 3. retinent. Imbecilliores 14. interior 29.
 uide Tragus) 23. Flores & fructus fert 176. a. 37. mollis: 41. constans: 49. habentia, 197. b. 7. Chebulus
 Pyracantha 42. armatur: 177. b. 1. desinunt, ut Cucur= 11. Citrinus, Kebulus, 34. rugosus, 49. scrupulum 51.
 bite. Longitudine 178. a. 27. durantia 178. b. 18. Rhom= CHEBVLA. 51. CHEBVLA 198. a. pondus æquan
 bucea, 38. subrotunda sunt. lucta 47. pro qui lege cui 179. te, & intus oblongum. 33. Chebule 43. substantia & color
 b. 7. Grauchen/ id est, (Subfusca,) 43. Grige= re similis: 44. corticem colore 48. commendantem. 198.
 liste (Græci & quidam dicunt) & o. f. experte, facili b. nucibus, abundat, nisi nucem legat. 199. a. 43. Myxa
 in ore dissolubiliq; gustu in dulci 180. a. 36. teneriore & uel Sebastii, quos b. S. a. & ipsi è Syria translati 53. carne
 succo flore constant. Sap. 40. uibicibus colore 180. b. 1. Pa= molli, 199. b. 1. lentore, sapore 34. Schœnauitho 39. tena
 ternianis 6. profundiusculè 10. succosa. gustu subacida, 45. uiori. 200. a. 19. Gangitide 200. b. 46. Smyrni 201. a.
 In summa Coreitith. ferè æq. e. sim. sunt. Colore inter 18. uersicolor: Aceris 201. b. 1. in Lemmate sic. Cen-
 181. b. 12. Augustana, 24. odorisq;. 181. b. 3. uulgo dictos, taurium maius quod hic damus, Inule ferè fo-
 una iconè exprimere 11. furcisq; 18. exornant, 33. Flores lia habet, Helueticis alpiibus non infrequens.
 uirentes gemmarum 29. commutitur, 37. Cum etiam 39. Iuglandis autem folia spectantur in altero gene
 similis est forma. 52. muniatur, 183. a. 8. Lemmati capitis re Italico: cuius folia separatim appinximus. 34.
 13. adscribe hæc uerba. Citrus apud ueteres dicitur uisoso 52. corrosum, sapore & odore acerrimum & suau-
 uisum.

uissimum. 202. a. 1. Thapsia maioris in It. nascentis: & ut 47. distent. 211. b. 17. 2015. 33. referende: cum 212. b. p. l. i. O. nascentis, 17. hoc, abundat. 40. constante: gustu 1. l. Eleagnus Cordi, ut accepi: & Bellonij. Eade est Rhus 42. afficiente: odore 45. coepta. Et in sine pagina adde, sylvestris Plinij Dodonæo. 213. a. 8. De stirpibus 213. b. 5. Icon sequitur. 202. b. in Lemmate, Thapsia 203. Turcico 213. b. 37. macronem. 214. a. 2. post, alium, adde. 21. leuem: gustu. 203. b. 23. teretes utroq; lateri: 204. Huius species alia maior, ad quatuor cubitos (ni fallor) 210. inueterata, 21. capiti 205. a. Ad Mahalebi iconem enascens, fructu distinctius gemino reperitur in montibus circa Curiam Rhatorum: Orchocarpi nimirum (cuius in hæc adscribes: Mahalebi icon, expressa ad ramu- circa Curiam Rhatorum: Orchocarpi nimirum (cuius in sum siccum, quem ab amico eruditissimo ac Sylua meminit Cordus) peculiare genus, rimoso, fisco ac cepi Lugduno: nuper autem propè Vuesam op dependente cortice. Eam nobis primus Curia doctissimus pidum, quod dici itinere Tiguro distat, Rhæ- 10. Pontifella ostendit: qui etiam an rimosus ille pendu- ros uersus, copiosam eandem arbusculam inue lusq; cortex ei conueniat, observare poterit. 3. simplicia ni: Tintenbeere uocant accolæ. 205. b. 50. splendet: medicamenta 14. post Arbutus, adde, (cuius fructum hæc gustu. 206. a. 3. acutus multo, 206. b. exhalante q. t. i. e. proximè refert,) 18. urinam 23. magni 31. Cisthum 32. est, fuluum, c. a. e. crasse sit. 22. de eo 48. hepatis. 207. a. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

Γ Α Μ Η Α Ι Ο Ν
MICHAELIS BARTH ANNAEBERGENSIS

AD M. MAURICIUM STEINMETZ SPONSVM AMICVM S. S. DE

sponsa eius Virgine honestiss. Catharina filia opt. uiri

Ioan. Kallæ pharmacopolæ & ciuis

Lipsici.

DESIERAM nuper componere inutile carmen,
Decrèramq; animo steriles relinquare Musas,
Hoc tam corrupto commotus tempore, quo nunc
Omnia sunt omnes, quo nec discrimine iusto
Vllus honoratur uates, neq; præmia cuiquam
Pro quamuis magno redduntur digna labore.
Sed fraudes tantum & crassa ignorantia regnant,
Ac cytharas pulsant miseranda fortis aselli:
Aut calamos si quando leues tractare liberet,
Decrèram insanos mores uitamq; pudendam
Inuistorum hominum Satyra uexare decenti,
Aut acri stultas Epigrammate pungere mentes.

Donec sunt promissa tibi connubia primùm
MAURICI nostros inter memorande sodales,
Hic mihi summam aurem uellit Gryneus Apollo,
Admonuitq; & amicitiae officijq; decentis.

Gratulor ergo tibi præstanti corpore sponsam,
Et fama egregia, & præclara mente puellam,
Que tibi connubio & stabili sociatur amore,
Quam tibi, si clari generis mouearis amore,
Et patria, & poterunt sat commendare parentes:
Mater honesta, pater priscos superare Crateuas
Qui queat, herbarum radices arte secando,
Et folia, & flores, ac fructus inde legendo,
Miscendo & seuos contra medicamina morbos.
Quid quod ea affines iungit tibi sœdere CORDOS?
Cordatos uerè CORDOS, quos pulcer Apollo
Ingenuas omnes docuit feliciter artes:

Ecquis enim EVRICIO medica præstabat in arte?
Dulcisono quisnam superabat carmine eundem?
Parcite Germani, & pariter mihi credite uates,
Hoc melius nemo ex uobis Epigrammata lussit,
Arguto uix hunc æquauit carmine uates.
Bibulis alta tuus, tuus aut Verona Catullus.

At tu à tam multis non sat laudate VALERI
Tu patris egregij & decus immortale tuorum
Europam implesti iuuenilis laudis honore,
Tu iuuenis senibus stirpes monstrare solebas,
Herbarum tibi erat subiecta potentia soli.
Patria testatur non hoc Germania tantum,
Sed docta Ausonia, & terrarum illa inclita Roma,
In qua CORDE tibi tumultum struxere Camœnæ,
Et celeres obuii, tundentes pectora pugnis
Assiduè plangunt, crebra & suspiria uersant,
Nec cessant longum luctus extendere in æuum.

Tertius et dignus patre tali et fratre PHILIPPVS
Præter Apollineas herbas, studiumq; paternum
Impiger ingenium miras intendit in artes,
Quarum ope adinuenit uaria organa, carus ob illud
Principibus multum ipse uiris iam cœperat esse,
Inuida sed cœptum, nobis mors semper iniqua,
Interrupt opus, morientem uidimus illum,
Nec dudum exanimum sepeliuit Lipsia corpus.

Prætereo AVGVSTI tacitus præconia CORDI,
Illius doctasq; manus, animumq; sagacem,
Quis nil Parrhasio, nil concessurus Apelli,
AVGVSTI pingit dum principis ora, uidetur.
Hos CATHARINÀ uiros iungit tibi sœdere iuncta.

Sed non ista tuam mentem mouere, nec est nunc
Illorum usq; adeò dulcis tibi mentio fore.
Sed magis eximias dotes, frontemq; pudicam
Respexi, & teneram etatem, moresq; puellæ:
Que quod honestatem à primis exercuit annis,
Quodq; etate graues coluit, fouitq; parentes,
Quod uenerata Deum pietatis semina rectè
Imbibit, hoc fecit tua pectora faucia telum.
Nec tua in hoc ratio neq; mentis seruior aberrat,
Nam neq; diuitias, aut clarorum splendor auorum,
Nec tam forma decens quenquam effecere beatum,
Quàm si casta domi, & sceleris si pura sit uxor,
Aeterno deuota Deo obseruansq; mariti.
Cætera quæ uulgus stupet atq; ingentia ducit,
Hæc persèpè malis largè concessa uidemus,
Fluxa, caduca, boni pulcro uix nomine digna,
In quibus haud quicquam sapiens fiducia ponit.
Non libet exemplis uti prisce siue nouis.
Cernimus assiduè ueteri à uirtute parentum
Natos deficere, in lepores transire leones,
Ex aquilis molles fieri imbellesq; columbas.
Obuia sunt etiam & notissima nomina eorum,
Qui è Crassus tri exiguo sunt tempore facti,
Quiq; ob diuitias scelera in peruersa uentem,
Degenerem egerunt, & agunt hoc tempore uitam,
Nec uerò ullius est plus decantata puellæ
Tyndaridis quàm forma decens, uerum illius ergo
Læsa fides thalami, prostratum nobile regnum,
Tota decennali sudauit Græcia bello,
Raptori exitio fuit hæc raptæq; Læcæne.
Quid quod tam facit hanc morbus populatur & etas?
Ut flos in pratis primo spectabilis ortu,
Mox ustus fugiente die languetq; caditq;
Sic hodie forma quàm ceu florere uidemus.

Ulam

Illam craftina lux torret uel tertia febre,
Depascens pulcrasq; genas, floremq; decorum.
Ergo bono fragili stultum ergo est fidere formæ,
Stultum auro, aut sola sibi nobilitate placere.

Inde licet forma tua sit CATHARINA decenti,
Sit diues satis, atq; bonis maioribus orta,
Non tamen hæc animum tibi permouere, puellæ
Sed cantatus honos, & pulchræ gloria fame.

Ipsa etiam integræ uitæ & præconia laudis
Admirata tuæ, studium admirata medendi, &
Sublime ingenium rebus coelestibus aptum,
Esse tua & dici uoluit, meruitq; uolendo.

Quos igitur uirtus, non luno pronuba iungit,
Quos Deus omnipotens primæui nobilis autor
Coniugij, stabili sociar iussit amore,
His bona cuncta omnes, his omnia fausta precemur:

Turturibus ceu perpetua est concordia castis,
Sic sine lite torum teneat concordia uestrum.

Utq; focer si quando tuus tetrapharmaca miscet,
Resinam atq; picem fundit, tunditq; decenter,
Excipit hinc adipe & cera, atq; ex quatuor istis
Commixtis præstat medicamen nobile & unum:
Sic animæ uestre binæ, sic corpora bina
Coniugio commixta sacro, iungantur in unum,
Vna caro fiant, mens una, una inde resulet,
Nec secum pugnans nec dispar corde uoluntas.
In qua uiuacis superetis sæcula cerui,
Felicesq; simul plantetis Adonidis hortos,
Oscula libantes toties dulcissima uobis,
Coniungunt Paphiæ quoties sua rostra columbe,
Deniq; in amplexus sic uertite brachia uestra,
Ut uarijs hederæ circundant flexibus ulmos,
Nec segnes sterili consumite tempora uena,
Sed date maturos domui solatia foetus,
Qui pedibus mox calcantes uestigia uestra,
Et facie refrant nobis & mente parentes.


Hæc rata confirmet nutu Deus ipse benigno
Omnipotens, thalami certissimus autor honesti,
Immensus qui cuncta gubernat trinus & unus.


FINIS.

ab ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXYZ. a
bcdefghijklmnopqrstuxyz. Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Vv Xx Yy Zz.
AA.

ARGENTORATI EXCVDE-
bat Iosias Rihelius.

Anno M. D. LXI.





IN VALERII CORDI ANNO. tationes INDEX.

A BROTONVM	51. Anchusa	63. Auripigmentum	81.
Abrotoninum unguentū	13. Anchusa altera	63.	
Abfinthium	51. Androsæmum	61.	B
Abfinthium marinum	52. Androsaces	59.	
Acacalis	18. Anemone	48. Baccharis	53
Acacia	20. Anethum	54. Balaninum oleum	11
Acanthium	51. Anethinum unguentum	13 de Balauisjs priuatim tractatur	23
Acanthus	51. Anisum	54. Ballotē	57.
Acantibus syluestris	51. Anthemis	59. Balsamum	5
Acetabulum	69. Anthyllis	59. Batis	45
Acetabulum alterum	69. Anthirinum	72. Batrachium	48.
Acetum	77. Aparine	57. Bdellium	14.
Acetum mulsū	77. Aphace	46 Beta	44.
Achillea	63. Apios	75. Bitumen	16
Acinus	53. Apiastrum	57. Blatta cina	29
Acōnitum alterum	67. Apium satium	55. Blitum	44.
Aconitum Pardalianches	67. Apium palustre	55. Botrys herba	58.
Acorus	1. Apium montanum	55. Brasica	44.
Adarces	82. Apocynon	68. canina Brasica	76.
Adeps	31. Apollinaris	66. Britannica	61.
Adipes uarij	31. Aqua	77. Bromus	72.
Adiantum	72. Aqua marina	77. Buccina	26.
Aëtopminus	68. Aqua mulsā	77. Buglossum	71.
Aegilops	72. Araba	46. Bulbus uomitorius	48.
Aeris flos	79. Arabica spina	51. Bulbus ididolus	48.
Aeris squama	79. Araneus	30. Bunium	71.
Aerugo	79. Arbutus	25. Bupthalmum	60.
Aethiopsis	70. Arcton	70. Buprestis	30.
Ætites	83. Arena littoralis	84. Butyrum	31.
Agallochum	7. Argemone	48. Butyri fuligo	31.
Agaricum	49. Argenti recrementum	80.	
Ageratum	66. Argenti spuma	80.	C
Alcea	60. Argentum uiuum	80.	
Alga	69. Arisarum	48. Cacalia	71.
Alica	42. Aristolochia	50. Cadmia	78.
Alisma	60. Armenius lapis	80. Calamus aromaticus	4.
Allium	46. Artemisia	58. Calx	82.
Aloë	51. Artemisia tenuifolia	58. Canabis satina	60.
Alfine	68. Arum	48. Canabis syluestris	60.
Althæa	60. Asarum	2. Cancamum	9
Alumen	81. Asclepias	57. Canchrys	56
Alypum	75. Ascyron	61. Cancri	27
Abyssum	57. Asini ungule	29. Cantharides	30
Amaracinum unguentum	13. Aspalatus	5. Capparis	48.
Ambrosia	58. Asparagus	44. Caprarum ungule	29
Ammi	54. Asphodelus	48. Caprificus	25.
Amomum	3. Asplenium	59. Capnos	20.
Ampeloprasum	46. Aster Atticus	71. Cardamomum	1.
Amurca	20. Astragalus	66. Caries lignorum	18
Amygdala	25. Atramentum futorium	80. Carum	54.
Amygdalinum oleum	11. Atramentum metallicum	81. Caseus omnis	30.
Amylum	43. Atramentum librarium	84. Castia seu Castia	3
Anagallis	48. Atera	42. Castanea	22
Anagyris	60. Atriplex	44. Catanance	72
Arcaon	70. Auena	42. Caulalis	45

Glanz

Glauze
Gluecinum unguent.
Glutinum
Gobius
Gramen
Grossi
Gummi
Gutta Ammoniaca
Gypsum

72. Idea radix
13 Indicum
57 Inlybus
28. Irinum unguentum
63. Iocinora
25. Irio
20. Iris
57 Isatis satina
82. Isatis agrestis
Isopyron, herba
Inglandes
Iuncus
Iuniperus

H

Halica
Halimus
Harundo & papyrus
Hedera
Hedera terrestris
Hedychroon ung.
Hedysarum
Helenium
Helenium Aegyptium
Heliochrysum
Heliotropium maius
Heliotropium minus
Hemionitis
Hieracium minus
Hemerocallis
Helxine
Hiatile
Hieracium maius
Hippace
Hippocampus
Hippoglotton
Hippomarathrum
Hippophastrum
Hippophaes, herba
Hippopotami testiculi
Hippuris
Hirci barba
Hirundo
Holostrum
Hordeum
Hyacinthus
Hydromalum
Hydropiper
Hypecoum
Hypericum
Hypocistis
Hyoscyaminum oleum
Hyssopus

64

I

Iasminum unguent.
Iaspis
Ichthyocolla

42.

L

13. Labrum Veneris
49 Labrusca
71. Labruscae flos
13. Lacerta
59 Lacerta Chalcidica, seu seps
9. Lac omne
10 Lacrecens
65. Lac muliebre
76 Lactuca
76. Ladon
59. Lanaria herba
55 Lase
58. Lappathum
64. 68. Lapis Thracius
27 Lapis hematites
55 Lapis Asius
31 Lapis Arabicus
26. Lapis Galactites
71. Lapis Melitites
55. Lapis Morochithus
74 Lapis Alabastrites
74 Lapis Thylites
28 Lapis Iudaicus
65 Lapis Amiantus
46 Lapsana
29. Laspitium
62 Lathyrus
42 Latinum unguentum
66 Laurus, *laurea*
78 Laurus Alexandrina
47 Laurinum oleum
66. Lemnia terra
60. Lens
20 Lens palustris
11. Lentiscus
51. Lentiscinum oleum
Lentiscina Resina
uinum Lentiscinum & Terebinthi=
num
Leontopetalum
13. Leontopodium
83. Lepidium
57 Leporinus pes, herba.

64. Lepus marinus
80 Lepus terrestris
45 Leucacantha
13 Leucas
29 Libanotis
46. Libanotis coronaria
1 Lichen, herba
49 Ligusticum
49 Ligustrum seu Cyprus
71 Ligustrinum unguentum
25 Lilium
65 Lilinum unguent.
17 Limonium
Linum
Lithocolla
Lithospermum
Lixiua e crematis ficiramis
77 Lochste
77 Lolium
30. Lonchitis
30. Lora
30. Lotus arbor
30. Lotus satina
45. Lotus syluestris
20 Lotus Aegyptia
Lupinus
48 Lupinus syluestris
31 Lychnis coronaria & agrestis
44 Lycium
83 Lycopsis
83 Lyfimachia
83 Lythum

27.
27.
51.
57.
56
56.
56
54
19.
13
57.
13
61.
43
84
60
26
29.
43
60
77
24
70.
70.
70.
43.
43.
57.
20.
63
64
42

M

83 Macer
83 Mana
83. Meon
83. Magnes lapis
44 Mala punica
56. Mala Persica
75 Mala Agrestia
12. Mala Armeniaca
17. Medicum malum
73 Melimela
12 Melibathrum
80. Matobathrinum unguent.
43 Malua
68. Mandragora
15. Maris cerui genitale
12. Marrubium
15. Marum
78 Medion
57. Medulla animalium
71. Megalium unguent.
48. Mel
62. Melia terra

18
28.
1.
83
22.
23.
23.
23.
24
23.
3
13.
44.
67.
29
58
53
46
61.
31.
13.
35.
84

AA ij

Melilotus	53	Ocimum	63	Pancratium	48.
Melinum unguentum	3	Ocinum unguentum	13	Paronychia	65.
Melomeli	78	Ocinum	45.	Parthenium	59.
Memphites	83.	Oenagra	71	Pastinaca erratica	54.
Mendesium unguentum	13.	Oenanthe	58.	Pastinaca marina	27.
Mentastrium	52.	Oenanthinum unguentum	13	Pedicularis, herba	74.
Mentha sativa	52.	Ocypus	31	περιάφραση	64.
Mercurialis	76.	Olea sativa & sylvestris	21	Pepo	45.
Mespilus	24.	Aethiopicæ Oleæ lacryma	21	Replus, herba	75.
de Metallicis medicamentis	78.	Oleastro oleum	21	Persea arbor	26.
Metopium unguentum	13.	Olecomel	11	Petasites	70.
Milium	42.	Oleum acerbum	10	Petroelinum	55.
Millefolium	70.	Oleum album	10.	Peucedanum	56.
Minium	80.	Oleum commune	10	Phalangium	58.
Misy	81	Oleum mastichinum	12.	Phalaris	60.
Mitula	27	Oleum picinum	16	Phaselus	43.
Morus	25.	Oleum Sicyonium	10.	Phagus & Ilex	21.
Mullus piscis	28	Oleum sylvestris oleæ	10	Phoenix	64.
Multipedes	29	Olusatrum	55.	Phyllum, herba	59.
Mulsium	77.	Olyra	42	Phrygius lapis	82.
Muscus marinus	69.	Omotarichus	28.	Phu. 3. siue Nardus Cretica	
Mures	30.	Omphacites	77	Phycus marinus	69.
Muria	82	Omphacium	77	Phyllitis	58.
Muris auricula	49	Omphacomelites	78	Picea πικρα	15.
Mus araneus	30.	Onobrychis	60.	Picearum eruce	30.
Muscus	7	Ononis	51	Picis fuligo	16.
Mustela domestica	28	Onosma	59	Pinus, πινος	15.
Myagros	71	Ophites	83.	Piper	46.
Myrrha	14.	Originum omne	52	recentium Piscium iusculum	28.
Myrrha boeotica	14	Orminum sativum	59	Pira	24.
Myrrhis	71	Ornithogalum	46	Piraster	24.
Myrtus	23	Orobanche	46	Pissasphaltus	16.
Myrtidatum	23	Orobis	43.	Pistacia	25.
Myrtinum oleum	12	Oryza	42.	Pitydes, πικρις	15.
		Ostifragus avis	29.	Pityusa	75.
		Ostracites	84.	Pix liquida	16.
			72.	sicca Pix	16.
Naptha	16.	Olyris	49	Plantago	44.
Napus	44.	Othonna	29.	Platanus	17.
Narcissus	74	Oua	29.	Plumbago	79.
Narcissinum unguentum	13	candidum Oui	19	Plumbarius lapis	79.
Nardus	2	Oxyacantha	77	Plumbi recrementum	79.
Nardus Celtica	2	Oxalme		Plumbum elotum	79.
Nardus montana	2.			Polemonia	62.
Nardinum unguentum	13.			Polium	58.
Nascapthum	8.			Polycnemum	57.
Nasturtium	46.	Peonia	60	Polygala	72.
Nepeta	52.	Palurus	19	Polygonatum	61.
Nerium	68	Palma	22	Polypodium	76.
Nigella	56.	Palma indica	22.	Pompolyx	79.
Nigellinum oleum	11.	Palma Thebaica	53.	Poterium	51.
Niri spuma	82	Panaces Herculeum	54	Populus alba	17.
Nitrum	82	Panaces Asclepium	54	Populus nigra	17.
pontica Nux	25.	Panaces Chironium	42.	Porrum	46.
Nymphaea	59	Panicum	66	Portulaca	44.
		Papaver erraticum	66.	Potamogeton	69.
		Papaver cornutum	66	Propolis	41.
		Papaver sativum	66.	Prunus	25.
		Papaver spumeum	66.		
Ochra	80				

Pseudo

Pseudoburnium
Pseudodictamnus
Pforium
Pfyllum
Piarica
Pulegium
Pulicaris
Pulmo urfinus
Pulmo suillus
Pulmo agninus
Pulmo marinus
Pumex
Purpure
Pycnocomum
Pyrethrum
Pyrites lapis
Pythema

Q

Quercus
Quinquefolium

R

Radicula
Rana
Rapa sativa
Raphaninum oleum
Raphanus
Resine alie
Rhamnus
Rhaponticum
Rhodi radix
Rhus, flos
Ricininum oleum
Ricinus
Rose
Rosaceum unguentum
Roseipastilli, flos id
Rubia
Rubrica fabrilis
Rubrica Sinopica
Rubus
Rubus Idæus
Rumex
Ruscus
Ruta
Ruta sylvestris

S

Sabina, Spatio
Saccharum
Sagapenum
Salis flos
Sal
Salis spuma seu lanugo

71. Salamandra
52. Salix
81. Salvia
67. Sambucus
48. Sampsuchinum unguentum
52. Sampsuchus
67. Sandaracha
29. Sanguinalis foemina
29. Sanguinalis mascula
29. Sanguis animalium
29. Sapphirus
81. Sarcocolla
26. Sarmenorum vitium cinis
75. Sarxiphagum
56. Satyrium, herba
83. Satyrium alterum
71. Saxifraga
Scandix
Schoenus, eximius
Scilla, onidæa
21. Sciurus
64. Schistum lac
Schistus
Scolopendra marina
Scolymus
48. Scordium
28. Scorodoprasum
43. Scorpioides
11. Scorpio Marinus
44. Scorpio Terrestris
15. Scammonia
18. Selenites
49. Senecio
64. Senecta anguim
22. Sepia
11. Serpillum
74. Serum lactis
20. Sesamoides maius
12. Sesamoides minus
20. Sesamum
60. Sesele
80. Sedum maius
80. Sidium
63. Sideritis
63. Silique
44. Silurus
71. Silybus
53. Sinapi hortense
53. Sinapinum oleum
Sifer
Sifon
Sifymbrium
17. Sium
36. Suis talus
56. Smaris
82. Smilax
81. Smilax hortensis
82. Smilax lentis

30. Smyrnum
21. Smyris lapis
52. Solanum idæum
75. Solanum firsolum
13. Solanum somnificum
53. Sonchus
81. Sorba
61. Sordes statuarum & Gymnastori
61. Sory
31. Sordes palestrarum
83. Sparganium
57. Spina alba
82. Spodium
62. Spondylium
59. Spongie
59. Stacte
62. Stachys
45. Stibium
4. Stichas
48. Steebe
30. Stratiotes aquaticus
30. Stratiotes millefolius
83. Strigmenta balnearum
27. Strobili
51. Styrax
58. Succinum
46. Sulphur
76. Sycomorus
27. Symphytum petraeum
27. Symphytum alterum
75
83.
69.
T
27. Tamarix
27. Taxus arbor
53. Telephium
30. Telline
73. Terebinthus
73. Terra
42. Terra ampelitis
54. Terra ex fornacibus
68. Teste marina
23. Testiculus
63. Testiculus alter
23. Teucrium
28. Tilia
74. Tithymali
46. Thalassomeli
12. Thalictron
44. Thapsia
54. Thelypteris
45. Thlaspi
44. Thunus
30. Thus
28. Thuris cortex
73. Thuris fuligo
46. Thuris manna
73. Thymelea

AA iij

Thymbra	53	Vina concinnata marina aqua	77.	Vinum scilliticum	77.
Thymoxalme	77.	Vina pluribus diuersisq; odoramentis	Vinum è scomoris	78	
Thymus	52.	condita	78.	Vinum è syluestri uua	77
Tomentum	58.	Vina pluribus herbis condita	78.	Viola	58.
Tordylum	54.	Vina uarijs plantis condita	78.	Viola nigra	71
Torpedo	27.	Vini facultas	77	Viperæ carnes	27.
Tragacantha	51.	Vinum	77	Viscum	57
Tragium	65	Vinum album	77	Vitæ	20
Tragium aliud	65	Vinum absinthite	78	Vitis alba	76
Tragus	42.	Vinum aromatite	78.	Vitis nigra	76
Tragus, herba	65	Vinum è baccis lusiperi	78	Vitis syluestris	76
Tribulus	62	Vinum cedrinum	78	Vinifera uitis	77
Trichomanes	72.	Vinum ex cotoneis malis confectum	Vlmus	18	
Trifolium	58		77.	Vnguenta, <i>μνρα</i>	12.
Tripolium	72.	Vinum ficatum	78	Vngulæ caprinæ	29.
Triticum	41.	Vinum hyssopite	78	Vrinæ	32
Trixago	57.	Vinum ex Labruscæ floribus confectum	Vrtica	69	
Tubera	46	etum	78	Vua	77
Tusfilago	58	Vinum loco diffrens	77	Vua passa alba	77
Typha	58.	Vinum melittites	77.	Vulpinus pulmo	29
		Vinum ex Myrti baccis confectum	78		
		Vinum myrteum	78	X	
Veratrum album	71.	Vinum palmecum	78	Xanthion	72.
Veratrum nigrum	73.	Vinum picatum	78	Xyris	63
Verbascus	70	Vinum pincis nucleis conditum	78		
Verbena supina	66	Vinum ex puniceis	78	Z	
Verbenaca recta	66	Vinum resinatum	78		
Vermes terre	30.	Vinum rosaceum	78	Zea	42
Vesicaria	67	Vinum sapore diffrens & mixtione	Zingiber		47
Vetonica	61		77	Zopissæ, <i>ζωπισσα</i>	1

A		Allium sativum multifidum	144. Artemisia maior	145.
Allium sativum amphicarpon		144. Arum		102.
A	BROTONUM candidum, seu foemina	Allium simplex utruq;	144. Asarum	112.
		107 Aloë	210. Asclepias	122.
Abrotonum nigrum mascul.		101. Asparagus		101.
Asfinthium	145 Alsine	159 Asplenium		171.
Asfinthium dulce	145. Amarantus purpureus	168 Aster atticus		140.
Asfinthium Seriphium	205. Anblatum	89 Asragalus, herba		98.
Acacia indica	197 Ammi	127 Astrantia		124.
Acer maior	175. Amomum	195 Auellana Indica		192.
Acer tenuifolia	174. Amygdale minores			
Achillaa	136 Anacardium	198.		
Aconitum monococcum	151. Anagyris	194.	B	
Acorus	203 Anchusa minima	190. Balanus Myrepsica		194.
Adiantum candidum	171. Anemone tenuifolia	93. Balsamella		88.
Adiantum nigrum	172 Anemone tenuifolia altera	151 Bellium		205.
Aëzoum minimum	98 Anisum	151 Bechium		93.
Aëzoum ferratum	92 Anonymus	126. Benzoum		207.
Agalochum	191. Apium sativum	176 Benzoumum oleum		207.
Agrimonia	168 Apium agreste	168 Bistorta		87.
Alchimilla	147. Aranguus	168. Botrys		106.
Allium campestre	143 Argemone	183 Brasma		196.
		135 Brasica agrests		147.

<i>Brassica marina</i>	205. <i>Colchicum nigrum</i>	162. <i>Dorycnium</i>	89.
<i>Brassica sylvestris, utrgata</i>	96. <i>Colchicum subrubens</i>	163. <i>Dracunculus henricophyllus</i>	152.
<i>Bresna</i>	196. <i>Colchicum album</i>	163. <i>Dracunculus palustris</i>	98.
<i>Bryonia alba seu ruffa</i>	116. <i>Colocynthis fungosa & levis</i>	118. <i>Dracunculus polyphyllus</i>	152.
<i>Bryonia nigra</i>	116. <i>Colocynthis grandis, candida</i>	118. <i>Dracunculus primus</i>	152.
<i>Buglossa longifolia</i>	134. <i>Colocynthis grandis, oblonga</i>	114. <i>Drosum</i>	147.
<i>Buglossa urbana</i>	109. <i>Colocynthis grandis, rotunda</i>	115. <i>Drosomeli</i>	211.
<i>Buglossa altera urbana</i>	109. <i>Colocynthis oblonga, glabra</i>	115.	
	<i>Colocynthis turbinata</i>	115. E	
C	<i>Colophonina</i>	209	
<i>Calceatrippa candida</i>	<i>Colymbades</i>	185. <i>Elleborus albus</i>	165.
<i>Caprifolius</i>	159. <i>Conyza Helenitis</i>	160. <i>Endiua</i>	157.
<i>Cardamomum maius</i>	184. <i>Conyza sylvestris, glabra</i>	160. <i>Epimedium</i>	93.
<i>Cardamomum mediocre</i>	195. <i>Conyza sylvestris, hirsuta</i>	160. <i>Eruca maior</i>	124.
<i>Cardamomum minus</i>	195. <i>Conyza oides</i>	216. <i>Eupatorium</i>	168.
<i>Carduus sphaerocephalus</i>	195. <i>Corallodes</i>	151. <i>Eupatorium alterum</i>	169.
<i>Carpesium</i>	87. <i>Coriandrum</i>	126. <i>Euphorbium</i>	210.
<i>Carpobalsamum</i>	195. <i>Cornus foemina</i>	188	
<i>Carum</i>	197. <i>Coronopus sativa</i>	137. F	
<i>Caryophyllus minor aut immaturus</i>	100. <i>Corruda</i>	112	
	<i>Costus albus</i>	201. <i>Faba nigra maior</i>	166.
	196. <i>Costus Arabicus</i>	201. <i>Faba vulgaris</i>	166.
<i>Caryophyllus maior aut maturus</i>	<i>Costus flauus</i>	202. <i>Fausel</i>	193.
	196. <i>Costus Syriacus</i>	202. <i>Ficus</i>	184.
<i>Caryophyllorum fessuae</i>	196. <i>Cotonea mala</i>	181. <i>Filipendula</i>	94.
<i>Casia Aromatica</i>	192. <i>Cotonea malus sylvestris</i>	188. <i>Filix latifolia</i>	134.
<i>Casia folium</i>	199. <i>Cotoneus</i>	181. <i>Filix mascula</i>	169.
<i>Canthamum</i>	206. <i>Crethamum marinum</i>	200. <i>Foenogracum</i>	100.
<i>Centauris</i>	86. <i>Crocus</i>	163. <i>Folia caryophylli</i>	199.
<i>Centaurium maius</i>	201. <i>Cubebe</i>	196. <i>Fragula</i>	173.
<i>Cepa ovata</i>	108. <i>Cuci</i>	193. <i>Fraxinella</i>	94.
<i>Ceruisina</i>	175. <i>Cuculi</i>	197	
<i>Chamaecerasus montana</i>	213. <i>Curcuma longa</i>	203. G	
<i>Chamaecyparissus vulgaris</i>	149. <i>Curcuma rotunda</i>	203.	
<i>Chamaeclema</i>	161. <i>Cucumis anguinus</i>	141	
<i>Chamaedrys</i>	125. <i>Cucumis puniceus</i>	118. <i>Galanga maior</i>	202.
<i>Chamaemesspilus</i>	214. <i>Cucurbita cameraria</i>	116. <i>Galanga minor</i>	202.
<i>Chamaenerium</i>	215. <i>Cucurbita plebeia</i>	116. <i>Galbanum</i>	209.
<i>Chamaepeuce</i>	111. <i>Cuminum sativum</i>	205. <i>Garofinum</i>	156.
<i>Chamaepitys prima</i>	109. <i>Cyclaminus</i>	131. <i>Gentiana</i>	132.
<i>Chelidonium minus</i>	122. <i>Cytisus albus, sylvestris</i>	187. <i>Genista angulosa</i>	189.
<i>Chelidonium palustre</i>	122. <i>Cytisus niger, mator</i>	188. <i>Genista uncea</i>	189.
<i>Chelidonia phragmitis</i>	122	<i>Geranium supinum maius</i>	108.
<i>Chinæa radix</i>	212. D	<i>Gingidium</i>	90.
<i>Chondrilla tenera</i>	142.	<i>Gladiolus palustris</i>	124.
<i>Cicer arietinum</i>	99. <i>Damaconium calliphylon</i>	151. <i>Glycyrrhiza</i>	164.
<i>Cicer nigrum</i>	99. <i>Damaconium tenuifolium</i>	151. <i>Gratiola</i>	86.
<i>Cichorium</i>	141. <i>Dauconides maius</i>	159. <i>Guaiacum</i>	191.
<i>Cichorium sativum</i>	142. <i>Dauconides minus</i>	159. <i>Gummi</i>	209.
<i>Cicuta maior</i>	162. <i>Daucus angulosus</i>	103.	
<i>Cicuta minor</i>	162. <i>Daucus conioophyllus</i>	155. H	
<i>Cinamomum characium</i>	192. <i>Daucus cyanopus</i>	155	
<i>Cinnabari</i>	207. <i>Daucus Selinoides</i>	155. <i>Halicacabus</i>	165.
<i>Citrius arbor</i>	183. <i>Daucus tenuifolius</i>	144. <i>Hammoniacum</i>	210.
<i>Citrus altera</i>	185. <i>Dipsacus sativus</i>	106. <i>Helenium maius</i>	142.
<i>Citrus arbor</i>	182. <i>Dipsacus sylvestris</i>	105. <i>Helianthemum</i>	89.
<i>Cnicus sativus</i>	167. <i>Dolichus</i>	127. <i>Helleborine maior</i>	92.
<i>Cnicus supinus</i>	166. <i>Doronicum</i>	203. <i>Helleborine tenuifolia</i>	92.

Helleborus alter niger	92. Macis seu Macer	193. Oleum Benzoinum	207
Helleborus niger nostrates	102. Mala	179. Oleum eiusq; differentie.	185
Hemerocallis rubens	139. Malua palustris	101. Oleum styracinum	208
Hepatica alba	153. Malua sativa laciniosa	113. Oline	184
Heraclea	110. Malua sylvestris recta	114. Olsenchium	149
Hiberis maior	124. Malua sylvestris, supina	148. Opium	210
Hippia minor	159. Mandragoras albus seu masculus	Opobalsamum	206
Hirci barba	155.	204. Opopanax	210
Hirundinaria	128. Mandragoras niger seu foemina	Orchis	129
Hordeum glabrum	110.	204. Oxyccocum	140
Hyacinthus sylvestris	149. Mastiche	208. Oxyis	173
Hyoscyamus peruvianus	80. Matricaria	161	
Hyssopus sativa	107. Melligetta	195.	
	Melon	117.	P
	Melon moschatellinus	118	
	Melougena	90.	
Imperatoria	124. Mentha corymbifera minor	143. Paeonia foemina	135
Intla	142. Mentha corymbifera maior	153. Palma Christi	130
Inula comagena	202. Mentastrum	156. Palma Christi alia	130
Intybum nauseosum	114. Mercurialis foemina sylvestris	111. Palma montana	150
Iris lutea	134. Mercurialis mascula syl.	111. Panicum	110
Iris nostras sativa	132. Milium Indicum	142. Papauer cornutum	131
Iris sylvestris	133. Millefolium terrestre maius	139. Pardalianches monococcon	151
Iris tenuifolia	133. Millefolium terrestre minus	139. Parietaria	106
Isophyllum	108. Millegrana	98. Parthenium	161
Iuube	158. Morus gallinae	159. Pastinaca nigra sylvestris	100
Iuube minores	199. Moschatella	172. Pentaphyllum palustre	95
Ixopus	104. Myrobalanus	197. Peplus	106
	Myrobalanus dicta Belliricus	198. Perfoliata	103
	Myrobalanus dicta Chebulus	197. Persica minor	190
	Myrobalanus citrina	197. Petasites	123
	157. Myrobalanus Emblicus dicta	198. Peucedanum	125
Lactuca agrestis	209. Myrrha	206. Pepo	118
Ladanon	209. Myxa	199. Phalaris	101
Larigna Resina	185.	Phaeolus seu phaselus	127
Larix	209.	Phasolus minor	101
Lasericium	104. Nardus Celtica	200. Phasolus sativus	101
Lauendula maior	105. Nardus Saliunca	200. Phumaius	102
Lauendula minor	124. Nascaphthum	192. Phyllitis	113
Lepidium maius	138. Nigella	128. Phyllitis lacustris	150
Ligusticum sativum	150. Nigella cornuta, seu sylvestris	128. Piperitis	88
Liliago	86. Nigella Damascena	128. Piper album	196
Limnium	150. Nux Indica	192. Piper longum	196
Limnopence	183. Nux Indica minor	193. Piper nigrum	196
Limonis arboris fructus	183. Nux moschata	193. Pire urbanae	176
Lingula uulneraria	153. Nux moschata mascula	193. Pirus	176
Lithospermum	93. Nux Styracina	194. Pistacia	198
Lotus sativa	126. Nux uonica	194. Pityospermon	143
Lupinus sativus	137. Nymphaea alba	98. Pneumonanthes	162
Lycotonom sativum pentacarpum	Nymphaea citrina	99. Polium maius	124
	145	Polium minus	125
Lycotonom sativum tricarpum		Polyacantha	91
	145	Polychrestum	155
Lycostaphylon foemina	174. Ocimum Charyophyllum	147. Polygalon	127
Lycostaphylus mascula	190. Ocimum Nabathicum	147. Polygonatum	113
	Ocimum nigrum	114. Polygonatum angulosum	113
	Olea	184. Polygonatum tenuifolium	113
Macholebum	204. Oleaster Germanicus	186. Polypodium	171

Portulaca

Portulaca agrestis
Portulaca sativa
Pteridium
Pteridium citrinum
Propolis
Pseudoacorus
Pseudocrania
Pseudocytisus
Psyllion
Pteridion
Pteridion foemina
Pteridion masculum
Pulegium
Punica mala
Punica sylvestris

R

Radix Chinae
Rhodi radix
Ranunculi
Ranunculus minor
Ranunculus palustris
Resina Elemnia
Rha barbarum
Rha indicum
Ricinus
Rorilla
Rosmarinus maior
Rosmarinus minor
Rosmarinus sylvestris
Rosmarinus tenuifolius
Ruta sativa
Ruta sativa maior

156 Scorodonia
156. Sebastia
191. Sena
191. Siliqua Indica
207. Siliquastrum
134. Sinone
187. Sifone
188. Sisyinchion
154. Smilax sativa, seu Lewis
170. Smyrnum
170. Solanum nigrum
169. Solanum puniceum
110. Sonchus asper maior
183. Sonchus asper minor
184. Sonchus Lewis
Sonchus sylvestris
Sorbis aculeata
Sorbis torminalis

212. Stachys
137. Stichas Arabica
119. Staete
121. Stratiotes
119. Struthion
208. Struthiopteris
201. Styracium oleum
201. Sympbytum
141. Sympbytum maius candid.
86. Sympbytum maius purpureis flori-
bus
148. Sympbytum maius rubens
148. Styrax.
148. Styrax liquidus
137
136.

T

Tanacetum
Tanacetum peruvianum
210. Tapsia minor
209. Tarum
86. Tarum crispum
86. Terebinthina Resina
174. Testiculus alius
148. Testiculus bifolius
191. Testiculus candidus
191. Testiculus candidus, odoratus minor
191.
208. Testiculus, herba
144. Testiculus minor
144. Testiculus pumilio
149. Thalictrum nigrum
149. Thalictrum tenuifolium
207. Thamarindus
145. Tamariscus foemina
210. Thamecnemum
199. Thapsia maior
171. Thlaspi cardumoides
146. Thus

91. Thuris cortex
199. Thuris manna
87. Thymbra
194. Thymbra sativa
88. Thymelea maior
132. Thymelea minor
132. Thymus capitatus
122. Thymus nostras
127. Tithymallus pentactonius
158. Tordylon
158. Tormentilla
158. Tragacanthum
157. Tribulus lacustris
157. Trichomanes
157. Trifolia, arbor
139. Trifolium Palustre
176. Trinitas
175. Triticum Bactrianum
146. Tulipa Turcarum
105. Turbitum
206
139
124
171
208. Verbascum leptobryllon
131. Vesicarium Solanum
167. Vetonica
Vetonica alba
167. Victoralis foemina
167. Vlmus
207. Vrtica minor
208

X

Xanthion
154. Xiris sylvestris
92. Xylobalsamum
204
192
192
208.
129. Zedoaria
130. Zingiber
129. Zizypha
Zuccharum
130. Zuchagrandis, rotunda, glabra
129. Zucha maior, rotunda
129. Zucha maior, longa
130. Zucha rotunda mediocris
97. Zucha rotunda, minor
97. Zuzumbetum
197
186.
104.
202
108
208

INDEX


Sacharum
Sagapenum
Sagitta
Salsifora
Sambucus aquatica
Samsuchus
Sandalum album
Sandalum citrinum
Sandalum rubrum
Sandarax
Sanguisorba maior
Sanguisorba minor
Santonium maius
Santonium minus
Sarcocolla
Satureia
Scammonium
Schoenus
Scolopendrium
Scolymus


uam obferuationum.

Lapides

Lapides ferrarij	218	
Lapis ferrugineus	219.	O
Lapis molochites	220	
Lapis ostracites	219.	Ochra lapidosa, &c.
Lapis ruffus, &c.	219.	Ochra rubiginosa
Larix arbor	223	Oleatri peculiare genus
Lateres Augusta & Nurenbergæ	220	Onyx pulcherrima
Et	223	Onyx simplex
Lepidium maius sponte ubi nascitur		Ostracites lapis
	221	Ophioglossus
Lentiscides	223.	Orchocarpium peculiare genus
Lignum carbonis	218	Orifella quid
Lilium sylvestre	221.	Orphus piscis
Lunaria	221.	
Lupinus quidam Indicus	223	P
Lutum figulinum	218	
Lutum suffusum	220	Petroselinum Indicum
Lycostonum aconitum purpureo		Piper Aphricanum
re.	221.	Piper Aphricum aliud
Lycostonum floribus coeruleis	221.	Pisciculi in fisco pallidi
Lycostaphylos mascula	223	Piscis planus
Lycus amnis	219	Piscis uolitans
Lynum ostrie arboris	219.	Phleon
Lysimachia minor	223.	Pseudocrantia arbor
		Pseudocyperus
		Pulmo marinus
		Pumex candidus, &c.
M		
Magnes fissilis	218	
Magnes lapis	218	R
Magnes ultramarinus	218	
Maie	221.	Radices in carbonem crematæ
Marmoris alia species	219.	Radix speciei cardopacie maioris
Marmor aliud pulcherrimum	220	Ramulus quidam
Marmor calcarium	220	Refina quædam uitrea
Marmor mensarum candid.	219.	Rhamni nigri fructus qualis
Marmor planum, &c.	218	Rhus frutex
Marmor purpureum, &c.	219.	Ricinus quidam
Marmor Salisburgense	220	Rubea sylvestris
Marmorosum saxum	220	Rubrica dura
Materia peregrina arboris	223.	Rubrica ruffa
Melissophyllon sylvestre	223	Rubrica lapidis Hematidis
Melon citrinus Indicus	222	Rubrica uersicolor
Melon citrinus Indicus alius	222	Rumicis species
Melon indus	223	Ruta quædam sylvestris
Mentastrium odoratum	221.	
Mentastrium uulgaris simile	221.	S
Monocloño Artemisie herba non dis-		
similis	223.	Sal in plateis, &c.
Motacilla auis species	224.	Sandali rubræ species peculiaris
Minium	220	Saxum durum
Muscus quidam	221	Sarda
Myrrha quædam species	223.	Sardonix
		Saxum eminens & candidum in cine-
		reo.
		Saxum ex Thermis genitum
N		
Nucleus quidam Indicus	223.	Saxum ferrugineum
Nux pineæ similis	223	Saxum marmorosum

Semen herbæ cuiusdam umbelliferae	222.	
Semen aliud cuiusdam herbæ umbelliferae	219.	fera
	223.	Seriphium
	223	Smagelon piscis
	220.	Simia porcaria
	218	Similaces Indicae
	219.	Spermatis ceti genus
	221.	Spina Indica materia
	223	Stannum purissimum
	221	Stanni uena
	224.	Stecindolen
		Steinraben
		Styrax arbor
		Subulones
	223.	Sulphur
	222	
	222	
	224.	T
	224.	
	223.	Tæda arbor
	222.	Tamariscus semina
	223	Terra salsa ubi
	223	Terra uitiosa ubi
	223.	Terra purpurea ubi
	220	Tesudines
	224.	
		Thermæ calidæ & frigide quid
	219	
		Thermæ Caroli
	218.	
		Thermæ factitiæ
	219	
	220.	Thermæ in Suguia Vuirtenberg.
	223.	Thermæ Mattiacæ
	221.	Thlasi quoddam minutum
	223.	Thelicerania
	222.	Thymelæa minor
	222	Tilia grandis
	222.	Tractus inter Culmam acutam, & E-
	221	lebogium quid
	220.	
	218.	Tragus sylvestris
	218.	Trifolia arbor
	220	Turchoides
	218	
	223.	
	221.	V
		Vena gemmea
	22	
		Viola equina
	221.	
	219	Viscum in populo nigra
	222.	
	223.	Vrphus piscis
	214.	
	218.	
	218	X
	218	
	218	
		Xris minor
	223	
	219	
	219	Z
	219	
	220	Zinsein
	218	






Note on the Illustrations in this book

The woodcuts in this book are curiously good and in most cases there is little or no difficulty in recognizing the plant figured. There are in all something over 270 of them.

On page 85, in a letter from Conrad Gerner to Jerome Mercurius of Leipzig the source of these cuts is very fully explained. Some 220 of them are taken from "Tragus" (Le Boncompagni) Hier. R. H. 2^d edition 1546. (the first edition having illustrations). Each cut so used is acknowledged by the reference to Tragus' work printed over it. More on pp 174, 176 177 & 184 are especially characteristic of Tragus and Mercurius gave him the title of "Homo Sicularis" - Tragus died at Hornbach 1554.

Gerner says that none of the drawings were made expressly for this book with the exception of a few by himself. He prints Rinkelius appears to have had a number which were made use of. The drawing of the Lycopodium on p 211 is from the Cornuographia of Munster.



Cordus, Valerius:— Son of Emericus Cordus (author of a treatise on the English sweating sickness. Fribourg 1529) was born at Neire-Camel in 1515. He travelled all over the mountains of Germany & various parts of Italy by a life simple & chief of a wound in the leg, caused by a kick from a horse, in 1544. The following distich is inscribed on his tomb:—

*Ingenio superest Cordus, mens ipsa recepta est
Caelo; quod terra est, maxima Roma tenet.*

His works are:—

- (1) "Remarks on Diseases" Zurich 1561
- (2) *Historia Stirpium*. Libri V. Starburg, 1561 & 1563
- (3) *Dispensatorium pharmacorum omnium*, Leyden 1627.

Conrad Gerner: He "Pliny of Germany" was born at Zurich 1516 was the first professor of Greek at the University of Housanne. He was afterwards for 24 years professor of Philosophy at Zurich. Died of the plague in his museum Decr 13-1565. At the time of his death, without issue, there were living descendants of his uncle Andrew Gerner 135 persons of three generations.

He left 1500 botanical figures of which over 1000 were published in the *Epitome of Matthioli* published by Camerarius in 1586. Of these 948 were again used by Luffenbach for the herbal of Castor Duranto, thence they passed to Goerlin a bookeller of Ulm and were used for the "*Parnassus medicinalis illustratus*" of Becker. 1663. In 1678 they were used in a German Herbal by Bernard Vöszöcher. They appeared again in the "*Herbarium Botanicum*" of Zorniger, Basle 1696 & Carey in a later edition of the same work in 1753

Pulteney's sketches

Book plates of the Earl of Argyllford & John Earl of Minto